

KALENDARZ LEKARSKI

KRAKOWSKI

NA ROK

1906

Na wezwanie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego

ułożył

Dr TEODOR CYBULSKI

ROK SZESNASTY

W KRAKOWIE

NAKŁADEM KSIĘGARNI S. A. KRZYŻANOWSKIEGO

Druk W. L. Anczyca i Spółki.

1906



15

Medyc. 1906 3596/XV

Biblioteka Jagiellońska



1003120789

SPIS RZECZY.



	Str.
Kalendarz kościelny	I
Spis środków leczniczych	1
Nowe środki lecznicze	69
Najwyższe dawki środków leczniczych	81
Dawki przeciętne dla dzieci	83
Tablica brzemienności	85
Tablica rozwoju płodu	86
Oznaczanie okresu ciąży	87
Tablica wyrzynania się zębów	88
Wody mineralne i normalne	89
Podręcznik terapeutyczny	93
Choroby oczu	206
Choroby uszne	223
Otrucia	239
Badanie moczu	254
Wskazówki o kąpielach miner.	259
Skorowidz zdrojowisk	264
Uwagi sądowo-lekarskie	282
Część informacyjna	296

42 819
T



STYCZEŃ

JANWAR

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE	ŚWIĘTA RUSKIE
1 P.	Nowy Rok. Mieczysł.	19 Dekabr. Wonyfat.
2 W.	Makarego op. i Mart. ☿	20 Ihnatyja mucz.
3 Ś.	Daniela m. i Genowefy	21 Juljanyi
4 C.	Eugeniusza bisk.	22 Anastazyia m.
5 P.	Telesfora i Emiliany	23 Mucz. 10 K.
6 S.	Trzech Króli	24 N. Otec. Wigil. do Rożd.
7 N.	1 po 3 Kr. Juliana i Luc.	25 Roźdest. Chryst.
8 P.	Seweryna M.	26 Sob. Pr. Bohor.
9 W.	Marcyanny p., Wit.	27 Stefana mucz.
10 S.	Agatona i Wilhelma ☺	28 20 tys. Mucz.
11 C.	Higina pap. i Honor.	29 14 tys. ubit. Mład,
12 P.	Arkadyusza b.	30 Anysyi mucz.
13 S.	Gotfryda i Leonc.	31 Mełanyi prep.
14 N.	2 po 3 Król. Im. Jez.	1 SICZEN 1906.
15 P.	Pawła I. p.	2 Sylwestra p.
16 W.	Marcelego op. i Włodz.	3 Małachia pror.
17 S.	Antoniego op. wyzn. ☾	4 70 Apost.
18 C.	Kat. św. Piotra w Rz.	5 Wigil. do Bohaj.
19 P.	Ferdynanda i Henryka	6 Bohojawł. Hosp.
20 S.	Fabiana i Sebastyana	7 Sobor S. Joan.
21 N.	3 po 3 Kr. Św. Rodz.	8 N. po Prośw. Heor.
22 P.	Wincentego	9 Polyjewkta
23 W.	Zaśl. NMP. Rajmunda	10 Hryhoria jep.
24 S.	Tymoteusza b. m. ☿	11 Fteodosya prepod.
25 C.	Nawróc. ś. Pawła.	12 Tatyany mucz.
26 P.	Polikarpa i Pauli	13 Jermyla m.
27 S.	Jana Chryzostoma b.w.	14 SS. Otec. w Syn.
28 N.	4 po 3 Kr. Walerego	15 N. o Zakcheju Pawła
29 P.	Franciszk. S.	16 Petra Weryho
30 W.	Martyny i Hyacynty	17 Antonyia Wył.
31 Ś.	Piotra Nolasko i Marc.	18 Athanasia.

KALENDARZ ŻYDOWSKI

7 — 10 Tebet Post.

27 — 1 Schebat.

ODMIANY KSIĘŻYCA

☿ dnia 2 o g. 3 m. 50 w.

☾ dnia 17 o g. 9 m. 47 wiecz.

☺ dnia 19 o g. 5 m. 35 w.

☿ dnia 24 o g. 6 m. 7 wiecz.

LUTY

FEWRAŁ

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE		ŚWIĘTA RUSKIE
1 C.	Wig. Brygidy p. i Ign. ☽	19	Makarya prep.
2 P.	Oczyszcz. NMP. Wawrz.	20	Jeufymya
3 S.	Błażeja b. m. i Hipol.	21	Maksyma prep.
4 N.	5 po 3 Kr. Ansgarego	22	N. O. Mytar. i Far.
5 P.	Agaty p. m.	23	Klymenta j.
6 W.	Doroty p. i Tytusa b.	24	Xenyi prep.
7 S.	Romualda op. wyz.	25	Hryhoria bohos.
8 C.	Jana z Malty i Cyr.	26	Xenofonta prepod.
9 P.	Apolonii i Cyryla ☺	27	Joanna Zlat.
10 S.	Scholastyki p. i Wilh.	28	Jewrema prepod.
11 N.	N. Starozap. Obj NMP.	29	N. O błud. syni.
12 P.	Modesta m. i Eul.	30	Trech światyteli
13 W.	Modl. P. J. w Ogrojcu	31	Kyra i Joana mucz.
14 S.	Walentego kapł. m.	1	LUTYJ.
15 C.	Faustyna i Georgii p.	2	Strytenie Hosp.
16 P.	Julianny p. męcz. ☾	3	Symeona b.
17 S.	Alexego Falkoneri	4	Izydora prep.
18 N.	N. Mięsop. Symeona b.	5	N. Miasopustn.
19 P.	Konrada w.	6	Wukoła pr.
20 W.	Wspom. M. P. Leona b.	7	Partaftenya prep.
21 S.	Eleonory i Fort.	8	Fteodora.
22 C.	Kat. św. Piotra w Ant.	9	Nykyfora m.
23 P.	Piotra Dam. i Flor. ☼	10	Charalampia
24 S.	Macieja apost. i Serg.	11	Własya jep. m.
25 N.	N. Zapustna Zygryda	12	N. Syropustn.
26 P.	Aleksandra b.	13	Martyniana p.
27 W.	Stupa bicz. Juliana m.	14	Auxrntia prep.
28 Ś.	Popielec. Romana	15	Onysyma.

KALENDARZ ŻYDOWSKI

10 — 13 Post Estery. 12 — 15 Schuschau Purim.
 11 — 14 Purim. 26 — 1 Adar.

ODMIANY KSIĘŻYCA

☽ dnia 1 o g. 1 m. 29 wiecz. ☾ dnia 16 o g. 5 m. 20 r.
 ☺ dnia 9 o g. 8 m. 43 wiecz. ☼ dnia 23 o g. 8 m. 55 rano.

MARZEC

MART

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE	ŚWIĘTA RUSKIE
1 C.	Albina b. i Antoniny	16 Panfyla mucz.
2 P.	<i>Cier. Kor. P. J.</i> Heleny	17 Fteodora m.
3 S.	Kunegundy ces. ☽	18 Lwa Papy Rzymsko
4 N.	1 Postu. Kazimierza kr.	19 N. 1 Weł. Posta. Archyp.
5 P.	Hadryana i Ger.	20 Lwa episk.
6 W.	Marcyana i Kolety	21 Tymoftea prepod.
7 S.	<i>Snch.</i> Tomasza z Akw.	22 SS. Mucz. w Ef.
8 C.	Jana Bożego w.	23 Połykarpa jep.
9 P.	<i>Such.</i> Franciszki	24 Obr. Hł. Joan.
10 S.	<i>Such.</i> 40 Męczenn. ☽	25 Tarasia archiep.
11 N.	2 Postu. Konstant.	26 N. 2 Weł. P. Porfiryra
12 P.	Grzegorza W.	27 Prokopia
13 W.	Katarz. bon. i Krystyny	28 Wasyliia prepod.
14 S.	Leona b. i Matyldy	1 MART. Jowdoki mucz.
15 C.	Klemensa i Lon.	2 Freodora mucz.
16 P.	<i>Syn P. J.</i> Hilarego b.	3 Jewtropia mucz.
17 S.	Gertrudy p. ☽	4 Harasyima prepod.
18 N.	3 Postu. Gabr.	5 N. 3 Posta Krestopokton.
19 P.	<i>Józefa Obl. NMP.</i>	6 SS. 42 Mucz.
20 W.	Klaudyi, Eufem. i Teo.	7 Wasylija.
21 S.	Benedykta op. i Fil.	8 Ftefylaka m.
22 C.	Katarzyny p.	9 SS. 40 Muczen.
23 P.	<i>5 Ran P. J.</i> Wiktoryana	10 Kondrata
24 S.	Tymona i Szymona	11 Sofronia prepod.
25 N.	4 Postu Zwiast. NMP. ☽	12 N. 4 Weł. P.
26 P.	Dyzmy i Eman.	13 Nykofora patr.
27 W.	Jana Dam. i Lidy	14 Wenedykta prep.
28 S.	Jana Kapis. i Sykstusa	15 Ahapia muczen.
29 C.	Wiktoryna i Eustach.	16 Sawyna
30 P.	<i>Krwi P. J.</i> Zozyma	17 Aleksia prepod.
31 S.	Kornelii i Balbiny p.	18 Kyryła archiep.

KALENDARZ ŻYDOWSKI

27 — 1 Nisan.

ODMIANY KSIĘŻYCA

☽ dnia 3 o g. 10 m. 26 rano.

☾ dnia 17 o g. 12 m. 55 w.

☾ dnia 10 o g. 9 m. 15 w.

☽ dnia 25 o g. 12 m. 51 rano.

KWIECIEŃ

APRIEŁ

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE	ŚWIĘTA RUSKIE
1 N.	Męki Pańsk. Hug.	19 N. 5. Weł P. Chrysanfta
2 P.	Franciszka z P. ☸	20 Prep. O. w Ob. S.
3 W.	Ryszarda i Maryi Eg.	21 Jakowa prep.
4 S.	Izydora b. w d. k.	22 Wasyliya jep.
5 C.	Wincentego Ferd.	23 Nykona prebod.
6 P.	7 Bol. NMP. Celestyna	24 Artemia.
7 S.	Epifaniasza b.	25 Błah. P. Bohor.
8 N.	Palmowa Dyonizego	26 N. Cwitonosna Sobor. H.
9 P.	Marcela ☺	27 Matrony mucz.
10 W.	Ezechiela i Makarego	28 Izariona
11 S.	W. S. Leona W. pwdk.	29 Marka prepod.
12 C.	Wiecz. P. Zenona bm.	30 Maryi I. W. Czet.
13 P.	W. P. Hermenegilda m.	31 Piatok Weł. Ipatya
14 S.	Wcelka Justyna	1 APRIEŁ. Sob. Weł.
15 N.	Wielk. Zmartw. P. J. ☾	2 N. Woskresenie.
16 P.	Wielkanocny. Lamberta	3 Pon. świtłyj.
17 W.	Aniceta p. i Stefana	4 Wtor. świtłyj.
18 S.	Apoloniusza m.	5 Fteodula mucz.
19 C.	Tymona dk. i Jerz,	6 Jawtychia jepisk.
20 P.	Wiktora m. Antoniego	7 Hrehoria prep.
21 S.	Anzelma i Sym.	8 Iridiona ap.
22 N.	Biała 1. po Wielk. Sotera	9 N. Antipaschy. Antypy.
23 P.	Wojciecha ar. ☸	10 Terentia mucz.
24 W.	Fidelisa i Egb.	11 Antypy jepisk.
25 S.	† Marka ew. i Erm.	12 Wasyliya prep.
26 C.	NMP. Dobr. Rady	13 Artcmona j.
27 P.	Anastazego i Teofila	14 Martyna papy.
28 S.	Pawła od Krzyża	15 Arystarcha
29 N.	2 po W. Grobu P. J.	16 N. Myronosyc.
30 P.	Katarzyny panny	17 Symeona pr.

KALENDARZ ŻYDOWSKI

6 — 1 Nisan.

10 — 15 Początek Paschy.

16 — 21 Siódme święto.

11 — 16 Drugie święto.

17 — 22 Ósme święto.

26 — 1 Ijar.

ODMIANY KSIĘŻYCA

☸ dnia 2 o g. 5 m. 00 rano.

☾ dnia 15 o g. 9 m. 34 wiecz.

☺ dnia 9 o g. 7 m. 10 rano.

☸ dnia 23 o g. 5 m. 4 wiecz.

MAJ

MAJ

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE		ŚWIĘTA RUSKIE
1 W.	Filipa i Jakóba ☽	18	Joana prep.
2 S.	Zygmunta kr. i Anat.	19	Joana węł.
3 C.	Znal. Krzyża św., Aleks.	20	Fteodora prepod.
4 P.	Floryana m. i Mon.	21	Januaria m.
5 S.	Piusa pap.	22	Fteodora Syk.
6 N.	3 po Wiel. Op. ś. Józ.	23	N. O roslablenom.
7 P.	Domiceli i Ben.	24	Sawwy mucz.
8 W.	Stanisława bisk. krak. ☼	25	Marka
9 S.	Grzegorza z Naz.	26	Wasyłya
10 C.	Izydora roln. Anton.	27	Symeona jm.
11 P.	Mamerta b. i Franc.	28	Jasona apost.
12 S.	Pankracego, Nere.	29	Dewiat mucz.
13 N.	4 po W. Serwacego b.	30	N. O Samarianym. Jak.
14 P.	Bonifacego męcz.	1	MAJ. Jeremy pr.
15 W.	Zefii, Jana Chrz. ☾	2	Aftanasya, Bori ul ł.
16 S.	Jana Nep. i Ubalda	3	Tymoftea mucz.
17 C.	Paschalisa w. i Brun.	4	Pelahyi mucz.
18 P.	Feliksa, Eryka	5	Iryny mucz.
19 S.	Piotra, Celestyna	6	Jowa.
20 N.	5 po Wielk. Bernardyna	7	N. O śliporożdenom.
21 P.	† Tymot. i Wikt.	8	Joana Bohosław
22 W.	† Faust. Emila, Heleny	9	Nikołaja.
23 S.	† Andrzeja Bob. ☼	10	Symona Apost.
24 C.	Wniebowstap. P. J. Dez.	11	Wosn. Hosp. Mokia m.
25 P.	Grzegorza VII i Urb.	12	Jepyfania j.
26 S.	Filipa Nereusza w.	13	Hłykeryi mucz.
27 N.	Po Wnieb. Bedy w. d.	14	N. Swiat. Otec. Isydora
28 P.	Augustyna	15	Pachomya Weł.
29 W.	Maryi M. Pazzi i T.	16	Fteodora, Modesta
30 S.	Feliksa i Ferdynanda	17	Andronika.
31 C.	Anieli i Petroneli ☾	18	Fteodora prepod.

KALENDARZ ŻYDOWSKI

13 — 18 Ijar. Lag-B'omer. 31 — 7 Drugie święto.
30 — 6 Siwan. Zielone święto. 21 — 1 Siwan.

ODMIANY KSIĘŻYCA

☽ d. 1 o g. 8 m. 5 wieczór ☾ d. 15 o g. 8 m. 00 rano.
☼ d. 8 o g. 3 m. 7 wieczór ☿ dnia 23 o g. 8 m. 58 w.
♂ dnia 31 o godz. 7 m. 21 rano.

CZERWIEC

I JUN

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE	ŚWIĘTA RUSKIE
1 P.	Jakóba i Fort.	19 Patrykia jepisk.
2 S.	Wig. Marcelina i Eugen.	20 Ftałatea muczen.
3 N.	Zesł. Ducha św. Erazma	21 N. Sosz. S. Ducha.
4 P.	Świat. Franciszka	22 Preśw. Trójcy
5 W.	Bonifacego i Faustyna	23 Michaiła pr.
6 S.	Such. Norberta i P. ☺	24 Symeona prepod.
7 C.	Roberta op. i Sabiny	25 Tretye Obritenyie
8 P.	Such. Medarda i Wilh.	26 Ob. Hławy, ś. Joan.
9 S.	Such. Felicyana m.	27 Fteraponta
10 N.	1 po Sw. Trójcy Prz.	28 N. 1 po S. D. W. Świat.
11 P.	Barnaby Apostoła	29 Fteodosyi mucz.
12 W.	Eschil, Jana i Onufr.	30 Isaakia prep.
13 S.	Antoniego z Padwy ☼	31 Jermia apost.
14 C.	Boże Ciało. Bazylego	1 IJUN. Justyna mucz.
15 P.	Wita i Modesta	2 Nykyfora patr.
16 S.	Benona, Justyny	3 Łukilya
17 N.	2 po S. Adolfa, Jolan.	4 N. 2 po S. Mytrofana
18 P.	Marka i Marcelego	5 Dorotfteja
19 W.	Julianny Falkoner.	6 Wysaryona prep.
20 S.	Sylwerego i Florent.	7 Fteodora jep.
21 C.	Alojzego Gonzagi w. ☼	8 Fteodora mucz.
22 P.	Serca Jez. Paulina b.	9 Kyryła arch.
23 S.	NP. Nieust. Pom.	10 Tymoftea jep.
24 N.	3 po S. Nar. św. Jana	11 N. 3 po S. Warfiołomea
25 P.	Wilhelma op. i Febr.	12 Onyfrya prep.
26 W.	Jana i Pawła br. mm.	13 Akityły m.
27 S.	Władysława kr.	14 Jetyyssea pror.
28 C.	Wigil. Leona i Iren.	15 Amosa pror.
29 P.	Piotra i Pawła ap. ☼	16 Tychona prep.
30 S.	Wsp. św. Pawła Lucyn.	17 Manniła mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI

24 — 1 Thamuz.

ODMIANY KSIĘŻYCA

☺ dnia 6 o g. 10 m. 9 wiecz.

☼ dnia 22 o g. 12 m. 3 rano.

☼ dnia 13 o g. 8 m. 34 w.

☼ dnia 29 o g. 3 m. 17 wiecz.

LIPIEC

LIPIEC

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE	ŚWIĘTA RUSKIE
1 N.	4 po Sw. Krwi P. J.	18 N. 4 po S. Leontia mucz.
2 P.	Nawiedz. N. M. P.	19 Judy Ftad. apost.
3 W.	Anatola b. i Heleny	20 Meftodia.
4 S.	Józefa Kalasantego	21 Julgana mucz.
5 C.	Antoniego Zac.	22 Jewsewya jep.
6 P.	Izajasza pr. i Dom. ☽	23 Ahrypiny m.
7 S.	Cyryla i Metodego	24 Roźdest. S. Joanna Kr.
8 N.	5 po Sw. Jana z Dukli	25 N. 5 po S. Fewronyi
9 P.	Weroniki i Mik.	26 Dawyda prepod.
10 W.	7 Braci MM. Aleksan.	27 Simeona.
11 S.	Piusa p. i Pelagii	28 Kyra i Joanna
12 C.	Jana Gwalberta i Marc.	29 Petra i Pawła Apost.
13 P.	Małgorzaty p. ☾	30 SS. 12 Apost.
14 S.	Bonaw. b. w. i Marc.	1 IJUŁ. Kośmy i Dam.
15 N.	6 op Sw. Rozest. Apost.	2 N. 6 po S. Poł. Ryzy
16 P.	N. M. P. Szkapl.	3 Jakynfta mucz.
17 W.	Aleksego. i Marceliny	4 Andreia arch.
18 S.	Szymona z Lipnicy	5 Aftanasia Afron.
19 C.	Wincent. à Paulo	6 Sysoa prepod.
20 P.	Czesława i Hieronima	7 Ftomy prepod.
21 S.	Daniela i Praksedy ☼	8 Prokopya mucz.
22 N.	7 po Sw. Maryi Magd.	9 N. 7 po S. Pankratya
23 P.	Apolinarego i Lib.	10 SS. 45 Muczenikow
24 W.	Krystyny i Franc.	11 Enfimia.
25 S.	Jakóba apost. i Krzysz.	12 Prokta mucz.
26 C.	Anny Matki NMP.	13 Hawryła arch.
27 P.	Pantaleona i Aurelii	14 Akyły apost.
28 S.	Botwida i Wiktora ☽	15 Kyryka mucz.
29 N.	8 po Sw. Kunegundy	16 N. 8 po S. Aftynohema
30 P.	Abdona i Julity	17 Maryny mucz.
31 W.	Ignacego Loy. Heleny	18 Jemyfyana mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI

10 — 17	Thamuz.	Zdob. świąt. Post.
23 — 1	Ab.	
31 — 9	Post.	Spalenie świątyei

ODMIANY KSIĘŻYCA

☽	dnia 6 o g. 5 m. 25 rano.	☾	dnia 21 o g. 1 m. 57 wiecz.
☾	dnia 13 o g. 11 m. 10 rano.	☽	dnia 28 o g. 8 m. 54 wiecz.

SIERPIEŃ

AWHUST

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE		ŚWIĘTA RUSKIE
1 S.	Piotra w Ok., Faust.	19	Makryny prepod.
2 C.	NMP. An. i Alfonsa	20	Ilyi proroka
3 P.	Znal. św. Szczepana	21	Symeona prepod.
4 S.	Dominika wyzn. ☸	22	Maryi Mahdał.
5 N.	9 po Sw. NMP. Śnież.	23	N. 9 po S. Tryfoma m.
6 P.	<i>Przem. Pańskie</i>	24	Chrystyny mucz.
7 W.	Kajetana w. Donata	25	Uspen. ś. Anny.
8 S.	Cyryaka i Emiliana	26	Jermołaja m.
9 C.	Romana i Juliana	27	Pantaleimona mucz.
10 P.	Wawrzyńca ar. i Pauli	28	Prochora apost.
11 S.	Tyburcego., Zuzan.	29	Kałynyka mucz.
12 N.	10 po Sw. Klary ☸	30	N. 10 po S. Syły apost.
13 P.	Hipolita, Kas. i Rad.	31	Zapust. do Uspen.
14 W.	<i>Wig. Euzeb. i Atanaz.</i>	1	AWHUST. Prois. K.
15 S.	Wniebowzięcie NMP.	2	Stefana mucz.
16 C.	Rocha w. i Tarsyc.	3	Isakya prepod.
17 P.	Liberata op. m.	4	Sedmy Otrokow.
18 S.	Agapita m. i Fir.	5	Jewsychnyia m.
19 N.	11 po Sw. Jacka w.	6	N. 11 po S. Preobr. Hosp.
20 P.	Bernarda op. ☸	7	Dometya
21 W.	Joanny Franciszki de Ch.	8	Emiliana.
22 S.	Tymot., Hip. i Ant.	9	Mafty a apost.
23 C.	Filipa Ben. i Wal.	10	Ławrentya m.
24 P.	Bartłomieja apost.	11	Jewpła mucz.
25 S.	Ludwika kr. i Patr.	12	Fotya mucz.
26 N.	12 po Sw. Zefiryna	13	N. 12 po S. Maksyma
27 P.	Przen. ś. Kaz. ☸	14	Michea pror.
28 W.	Augustyna b. w. d. k.	15	Uspenye Bohor.
29 S.	Ścięcie św. Jana i Sab.	16	Nerukotw. Obraz.
30 C.	Róży i Feliksa	17	Myrona mucz.
31 P.	Rajmunda w. i Paul.	18	Flora i Ławra mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI

22 — 1 Elul.

ODMIANY KSIĘŻYCA

- ☸ dnia 4 o g. 1 m. 57 wiecz. ☸ dnia 20 o g. 2 m. 25 rano.
 ☸ dnia 12 o g. 3 m. 45 rano ☸ dnia 27 o g. 1 m. 42 rano.

WRZESIEŃ

SENTIABR

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE	ŚWIĘTA RUSKIE
1 S.	Broniśł. p. i Idziego	19 Andrea mucz.
2 N.	13 po Sw. <i>Joachima</i>	20 N. 13 po S. Samuila pr.
3 P.	Józefa Kal. ☺	21 Ftaaddea apost.
4 W.	Rozalii Palermo i Róży	22 Agatonika
5 S.	Wawrzyńca i Just.	23 Łuppa mucz.
6 C.	Zacharyasza pr.	24 Jewtychia mucz.
7 P.	Wig. Anast. i Reg.	25 Warftołom
8 S.	Narodzenie N. M. P.	26 Adryana mucz.
9 N.	14 po Sw. Im. Maryi	27 N. 14 po S. Primena pr.
10 P.	Mikołaja z T. ☾	28 Moysea muryna
11 W.	Prota i Jacka mm. T.,	29 Usikn. Hł. Joanna.
12 S.	Waleryana m. i Gw.	30 Aleksandra p.
13 C.	Filipa Al. i Amata	31 Położ. Pol. P. C.
14 P.	Podwyższ. † św.	1 SENTIABR. Symeona St.
15 S.	Nikomedesa m.	2 Mamanta m.
16 N.	15 po Sw. 7 Bol. MP.	3 N. 15 po S. Anftyna m.
17 P.	Piętna ś. Franciszka	4 Wawyły Swiasz.
18 W.	Józefa z Kop. Zofii ☼	5 Zachariji
19 S.	Such. Januarego z t.	6 Wosp. cz. Mychaila
20 C.	Eustachego z t., F.	7 Sozonta mucz.
21 P.	Such. Mateusza ap.	8 Roźdestwo Bohorod.
22 S.	Such. Tomasza z Wil.	9 Joakima i Anny
23 N.	16 po Sw. Lina p. m.	10 N. 16 po S. Mynodory p.
24 P.	NMP. Wyk. i Ger.	11 Fteodory prepod.
25 W.	Władysława i Kleof. ☽	12 Awtenoma.
26 S.	Cypryana p. i Justyny	13 Kornyla mucz.
27 C.	Kosmy i Damiana	14 Wodwyżenie Cz. Kr.
28 P.	Wacława męcz.	15 Nykity m.
29 S.	Michała arch.	16 Jowfimy
30 N.	17 po Sw. Hieron. w.	17 N. 17 po S. Sofii mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI

20 — 1 Tischri.	Nowy Rok 5666.
21 — 2 Drugie Święto.	22 — 3 Post Gedalja
29 — 10 Święto Pojednania.	

ODMIANY KSIĘŻYCA

☺ dnia 3 o g. 12 m. 34 rano.	☼ dnia 18 o g. 1 m. 31 wiecz.
☾ dnia 10 o g. 9 m. 51 wiecz.	☽ dnia 25 o g. 7 m. 9 rano.

PAŹDZIERNIK

OKTIABR

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE	ŚWIĘTA RUSKIE
1 P.	Remigiusza i J.	18 Jewmonia
2 W.	Aniołów Stróżów. ☺	19 Trofyma.
3 S.	Kandyda m. i Gerarda	20 Jewstajya mucz.
4 C.	Franciszka Ser.	21 Kondrata ap.
5 P.	Placyda i Flawii p.	22 Toky mucz.
6 S.	Brun., Rom. i Marc.	23 Zacz. S. Joana
7 N.	18 po Sw. NMP. Róż.	24 N. 18 po S. Ftekly m.
8 P.	Laurencyi i Pel.	25 Jewfrosini prep.
9 W.	Dionizego i Ludwika.	26 Joanna Bohos.
10 S.	Franciszka Borg. ☾	27 Kołystrata mucz.
11 C.	Germana, Firm. bw.	28 Charytona pr.
12 P.	Maksymiliana b.	29 Kyryaka prpod.
13 S.	Edwarda kr. i Chel.	30 Hryhora mucz.
14 N.	19 po Sw. Winc. K.	1 OKTIABR. N. 19 po S.
15 P.	Jadwigi i Teresy	2 Kypryana jepisk.
16 W.	Saturnina i Florentyna	3 Dionisia
17 S.	Wiktora b. i Małg. ☼	4 Jeroftea jep. m.
18 C.	Łukasza ew. i Tryf.	5 Charytyny mucz.
19 P.	Piotra z Alk. i Pel.	6 Flomy apost.
20 S.	Felicyana bm. i Ireny	7 Sergya i Wakha.
21 N.	20 po Sw. Jana Kant.	8 N. 20 po S. Pełahyi prep.
22 P.	Filipa i Korduli	9 Jakowa apost.
23 W.	Ignacego bw. Teodora	10 Jewłampya apost.
24 S.	Rafała arch. i Fel. ☽	11 Fyłypa apost.
25 C.	Chryzanta i Daryi	12 Prowa mucz.
26 P.	Ewarysta i Lucyana	13 Karpa i Papyła
27 S.	Sabiny i Florentego	14 Nazarya mucz.
28 N.	21 po Sw. Szymona	15 N. 21 po S. Jewtymya
29 P.	Zenobiusza i N.	16 Łonhyna mucz.
30 W.	Marcela Zenobii i Ger.	17 Andrea.
31 S.	Wig. Lucylli m. i Ant.	18 Łuki jew. ap.

KALENDARZ ŻYDOWSKI

4 — 15 Święto Kuczek.	11 — 22 Koniec Kuczek.
5 — 16 Drugie święto.	12 — 23 Radość z praw.
10 — 21 Święto Palmowe.	20 — 1 MARCHESCHWAN.

ODMIANY KSIĘŻYCA

☾ dnia 2 o g. 1 m. 46 wiecz.	☼ dnia 17 o g. 11 m. 40 w.
☾ dnia 10 o g. 4 m. 37 wiecz.	☽ dnia 24 o g. 2 m. 48 rano.

LISTOPAD

NOJABR

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE	ŚWIĘTA RUSKIE
1 C.	WW. Świętych. ☺	19 Joila proroka
2 P.	<i>Dzień zaduszny</i>	20 Artemia mucz.
3 S.	Huberta b. i Sylwii	21 Ilariona prep.
4 N.	22 po Sw. Karola Borom.	22 N. 22 po S. Awerkia jep.
5 P.	Zacharyasza	23 Jakowa apost.
6 W.	Feliksa i Leonarda.	24 Arefty mucz.
7 S.	Amaranta m.	25 Markiana mucz.
8 C.	Seweryna i Wiktoryna	26 Dymytria.
9 P.	Teodora żoł. i Urs. ☾	27 Nestora m.
10 S.	Andrzeja z Aw.	28 Terentia mucz.
11 N.	23 po Sw. Opieki MNP.	29 N. 23 po S. Anastasya
12 P.	5 Braci MM.	30 Zynowya mucz.
13 W.	Dydaka w. Eugen. b.	31 Stachia apost.
14 S.	Józefata b. m.	1 NOJABR. Kosmy i Dam.
15 C.	Leopolda w. i Ger.	2 Josafata archiep. m.
16 P.	Edmunda b. w. ☼	3 Akepsymy mucz.
17 S.	Salomei p. i Grzegorza	4 Joannyka prep.
18 N.	24 po Sw. Stanisł. K.	5 N. 24 po S. Hałaktyona
19 P.	Elżbiety i Ponc.	6 Pawła archiep.
20 W.	Feliksa Walerego	7 MM. 33 w Melyty
21 S.	<i>Ofiar. NMP.</i> i Alb.	8 Michaila Archan.
22 C.	Cecylii p. m. i Filem.	9 Anisfora mucz.
23 P.	Klemensa p. m. ☽	10 Szesty apost.
24 S.	Jana od Krzyża	11 Myny mucz.
25 N.	25 ost. po Sw. Katarzyny	12 N. 25 po S. Joanna Myi.
26 P.	Sylwestra i P. al.	13 Joana Zlatoust.
27 W.	Waleryana i Maxyma	14 Fylypa apost.
28 S.	Mansweta i Grzegorza	15 Hurya i Samon mucz.
29 C.	Saturnina m. i Illum.	16 Matftea jewanh.
30 P.	Andrzeja ap. i Justyny	17 Hryhorya jep.

KALENDARZ ŻYDOWSKI

18 — 1 Kislew.

ODMIANY KSIĘŻYCA

☺ dnia 1 o g. 5 m. 44 rano.

☼ dnia 16 o g. 9 m. 34 rano.

☾ dnia 9 o g. 10 m. 43 rano.

☽ dnia 23 o g. 1 m. 37 rano.

GRUDZIEŃ

DEKABR

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE	ŚWIĘTA RUSKIE
1 S.	Eligiusza b. i Nat. ☿	18 Płatona mucz.
2 N.	1 Adw. Bibiany, Aurelii	19 N. 26 po S. Awdya pror.
3 P.	Franciszka Ks.	20 Prokla i Hryhory
4 W.	Barbary i Piotra Chryz.	21 Wowed. Pr. Diwy.
5 S.	Post. Anastazego	22 Fylymona apost.
6 C.	Mikołaja b. w.	23 Amfylochya jepisk.
7 P.	Wig. Ambrożego	24 Jekateryny mucz.
8 S.	Niep. Pocz. NMP.	25 Kłymenta papy
9 N.	2 Adw. Leokadyi ☾	26 N. 27 po S. Ałypya prep.
10 P.	NMP. Loretań.	27 Jakowa mucz.
11 W.	Damazego i Sabina	28 Stefana mucz.
12 S.	Post. Aleksandra	29 Paramona mucz.
13 C.	Łucyi i Eugen.	30 Andrea apost.
14 P.	Post. Izydora i Spiryd.	1 DEKABR. Nauma pr.
15 S.	Wiktora i Waler. ☿	2 Awwakuma pror.
16 N.	3 Adw. Euzebii	3 N. 28 po S. Sofonia pror.
17 P.	Floryana, Łazarza	4 Warwazy mucz.
18 W.	Oczek. MNP. Teotyma	5 Sawwy Osw.
19 S.	Such. Tymot. Urbana	6 Mikołaja Cz.
20 C.	Teofila, Juliusza	7 Amwrozyja jepisk.
21 P.	Such. Tomasza ap.	8 Patapia prepod.
22 S.	Such. Zenona żołn. ☿	9 Zaczatyje Pr. Divy Maryi
23 N.	4 Adw. Wiktoryi	10 N. 29 po S. Myny
24 P.	Wig. Adama i Ewy	11 Danyła Stołpnyk.
25 W.	Boże Narodzenie	12 Spiryduna
26 S.	Szczepana pierw. m.	13 Ewstratia jepisk.
27 C.	Jana ap. i ewang.	14 Ftyrsa mucz.
28 P.	Młodzianków i Wikt.	15 Jełewterya jepisk.
29 S.	Tomasza Kant.	16 Ahhea proroka
30 N.	1 po B. N. Sabina	17 N. Sw. Praetec.
31 P.	Sylwestra ☿	18 Sewastyana mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI

12 — 25 Kislew. Poświęcenie świątyni.

29 — 1 Tebet.

ODMIANY KSIĘŻYCA

☿ dnia 1 o g. 12 m. 5 rano. ☿ dnia 15 o g. 7 m. 52 w.

☾ dnia 9 o g. 2 m. 43 rano. ☿ dnia 22 o g. 4 m. 1 wiecz.

☿ dnia 30 o g. 7 m. 41 wieczór.

SKALA STEMPLOWA.

SKALA I

na w e k s l e

			kor. h.
	Do	150 kor.	—10
nad	150 kor.	» 300 »	—20
»	300 »	» 600 »	—40
»	600 »	» 900 »	—60
»	900 »	» 1200 »	—80
»	1200 »	» 1500 »	1—
»	1500 »	» 1800 »	1—
»	1800 »	» 2100 »	1·40
»	2100 »	» 2400 »	1·60
»	2400 »	» 2700 »	1·80
»	2700 »	» 3000 »	2—
»	3000 »	» 6000 »	4—
»	6000 »	» 9000 »	6—
»	9000 »	» 12000 »	8—
»	12000 »	» 15000 »	10—
»	15000 »	» 18000 »	12—
»	18000 »	» 21000 »	14—
»	21000 »	» 24000 »	16—
»	24000 »	» 27000 »	18—

Od każdych zaś następnych 3000 kor. o 2 kor. więcej, przy czem jednak kwoty poniżej 3000 koron uważane będą za pełne.

SKALA II

kwity i dokumenta w sprawach prawnych.

			kor. h.
	Do	40 kor.	—14
nad	40 kor.	» 80 »	—26
»	80 »	» 120 »	—38
»	120 »	» 200 »	—64
»	200 »	» 400 »	1·26
»	400 »	» 600 »	1·88
»	600 »	» 800 »	2·50
»	800 »	» 1600 »	5—
»	1600 »	» 2400 »	7·50
»	2400 »	» 3200 »	10—
»	3200 »	» 4000 »	12·50
»	4000 »	» 4800 »	15—
»	4800 »	» 6400 »	20—
»	6400 »	» 8000 »	25—
»	8000 »	» 9600 »	30—
»	9600 »	» 11200 »	35—
»	11200 »	» 12800 »	40—
»	12800 »	» 14400 »	45—
»	14400 »	» 16000 »	50—

Nad 16000 kor. od każdych 800 kor. opłaconą być ma należytość wraz z nadzwyczajnym dodatkiem po 2 kor. 50 h. przyczem sumy niżej 800 kor. uważają się jako pełne.

SKALA III

ugody pożyczkowe, kontrakty służbowe, kwity na wygrane loteryjne.

			kor. h.				kor. h.
	Do	20 kor.	—14	Nad	1600 k.	do 2000 kor.	12·50
nad	20 kor.	» 40 »	—26	»	2000 »	» 2400 »	15—
»	40 »	» 60 »	—38	»	2400 »	» 3200 »	20—
»	60 »	» 100 »	—64	»	3200 »	» 4000 »	25—
»	100 »	» 200 »	1·26	»	4000 »	» 4800 »	30—
»	200 »	» 300 »	1·88	»	4800 »	» 5600 »	35—
»	300 »	» 400 »	2·50	»	5600 »	» 6400 »	40—
»	400 »	» 800 »	5—	»	6400 »	» 7200 »	45—
»	800 »	» 1200 »	7·50	»	7200 »	» 8000 »	50—
»	1200 »	» 1600 »	10—				

Nad 8000 kor. od każdych 400 kor. opłaconą być ma należytość wraz z nadzwyczajnym dodatkiem po 2 kor. 50 h. przy czem sumy niżej 400 kor. uważają się jako pełne.

OPLATA LISTÓW.

Za listy w miejscu doręczane	do 20 gr.	6 hal.
W Austrii i do Niemiec	» 20 »	10 »
Do Serbii	» 15 »	15 »
Do wszystkich innych państw europejskich »	15 »	25 »
Karty korespondencyjne w Austrii i do Niemiec . .	5 »	
Do Serbii	10 »	
Do wszystkich innych państw europejskich	10 »	
Należytość za rekomendowanie oprócz zwykłej opłaty		
do wszystkich państw	25 »	
Druki. Druki muszą być opłacane przy nadaniu:		
Opłaty wynoszą bez względu na odległość:		
do 50 gr.	3 hal.	
ponad 50 gr. do 100 gr.	5 »	
» 100 » » 250 »	10 »	
» 250 » » 500 »	20 »	
» 500 » » 1000 »	30 »	

OPLATA TELEGRAMÓW.

Do Austrii, Węgier, Bośni, Hercegowiny i do Niemiec (naj- mniej 60 hal.) za każde słowo	6 hal.
Do Rosyi europejskiej taksa 60 hal. i za każde słowo 24 »	
Do Rumunii » 60 » » » »	8 »
Do Serbii i Szwajcaryi » 60 » » » »	16 »
Do Włoch » 60 » » » »	16 »
Do Francyi » 60 » » » »	26 »
Do Anglii » 60 » » » »	22 »
Do Belgii » 60 » » » »	16 »



SPIS ŚRODKÓW LEKARSKICH

officyalnych i ważniejszych nieofficyalnych
wraz z podaniem ich cen,
sposobu stosowania i dawkowania.

Środki officyalne oznaczone są *. — Czcionkami rozstrzelonemi drukowane są te leki, których najwyższe dawki nie mogą być przekroczone bez oznaczenia ich wykrzyknikiem.

Skrócenia: *p. d.* = pro dosi; *k. r. d.* = kilka razy dnia;
krst. = kryształ.

Abri preceptorii Sem. (Jequiryty), Inf. 0'5—1'0:100;
stos. w chorobach ócz. 1'0 = 6 h.

Absinthi herba, Inf. 5'0—15'0:100 Col., Puly. 0'5—2'0
kilka razy dnia. 100'0 = 25 h. — **Extr.** 0'5 *p. d.* 1'0 = 8 h. —
Ol. aether. 1—2 kropli *pro dosi* 1'0 = 20 h. **Tinctura abs.**
i ***Tinct. Abs. compos.** 20—60 kropli *k. r. d.* 10'0 = 8 h.
Absinthinum 0'1—0'25 *p. d. k. r. d.* 0'01 = 6 h.

Acetalum (Diaethylacetal) Hypnotic. i Anaesthetic.
8'0—12'0 *p. d.* w emulsyi i miksTURze, także w lewatywach.

Acetonum (Nervinum i Anthelminticum) 5—20 kropli *k. r. d.* aż do 5'0! *p. d.* do wziewań 0'10—1; 100 agu.,
także w maściach 10'0 = 8 h.

***Acetum (purum)** jako napój 100—150 na litr wody
ocukrzonej; jako woda do ust lub płókania 20'0—50'0:150'0;
do zmywań, okładów, przestrzyk. czysty lub *aa* z wodą.
100 = 6 h.

***Acetum aromaticum** (zawiera: ol. Rosm., Junip. Lavand. Menthae) do mixtur 15'0—50'0:150'0; jako środek orzeźwiający, do kadzeń. 100 = 20 h.

— **pyrolignosum crudum** tylko zewnętrznie, czysty lub z wodą, do pędzlowań, zmywań i t. d. 100 = 10 h.

***Acetum Scillae**, jako diuret. i exp. w mixt. po 0'6—2'0 p. d., k. r. d. 10'0 = 5 h.

***Acidum acet. concentrat.** (96'0/0 kwas oct.) tylko zewn. jako środek żrący lub rubef. 10'0 = 6 h.

— **acet. dil.** 20—30'0/0 (kw. octowy) 0'5—2'0 k. r. d., w mixturze 5'0:20'0—150'0 zewn. jako Acetum. 100 = 24 h.

— **trichloro-aceticum**, zewnętrznie, jako środek żrący w stężonym roztworze. 1'0 = 8 h.

— **arsenicum** (Arsenicum album) 0'001 aż do 0'005! p. d., 0'02! *pro die* w pigułkach lub rozpuszczeniu; zewnętrznie jako środek żrący w maściach, pastach po 0'10—0'30:20'0;

***Solutio (Liquor) arsenicalis Fowleri** zawiera w 100 częściach 1 część kw. arsenaowego; 2—10 kropli (0'5!) p. d. i 2! p. die; zewnętrznie do zastrzykiwań podskórnych 1:1—3. 1'0 = 3 h.

— **Sol. arsen. Bietti** (Ammon. arsenic. 1:500 Aqu.) w 5—10 razy większej dawce od poprzedniego, tak samo i **Sol. arsen. Pearsonii** (Natr. arsen. 1:600 aqu.). 1'0 = 2 h.

— **Pilulae asiaticae** składają się z acid. arsenic., piper. nigr. i gumi arab., 1 pigułka zawiera 0'005 ars. Cena według taksy. — **Pulv. arsenic. Cosmi** (skł. się z acid. ars., Sang. dracon., Carb. anim., Cinna-baris) używ. do maści, past i w proszku etc. tylko zewn. jako caustic.

***Acid. benzoicum** (subl.) (Flores Benzoës) 0'1—0'5 p. d. k. r. d. jako expect.; w polyarthrit. 0'5—1'0 co 1—3 godziny, aż do 10'0—12'0 *pro die* w proszku lub mixturze; zewn. do wzięwań, opatrunków (5—10'0/0). 1'0 = 8 h.

— ***boricum** (boracicum) 0'2—1'0 p. d. k. r. d. aż do 5'0 p. die w proszkach, pigułkach i rozpuszcz.; zewn. jako zasypka, w roztworze 1—5'0/0 do zmywań, przestrzykiwań, płókań, wzięwań, także do opatr. ran jako Boroglycerin (3 cz. gliceryny i 2 cz. a. bor.), borlint, wata borowa (10—20'0/0), borphenolint; do maści i czopków (20—25'0/0). 10'0 = 5 h.

— **camphoricum** s. camphoratum 0'5—2'0 p. d. k. r. d. aż do 4'0 p. die w roztworze alkoholowo wodnym lub w opłatku przeciwko potom suchotników. 1'0 = 18 h.

— **carbolicum crystalisatum** (Ac. phenylicum, Phenolum) 0'01—0'10! p. d. k. r. d. aż do 0'50! p. die w pigułkach, roztworach alkoh. i emulsyi; zewn. jako środek żrący (5—30'0/0); jako antysept.; do lecz. ran w roztworach wodnych, alkoh., oliwie z collod. (10:10'0 Coll.); do zmywań, pędzlowań, wcierań, zastrzy-

kiwań w 0'10—15⁰/0; do linim. i maści w stos. 1:5 aż do 50 oliwy, glyc., linim. calcis; jako carbolspray (2—15⁰/0), do wstrzykiwań podskórnych (0'10—0'20:10'0 Aqu.), do mięszszowych (1:5 Aqu.). 10'0 = 6 h.

— **carb. crudum** tylko do desinfekcyi w roztworze (1:20) albo jako proszek z innemi ciałami. 100 = 6 h.

— ***carb. liquefactum** (10:1 Aqu.) jako środek żrący, jak powyżej. 10'0 = 6 h.

— ***chromicum** jako środek żrący, czysty albo rozcieńczony (1:20—50 Aq.), zewn. do pędzlowania *aa* z wodą w błonicy; przeciw poceniu się nóg 5:100 — zakraplanie w otitis media chronica. 1'0 = 6 h.

— **p. cresotinic**, jako sól sodowa, gorzki krystaliczny proszek, Antipyreticum, (reumatyzm stawów, tyfus, (pneumonia). Dla dzieci 0'015—0'06 *p. d.*, dla dorosłych 1'00 *p. d.* 4'0 *p. die.*

— **cinnamyllicum** (kwas cynamonowy) białozółte kryształki słabo w wodzie, lepiej w alkoholu rozpuszcz.; używany w roztworach 1'0:10—20 do podsk. wstrzyk. w leczeniu miejscowej gruźlicy (Landerer). 1'0 = 16 h.

— ***citricum** 0'5—20 *p. d.* k. r. d. w proszku saturat. mieszaninie burzącej (2'0—2'5 kw. odpowiada jednej cytrynie), zewn. do pędzl. (1:10 Aqu.); do zmywań, płókanek (1—2⁰/0). 10'0 = 18 h. Potio Riveri.

— **dijodosalicylicum** białe, drobno-krystaliczne w alkoholu i eterze rozp. igiełki. Analgeticum, antithermicum, antisepticum, dalej arthritis. 0'5—1'20 *p. d.* 3 r. dziennie.

Acid. formicicum jako rubefac. i żrący; w 1—10⁰/0 roztworze wodn. lub alkoh. do kąpieli parowych. 10 = 8 h.

— **gallicum** 0'3—1'0 *p. d.* k. r. d. w proszku, pigułkach, solut.; zewn. jako płókanie do ust (1'5⁰/0), woda do ocz (0'5—2'0⁰/0) iniekc. (1⁰/0), pędzlow. (1:6 glicer.). 10'0 = 22 h.

— **gymnemicum** posiada własność znoszenia pocucia smaku gorzkiego i słodkiego używa się w 2⁰/0 roztworze do płókania ust przed użyciem gorzkiego lekarstwa.

— **hydrobromicum** wew. 20—40 kropli : 100 Aquae używ. zamiast bromkalium, zewnętrznie do przyżegań. 10'00 = 15 h.

— ***hydrochloric.** (Acid. muriat.) **concentr. pur.** (24⁰/0) zewn. jako żrący; 1⁰/0—3⁰/0 jako płókania; do pędzl. (1—3:25—30 syropu lub miodu); do zmywań i okładów (1—2⁰/0); do kąpieli 60'0—120'0 na kąpiel. 10'0 = 4 h.

— ***hydrochloric. dilutum** (12⁰/0) 10—30 kropli *p. d.* k. r. d. aż do 5'0—10'0 *p. die* w rozcieńczeniu 1—2⁰/0 jako napój lub w mixturach 10'0 = 4 h.

— **hydrochloric crudum** (33⁰/0) 100 = 10 h.

— **hydrocyanicum** (kwas pruski wodnisty, zaw. 20% woln. kw. sinowodor.) 2—5 kropli *p. d. k. r. d.*, zewn. do pędzl. (0'25—0'50:5'0 Aqu.), jako woda do ocz. (0'05—0'25:5'0 Aquae), do maści (0'5:5'0). 0'1 = 2 h.

— **hydrofluoricum** ($\frac{1}{2}$ 0/0) 3 razy dnia 10—30 kropli w bardzo znacznem rozcieńczeniu; do wzięcia i opatr. (0'5—1'0:500).

— **hydrojodicum** 0'50—2'0 *p. d. k. r. d.* rozcieńcz. wodą.

— **hyperosmicum** (Acid perosmicum, osmicum) 0'001 *p. d. k. r. d.* w rozcieńczeniu wodnem lub w pig. (0'015! *p. d. a* 0'05! *p. die* w padaczce); podsk. zastrzyk. raz dnia $\frac{1}{3}$ —1 strzyk. Prav. 10% roztworu w nowotworach, wolu, nerwobólach. 0'1 = 140 h.

— **jodicum** 0'10—0'30 *p. d. k. r. d.* aż do 1'20! *p. d.* w rozcieńczeniu lub. pigułek, do tamowania krwotoków 50% zewn. w maściach 50%—100% albo podskórn. (1:5—10 Aqu.). 1'0 = 28 h.

— **kreosotinicum** (Antipyretic) jak acid. salicyl. 1'0 = 16 h.

— ***lacticum** 5—20 kropli = 0'3—1'50 *p. d. k. r. d.* w roztworze wodnym (1:200 Aqu.) w pastylkach aż do 10'0 *p. die*; zewn. do wzięcia. (15—20 kropli: 15—30 Aqu.), jako płókanie do ust (1:100—150 Aqu.); do pędzlowania (1:5—10 Aqu.); do zmywania ran (1—20%); czysty albo 60—80% do przyżegania wrzodów grzeliżnych. 1 = 6 h.

— **a-oxynaphtoicum** albo Acidum naphthocarbonicum, kawałeczki czerwone, pobudzające do kichania rozp. w H_2O z dodatkiem CO_2 , dalej w olejach tłustych, alkoholu i benzynie. Antizymoticum, Antisepticum. Scabies i Prurigo w 100% maściach, wewn. 0'1—0'2 *p. d.*

— ***nitricum. conc. pur.** (około 480% czyst. kw.), wewn. 0'20—1'0 w piguł. (w chor. wątroby, nephritis); zew. jako środek żrący. (10'0 = 5 h. — ***A. nitr. dilutum purum.** około 210% kw. 10'0 = 4 h. — ***nitriconitrosum** (fumans) czysty lub t. zw. Acid. nitric. solidifactum. 10'0 = 10 h.

— **oleinicum** wewn. w kolce żółciowej 1'0 *p. d.* 2 r. dz. 10'0 = 6 h.

— **oxalicum puriss.** 0'03—0'05 *p. d. k. r. d.* w proszku lub w 10% roztworze; jako płókanie do ust (10/0). 10'0 = 15 hal.

— ***phosphoricum** (160% czysty kwas fosf.), 10—30 kropli 0'5—1'5 *p. d. k. r. d.* aż do 10'0! *p. die*; jako napój ($\frac{1}{2}$ —10/0), w mixturze (2'0—10'0:100'0), w pigułkach; zewn. w roztw. 1—40% jako płókanie do zmywania ran. 10'0 = 6 h.

— **phos. sicum (glaciale)** 0'1—0'3 *p. d. k. r. d.* w pigułkach; łagodny środek żrący. 10'0 = 20 h.

— **pieronitricum** (picricum, carbagoticum); 0'10—0'25—0'50 *p. d. k. r. d.* 0'5! *p. d.* 1'0! *p. die* w pigułk. lub

w rozpuszcz. w trichinosis); zewn. jak kw. karbolowy 10:0=25 h.

— ***pyrogallium, Pyrogallolum** (kwas pyrogallusowy) zewn. w alkoh. (5—30:100) lub w maściach 1—10:20 wazeliny lub lanoliny. 1:0=8 h.

— ***salicylicum** (antisept. i antipyret.) 0:15—1:0 *p. d.* co 1—3 godzin aż do 2:0—8:0! *p. die* w proszk., pigułk., mixt. lub emulsi; zewn. jako zasyпка czysty lub z amyl. talcum, carbo; jako proszek do zębów lub tabaka (0:10—1:0:10—100 carbol., sacch., acid. tannic. etc.); do insulf. do pharynx. (1:5—50), w roztw. 1—3% do opatrunków, także jako wata i gaza salicylowa, jako woda salicyl. 2—3% z dodatkiem spir. vini, wody arom., gliceryny; do wziewań (1:500—1.000), do lewatyw (jako antipyr. 3:0—8:0). jako miejscowy antisept. 1:0—3:0 do przepłókiwań kiszek; mniej używany do zastrz. podsk. (1:600—1.000 Aqu.); do plastrów (1:2 empl. diachyl.), do maści i linim. do nacierań (w goścu: acid salicyl. 20:0, Spirit. vini 100:0, Ol. ricini 200:0, chloroformi 10:0), 1:0=3 h. — **A. boro-salicylicum** (składa się Ac. bor. 1, Ac. salic. 2, Aqu. 5, sprt. 10 odparow. do suchości). — Pulv. salic. c. Taleo (P. c. pudores pedum Ac. salic. 3, Amyl. 10, Talci 87).

— **sclerotinium** 0:15—0:25—0:30 *p. d.* kilka r. dz.; podsk. (1:10 Aqu.) 0:01—0:06! *p. d.* aż do 0:25! *p. die* 0:10=12 h.

— **siccinium alb.** (bursztynowy) 0:3—1:0 *p. d.* k. r. d. w pig., proszkach, roztworze wodn. lub alkoh.; zewn. jako płókanie (1:10—50) do pędzl. (1:5—10 miodu lub glyc.). 1:0=3 h.

— **sulfoichtyolicum** zob. Ichtyol.

— **sulfanilicum** używane w ostrym jodismus 4:5—6:00 *pro die*. Przy ostrym katarze nosa i krtani 2:00—4:00 *p. die*. — **Natrium sulfanilicum**. Przy jodismus. Usuwa symptom. ostrych katarów. 10:0:200 Aquae S. 2—3×d. łyżkę. 1:00=4 h.

— **sulfuricum anglicanum** (crudum; zawiera 75% kw.) 100:0=8 h. — ***Acid. sulfuric. conc. purum** (96%) 10:0=5 h. i **Acid. sulfuric. crud.** wszystkie 3 tylko zewn. jako środki żrące lub z proszkiem roślinnym (1:7—8) jako pasty.

— ***sulfuric. dilitum** (zaw. 100 cz. Ac. sulf. conc.: 476 Aqu.) 0:25—1:5 *p. d.* k. r. d. w pig. lub kroplami (5—30 kr. *p. d.*) z syropem, wodą osłodzoną, jako napój (2:0—4:0:500 Aqu.), zewnętrzzn. jako płókania do ust i gardła (1—4%), do pędzlow. (1:0—3:0:25:0) i zmywań. 10:0=2 hal.

— ***tannicum** czyli **Tanninum**, kwas garbnikowy 0:03—0:05 *p. d.* k. r. d. aż do 2:0 *p. die* w proszkach, pigułkach lub rozpuszcz. (w wodzie z dodatkiem alkoh., gliceryny, jako mixt. w wod. arom.); zewn. czysty albo w stos. 1:1—10 z amyl., zinc. oxyd., borax., cukrem;

do wdmuchiwań do nosa, krtani; do wziewań, zastrzykiwań (1—20:100), do kąpieli (10:0—50), do lewatyw (0:5—2:0:100), do maści (1:4—15), do czopków (0:20 tanniny, 2:0 Cacao, 0:20 ceræ fl.). 1:0 = 2 h. **Acid. tannic. boratum** (ac. tann. 1:3 Ac. boric.) jako zasypka. — **Baccila tannica** z taniny, tragacanthy, gliceryny, żelatyny. **Collodium tannic.** (1:10 coll.). — **Glycerinum tannic.** (1:4—10 Glyc.). — **Sapo tannini** (sap. 15, tannini 1).

— ***tartaricum** (kwas winny) 0:2—1:0 *p. d. k. r. d.* aż do 10:0 *p. die* w proszkach, w pastylk.; w mixt. 4:0:30:0—50:0 syr., 200:0 Aqu. (co godzinę 1—2 łyżek; jako napój 5:0—10:0:50:0—100:0 syropu na litr wody). 10:0 = 20 hal.

— **valerianicum** (iso) Ph. ger. III. 5—20! kropli *p. d. k. r. d.* aż do 40! kropli *p. die* z alkoholem albo z klejkami płynami. 1 = 35 h.

Aconitinum crystal. Duquesnel 0:0003! *p. d.* 2—3 r. dziennie aż do 0:0015! *p. die* w pigułk., zewn. w maściach (1:500) ostrożnie! 0:01 = 4 h.

Aconiti tuber pulv. 0:03—0:10 *p. d.* 2—3 r. d. aż do 0:5! *p. die* w proszkach, pigułkach. 1 = 2 h.

***Aconit Extract.** 0:005—0:01 *p. d.* 2—3 r. d. aż do 0:03! *p. d. i* 0:12! *p. die* w pig. i roztw. alkoh.; zewn. w rozpusz. (1:20—50), w maściach (1:5—10), 1:0 = 15 h. —

***Aconit. Tinet.** 2—10 kropli (0:1—0:5!) *p. d. k. r. d.* aż do 1:5! *p. die*; zewn. do nacierań. 10:0 = 10 h.

Adonis vernalis Hb. Inf. 4:0—8:0:150:0—200:0 colat., co 2—3 godz. łyżkę. 10:0 = 5 h.

Adonidin (glykozyd) wewn. 0:002—0:005—0:03! *p. d.* 0:1! *p. die*.

Aescorcin w 100/0—200/0 wodnym roztworze zakroplony do oka, w celu rozpoznawania zmian na rogówce.

***Aether (sulfuricus)** 5—10 kropli (0:1—0:5) *p. d. k. r. d.* aż do 8:0 *p. die* czysty lub z innymi środkami; w kaps. (Perles d'Ether zaw. 5 kropli); zewn. do anestezyi ogóln. Aeth. 9+1 Chlorf.) i do miejsc. (czysty), do wcierań (czysty lub w maściach), do lewatyw (1:0—1:5:100 Aqu.) do pędzl., do wstrzyk. podsk. w zapadzie (1/2—1 strzyk.). 10:0 = 5 hal. Prav. **Ae. crudus** tylko zewn.

***Aether aceticus** jak sulf. 10:0 = 14 h.

— **bromatus** zob. Aethylum bromat.

— **camphoratus** (Camph. 1:0 Spir. Aeth. 9) do zastrzykiwań podsk.

— **chloratus** (chlorek etylowy) środek znieczulający przez zamrożenie, w szklanych rurkach; lepszą jest mieszanina chlorku metylowego i etylowego (Anaestile).

— **petrolei** zob. petrol.

— **valerianicus** 1—2 kropli *p. d. k. r. d.* w kropl. albo kapsułk.

Aethoxycoffeinum wewn. 0·25 (z cocainum) w nerwobólach, migrenie.

Aethylenum bromatum 1—2 kropli 2—3 r. d. (w padaczce według Donatha). 1·0 = 8 h., **chloratum**, Chlorethyl, liqu. hollandic.) 5—20 kropli *p. d.* 3—4 r. d. z eterem, alkoh., olejotłuszczami; zewn. jako miejsc. anest. (czysty albo z eterem). 10 = 50 h.

Aethylidenum bichloratum jak chloroform do narkozy przy oper. zębów.

Aethylum bromatum jako sedat. 5—10 kropli (0·2) *p. d.* 2—4 r. d. na cukrze albo w kapsułkach, również jako anaestheticum w małych operacjach zamiast chloroformu.

— **jodatum** wewn. 5—10 kropli *p. d.* w gościecu, kile.

Agarius albus (Boletus Laricis, fungus Laricis) jako słabe drastic. po 1·0—2·0 *p. d.* k. r. d., jako przeciwpotny po 0·2—0·5 *p. d.* 2—3 r. d. w proszk., pigułek. 10·0 = 16 h. — **Agaricinum** (kwas) jako przeciwpotny 0·01—0·06—0·1 *p. d.* w pig. 0·1 = 10 h.

— **chirurgorum** do tamowania krwi.

Agathinum (Salicyl-Methylphenyl-hydrazon) antirheum. i antineuralg. 0·25—0·50, 3 r. d. białe kryształki nie rozpuszcz. we wodzie. 1·00 = 90 h.

Airol połączenie bismutu z garbnikiem i jodem. Używany jako antisepticum w emulsyi 10/0, (rzerzączka) w maści 10/0—20/0. 1·0 = 18 h.

Aletris farinosae Rad. (tonic. amar.) decoct. 15·0—30·0:100—150·0 Coll., także w proszkach 0·6 *p. d.* k. r. d. — **Tinet. a. f.** 4·0—8·0 *p. d.* k. r. d. — **Extr. fluid. a. f.** 0·5—2·0 *p. d.* k. r. d.

***Aloë** 0·02—0·03 *p. d.* k. r. d. jako amar. lub stomachic.; 0·05—0·3 jako rozwalniający; a 0·3—0·6 aż do 1·0! *p. d.* jako drasticum tylko w pigułkach; zewn. w clysm. (0·05—0·25). 10·0 = 3 h. Pulverat. 10·00 = 6 h.

— **hepatica** w trochę większych dawkach. ***Extr. aloës** jak poprz. po 0·02—0·03 *p. d.* k. r. d. jako stom., 0·05—0·2 jako rozwaln., a po 0·5 jako drastic. — **Massa pilular Rufi** (zl. Aloë 60, Myrrha 30, Crocus 10) w podwójnych dawkach jak Aloë. — ***Pilul laxantes** (Aloë 40, Jalap. 60, Saponis med. 20, Anis. vulg. fruct. 10) jedna pigułka waży 0·20. 10·0 = 40 h. — **Tinet. Aloë** jako tonic. i dig. 5—30 kropli *p. d.* k. r. d. 10·0 = 10 h.

Allylium sulfuratum (olejek czosnkowy) płyn wydający woń czosnkową, w H₂O mało rozpuszczalny. Używa się w cholerze. Rp.: Allylium sulfurat. 0·30, Muc. gummi arab. 35·00, Aq. dest. 120·00, Ol. ment. pip. gutt. II. Syr. spl. 24 Ds. Co 1/2 g. łyżkę. Równocześnie przemywanie irigatorem kiszek ciepłym 10/0 roztworem z Allyl. sulf. 3×d. Używane także w Phthisis, Lupus, Dyspnoe u astmatyków podskórnice 1—2cc. 0·50/0 roztwornu w steril. Ol. olivar.

Aloënum v. **Aloinum** 0·1—0·2 *p. d.* jako purg., 0·3 *p. d.* 0·6 *p. die*, jako drastic. w pig. także podskórnice (1:5—8). 1·00 = 6 h.

***Altheae sciss.** **Fol.** 100·0 = 20 h. i ***Rad.** 100·0 = 34 h. jako macer., inf., decoct., 5·0 = 10:100—300 Coll. albo jako species; Pulv. rad. al. jak consp. i jako masa do pig.; zewn. do katapl. i okład., inf. do płókań i lewatyw; do przestrzykiw. (3·0—5·0:100 Col.). — ***Species alth.** (Fol. alth. 10, Rad. alth. 5, Liquir 2·5, Flor. malv. i herb. Melilot *āā* 1, Sem. lini 2). 100·0 = 18 kr. — ***Species pro cataplas.** składu jak poprzedz. grubo proszkowany). 100·0 = 36 h. — ***Species pectoral.** (Fol. alth. 4, Rad. liquir, rad. alth., Hord. perl., fruct. Cerat — caric. *āā* 10, Foliōr. Verb., F. Malv., Rhead., Fruct. anis. stel. *āā* 1) jako decoct. z wodą lub mlekiem. 100·0 = 32 h. — ***Syrupus altheae** łyżeczkami, także jako corrigens. 10·0 = 5 h.

***Alumen** 0·05—1·0 *p. d.* k. r. d. do 5·0 *p. die* w proszku, pig. rozpuszcz. w żentycy lub mleku (1:200 mleka) jako Serum lactis aluminatum $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ litra dziennie; zewn. jako proszek do wdmuch. do nosa, gardła, oczu (czysty albo 1:20—25 cukru), jako woda do ust, gardła, oczu, (0·5—10:100—200) do wziewań, lewatyw (20/0), zmywań (50/0), do kąpieli (200·0) w maściach (0·1—2·0:10—25). 100 = 20 h. Alumen pulver. 100·0 = 3 h. — **Al. plumosum** s. **Talcum praep.** 100·0 = 10 h. — ***A. ustum** (Al. calcinatum) działa silniej od poprz. ma to samo zastosow. zewn. 10·0 = 8 h.

Alumina hydrica. (Argilla pura s. hydrata) wewn. jako antacidum, w biegunkach po 0·20—1·0. 100·0 = 16 h.

***Aluminii acetici liquor** (Aluminium aceticum, argilla acetica) 5—20 kropli 0·5—2·0 *p. d.* k. r. d. w rozp. z syropem; zewn. czysty albo rozcieńcz. do okładów (1:5—200) opatr., zmywań (1:5—10), przestrzykiwań (0·5—1:100). 100·0 = 35 h.

Aluminium acetico-tartaric. (alsol). Tylko zewn. jako adstring. i antysp. czysty albo rozpuszcz. także do płókania (1—20/0), pędzlow. (5—50/0). 1·00 = 3 h.

— **boroformicium** dawki i sposób zastosowania jak poprzedni.

— **kalium sulfophenylicum** bezbarwne krst. w H₂O rozp. Antisepticum, Adstringens. Stypticum. Externe w 50/0 rozczyynie.

— **sulfuricum** w zastos. jak Alumen. 10·0 = 4 h.

Alumnol. (naftosulfonian glinowy) adstring. i antisept. tylko zewn. 0·5—20/0 do zmywania ran, przestrzykiwania, w maści 3—60/0 lub jako zasypka (na ulcus molle) w rzerzączce (10/0—20/0). 1·0 = 10 h.

Ambra grisea 0·06—1·0 w proszku, pigułka, pastylka. 0·01 = 20 h.

***Ammonia** (pura liquida), Liquor ammonii caustici,

Amoniak; około 10⁰/₀, wewn. 3—20 kropli (0·1—0·5) *p. d.* k. r. d. znacznie rozcieńczony płynami, kleikami; zewn. do wachania, do injek. (5—15:60—100) do zmywań i nacierań (2—6⁰/₀); do wcierań, lewat. (5—10 kropli) *p. d.*, do maści i linim. (1:5—10), podskórn. (1:5—10), a 10·0 = 3 h. — ***Liquor ammoniae anisatus** (ol. anis. 1, alkoh. (90⁰/₀) 20, amm. 5) 2—20 kropli *p. d.* k. r. d. do 5·0 *p. die*; zewnętrznie do wachania, do wziewań. 10·0 = 10 h. Do wcierań używa się ***Linimentum ammoniatum s. lin. volatile** (ol. oliv. 4, am. 1). 10·0 = 6 h. **Linim. ammoniato-camphoratum** — ***Linim. saponato-camphoratum** (Balsam Opodeldoc.). 10·0 = 10 h. — **Linim. saponato-camphorat. liquid.**

— ***Ammoniacum** (Gummi resina A., A. depuratum) 0·3—1·0 *p. d.* k. r. d. do 5·0 *p. die* w pigułkach albo zawies., zewnętr. do plastrów 100 = 50 h., pulv. 10·00 = 12 hal.

— **Ammonium acetic. solut.**, Liquor ammon. acetic. (jest 15⁰/₀ Amm. acetic.) 2·0—10·0 *p. d.* k. r. d. czysty albo w mixt. (10·0—50·0:100) z środkiem diaphor.; zewn. do płókań i nacierań. 10·0 = 10 h.

— **benzoicum** 1·00 = 6 h.

— ***bromatum** 10·0 = 36 h.

— ***carbonicum** (sal. alkali volatile, Ammoniumcarbonat) 0·2—0·6 *p. d.* k. r. d. aż do 2·0 *p. die* w proszku, rozpuszcz., mixt., satur.; zewn. do wachania, do zmywań, maści i liniment. 1:5—10. 10 = 5 h. — **Aqua am. bicarb.** (0·2:200). **Ammonium carbonic. pyrooleosum** (Sal. volatile cornu cervi). 10·0 = 3 h.

— ***Ammonium chlorat.** (sal. amm. depur., salmiak) 0·5—1·0 *p. d.* k. r. d. do 10·0 *p. die* w proszku, pig., powid., roztwór., mixt.; zewn. jako zasypka; do płókanek (1—3⁰/₀), do zmywań, kąpieli (50·0—100·0), pędzlow. (3—5:50) i wziewań; także do maści i linim. (1:5—10). 10·0 = 4 hal. Są także pastylki salmiak. (Tablettes pectorales). — **Am. chlorat. ferrat.** (Ferrum ammoniatum) 0·2—1·0 *p. d.* k. r. d. w rozp. lub mixt. (2—5⁰/₀). 10·0 = 10 h.

— **Amm. jodatum** (zaw. 63⁰/₀ jodu) 0·10—0·6 *p. d.* k. r. d.; do maści (1:20—50). 1·0 = 14 h.

— **embelicum** wewn. 0·30—0·50 z syropem l. miodem (dzieciom 0·2) przeciwko tasiemcowi.

— **phosphoricum** 0·5—4·0 *p. d.* k. r. d. aż do 6·0 *p. die* w rozpuszcz. 10·00 = 20 h.

— **pierinicum** (pieronitricum) 0·05—0·10 *p. d.* k. r. d. aż do 0·4 *p. die* polecony w zimnicy. Łatwo wybuchający!

— **sulfoichtyolicum** zob. **ichtyol.**

— **valerianicum** 0·1—0·3 *p. d.* k. r. d. aż do 1·0—4·0 *p. die* w pig., mixt., 1·0 = 15 h.

— ***Amygdalae amarae** (Semen. amygd. amar.) wewn. w emulsyi ze słodk. migd., zewn. w proszku i w pastach.

10:0 = 6 h. — ***dulces** 1:25 do emulsyi. 10:0 = 5 hal. — ***Emulsio amygdalin.** (Amygd. dulc. decortic. 25, Sach. 15, Aqu. 250). — ***Ol. amygd.** łyżeczkami czysty, albo z wodą jako emulsya fałsz., wreszcie jako mixt. oleosa 10—20:200 Aqu.; zewn. jak ol. oliv. 10:0 = 12 h. — **Ol. amygd. amar. aether.** $\frac{1}{4}$ —1 kropli (0:01—0:05) rozp. w alkoh. albo w eterze, także na cukrze, albo w emuls., ext. czysty albo w miesz. do wcierań, maści (0:1:10:0). 0:1 = 20 h. — ***Syrup. amygdalinus.** 10:0 = 8 h.

Amygdophenin wewn. 1:0 p. d. k. r. d. aż do 6:0 p. die jako antineuralg., antirheum. 1:00 = 35 h.

Amylenum hydratum (Amylenhydrat) bezbarwna ciecz (Hypnotic. i sedativ.) 3:0—4:0 p. d. 8:00 p. die rozp. w wodzie, także w lewatywie 4:0 p. d. z mucilago gumm. arab. 1:0 = 10 h.

= ***Amylium nitrosum** (Amylnitrit.) 1—5! kropli p. d. do wzięwań; antidot. w asfiksyi chloroform. i zatruciu kokainą podsk. (1:10 Spirit.) 1:0 = 5 h.

Amyloform związek formaldehydu ze skrobią. Biały nierozpuszczalny proszek. Nie trujący, działa odwianiająco, antyseptycznie. Używane przy głębokich albo powierzchniowych ranach itd. jako zasyпка. 1:00 = 30 h.

***Amylum** (Tritici) jako constit. do proszku, do mucil., consp.; zewn. jako zasyпка; także do lew. 1—2 łyżeczki zagotowane z 200:0 aquae. 1:00 = 30 h.

Amylum jodatum. Ciemno-niebieski, woń jodu wydzielający nierozpuszczalny słodkawy proszek. Używa się jako antisepticum do ran zamiast jodoformu. 1:00 = 5 hal.

Amylum Marantae pulv. (Arrow-root) (1—2 łyżeczki zagot. z filiżanką rosółu, wody, mleka). 100:0 = 60 hal.

= **Analgen** (antipiret, antineuralg.) 0:50—1:0 p. d., 3:00 p. die skuteczny jako antineuralg. 1:0 = 44 hal.

***Angelicae** rad. pulv. 0:5—2:0 p. d. k. r. d.; 10:0 = 4 h. — **Extr. angelic.** 0:20—1:0 p. d. k. r. d. 1:0 = 10 h. — **Spirit. angel. composit.** 10—20 kropli p. d. k. r. d. 10:0 = 8 h.

Angusturae cortex. 0:5—1:0 p. d. k. r. d. w proszku, lub dec. (5:0—15:0:100—200). 10:0 = 5 h.

Anilinum sulfuric. 0:05—0:12 p. d. 1—3 r. d. w proszku, pig. w rozp. (0:05—0:20:150); ext. w maściach (1:20—30). 1:0 = 2 h.

***Anisi fructus** (Semen anisi vulg.) 0:3—1:0 w proszku, inf. (3—5:0). 100 = 30 h. — **Ol. anisi. vulg.** 1—3 kropli k. r. d. w elaeosach. 1:00 = 10 h. — ***Spiri anis. vulg.** $\frac{1}{2}$ —2 łyżeczek k. r. d. 10:0 = 5 h.

***Anisi stellati fructus** 10:0 = 12 h. Pulv. 10:00 = 18 h.

Anthrarobinum produkt redukcji alizaryny, używane jak chryzarobina.

Antidotum arsenici = Liquor ferri sulfuric. oxyd. 100, Aquae 200, do tego przy ustaw. mieszaniu 15 Magn. ust. z 250° Aqu. winien być zawsze świeżo przygotowywany, podaje się łyżeczkami co $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ godz. dosis = 2 K. 30 h.

***Antifebrinum** (Acetanilidum) 0'25—1'0! *p. d. k. r. d.* do 2'0! *p. die* jako antipyr., rheumat., neuralg. w proszk., pigułek., rozp.; zewn. jako antisept. 1'0 = 3 h.

Antipyrinum. (Dimethylphenylpyrazolon) 0'5—1'0—3'0 *p. d.* 3—4 r. d. aż do 8'0 *p. die* (dzieciom najw. 0'75 *p. d.* 3—4 r. d.) jako proszek lub mixt.; zewn. jako zasyпка, także do lewatyw; do wstrzykiwań do cewki $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ 0'0. 1'00 = 5 h.

Antipyrinsalol powstaje przez stopnienie salolu z antipyr. *āā*. Przezrzysty, brunatnawy płyn. Antisepticum, Haemostat. do tamp. przy krwawieniu macicy.

Antiseptol (Cinchoninum jodosulphuric.) zaw. 5% jodu, ma zastęp. jodoform, tylko zewn. w 10% rozczyzn.

Antispasmin (Narceinnatrium — Natrium salicylicum) wewn. 0'50 *p. d.* 1'00 *p. die* w rozczyzn., w krztuścu. 0'10 = 14 h.

Apiolum cryst. album. 0'25—1'0! *p. d. k. r. d.* aż do 4'0! *p. die* w proszku lub syropie, polec. w zimnicy i dysmenorrhoe. 0'1 = 4 h.

Apocodeinum hydrochloricum 0'01 *p. d. k. r. d.* 0'08 *p. die* w pig. lub w rozpuszcz.

Apolysinum 0'50—1'0 *p. d. k. r. d.* w proszku, jako antipyr. antineuralg.

***Apomorphinum hydrochl.**, jako expect. 0'001—0'005 *p. d.* w proszku., pigułek. mixt.; jako emetic. 0'01! *p. d.* aż do 0'05! *p. die*; także podskórnice jako emetic. w dawce 0'001—0'01; dzieciom 4-tą część dawki lub 0'01—0'03 w lewatywie. 0'01 = 4 h.

***Aqua amygdalar. amar. concentr.** zawiera na 1000 części 1 część bezwodn. kw. pruskiego 0'5—1'5 (10—40 kropli) *p. d.* aż do 5'0! *p. die* czysta kroplami albo w mixt. 10'0 = 12 h. dosis *p. d.* 1'50! *p. die* 5'00!

— ***amygd. am. diluta.** (Aq. Cerasorum) (na 1000 części: 0'05 bezw. kw. prusk. (łyżeczkami czysta albo w mixt. 10'0 = 2 h.

— **aromat. spirit.** do nacierañ. 100'0 = 30 h.

— ***Goulardi** zob. plumbi acet.

— ***calcis** (Aqua calcariae) z calcium oxydat. 100'0 = 6 hal.

— ***carbolisata.** 100'0 = 6 i 5%. 100 = 8 h.

— ***carminativa** (Flor. chamom. roman. 100, cort. citr., fol. menth. crisp., fruct. carvi., coriandr., foeniculi *āā* 30'0:4000 Aqu.) łyżeczkami. 100'0 = 24 h.

- ***chlori** (Aqua chlorata). 10:0 = 5 h.
- ***cinnamomi spl.** 100 = 22 h.
- **cresolica** 10% do desinfekeyi. 100:000 6 h.
- ***foeniculi** zob. foen. fruct. 100:0 = 15 h.
- **hydrosulfurata** przy zatruciu metalami. 100:0—500:0 czysta albo rozcz. wodą, łyżkami. 10:0 = 5 h.
- **kreosoti** (Aq. Binelli) wewn. łyżeczkami, zewn. do przepłókiwań, inhalacyi. 10:00 = 3 h.
- ***laurocerasi** (zaw. 10/100 bezwodn. kw. sinowdorow.) używ. jak Aqu. amygd. amar. concentr. 10:0 = 8 h.
- ***melissae** jako corrig. do mixt. 100:0 = 24 h.
- **menthae crisp.** tak samo. 100:0 = 30 h.
- ***menthae piperitae** tak samo. 100:0 = 30 h.
- ***rosae.** 100:0 = 20 h.
- ***rubi idaei.** 100:0 = 18 h.
- *Araroba** zob. Chryzarobin. 1:0 = 8 h.
- Arbutinum** (glykozyd z fol. uvae ursi) 0:5—1:0! *p. d.* aż do 4:0! *p. die* w proszku lub w mixt., stos. w zap. nież. pęcherza i w chorobach nerkowych. 0:10 = 4 h.
- Arecae nuces. pulv.** pod. przeciw tasiemcowi w dawce 4:0—6:0 w proszku.
- Argentamin** 100% płyn bezbarwny, oddział alk., w rzerzające do przestrzyk. 1:5000. 1:0 = 14 h.
- Argentum chloratum** (muriaticum) 0:01—0:10 *p. d.* w proszku, pig. 0:1 = 5 h.
- Argentol** proszek trudno rozp. antisept. Używany do ran, starych wrzodów, chorób skórnych, ulcus molle itd. we formie maści (1:50—100:00) w emulsiach (1:1000—3000:0) jako wstrzykiwanie przy gonorrhoea.
- Argentum iodatum** 0:005 *p. d.* jak Arg. chlorat. 1:0 = 1 K.
- ***nitricum crystallis.** 1:0 = 18 h. i ***nitricum fusum** 1:0 = 22 h. wewn. po 0:005—0:03! *p. d.* 2—4 r. d. aż do 0:20! *p. die* w pig., past., rozcz.; w subst. w zgęszcz. lub rozpuszcz. (1:1—2) jako środek żrący; także jako crayon; w rozcieńcz. do przestrzykiwań (0:10—1:0:100 Aqu.), do wzięwań (0:01—0:3:100), do pędzlow. (1:0—10:0:100), do ócz (0:01—1:0:100), w maści (0:20—0:80:10:0) także w proszku (0:1—0:5:5:0 cukru lub alunu) do wdychiwań do gardła lub krtani. Dawki maksym. 0:03 *p. d.* 0:20 *p. die* dla obu preparatów.
- Arg. nitric. c. kalio nitrico** (Lapis infernalis mitigatus, zaw. 1 arg. n. i 2 k. nit.) jako środek żrący łagodn. 1:0 = 10 h.
- Argonin** w zim. H₂O rozp. proszek. Używany jako adstringens-antisepticum-antigonorrhoeicum w 1—20% rozcynach (ap. vitr. nigr.). 1:0 = 18 h.

Argilla alba s. Bolus. a. jako constit. do proszk., pig., także zewn. jako zasyпка. 100:0 = 12 h.

Aristol (dwujododwutymol) różowobrunatny proszek rozp. w oliwie i paraf., stos. w chorobach skóry i nosa (lupus) w 10% maści lanolin. 1:0 = 18 h.

***Arnicae flores** seiss. 10:0 = 4 h. i ***Radix**. 10:0 = 5 h. wewn. 0:3—1:0 p. d. k. r. d. w proszk., pig., inf. (2:0—10:0:100:0); zewn. jako tabaka, także do okł. i lewat. (inf. 5:0—27:0:100). **Extr. flor. arn.** 0:2—0:5 p. d. 1:0 = 5 kr. **Extr. rad. Arn.** 0:2—1:5 p. d. 1:0 = 10 h. — ***Tinct. Arnicae** 1:0—2:0 p. d.; zewn. do wcierań, okład. i t. d. 10:0 = 8 h.

Artemisiae Hb. 10:0 = 3 h. pod. jak Hb. absinthi. **Rad. Art.** pulv. w proszku 0:1—2:0 p. d. albo w inf. 2—5%; 10 = 10 h. **Rad. Art.** in toto 100:00 = 35 h. — **Extr. Art.** 0:10—0:5 p. d. 1:0 = 16 h.

***Asa foetida** (Gummi resina dep.) wewn. 0:3—0:5—1:0 k. r. d. w pig. lub zawiesinie 2:0—6:0:100, także w lewat. 3:0—10:0 (w emuls. z żółtkiem). 10:0 = 10 h. **As. foet.** pulv. 10:0 = 18 h. **Tinct. as. foet.** 20—60 kropli p. d. czyst. albo w mixt. 10:0 = 8 h.

Asaprol b naftalo a sulfonian wapniowy, (antisept. antipyr. i antirheum) 0:5—1:0 p. d. k. r. d.; 4:0 p. die. 0:10 = 3 h.

Aseptolum 33¹/₂% (Acid. sozodolicum, kw. orto-fenolosulfonowy) gęsta ciecz, działa antysp. 3—5% rozc. wodnym; rozp. w oliwie, glyc. lub alkoh. nie działa. Stosowany zewnętrznie zamiast kw. karbolowego, nie-trujący. 10:0 = 24 h.

Aspirinum kwas acetylosalicylowy używa się zamiast salicylu w gościec stawowym 3 r. d. po 0:50.

***Atropinum sulfuricum** 0:001 p. d. aż do 0:003! p. die w pig., proszk. lub w rozp.; zewn. do oczów (0:10—0:5:100:0 Aq.), podsk. 0:0002—0:001 (2—10 przedziałek strzykawki Pravaza z rozc. czyn. 0:01—0:05:10 Aqu.) również razem z morf. (Atrop. sulf. 0:05, morph. mur. 0:4; Aqu, dest. 20:0), w maści i linim. 0:2—0:5:100. 0:01 = 4 h.

— **valerianicum**, wewn. jak sulf. 0:01 = 5 h.

Aurantii fructus cort. (flavedo cort. aurant.) 0:3—2:0 p. d. 2—4 r. d. w proszku. Inf. 5—12%; 10:0 = 12 h.

Aurant. folia seiss. 1:0—4:0 p. d. inf. jak cort. 1:0 = 4 h.; tak samo **flor. aurant.** 10:00 = 20 h. — ***Aqua flor. aurant.** (Aqua naphae) 10:0 = 6 h. — ***Ol. flor. aurant.** 0:1 = 8 h. — ***Ol. cort. aur.** 1:0 = 10 h. — ***Ol. Bergamott.** 1:0 = 6 h.; tak samo **Syrup. cort. aur. corrig.** do mixt. 10:0 = 5 hal.; tak samo **Syrup. aur. flor.** 10:00 = 10 h. — ***Tinct. aur. cortic.** 20—60 kropli. 10:0 = 8 h.

***Aurumnatrium chloratum** 260% wewn. 0:003 p. d. 1—2 r. d. aż do 0:05! p. d. 0:20! p. die w pigułk., pastylkach, proszkach lub w rozp. (in vitro nigro), dzieciom

w kokluszu z 20% rozczynu 5—8 kropli; jako woda do ócz (0'1—0'2:100), w maściach 0'2:5. 0'10 = 46 h.

Aurum chloratum wewn. 0'002—0'02! w sol. zewn. jako środek żrący. 0'10 = 75 h.

— **foliatum** do powlek. pig.

— **jodatum** stos. w kile.

— **monobromatum** wewn. 0'008—0'012 *p. d.*; dzieciom 0'003—0'006 *p. d.* stos. w padaczce. 0'01 = 12 h.

***Axungia porcina** (Adeps suillus) tłuszcz do maści. 100 = 40 h.

***Axungia porci benzoata.** 10'0 = 8 h.

Balsamum canadense. 10'0 = 24 h.

— ***Copaivae** wewn. 0'5—2'0—3'0 t. j. od 10—40 i 60 kropli *p. d.* aż do 20'0! *p. die* w pig. a najczęściej w kapsułkach (capsulae gelatin.) razem z ext. cubeb., także w emulsyi (15'0 z 7'5 Gummi mimos. i 100'0—150'0 Aqu.) zewn. do lewatyw. (7'0—15'0), do nacierań. 10'0 = 14 h.

Balsamum Nucistae zewn. do nacierań.

— ***peruvianum** wewn. 0'1—1'0 *p. d.* aż do 5'0 *p. die* w pigułkach, past., elect. lub emulsyi; zewn. czysty lub w maściach używ. do opatr. ran, do zastrzykiwań w gruźlicy (Landerer); rozp. w alkoh. jako płókanie, tinct. do zębów i t. d. jako antiscabiot. 10'0—15'0 na jedno wtarcie, wreszcie do celów kosm. 10'0 = 50 hal. — **Syrup. bals. peruv.** czyli Syr. balsamicus — expect. i corrigens.

— ***tolutanum** stos. jak. bals. peruv. 10'0 = 25 h.

— **vitae Hoffmani** (mixt. oleoso-balsamica) 5—20 kropli *p. d.*; do wąchania, nacierań, także do kosmet. 10'0 = 15 h.

***Bardanae rad.** Dct. (10'0—50'0:100—500 Col.). 10'0 = 4 hal.

Baryum chloratum puris. wewn. 0'02—0'1 *p. d.* do 0'60! *p. die* w pig.; zewn. 0'5—2'0:100. 10'0 = 5 h.

***Belladonnae rad. sciss.** wewn. 0'01—0'07 *p. d.* do 0'3! *p. die* w proszk., piguł., inf. (0'3:100), w ziewań (0'5—1'0:100), przestrzykiwań (1—40%), okładów (2—50%) i maści (1—5:10). 1'0 = 5 hal. — **Bellad. rad. pulv.** 1'00 = 2 h. — **Extr. rad. Bellad. fol.** albo rad. 0'01—0'05! *p. d.* aż do 0'2! *p. d.* w proszk., pig. 1'0 = 15 h.

— ***Fol. Belladon. sciss.** 0'05—0'2! *p. d.* aż do 0'6! *p. die* w proszk., piguł. (0'5:100); jako cygareta do palenia, do miejsc kąpieli; do okład., przestrzyk., do wziewań (0'5—1'0:100) lewatyw, jako woda do ócz (1'0—3'0:25). 1'0 = 5 h. — **Fol. Bell. rud. tus.** 10'0 = 8, pulv. 1'00 = 2 h. — ***Extr. fol. Bellad.** 0'01—0'05, aż do 0'2! *p. die.* 1'0 = 15 h. — **Tinct. fol. Bellad.** wewn. 1—10 kropli, 10! *p. d.* aż do 4'0! *p. die.* 10'0 = 10 k.

Benzinum Petrolei wewn. 0'2—1'0 (5—25 kropli)

mixt. i kaps. 2—3 r. dnia, do nacierań (1:2 tłuszczu); do lewatyw i wzięwań. 100:0 = 22 h.

***Benzoë, Resina Benzoë** wewn. 0:2—1:0 *p. d.* w pig., emulzyi, do proszku do zębów, do płókanek (2—40/0), do wody do oczu (1—20/0) do środka kosm. 10:0 = 15 h. pulv. 10:0 = 20 h. — **Tinct. Benz.** do wody do zmywań, do okład. 10:0 = 10 h.

Benzol stos. jak Benzinum 1:0! *p. d.* aż do 6:0! *p. die* w emulsyi przeciw czerwiom; zewn. w maści 2—3:200 w scabies. 10:0 = 8 h.

Benzonaphtol (Acid. benz. i naphtol.) proszek podaw. wewn. 0:5 *p. d.* aż do 5:0 *p. die* (dzieciom o 2 *p. d.* aż do 2:0 *p. die*), jako antisept. kiszkowy. 1:0 = 5 h.

Benzolguajacol czyli **Benzosol** (Acid. benz. i guajacol.) proszek używany w gruźlicy w miejsce guajacolu 0:25! *p. d.* 2—3 r. d. 2:50! *p. die* 1:0 = 34 h.

Berberinum muriaticum i **sulfur**. 0:03—0:05 *p. d.* 0:1 = 5 h.

Betolum (Naptosalolum-Naphtalolum) proszek bez smaku i zapachu, polecany przeciw gośćcowi, nieżyłowi pęcherza, w chorobach kiszek z rozkładem treści jelit; 0:3—0:5 *p. d.* 2—4 razy dnia, aż do 2:0 *p. die* w proszku. 1:0 = 10 h.

Betulae albae Folia zbierane na wiosnę i suszone w ciemnym miejscu. Używane jako Diureticum. Na filiżankę używa się 25:00—35:00 folia rozparzonych 200 wrzącej wody, stoi przez 2 godz. i podaje się 2—3 filiżanki dziennie zimne albo ciepłe. 10:00 = 3 h.

Bismuthol proszek biały krystaliczny w H₂O rozp.; używane jako antisept. do ran w 1—40/0 roztworze, albo 10—200/0 maści lub jako zasyпка.

Bismuthum benzoicum v. **subbenzoicum** proszek używany jako zasyпка na wrzód miękki. 1:0 = 8 h.

— **carbonicum** 1:0 = 6 h. i **citricum** 1:0 = 16 hal. używa się jak B. subnitr.

— **gallicum basicum** = Dermatol.

— **jodo-gallicum** proszek szaro zielony, hygroskop. w kwasach i zasad rozp. Używane jako antisept. zamiast jodoformu.

— **lacticum crystalisatum** 0:05—0:2 *p. d.* 2—4 razy dziennie. 1:0 = 8 h.

— **loretinicum** proszek żółty nierozp. Działa wysuszająco na rany. Zastosowuje go się również w chorobach ocznych jako zasypkę, albo masć w katarze oczu, w dyfteryi albo gruźlicz. chorobach ocznych.

— **B naphtalicum** czyli **Orphol**, brunatny proszek, nierozp. w wodzie 0:50 *p. d.* 1:0—3:0 *p. die* w biegunkach, w durze. 1:0 = 20 h.

— **oxyjodatum** v. **subjodatum** 1:0—2:0 *p. die*; zewn. jako zasyпка i do maści. 1:0 = 20 h.

— **salicylicum** 0'3—1'0 *p. d.* 2—4 razy dz. w pig. i w proszk. 1'0=8 h. tak samo używa się **B. subsal.**

***subnitricum** czyli **Magist. bismuthi** 0'20—1'0 *p. d.* 2—4 r. dz. (dzieciom w rozwołnieniu 0'1—0'4 co 2—3 g.) w proszk. i pig.; zewn. jako proszek do wdmuchiwań do gardła, nosa, krtani; do wstrzykiwań (rzerzączka) (4—12'0); także do maści (3—10'0). 1'0=6 h.

— **tannicum** 1'0=8 h. jak subnitr.

— **tribromphenilicum** czyli **Xeroform**, żółty nierozp. proszek, 5'0 *p. d.* die w dawkach po 0'50, wewn. w cholerze; zewn. jako zasypka do nosa, ucha, w chorobach skórnych; w rzerzączce (10'0—20'0 emulsya). 10=115 h.

— **valerianicum** 0'03—0'15 *p. d.* w proszk. lub pig. 1'0=10 h.

Blattae orientales 0'6—1'0 *p. d.* w proszk. (jako diaphoretic.) także w inf. lub decoct. 5—10'0. 1'0=25 h.

***Bolus alba** zob. **Argilla alb.**

***Borax** (veneta) czyli **Natrium biboracicum**, wewn. 0'5—2'0 *p. d.* k. r. dz. w proszku, rozp. w mixt., lub w linctus; zewn. do płókanek do ust i gardła (2—5'0), do pędzlowań (1'0—5'0; 25'0), do zmywań (10'0—20; 100) przestrzykiwań (1'0—5'0; 100'0), wziewań i maści 1:3—10, 10'0=6 h.

Bromoformium podaw. dzieciom w kokluszu po 2—7 kropli na łyżce z wodą, dorosłym 0'50 w kapsułkach w napadach astmy. 1'0=6 h.

Bromol=**Tribromphenol**, proszek rozpuszcz. w alkoholu, eterze, olejach; zewn. w maściach (4'0:30'0); do pędzlowań błonicy (1'0:25'0 Glycerini).

Bromum używane jako środek żrący 0'1=2 h.

Bromalin blaszki, białe w H_2 O rozp., u kobiet i dzieci jako **Sedativum nervos.** 2—4'00; używa się w zastępstwie kali brom. bez ubocznych działań, dla epileptyków i neurasteników 1'00=20 h.

Bromidia składa się z **Chloralhydr.**, kali brom. **Ext. hyosc.**, **Ext. cannab** i cukru, daje to płyn brunatny, używane jako **hypnoticum** $\frac{1}{2}$ —1 łyżeczki od herbaty *p. d.* w wodzie najwyżej 3 razy w 24 godzinach 5'00! *p. d.* 15'00! *p. die* 10'100=60 h.

Bromopyrin antypyreticum dawki jak antipyryna.

Brucinum wewn. 0'005—0'01! *p. d.* 2—3 r. dz. w pig. lub z rozc. alkohol. (1'0:25'0) kroplami (2—25). 0'10=5 h.

Bryoniae rad. sciss. 0'5—2'0 *p. d.* w proszk. lub inf. 5—15'0:100—200 col.). purgans. 10'0=20 h.

***Bulbus scillae** zob. **Scill. Bulb.**

Butyrum cacao zob. **Cac. Sem.**

Butyl-Chloralum hydratum, **Crotonchloral hydrat** wew. 0'1—0'2—2'0! *p. die*. Analgeticum, hypnoticum. 1'0=20 h.

Cacao Sem. express. (Cac. odtluszcz.) 10:0 = 16 h.
Oleum (Butyrum) Cac. 0:5—2:0 *p. d.* w proszk., past.,
 zawies.; jako constit, do maści, suppos., bacill. 10:0 =
 12 h.

Cacti glandiflori tinct. składu niepewn. lub pe-
 wniejszy **Extr. Cact. gd. fluidum** jako analeptic. kro-
 plami 5—15 *p. d.* 2—3 razy dziennie. 1:0 = 10 h.

Cadmium salicylicum igielki bezbarwne rozp.
 w gor. H_2O , $alcoh.$, $aeth.$ i $glyc.$ Adstringens; używane
 w zapaleniu oczu i Gonorrhoea w 1% roztworze.

— **C. bromatum**, 1:00 = 5 h. **C. jodatum** 1:00 = 12 h.

— **sulfuricum** tafelki bezbarwne, rozp. w gor. H_2O .
 Adstringens, Antisepticum. W okulistyce używane tak
 jak **Zinc. sulf.** w 1% roztworze. 1:00 = 6 h.

Caesium bitartaricum w nerwowem biciu serca
 z 3 \times a 0:18—0:30 tak samo używa się i **C. bromatum**.

***Calami Rad., Rhizoma** (Rad. acori cal.) 0:5—2:0
p. d. w proszk., pig., inf. (5:0—15:0:100 Col.); do pro-
 szku do zębów, dzieciom do gryzienia. 10:0 = 4 h. —

pulv. 10:00 = 8 h. **Extr. Cal.** 0:1—0:5 *p. d.* 1:00 = 15 h.

Oleum cal. $\frac{1}{2}$ —2 kropli *p. d.* w emuls. 1:00 = 10 h. —

Tinct. cal. 10—60 kropli *p. d.* używ. do płóć. do ust,
 tinct. na zęby. 10:0 = 6 h.

***Calcaria chlorata** zob. Calcium hypochlorosum.

— **usta** zob. Calc. oxydat.

— **saccharata** 0:5—1:0 *p. d.*; w dużych dawkach po-
 daje się w zatruciu zgęszcz. kw. karbol.

***Calcium carbonicum nativum** (Creta alba, kre-
 da) jako proszek do zębów i t. d. 100:0 = 18 h. ***Cal-**

cium carb. purum (praecipit., Calcaria carbonic.) 0:20
 —0:40 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., mixt.; także zewn.
 w proszk. 10:0 = 28 h.

— **chloratum** (fusum) 0:1—0:6 *p. d.* w rozp.; do opatr.
 1:24, do oczów (0:1—1:0:100) do kąpieli (30:0—100:0 na
 kąpiel) 10:0 = 8 h.

***C. hypochlorosum** v. Calcaria hypochloresa, cal-
 caria chlorata (Chlorkalk) wewn. 0:05—0:30 *p. d.*, 4—6 r.
 d. pastyl. lub wodnej mixt.; zewn. do płókań (1:0—4:0:
 100) do pędzlow. (0:5—1:5:25), do przestrzykiwań (0:05—
 0:1:100), do kąpieli (150:0—400:0), maści (1:0—10:0). Do
 nakadzań i desinfekcyi (rozwiesza się płótna namoczo-
 ne w rozp. C. hyp.). Podskórne wstrzykiwanie 2% rozc.,
 polecane w ukąszeniu jadowitych węzów. 100:0 = 12 h.

***C. Oxydatum** (Calcaria usta s. caustica) tylko
 zewn. jako środek żrący, jako Pasta caustica viennensis

(zaw. kal. caust. 5 cz. na 6 cz. Cal. oxyd.). 100:0 = 12 h. —

extincta używ. do wytw. ***Aqua calcis** (Aq. calcariae)
 wewn. jako antacidum 50:0—200:0 *p. d.* aż do 300—600 *p.*
 die z mlekiem; zewn. do płókań, wzięwań, okładów 100:00

= 6 h.

C. permanganicum używane jak Kal. permang. o silniejszych własnościach antisept.

Calceis linimentum (Stahli) używane w oparzeniach jest miesz. Aqu. calc. z ol. oliv. *āā*.

***Calcium phosphoricum** (Calcaria phosph.) 0·5—2·0 *p. d. k. r. d.* w pr., w rozpuszcz. z dodatkiem acid. phosph. polecane przez Kolischera i Freunda do zastrzykiwań w gruźlicy stawów. 10·0 = 66 h. **hypophosphorolum** 1·0 = 5 h.

— **sulfuratum** najcz. zewn. w maściach (1·0—3·0:25) do kąpieli (50·0—120·0) wewn. po 0·06 w pigułkach jako profilaktyk w grypie. 10·0 = 5 h.

— **sulfophenilicum** proszek biały, o ściągająco gorzkim smaku, Antisepticum, Desinficiens i Adstringens, rozpuszczalny w H₂O i alkoholu. Rozczyn 10% osłodzony podaje się wewnątrznie co 2—3 godz. łyżkę.

***Calcium oxysulfuratum sol.** (Solutio Vlemingx), na świerzb 100·0 = 40 g.

— **sulfuricum ustum** czyli gips do opatrunków. 100·0 = 5 h.

***Camphora** wewn. 0·03—0·2 *p. d. k. r. d.* jak excit., 0·3—0·5 *p. d. i*—2 r. d. jako sedativ. w proszk. (in charta cerata) pig. mixt., emuls. Także do wziewań, nakadzań, jako proszek do nosa, do płókań (0·2—1·0:100), lewatyw (0·3—1·0), maści (3·0:25) mydeł, do podsk. wstrzyk. (1:12 Spir., albo 1:5 Aeth., lub oliwy); jako excit. całą strzykawkę Pravatza na raz) 10·0 = 12 h. — ***Ol. camphorat.** zaw. 1 C. na 3 ol. oliv. 10·0 = 10 h. — ***Spirit camphorat.** zaw. 1 C. na 9 Spirit.; do wcierań, zmywań. 100 = 50 h.

Camphora monobromata 0·1—0·4 *p. d. k. r. d.* aż do 3·0 *p. die* w proszkach, kapsułkach, pig. kołacz. (trochisci). 1·0 = 5 h.

Cancerorum lapid. pulv. po 0·1—0·3 *p. d.* do proszków. 10· = 24 h.

***Cannabis indicae. herb.** 0·2—0·4 *p. d.* w proszk., inf. (2·0—5·0:100—200) do wziewań, do cygaret. 10·0 = 6 h. — **Haschisch pur.** (Churrus) 0·01—0·05 *p. d.* ***Extr. cannabis indicae** 0·03—0·1! *p. d.* jako sedat., 0·1—0·2—0·3! *p. die* jako hypn., w pig., past., mixt., rzadko w maściach (0·2—0·5:10). 1·0 = 24 h. — **Tinet. cannab. ind.** 5—20 kropli aż do 1·0! *p. d.* a 4·0! *p. die* 10·0 = 14 h.

Cannabinum tannicum (hypnotic.) po 0·1—0·25 w pr. 0·1 = 4 h.

***Cantharides** wewn. 0·015—0·05! *p. d. k. r. d.* aż do 0·2! *p. die* w proszk., pig. zewn. w proszku lub maści (1·0:8—10) w plastrze 10·0 = 24 h. — ***Tinct cantharid.** 0·1—0·5! *p. d.* aż do 1·0! *p. die*; zewn. jak canth. 10·0 = 12 h. Ung. Canthar. — **Collodium Canth.** (1:5 Coll. 10·0 = 30 h.).

***Emplastr. canth. ordin.** (vesicat). 10'0 = 20 h. ***Empl. canth. perpetuum.** 10'0 = 30 h.

Cantharidinum do zewn. użytku w maści, coll. (0'10:50) polec. do wstrzyk. podsk., w gruźlicy krtani. (0'0001) także psoriasis, lepra, błonicy. 0'01 = 10 h.

***Capilli Veneris Hb.** 10'0 = 4 h. i **Syrup Capill. Vener.** 10'0 = 8 h.

Capsici fructus 0'05—0'2 *p. d.* 3—4 r. d. w proszk., pig.; zewn. do katapl. 10'0 = 8 h. — **Tinct capsici** 10—30 kropli (0'3—1'0) *p. d.* z wodą lub kleikami zewn. do wcierań, kropli do zębów. 10'0 = 6 h.

***Carbo ligni depuratus** (Carb. vegetabilis) 0'5—2'5 *p. d.* w proszk., zewnętrznie, do proszku do zębów, do płókanek (3'0—5'0:100), do maści (10'0:25'00). 100'0 = 22 h.

— **Carb. animalis.** — **Carb. panis.** 10'0 = 10 h. — **Carb. spongiae.**

***Cardamomi fructus** (semen) 0'3—1'0 *p. d.* jako składnik Species arom., niekt. tinct. i innych śr. 1'0 = 10 h.

Cardui Benedicti Hb. 1'0—2'0 *p. d.* w proszk., inf. lub decoct. (5'0—15'0:100). 10'0 = 4 h. — **Extr. card. ben.** 0'5—2'0 *p. d.* 2—3 r. d. w pig., mixt. 1'0 = 4 h.

Carica papaia zob. Papainum.

Carniferrinum przetwór żelazisty otrzymany z mięsa 0'50 *p. die.* 1'0 = 28 h.

Carpainum hydrochloricum alkaloid z Carica papaia stos. w angina pectoris i w wadach serca 0'006. *p. d.* aż do 0'03 *p. die* w pig., kroplach, podskórnie 0'006—0'01 środek nasercowy, działający podobnie jak Sparteina.

***Carageen Dct.** 3'0—5'0:100—500 Coll. 10'0 = 4 h.

***Carvi fructus** (Sem). 100 = 25 h. — **Ol. Carvi.** 1'0 = 8 h. **Spirit. carvi.** mają podobne zastosowanie jak Anis. fructus 10'0 = 5 h.

— ***Caryophylli** (flores) wewn. po 0'3—0'6 w proszku, inf. (2'00—6'0:100—200 Coll.). do proszku do zębów, do płókania i tinct. **Oleum caryoph.** 1/2—2 kropli, wewn. do nacierań. 1'0 = 3 h.

Cascarae sagradae cortex czyli **cortex Purshianae** 0'5—2'0 *p. d.* w inf. 10'0 = 5 h. — **Extr. fluid Casc. Sagr.** 1/2—1 łyżeczki k. r. d. do 4'0 *p. d.* a 10'0! *p. die* czyste albo w syropie. 10 = 20 h.

***Cascarillae cortex** r. b. 1'0—2'0 *p. d.* k. r. d. w pr. lub lepiej w inf., decoct. (10'0—20'0:100—200 Coll.). 10'0 = 8 h., pulv. 10'0 = 10 h., sciss. 10'0 = 5 h. — **Extr. Cascarillae** 0'3—1'5 *p. d.* w pig. 1'0 = 15 h. — ***Tinct. Cascar.** 20—40 kropli aż do 10'0 *p. die.* 10'0 = 12 h.

***Castoreum (canadense)** 0'1—1'0 *p. d.* 2—4 r. d. w pig., proszk. 10'00 = 60 h. — ***Tinct. castorei** 10—60 kropli *p. d.* 1'0 = 20 h.

Cast. sibiricum tak samo jak canadense.

***Catechu** (Terra japonica 0'5—1'5 *p. d.* w pig., proszk. rozp. w wodzie lub alk. 3—5'0/0): do proszku do zębów,

do past i tinctur. 10'0 = 14 h. — ***Tinct. catechu** 10—60 kropli *p. d.*; 10'0 = 10 h.

***Centauri minoris** Hb. 1'0—2'0 *p. d.* w proszku; w inf. (5—10'0). 100'0 = 48 h. — ***Extr. cent. min.** 0'5—2'0 *p. d.* 2—3 r. d. pig. mixt. 10'0 = 60 h.

***Cera alba** 10'0 = 10 h. i ***flava** 10'0 = 8 h. wewn. w emuls. (15'0:200 z żółtkiem lub 15'0 gumi arab.); jako constit. do maści, plastrów, świeczek itd.

— **japonica** tak samo. 10'0 = 5 h.

Cerasorum syrupus corrig i const. 10'0 = 6 h.

Cerium oxalicum oxydul. 0'05—0'1—0'3! *p. d.* aż do 1'0! *p. d.* w proszk. lub pig.; polec. w vomitus gravid., dyspep., cardialgii, epilepsyi, 1'0 = 3 h.

***Cetaceum** (sperma Ceti) przeważn. zewn. do plastrów, maści (1:2 ol. oliv.) 10'0 = 10 h. Gold Cream.

Ceratum cetac. 1'0 = 14 h.

Cetrarinum (otrzym. z lichen. islandic.) goryczka w pig. po 0'05—0'5 *p. d.* pół godz. przed jedz., popr. apetyt.

***Chamomillae vulg. flores** 1'0—5'0 *p. d.* w proszk., inf. (5'0—15'0:100—200 Col.) do species; zewn. do suchych lub wilg. okładów, do przestrzykiwań (25'0) do kąpieli (300'0—750'0 na kąpiel). 10'0 = 8 h. **Aqu. chamomill.** do mixt. 100'0 = 20 h. — **Extr. Chamomill.** 0'5—1'5 *p. d.* 1'0 = 10 h. — **Ol. Chamomill. aeth.** 1/2—2 kropli *p. d.* 0'1 = 14 h. — **Syr. Chamom.** Corrig. 10'0 = 8 h. — **Tinct. Chamom.** 10—30 kropli *p. d.* 2—4 r. dz. 20'0 = 8 h.

Charta nitrata używany do wdychiwań w astmie.

Charta sinapisata rubefaciens (Rigollot).

Chelidonii Hb. — **Extr. Chelidonii** 0'1—0'5 *p. d.* w pig., mixt. 1'0 = 20 h.

***Chenopodii ambrosioides** Hb. 0'5—4'0 w proszk. spec. Inf. (10'0—30'0:100—200 Coll.); do okładów. 10'0 = 6 hal.

***Chinae cortex fuscus** 10'0 = 24 h., **Cort. chin. calisayae** 10'0 = 32 h. i **Cort. Chinae ruber** nid. tus. pulv. 10'00 = 74 h. 10'0 = 62 h. (Farmakopea nie rozróżnia poszczególnych rodzajów kory tylko oznacza, że ma zawierać przynajmniej (5'0 alkaloïdu) 0'5—1'5 *p. d.* w proszk., electuarium, pig., mixt., inf. lub decoct., (5'0—25'0:100—200 Col.); kawa chinowa, czekol. chin., wino chinowe.; zewn., do zasypek, proszku do zębów, okładów; inf. lub dect. do płókania ust, przestrzykiwań, lewatyw. — **Extr. Chinae aquosum** w 5'0 rozp. łyżkami 1'0 = 20 h. i **Extr. Chinae spirituos.** 0'3—2'0 *p. d.* w pig., mixt i zewn. do tinct. pomad.; **Tinct. chinae** 1'0—5'0 *p. d.* 10'0 = 12 h. i ***Tinct. chinae comp.** 1/3—1 łyżeczki *p. d.* 2—4 r. dz. kroplami albo w mixt. 10'0 = 20 h.

***Chinae vinum** 100 = 100 h.

Chinidinum sulfuricum (Conchinin) 1'0 = 20 h.

— **tannicum** 0'10 = 12 h. stos. jak sole chininy.

Chininum czysty alk. 0'03—1'0 w pr., pig., w rozp. w alkoh. lub aeth. mało używ. tylko sole. 1'00 = 32 h.

Chininum aethylosulfuricum w dawce 0'02—0'4 do podsk. zastrzyk. 10'0 = 10 h.

— **arsenicum** 0'003—0'01 w pig. 1'0 = 32 h.

— **bihydrochloricum** (bimuriaticum) 0'25—0'50 p. d. podskórn. sól łatwo rozpuszczalna. 0'1 = 8 h.

— **bihydrobromicum** 0'50—1'0 w proszku lub podsk. (1'0—3'0:10 Aqu.) 0'1 = 8 h.

— **bimuriaticum carbamidatum** do podsk. zastrzyk. 0'1—0'5 p. d.

bisulfuricum (rozp. w 11 częściach wody) stos. jak sulf. 1'0 = 25 h.

— **citricum** jak Ch. sulf. 1'0 = 28 h.

— ***ferro citricum** 0'05—1'0 p. d. do 2'0 p. die w pr. pig. rozp. 1'0 = 10 h.

— **hydro-bromicum** (bromatum) 0'05—0'5 p. d. do 2'0 p. die w proszk., pig., rozp., podsk. (10'0) rozc. alkoh. 1'0 = 26 h.

— **hydro-chloricum** (muriat.) rozp. w wodzie zastos. wewn. jak sulf., do zastrzykiwań podsk. (0'15—0'25: Glycer., aqua aa 0'5). 1'0 = 15 h.

— **hydrojodicum** 1'0 = 32 h.

— **jodicum** proszek krystaliczny, biały. Neurotonicum. Podskórn. 10'0 rozc. zyn.

— **jodo hydrojodicum** proszek karmazynowy, podawany wewn. w II i III postaci kily. 2'5 p. die.

— **glycerino-phosphoricum** krst. w gorącej H_2O i alkoholu rozpuszczalne. Używane w malarii, neuralgii. 3 X d. 0'10—0'3.

— **lacticum** łatwo rozpuszcz. w wodzie. 1'0 = 32 h.

— **phosphoricum** 1'0 = 30 h.

— ***salicylicum** 0'1—0'5 p. d. do 2'0 p. die 1'0 = 24 h.

— ***sulfuricum** jako tonicum 0'03—0'15 p. d. k. r. d.; 0'3—2'0 w ciągu 24 godzin w intermittens, neuralgiach, durze i t. d.; po 1'0 na raz w bardzo wysokich gorączk. w proszk., placuszk., pig., w rozp. w wodzie, winie lub mleku; zewn. do wdychiwań do nosa, gardła, krtani; do przestrzykiwań nosa, cewki moczow., pęcherza (w 10'0), do zastrzyk. podskórn. (1'0:10 Aqu. i kilka kropli acid. sulf., lub 1:6 Gliceryny) do maści (1:40—80) do czopków, pomad. (0'5—1'0:25) 1'0 = 14 h.

— ***tannicum** (2—4 razy większe dawki jak sulf.) w proszkach lub zawiesinie. 1'0 = 15 h.

— **valerianicum** 0'05—0'5 p. d. w pr. i pig. 1'0 = 26 h.

Chinoidinum puriss. (2—3 razy większe dawki jak chin. sulf.) 0'1—1'0—3'0 p. d. k. r. d. w proszk., pigułk., w rozp.; w wodzie z dodat. kwasu lub alkoh. 1'00 = 3 h.

Chinoidinum sulfuricum 1'00 = 3 h.

Chinolinum pur. 1'0 = 8 h. wewn. nie używany, tylko

do płókań 1'0:500,0 z dodatkiem alkoholu i do pędzlowań 5'0 w błonicy. 1'0 = 8 h.

— **tartaricum** 1'0 = 4 kr., jako antysept i antypyr. po 0'5—1'0—2'0 *p. d.* 0'5—6'0 *p. die* w proszku, mixt., do płókań, wzięwań, pędzlowań (3—10'0). 1'00 = 32 h.

Chinopyrin, 3 cz. chininy + 2 cz. antipirin. do wstrzykiwań podskórnych.

Chinosol siarkan oxychinolino-potasowy zewn. do zmywań 1:100, gaza, wata; zasyпка w poceniu nóg 2:100 amylum. 1'00 = 22 h., w tabletkach á 1'00, 10 sztuk = 1 k. 20 h.

Chloralose środek nasenny 0'25—0'75 wywołuje sen, czasami działa ubocznie (zawroty, deliria). 1'00 = 14 h.

Chloralum - butyl hydrat. zob. Butyl-chloralum hydr.

Chloralum cyanhydratum 0'646 rozp. w 100,0 wody daje lek tak samo dział., jak Aqua amygd. amar. i zamiast tejsze polecany; przetwórz trwały (nieużywany).

— **formamidatum** Chloramid, Chloralformamid, używ. jako hypnot. *p. d.* 1'00! *p. die.* 4'00! w rozp. w wodzie, łatwo się rozkłada, przechowywać w chłodzie. 1'0 = 10 h.

— ***hydratum** 0'1—2'0 *p. d.* co godz. jako sedat.; 1'0—3'0 *p. d.* do 6'0! *p. die* jako hypnot. (dawkę tę można w delir. potator. przekroczyć do 4'0! *p. dosi.* a 8'0! *p. die* a nieraz jeszcze wyżej) w rozp. albo pig.; zewn. do lewatyw, czopków (1:1), do zastrz. podskór. (0'5—1'0:100) także do opatryw. ran, atoniczn. wrzodów, róży (1:20—50 Aqua albo glyc.) do pędzlowań. (1:30). 1'0 = 3 h.

Chlorsalol o i p (Chlorphenolum salicylicum). Krst. berbarwne w alkoholu i eterze rozp. Silny desinfiens. Przy Cystitis 4'0—6'0 *p. die.*

Chloralurethan (uralium) 2'0—3'0 *p. d.* polecany jako hypnoticum. 1'0 = 20 h.

***Chloroformium** wewn. 2—10—20 kropli (0'2—1'0) *p. d.* k. r. d. w syropie albo z klejami, z alkoholem albo eterem, w zawiesinie, w kaps., do wzięwań 2'0—10'0 czysty albo z eterem (1:9); do narkozy czysty lub z eterem i alkoholem, do maści, liniment., lewatyw (6—20 kropli), do podskórnych zastrzykiwań (0'50—1'0). 10 = 10 h. — **Aqua chloroformii** (1'0 chlorof.: 200 Aqu.) wewn. łyżeczkami aż do 150'0 *p. d.* czystej lub w miksturze; do przepiókiwania żołądka (3'0—10'0 chlorof. na 100 Aqu.) 100 = 40 h.; **Linimentum chloroformii** (1:2—10 Ol. Oliv.); **Liquor morphini chloroformiatus** 5—25 kropli *p. d.*

***Chlorum solutum** (Aqua chlorata, Aqua chlori) wewn. 2'0—5'0 *p. d.* aż do 50'0! *p. die* w 5-krotnem roz-

cieńczeniu (in vitro nigro); zewn. jako płók. do ust, gardła, do zmywań, przestrzykiwań (5'0—50'0 Aqu.) do pędzlowań (1:1—5 syropu lub miodu). 10'0 = 6 h.

Chrysarobinum (niewłaśc. nazw. Acidum chrysophanicum), araroba, proszek żółty; zewn. w maściach (1—5:20) w collodium, w żelatynie (5—15%). 1'0 = 20 h.

Cichorei Hb. i Rad. używane jak Taraxacum. 100 = 6 hal.

***Cinae flores** (Semen Cinae) wewn. 0'50—2'0 *p. d.* k. r. d. w proszku, mixt., powidl., czekolad., w infus. 10'0 do 15:100 do lewatyw 5'0—20'0:50'0—100'0 Aqu.) 10 = 3 h. **Extract. Cinae aether.** 0'30—2'0. 1'0 = 5 h.

Cinchoninum purum 1'0 = 10 h.; **C. hydrochloricum** i **C. sulphuricum** 1'0 = 6 h., w dawkach 2 razy większych niż chininum.

Cinchonidinum purum 2'0 = 6 h.; **C. hydrochloricum** 1'0 = 6 h. i **C. sulphuricum** 1'0 = 4 h., stos. jak poprzedni. **C. tannicum** stos. jak Chinin. tannic.

Cinamomi cortex (chinensis) 0'20—1'50 *p. d.* w proszku, w powidelk., w maceracyi wodnej. l. winnej, w infus. 3'0—15'0:100; conspeg. 10 = 12 h. — tak samo **Cort. Cinnam. Zeylanici** 10 = 10 h. — ***Aqua Cinnam. simplex** 100 = 22 h. — ***Aqua Cinnam. spirituosą** łyżeczkami l. w mixt. 100 = 50 h. — ***Ol. aether. Cinnam.** 1/2 do 2 kropli *p. d.*, corrigens. 1'0 = 20 h. — ***Syrup Cinnam.** (10'0—20'0:100). 10 = 12 h. — **Tinct. Cinnam.** 10—60 kropli *p. d.*; dodatek do płók. zębów i ust. 10 = 8 h.

Cinnamyleugenol igielki świejące rozpuszczalne w gorącym alkoholu, chlorof. aetherze. Używa się w tuberculosis. Podskórnie jako 10% rozczyn.

Citri fructus jako **succus citri** do mixt., saturacyi, limonad, do płók., pędz. — ***Ol. citri** 1—3 kropli *p. d.*, corrig. 1'0 = 8 h. — **Syrup citri** 10 = 22 h. — **cortex fr. citri** stosow. jak **cort. aurant.** 10 = 10 h.

Citrophenum poł. kw. cytryn. z phenetidną; proszek kryst. tr. rozp. w wodzie; wewn. po 0'5—1'0 *p. d.* aż do 6'0 *p. die* 1'0 = 25 h.

***Coca folia**, wewn. 0'30 1'0 *p. d.* 2—4 r. dz., w proszku lub decoct. (2'0—10'0:100—150) 20 = 14 h.

Cocainum hydrobromicum 0'10 = 20 h. dawka jak

***Cocainum hydrochloricum** (częśćciiej używ. niż cocain. purum, citricum, hydrobrom., salicyl.) wewn. 0'02—0'10! *p. d.* aż do 0'30! *p. die* w proszku, rozpuszcz. w wodzie, alkoh.; najczęściej zewn. do znieczulenia błony śluz. w 2—20% roztworze, czasem z morfiną; w maściach 0'20—0'30:10—20 w czopkach 0'01—0'02, 0'10 = 20 h.

Coccionela 10 = 12 h. i **Carminum** 10 = 15 h. barwiki.

Cocculi indici fruct. wewn. 0'05—0'20; zewn. w maś-
ciach i decoct. (1—20/0) 10 = 4 h.

Cochleariae herba; Spiritus cochlear. 1'0—4'0 p.
d. do płók. do ust, do tynktur zęb. 10 = 6 h.

Codeinum hydrochloricum 0'10 = 14 h. — **C. sul-**
phuricum i najw. używ.: **C. phosphoricum** 0'10 = 14 h.,
wewn. 0'015—0'16! p. d. aż do 0'40! p. die w proszk.,
pig.; mixt.; do podskórn. wstrzyk. 0'50:10 Aqu.)

Coffeae semen 10 = 10 h.

***Coffeinum Theinum** — wewn. 0'02—0'20!
p. d. do 0'60! p. die w pig., proszk., pastylk.;
podskórn. 0'01—0'02 p. d. 1'0 = 25 h.

— **citricum** 1'00 = 25 h.

— **hydrobromicum** 1'00 = 25 h.

— **natriobenzoicum** 1'0 = 20 h.

— **salicylicum** 0'10 = 20 h.

Colchici semen 0'05 = 0'25 p. d. w proszk., pig.,
10 = 6 h. **Acetum colchici** 1'0—2'0 p. d. 10 = 4 hal.

***Tinct. colchici semin.** 0'50—1'50! p. d. — 5'0! p.
die czysta lub w mixt. 10 = 12 h. — **Vinum col-**
chici semin. tak samo 10 = 20 h.

Colchicinum 0'0005—0'003! p. d. w proszk., pig., roz-
puszcz do podsk. zastrzyk. (b. drażni). 0'01 = 6 h.

***Colla pisc.** zob. Ichtyocolla.

***Collodium** środek osłaniający 10 = 40 h.

— **cantharidatum** zewn. zamiast empl. cantharid.
10'0 = 30 h.

— **elasticum** (Ol. ricini 1'0, ol. Terebinth. 5, Collodi.
94) 10 = 10 hal. **Aceton Collodium** patrz **Filmogen**
10'00 = 58 h.

Colocynthis fruct. pulv. (pulpa) wewn.
0'01—0'30! p. d. — 1'0! p. die w proszk., macer.,
infus. (10'0:100 Aqu. lub vinum) 1'0 = 8 h. —

Fruct. Colocynthis praeparat. stos. podob.
jak poprz. ***Extract. Colocynthis.** wewn. 0'005—
0'01 p. d. jako purg.; 0'01—0'05! p. d. — 0'20! p. die jako
drastic. 1'0 = 38 h. — **Tinct. colocynthis.** 1'0! p. d.
3'0! p. die. 10'0 = 20 h.

***Colombo rad. sciss.** (Calumba) 0'50—2'0 p. d. k. r.
d. w proszk., pig., infus. decoct., 5'0—15'0:100—200. 10 =

6 hal. **Extract. Colombo** 0'30—1'0 p. d. — 3'0 p. die
w proszk., pig., mixt. 1'0 = 30 h.

***Colophonium** tylko zewnętrznie. ***Empl. oxycro-**
ceum (Coloph. 1, Cer. flav. 3). 10'00 = 32 h.

***Collyrium adstring. luteum** 10'0 = 6 h. zob. Zin-
cum sulphur.

Conchae marinae praeparatae wewn. 0'50—2'0 p. d.
w proszk.; zewn. do proszk. zęb. 10'0 = 5 h.

***Condurango cortex.** w infus. macer., li decoct.,
(15'0—30'0:400 aquae ad coll. 200) 1—2 łyżk. p. d. 2—4
r. d. 10'0 = 6 h. — **Extract. Condur.** 0'2—0'50 p. d. 10'0 =

20 h. — **Ext. Condur. Fluid P. D.** 10'00 = 110 h. — **Vinum Condur.** łyżkami. 100'00 = 100 h.

***Conii maculat herb.** 0'05—0'30! *p. d.* — 2'0! *p. die* w proszk., pig., infus. (10'0—20'0), zewn. do okładów w infus. (1—4'0), do przestrzykiwań, wziewań (czasem z fol. hyoscyami). 10'0 = 4 h.

Emplastr. Conii 10'0 = 10 h. ***Extract. Conii** 0'02—0'20! *p. d.* — 0'60! *p. die* w proszk., pig., rozpuszcz. mixt., jako woda do ocz. (2—4'0); do wziewań (0'10—0'20:100), do lewatyw (0'10—0'30:150), do maści (0'50—1'0:10'0). 1'0 = 14 h.

Conium purum 0'0001—0'001! *p. d.* — 0'003! *p. die* w pig., kropl., mixt.; zewn. rozpuszcz. w alkoh., w maści (0'01—0'10:—15). 0'10 = 34 h.

Convallariae majalis herb. 0'3—0'5—1'0 k. r. d. inf. 5'0—10'0:100—150 Col. 10'0 = 4 h. — **Conv. maj. flor.** 10'0 = 12 h. — **Extr. conv.** 0'1—0'5 *p. d.* aż do 0'2 *p. die*. 1'0 = 5 h. — **Tra conv.** kroplami. 10'0 = 15 h.

Convallamarinum 0'005 = 0'06! *p. d.* aż do 0'3! *p. die* 0'10 = 3 h.

Cordol Tribromsalol. Antineuralgicum, antirheumaticum, sedativum, hypnoticum, 0'5—2'00 *p. d.* 1'5—5'00 *p. die*.

Cordyl Acetyl-Tribromsalol. Igiełki białe w alkoholu. rozp. Działa jak cordol. Dawka 0'50—2'00! *p. d.* 1'50—5'00 *p. die*.

***Coriandri fructus** (semen) 0'5—2'0 *p. d.* w proszk., inf., macer. (5'0—10'0—Col.). 100'0 = 16 h.

Cornutinum citricum (alkaloid z *Sec. corn.*) brunatny proszek 0'003, dwa r. d. w pig. rozp., w spermatorrhoe; w położnictwie zam. secale w dawce 0'005—0'01.

Coto cort. (antidiarrhoic) 0'02—0'05 w proszku. 10'0 = 20 h. — **Tinet. coto** 10—15 kropli *p. d.* k. r. d. 10'0 = 16 hal.

Cotoinum glykozyd 0'1—0'2—0'3! *p. d.* 1'0! *p. die* w kaps., emulz. i mixt. 0'01 = 8 h.

Creolinum zewn. w 1/2—2'0 roztworze do zmywań, do pedzłow. 10'0 = 6 h.

Cresolum crudum = surowy kw. karbolowy.

Crocus (szafran) 0'2—1'5 *p. d.* w proszk., powid., inf. (2—5'0); do okładów, plastrów, maści. 1'0 = 34 h. — **Tinet. croci** 10—50 kropli. 10'0 = 55 h.

Cubebae fructus 1'0—10'0 *p. d.* aż do 30'0! *p. die* w proszk., pig., tabl.; do przestrzyk. w inf. (10'0—15'0:100 Col.). do lewatyw (5'0—15'0 z żółtkiem). 10'0 = 6 h. — **Ext. Cubebae** 0'5—2'0 *p. d.* k. r. d. w pig., zawiesinie. 1'0 = 20 h. — **Ol. Cubeb.** 5—15 kropli. 1'0 = 10 h.

Cuprum aceticum (*Aerugo crystallisata*) rzadko wewn. po 0'006—0'06 *p. d.* w pig., proszk., rozp.; zewn.

do płók. (0'1:100), przestrzyk. 0'4—1'0:100), jako woda do ocz (0'1—0'5:100 do maści (1—10⁰/0). 10'0 = 10 h.

— **aluminatum** (lapis divinus) tylko zewn. jako żrący, jak woda do ocz (0'1—0'5:100), płóćkanka (1'0—2'0:100). 10'0 = 10 h.

— **oxydatum** (nigrum) 0'01—0'1 *p. d.* w proszk., w pig.; w maści (1:8—20). 1'0 = 3 h.

— ***sulphuricum purum** wewn. po 0'01—0'03 *p. d.*; jako wymiotny po 0'05—0'4! (dzieciom 0'05—0'1 *p. d.* aż do skutku) w proszk., pig., rozp.; zewn. in subst. albo w proszku (1:1—20 sacch.), także w rozp. (0'2—1'0:3'0—100 Aq.), jako żrący i adstring., do pędzlow. (0'1—0'2:20 Glyc.), płók. (0'1—1'0:100), do ocz (0'05—0'5:100), do przesstryk. (0'2—2'0:100), do maści (1'0—3'0:10—25) i maść do ocz (0'1—0'6:10). 10'0 = 6 h. — **C. sulf. crudum** tylko zewn. — **Cup. sulf. ammoniatum** 0'01—0'10! aż do 0'4! *p. die* w proszk., pig., rozp.; zewn. do płókań, przestrzyk. (0'1—0'4:50 Aq.). 10'0 = 10 h.

Curare 0'001—0'002 *p. d.* rozp. w wodz. lub alk.; do podsk. wstrzyk. (0'1:10 Aq.), rozpocz. od 0'002 ostrożnie w górę aż do 0'02, *p. die*; przed użyciem wypróbować przetwór na żabie 0'1 = 20 h.

Curcumae rad. do barw. maści. 10'0 = 4 h.

Cutolum (Aluminium boricotannicum) zewn. jako zasypka, lub w maść. wieczem., interirgo oparzeniach, odmrożeniach.

***Cydoniae semen** 10'0 = 10 h. używ. do **Mucilago Cyd.** (1:50 Aq.). 10'0 = 6 h.

***Dammar resin.** wchodzi w skład empl. adhaesiv.

Dermatol (pol. bism. z kw. gallus.). proszek bezwonny delikatny, używ. zewn. jak jodoform w proszku, maściach, gaza 10—20% itd., także wewn. w chorob. przew. pokarm. jak bism. subnitr. aż do 2'0 *p. die* 10'0 = 100 h.

Diaphterinum (Oxychinaseptol) proszek w wodzie rozp., nietrujący, antysept. do przepłók. jam. 1/2—20%. 1'0 = 10 h.

Digitalinum verum, proszek mało rozp. w wodzie, ma dział. podobnie jak inf. fol. digit.; przetwór dig. germanicum wewn. po 0'001—0'002! *p. d.* aż do 0'01! *p. die*; przetwory francusk. i angielsk. znacznie mniej 0'00025—0'0005 *p. d.*; także w maściach. 0'01 = 4 h.

***Digitalis folia** 0'03—0'20! *p. d.* 4—6 r. dz. — 0'60! *p. die* w proszk., pig., infus. (0'50—1'0:100 Coll. wyżyć w ciągu dnia) 10'00 = 5 h. — **Ace-tum digitalis** 0'50—1'0 w kropl., mixt. — **Extractum Digitalis** 0'03—0'20! *p. d.*, 1'0 *p. die*. — ***Tinctura Digitalis** 0'50—1'50! *p. d.* — 5'0! *p. die*. 10'0 = 12 hal.

Digitoxinum proszek nierozpuszczalny w wodzie,

0'00025! *p. d.* 2—4 r. d. lepiej w klyzma 0'00075 nie drażni żołądka i dobrze się resorbuje. 0'2 = 100 h.

Dijodoform czworojodoetylen, zast. jak jodoform, bezwonny.

Diuretinum (Theobromin. nastrosalicyl) proszek biały w wodzie rozp., działa moczopędnie, nie wpływa na serce. 1'0 *p. d.*, 5'0—6'0 *p. die* 10'0 = 300 h.

Djamboë folia (z *Psidium-pyriferum*), *Stypticum*, *Stomachicum*. Co 2 godz. 0'5—1'00.

Duboisinu sulphur. 0'01 = 8 h. — **D. hydrobromicum** proszek bez smaku i zapachu, działa nasennie, wewn. lub podskórnie 0'0002—0'001 *p. d.* — 0'003 *p. die*; stosowany u umysł. chorych.

***Dulcamarae stipites** 0'50—2'0 *p. d.* k. r. d. w proszku infus., decoct. (5'0—20'0: 120 coll.), także w species.

Extract Dulcamarae. 0'50—1'50 *p. d.* 1'0 = 4 h.

Elaeosacchara składają się 50 cukru i 1 olej eter.

***Electuarium aromaticum** c. opio $\frac{1}{2}$ —1 łyżeczki 3—4 r. dz. 10'0 = 8 h.

***Electuarium lenitivum sennae** 1—10 łyżeczek. l. w mixt. 10'0 = 10 h.

***Elemi resina** do maści, plastrów. 10'0 = 5 h.

Elixir amarum łyżeczkę do $\frac{1}{2}$ łyżki *p. d.* 2—4 r. dz.

aurantiorum compositum 1—3 łyżeczek *p. d.* k. r. d. 10'0 = 20 h.

Emetinum purum 0'0005—0'002 jako expector.; 0'005—0'01 jako emetyk, w proszku, rozpuszcz. 0'10 = 10 h.

***Emplastrum adhaesivum** 500 □ cm. = 30 h.

— **anglicanum** 100 □ cm. = 40 h.

— ***cantharidum ordinarium** (vesicans) *Canth.* 2, ol. oliv. 1, potem cera flava 4. Tereb. 1, 10'0 = 20 h.

— **perpetuum** (rubefaciens)

hydrargyri. 10'0 = 15 h.

— **meliloti.** 10'0 = 8 h.

— ***oxycroceum** (Colophon. 1, Cerae flavae 3). 10'0 = 32 h.

— ***saponatum** (Empl. diachyl. simpl. 600, Cerae alb. 100, sapo. venet. 50, Camphor. 10, Ol. oliv. 40). 10'0 = 10 h.

Eosot (Creosot. valerian.). Używany w gruźlicy 3×d. 1—3 kapsulek á 0'20.

Ephedrinum hydrochlor. alk. z ephedra vulg. w 10% roztworze działa jak Homatropin.

Equiseti herba decoct. (5'0—30'0: 150—200 coll.). 100'0 = 20 h.

Ergotininum Alkaloid z sec. cornut., przetwórnietrwały, podskórnie 10—20 kropli z roztworu 0'001:1'0 w nerwicach naczynioruchowych. 1'0 = 30 h.

Ergotinum (Extr. sec. cornuti aquos; Bonjean) 0'10—0'50! *p. d.* — 1'5 *p. die* w pig., pastyl., rozpuszcz., mixt.; podskórnie 0'02—0'20 *p. d.* (nawet 0'50 *p. d.*) — 1'0 *p. die*

rozpuszcz. w wodzie, glicerynie. i alkoholu; do czopków (0'20—0'50:2), do lewatyw (1'0—3'0:100—200 aquae).
dialysatum (Bombellon), 1'0=30 h., stos. jak poprzedni.

citricum solubile do zastrzyk. podskórnych 0'0002 p. d.; **cornutinum** (Kobert) 0'0025, w krwotok., poronien.

Erodium cicutarium (Geraniaceae). Używ. w krwotokach macicznych. Rp. Inf. Erod. cic. 15:180 Aq. Ol. menth. pip. gutt. II. S. Co 2 godz. łyżkę stołową.

Eryodictionis Californici fol. (Verbasanta), Syrup **Er. Calif.** 10'0=30 h.

Erythrolum tetranitricum. Igielki bezbarwne, w alkoholu rozp., przy silniejszym uderzeniu lub w cieple eksplodujące. Używa się w Angina pectoris, Asthma, zapaleniu nerek i t. d. w odstępach 4—6 godz. rozczyну alkohol. 4cc z wodą zmieszanego (1:60) p. d. 0'07! 0'10=80 h.

Eserinum zob. Physostigmin.

Eucaïn. Używane zamiast cocaïny w rozczyynie 5—10% w chorobach nosa i gardła. Do oczu niewolno z astosowywać. 0'10=10 h.

Eucalypti globuli, cortex — folia 0'50—1'0 p. d. — 10 p. die w proszk., infus., decoct. (10'0—30'0:100—150 coll.), co 1—3 godz. w zimnicy; do płókanek, lewatyw. 10'0=3 h.

Eucalypteol (Eucalyptinum hydrochloricum) otrzymuje się z Ol. Eucalypti, tworzy włókna białe, rozpuszczalne w alkoh., eterze, chlorof., w ol. eter. i tłustych olejach. Używane jako antisepticum wewnątrznie w chronicznej Bronchitis, Pneumonii, gruźlicy płuc itd. po 0'25 dziennie 4—6 razy. **Vinum Eucalypti** 1—3 łyżeczki p. d. — **Oleum Eucal.** (Eucalyptolum depuratum) wewn. 0'20—2'0 p. d., do nacierañ (1—5:10 Ol. Oliv.), wziewań, podskór. (0'20—0'50 p. d.). 10=35 h. — **Tinctura Eucal.** łyżeczkami 40'0 p. die, do płókan. itd. 10'0=10 h. — **Eucalyptolum** wewn. 0'3—2'0 desinf., antipyr. 1'0=6 h.

Euchinin Etyloweglan chininy. 0'10=6 h. — **E. hydrochloricum**, łatwo rozp. w H₂O. — **E. sulphuricum**, trudno rozp. w H₂O. — **E. tannicum**, trudno rozpuszcz. w H₂O. Używane jak chinina w dawkach 0'20—1'00 pro dosi.

Eudoxin. Proszek czerwono-brunatny. Używa się w katarach żołądka i kiszek 3×d. 0'20—0'50, dla dzieci 0'01—0'2 pro dosi, 0'10=8 h.

Euphorbium resina do drażniących maści (1:20), zasypek.

***Euphorinum = Phenylurethanum** proszek rozp. w wodzie z wyskok., wewn. 0'10 p. d. — 1'50 p. die jako antipyrctic; także jako antirheum zew. w maśc., rozp. działa antysept. 1'0=18 h.

Europhen (Kresoljodid). Proszek rozp. w wyskok., chlorof., eterze, ma podobne własności jak jodoform, stosow. w maśc. (2—10%) podskórne (0'05—0'10) jako antiluetic. r'o = 54 h.

Exalgin antineuralg. antip. 0'10 p. d. — 0'25 p. die w proszk. l. rozp. w wodzie z dodatkiem alkohol. r'o = 40 h.

Faba calabarica zob. Physostigmin.

— **St. Ignati** podobne stos. jak nux. vomic., dawka o 1/2 mniejsza.

Fango, muł z gorących źródeł z Battaglia. Masa brudno-zielona, używana w dolegliwościach rheumat., jakoteż w kobiecych chorobach w formie okładów.

Farfarae folia et flores jak folia altheae. 100'0 = 32 h.

Fel Tauri (recens) 5'0—15'0 p. d. k. r. d. w rozp. mixt., z wod. aromat., do maści, liniment. — **Fell. Tauri inispisatum** 0'50—1'50 p. d. k. r. d. w pig. l. jak poprzednie, do maści, liniment. lewat. r'o = 3 h. — **Fell. Tauri depuratum siccum** i **Natrium Taurochloricum** w dawk. o 1/2 mniejsz.

Ferratinum połączenie białka z żelazem; w wodzie nierozp., l. w połączeniu z sodem rozpuszcz., stosow. w niedokrewn., w blednicy 0'5—1'0 p. d., 1—3 z dz. dzieciom 1'0—0'5, r'o = 24 h.

Ferratinnatrium stos. jak poprzedni szczególnie u dzieci.

Ferropyrin (ferripyrin). Ciemno-czerwony w H₂O rozp. proszek. Używa się w 20% roztworze do tamponowania ran krwawiących. Przy gonorrhoe w 1—5% roztworze. W anemii i blednicy 3—4 X dnia po 0'05 w roztworze r'o = 32 h.

Ferrum aceticum liquidum (Liquor ferri acetici). (5—20 kropli p. d. k. r. d. w aromat. mixt. 10'0 = 8 h. — **Tinct. ferri acet. aether.** 10—50 kropli p. d. 2—4 r. dz. z cukrem, surup., winem. 10'0 = 14 h.

Ferrum aceticum siccum 0'05—0'20 p. d. k. r. d. w pig. r'o = 3 h.

— **albuminatum liquidum** (Liquor ferri albuminati) 1/2—2 łyżeczek p. d. 2—4 razy dziennie, podskór. 0'50—1'50 p. d. 100'0 = 100 h.

Ferrum bromatum 0'05—0'25 p. d. k. r. d. w pig., rozpuszcz. r'o = 5 h.

— ***carbonicum saccharatum** 0'20—0'50 p. d. k. r. d. w proszk., pig. 10'0 = 24 h.

— **chloratum** (muriaticum oxydulat.) 0'10—0'25 p. d. k. r. d. w rozp. **Liquor ferri chlorati** 0'20—1'0 p. d. 2—4 r. d. w syrop., winie. — **Spiritus ferri chlorat. aether.** zob. Ferrum sesquichlor. 10'100 = 12 h.

— **citricum ammoniatum** 0'20—1'0 p. d. w pig., proszk., rozpuszcz. r'o = 8 h.

— **citric. c. chinino citrico** zob. *Chininum ferro-citricum*.

— **citricum oxydatum** 0'10—0'60 *p. d.* 2—4 r. d. w pig., proszk., l. syrup.; podsk. z 10⁰/₀ rozczynu 0'10 *p. d.*

— **glycerino-phosphoricum**. Żółte, w H₂O i rozcińcz. alkohol. rozpuszcz. kryształki Rp. *Ferri glyc-phosph.* 2'00, Aq. Cinamon, 40'00, Syr. aurant. 160'00 Ds, Łyżkę do szklanki wody. 1'00 = 22 h.

— **hydroxydatum dialysatum** wewn. 5—10—20 kropli *p. d.* zewn. jako haemostat i styptic. 1'00 = 5 h.

hypophosphorosum, syrupus ferri hypophosphorici, łyżeczkami.

— **jodatum** 0'05—0'30 *p. d.* — 0'50 *p. die*, w proszk., pig., rozpuszcz. (w glicerynie); do maści (1—2 : 5—20), do kąpieli (25'0—60'0 na kąpiel). — **Liquor ferri jodati** tak samo jak *ferrum acet liquid.* — **Ferrum jodatum saccharatum** 0'25—1'0 *p. d.* — 2'0 *p. die*, w proszk., pig., pastyl., rozpuszcz. 1'0 = 6 h. — **Syrupus ferri jodati** 10'0—15'0 *p. d.* 2—3 r. d. w mixt. l. *aa* ze syrup. simpl. 10'0 = 8 h.

Ferrum lacticum 0'10—1'0 *p. d.* w proszk., pig. 1'0 = 4 h.

— **malatis f. extractum** (*Extract. ferri pomat.*) 0'20—0'60 *p. d.* k. r. d. w pig., l. rozpuszcz. 10'0 = 20 h. — ***Tinctura malatis ferri** (*Tinct. ferri pomat.*) 10—60 kropli (0'50—2'0 *p. d.*) k. r. d. w syrup., winie, mixt. 10'0 = 18 h.

— **oxychloratum solutum** (*Liquor ferri oxychlorati*) — zobacz. *Ferrum sesquichlor. solutum*.

— **oxydatum fuscum** 0'20—1'0 *p. d.* w pig., proszk.

— **oxydatum saccharatum solubile** 0'50—3'0 *p. d.* (stos. w zatr. arsenikiem $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ łyżeczki co godzinę).

— **oxydatum oxydulatum** (*Aetiops Martialis*) 0'15—0'50 *p. d.* w proszk., pig. 1'0 = 3 h.

— **peptonatum sicum** 1'0 = 8 h. stos. jak F. alb. solub.

— **phosphoricum oxydulatum**. — **Ferrum phosph. oxydatum** stos. jak F. oxydat. oxydul.

— **pulveratum** (*Limatura ferri*) 0'05—0'2 *p. d.* k. r. d. 10 = 8 h.

— **pyrophosphoric. oxydatum** 1'0 = 6 h. stos. jak F. phosphor.

— **pyrophosphor. c. ammonio citrico** 0'10—0'50 *p. d.* w proszk., pig., rozpuszcz. 10'0 = 30 h. = **Ferrum et Natrium pyrophosphor.** wewn. jak poprzedni podskórn. (1:6 Aq.).

— **hydrogenio reductum** 0'05—0'20—0'50 *p. d.* 1—4 r. d. w proszk., pig.

— **sesquichloratum crystalisatum** 10'0 = 10 h. a z niego ***Ferrum sesquichloratum solutum** (*Liquor ferri*

sesquichlorati) 0'10—0'50—1'0 (2—15 kropli k. r. d. w rozpuszcz. mixt.; zewn. jako żrący, czysty albo jako styptic. (1:3—5 Aqu.) na wacie (Gossypium haemostatic.); do przestrzyk. (0'10—5'0:100—500 Aqu.), jako woda do ust, oczów, uszu (0'20—4'0:100), jako płókanie (2—5%), do wzięwań (1'0—20'0:500) do maści, czopków (1'0:2'0—10). 10 = 8 h. str. 10, ***Spiritus ferri sesquichlor. aether.** (**Tinct. ferri chlor. aether.** Tinct. nervitonica Bestuscheffii 0'30—1'50 p. d. (10—20 kropli) k. r. d. czysty lub z środkami aromat., w syropie, mixt.

***Ferrum sulphuricum** (oxydulat) czyste 0'05—0'50 p. d. 2—4 r. d. w proszk., pig., pastylk., rozpuszcz.; jako zasyпка z alunem lub węglem; do pędzlow., przestrzyk., do (1—2%), do okładów (2—5%), do kąpieli (25'0—100'0 na kąpiel), jako woda do ocz (0'05—0'40:25 Aqu.); do maści, liniment. (1'0—10'0:30). 10'0 = 4 h. — **Ferrum sulphur crudum** (vitriol) do odwietrz. także do kąpieli 100 = 4 h.

— **sulphur. siccum** 0'03—0'20 p. d. w pigułk. **Liquor ferri sulphur. oxydati** 0'50—2'0 czyli 8—30 kropli, zob. Antidotum arsenici.

— **tartaricum** jako kalium ferro tartaricum. (Tartarus ferratus 0'20—0'50 p. d. k. r. d. w pig., mixt., rozpuszcz. 1'0 = 4 h. ***Kalium ferro-tartar. crudum** (Globuli Martiales) tylko do kąpieli (30'0:120 czyli 1—4 kul na kąpiel). 1 kula = 40 h.

***Filicis maris rhizoma** (Radix) 12'0—20'2 p. d. 2—4 r. dz. w proszk., powidełk., w zawieszynie, rzadko w decoct. (30'0—60'0:100 coll.) 10'0 = 12 h. — ***Extract. filicis maris** 2'0—10 p. d. w pig., kaps., powidełk. 1'0 = 25 h.

Filmogen (Acetoncollodium), 15% roztwór Nitrocelulozy w Acetonie. Na skórze tworzy powłokę. Używane n. p. przy Psoriasis ā ā part. cum Ol. Cadini. 10'00 = 58 h.

Foeniculi fructus (semen) 0'50—2'0 p. d. w proszk., inf. (5'0—15'0:100) species. 100'00 = 24 h. ***Aqua foeniculi** łyżeczk. 100 = 15 h. — ***Oleum foeniculi** 1—3 kropli p. d. 1'0 = 8 h. **Syrupus foeniculi** 5'0—15'0 p. d. corrig. 10'0 = 6 h.

Formaldehydum solutum. Formalina około 35% roztwór. wodny czyst. form. przeważnie do dezynfekcyi; w dentyście.

Formanilidum krysz. rozp. w wodzie wewn. 0'15—0'25 k. r. d. jako antypir.; zewn. wdmuchiwa. ā ā z amyllum lub 2% roztwór. do pędzl. znieczula.

Formicae rufae do kąpieli (1/2—1 kilo) — **Spiritus formicarum** 20—60 kropli k. r. d.; zewn. do nacierań, zmywań, kąpieli. 10'0 = h.

Frangulae cortex decoct. (10'0—25'0:100—200 coll.) łyżkami, także do lewatywy. 10'0 = 4 h.

Franciscae uniflorae, radix. Otrzymywane z Fran-

ciscea uniflora albo *Brunfelsia hopeana*. Używane jako *antisiphiliticum*, *antiscrophulosum*, *antirheumaticum*. Podaje się 3—4 \times d. 0'60 sproszkowanego korzenia.

Fuchsinum (*Rosanilinum hydrochloric.*) 0'025—0'25! *p. d.* do 0'50! *p. die* w proszk., pigułk., wodach arom., mixt.

Fungus chirurgorum zewn. jako haemostat.

Fungus Laricis 0'1—0'2 k. r. d. w pig. przeciw potom suchotników. Zob. *Agaricus alb.*

Gallacetophenon. Proszek alizarynowo-żółty, rozp. w gorącej H_2O , glicerynie, alkoholu i eterze. Używane jako *antisepticum* w psoriasis, eczema, jako 4⁰/₀ rozczyn lub 10⁰/₀ maść. 1'00 = 14 h.

Galbanum gumi resina (*Peucedanum galbanifluum*) 0'30—1'0 *p. d.* w pig., do plastr., do lewat. (2'0—6'0).

Galeopsis grandiflora Hb. w infus, lub decoct. (15'0—30'0: 100), 10'0 = 5 h.

Gallae (*halepenses*, *turcic.*) 0'30=1'0 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., infus. (5'0—15'0: 100) zewn. do zasypek, maści (1: 10), kąpiel, (100'0—200'0) na kąpiel, lewat. 10'0 = 8 h. ***Tinct. gallarum** (0'50—2'0) 10—40 kropli *p. d.* zewn. do pędzl. płókanek, przestrzyk. (5—10⁰/₀). 10'0 = 8 h.

Gallanolum (*Anilid kw. gall.*) zewn. w maściach (1—5: 30,0) w chor. skórnych (*psoriasis*), 1'0 = 20 h.

Gallicynum (*Methylaether. k. gall.*) w niez. spojówce 1'0 = 24 h.

Gallobromolum wewn. w rozc. 10: 150 3 łyżki dziennie zamiast bromu w epilepsji; zewn. 1—2⁰/₀ w rzerzączce. 1'0 = 20 h.

***Gelatina animal. alba** decoct. (1'0—8'0: 100 coll.), zewn. do kąpeli (1/2—2 kilo na kąpiel, w odmrożeniach, do lewat., jako constit. do przyrządzania leków. 10'0 = 12 h.

Gelsemii sepervirent. radices 0'05—0'40 *p. d.* 10'0 = 5 h. — **Extr. fluid. gels. semp.** 0'03—0'40 *p. d.* — 0'50 *p. die.* 10'0 = 20 h. — **Tinct. gelsem. semp.** 5—30 kropli *p. d.* 10'0 = 12 h.

***Gentianae radix** wewn. 0'30—1'50 *p. d.* k. r. d. w proszk., macerac. (alkoh. lub wodzie), w infus. i. decoct. (3'0—15'0: 150) 10'0 = 3 h. — ***Extr. Gentianae** 0'50—2'0 *p. d.* kr. r. d. w pig., mixt. 10'0 = 35 h. — **Tinct. Gentianae** 1'0—2'0 *p. d.* 10'0 = 8 h.

Geosot = **Guajacolum valerianicum** płyn oleisty w alkoholu i eterze rozpuszczalny. Używany w gruźlicy 2—3 \times a 0'20 w kapsułkach gelatynowych 1'00 = 28.

Glutol = **Formaldehyd-Gelatine** proszek żółtawo-biały rozpuszczalny w H_2O zapomocą ogrzania. Używa się jako *antiseptikum* w ranach, sparzeniach itd. 10'00—170 h.

***Glycerinum** wewn. łyżeczk. lub łyżk. aż do 40'0—

100 *p. d.*, zewn. czysta z wodą do nacierań, pędzlow., przestrzyk., lewat. (2'0—3'0), wziew. (czysta lub 1:5—10 aqu.), do tampon., jako const. i excip. rozmaitych środków. 10'0=6 h. — ***Unguent. glycerini** do opatr. 10'0=12 h.

Gossypium depuratum (wata) — **Gossypii herbaei rad. cort.** 0'30—0'60 *p. d.* w proszk., decoct., (10'0—15'0: 100—200 coll.). — **Extr. fluid goss.** 1'0—5'0 *p. d.* — 15'0 *p. die.* 10'0=20 h. **Extr. gossyp. fluid.** P. D. 10'0=50 h.

***Graminis radix.** (rhizoma) decoct. (30'0—100'0) ***Extract. graminis** łyżeczk. 10'0=30 h.

***Granati cortex** w mac., decoct. (30'0—100'0: 200—500 coll.). 10'0=8 h. — ***Extr. granati** 4'0—8'0 *p. d.* 2—3 r. dz. w mixt. 1'00=14 h.

Gratiolae hb. 0'10—2'0 *p. d.* — 3'0 *p. die.* w proszk. pig., decoct. l. infus (2'0—10'0: 100—150 coll.). — **Extr. grat.** 0'20—1'0 *p. d.*

Grindeliae robustae flor. jako extr. fluid. 0'20—0'40—1'0—2'0 *p. d.* w asthmie w mixt. l. mleku. — **Extr. grindel.** 0'10—0'15 *p. d.* 10'0=20 h. **Extr. Grindel fluid.** P. D. 10'0=50 h. **Tinct. grindel.** 10—15 kropli.

***Guajaci lignum** wew. 15'0—20'0 *p. die* w spec., proszk., najczęściej decoct. (15'0—20'0: 100—200 coll.). 10'0=2 h. — ***Resina Guajaci** 0'30—1'0 *p. d.* 2—4 r. dz. w proszk., pig., zawiesinie (2'0—8'0: 100), w mixt. 10'0=15 h. = **Species lignorum** (składa się Lign. guaj. raspat 5; Rad. ononid. 3; Rad. liquirit. i lign. sassafraas *aa* 1) decoct. (25'0—60'0: 500—1000 aqu.). 100'0=40 h. **Tinct. Guaj.** 15—50 kropli *p. d.* k. r. d. w mixt. 10'0=12 h.

Guajacetin proszek biały, w H₂O rozp. nietrujący, używa się w gruźlicy 3—6×a 0'50 *p. d.* 1'0=34 h.

Guajacolum 0'1—0'5! *p. d.* w roztworze wodno-alkohol., winie, tranie, także w kaps. w miejsce kreosotu u suchot. działa także rozpost. na skórze (1:3 Alkoh.) 10'0=80 h. — **Guajacol benzoic.** i **Guaj. carbonicum** stosow. u suchotn. 0'20—0'60 *p. d.* — 5'0 *p. die.* nie psuje trawienia 1'0=18 h.

***Guarana pasta** 0'50—4'0 *p. d.* w proszk., u dzieci 0'30—1'50 *p. d.* 2—3 r. dz. 1'0=4 h.

***Gummi arabicum** 1'0—10'0 *p. d.* w proszk., rozp. puszcza, zawiesin. z syrup., jako excip. dla kamfory itd. 10'0=14 h. — ***Mixt. gumm.** (składa się gum. arab. 10; sacchar. 5; aq. 150) łyżeczkami czysta l. do mixtu. —

***Mucilago gum., arab.** (1:2 aq.) czyst. l. mixt., jako constit. do rozmaitych lek. 10'0=10 h. ***Pasta gum. albuminata** (ciasto ślazow.). 10'0=18 h. — ***Pulvis gum.** składa się z amylum, rad. liquir. *aa* 1'0, gum. arab., sacchar, *aa* 2) jako consit. do proszk. pig. 10'0=12 h. — **Syrup. gum.** (składa się mucilag. gum. arab. syr. simpl. *aa*).

Guttapercha depur. do ustalających opatr., w dentystyce. 1'0=8 h. **Traumaticinum** (guttap. i, Chloroform 10) stosow. jak collodium. 10'0=32 h.

Gutti gummi — resina gutti 0'01—0'30! *p. d.* — 1'0! *p. die* w pig., proszk., zawiesinie (0'30—0'50:100). 1'0=4 h.

Hamamelides virgin. cortex. 0'10—0'50. *p. d. k. r. d.* w proszk., pig., decoct. (15'0—30'0:100—200 coll.). — **Extr. fluid. hamamel. v.** 2'0—8'0 *p. d.* 2—3 r. d. 10'0=18 h. **Extr. fluid. ham. P. D.** 10'0=45 h. — **Extr. ham. v. siccum** (Hamamelin — Hamamelidin) 0'03—0'05 *p. d. k. r. d.* w pigułk. do maści, (2—4:20—30), do czopków (0'05—0'10). — **Hazelin** wodny ekstrakt świeżej kory ham. virg. 1'0—2'0 *p. d.*; zewn. do nacierań, okładów etc.

Hellebori viridis (rad. rhizom.) 0'03—0'30 *p. d.* — 1'0—2'0 *p. die* w proszk., decoct., macer., infus. (0'20—2'0:100. — **Extr. hel. vir.** 0'05—0'10 *p. d.* — 0'30 *p. die* — **Tinct. hel. vir.** 10—30 kropli *p. d.* — **Helleborinum** 0'01—0'3! *p. d.* — 0'12! *p. die* w proszk. mixt. w miejsce digitalis, łatwo wywołuje rozwolnienia.

Herniariae glabrae hb. do spec. i decoct. (5'0—15'0:100 coll.). 10'0=4 h.

***Hirudo** (pijawki). 1 szt.=20 h.

Homatropinum hydrobromicum jako mydriaticum 0'5—1'0:100 mniej trujący jak atropin wewn. w pig. 0'001! *p. d.* — 0'003! *p. die* przeciw potom nocnym u suchotn. 0'01=35 h. — **H. muriaticum sulfuricum** 0'01=35 h. stos. tak samo.

Hydrargyrum aceticum oxydat. rzadko wewnętrzn. najczęściej jako kosmetyk przeciw piegom, rozpuszczalne (1'0—1'50:100 aq.) — **H. acet. oxydulat.** do maści (1'0—2'0:25).

Hydrargyrum aethylo chloratum podsk. (0'10:10'0 aq.) $\frac{1}{2}$ —1 strzyk. na raz.

— **benzoicum** w wodzie nierozp. tylko w alkohol., wewn. 0'005—0'01 w pig. lub z rozczyngu 0'25:30 Aquae i 0'25 soli kuch. dziennie 1 strzykawka podskórn. zew. do okładów na ulcera luet. (0'05—0'2:30), 1'0=10 h.

— ***bichlor corrosivum** (sublimat) wew. 0'003—0'03! *p. d.* — 0'10! *p. die* w pig. (często z opium) rozpuszczalny w alkoholu, wodzie, zewnętrzn. jako środek żrący w rozczyzn. zgęszczonych (0'50—1'0:10 aq., collod., alkoh.). znacznie rozcieńczony jako antyseps. do płukań (0'05—0'10:500—1000). do ocz (0'01:25—100), do wziewań, rozpylań (0'01—0'05:500—1000); do okładów, opatrunk., przepłókiw., (1'0:1000—2000 z dodatkiem soli); do pochwy (0'30—0'60:100) do nosa (0'01—0'03:100) itd., do pędzlowań (0'50—1'0:100 glyc., wody l. alkoh.), do kąpieli

(10—3'00 na kąpiel) do maści (0'50—10:25), podskórn. (10:100 aq., albo lepiej Hydrarg. b. chl. corr. 1:100 aq. + 3 Natr. chlorat.), t. j. 0'005—0'01 *p. d.*, 1—2 r. dz. w rozmaite miejsca ciała; także do dezynfekcyi, 10=4 h. — **Pastili sublim.** = à 10. — **Hydr. bichl. albuminat solut.** wewn. w dawkach jak bichl. corr. w mleku, kawie itd. często podsk.: 0'005—0'01 *p. d.* — ***Hydrarg. bichlor. amoniak.** (H. praecipitat. album) tylko zewn. jako zasypka (10:25—50 sacch.), do maści (10:10—25), 10=5 h. — **Hydrarg. peptonat. liq.** 10% do iniekcyy podskórnych 10=6 h.

— ***bijodatum rubrum** 0'005—0'01 w pig., rozp. (z kal. jod.). — 0'1, *p. die* w kile, zewn. jak sublimat. 10=8 h.

Hydrarg. carbolicum (diphenylicum) 0'02—0'03 *p. d.* 2—3 r. dz. (dzieciom 0'004—0'005 *p. d.*) jako antilueticum. 10=16 h.

***Hydr. chloratum mite subl. parat.** wewn. 0'01—0'20 *p. d.* 3—4 r. dz. jako antiluetic.; 0'10—0'50—10 *p. d.* jako laxans, w proszk., pig.; zewn. jako zasypka do nosa, gardła, ocz., lewatyw (0'10—0'50 z środkiem klejkimi), do maści, czopk., podskór. (0'01—0'02 *p. d.*), 10=4 h.

***H. chloratum mite vapor. parat.** 1/3 dawki poprzedniej 100=5 h.

— ***metallicum depurat.** 10'00=15 h. ***Emplastr. hydrarg.** (H. 1:4). 10'0=15 h. ***Unguent. hydrarg. ciner.** (1:3) do wcierań miejsc. po 0'50—4'0 *p. die* na jeden raz 1. kilka razy wetrzeć (z dodatkiem K. jod. Camphor., Opium, Bellad i t. d.), do wcier. przy lues. (1'50—4'0 *p. die*) do czop. (0'20—0'50—2'50:5 Ol. Cacao, sapo 1. cera). 10'0=18 h.

— ***jodatum flavum** 0'01—0'05! *p. d.* — 0'20! *p. die* w proszk., pig., past.; zewn. do maści (0'50—5'0:25—50), do maści ocz. (0'10—0'50:10—25). 10=8 h.

— **jodicum** proszek biały rozp. w rozcieńcz. rozczy nie soli kuchen. albo kali jodat. Używa się w lues, podsk. 1—1 1/2 Prav. co 2—4 dzień, a to z następującego rozczy nu: *Rp.* Hydrarg. jodic. 0'12 kali jod. 0'08 Aq. des. 10'00, potrzebne 20—30 iniekcyy.

— **kalium sulfurosum** nie tworzy strątu z białk. polec. do wstrz. podskórnych (0'25:10,0 z tego 1/2—1 strzykawki *p. d.*

— **nitricum oxydat.** 10=3 h. i **H. nitricum oxydulat.** 10=3 h. od 0'004—0'015 *p. d.* — 0'05 *p. die* w pig., rozpuszcz., do maści (Ung. Hydrarg. citrini) do wcierań.

— **oleinicum** 15% do wcierań 0'50—2'0 *p. d.* 1—2 r. dz. (czasem z morfiną). 10=3 h. tylko zewnętrzn.!

— **oxycyanatum** b. silny antiseptyk w 2% rozczy 10=18 h.

***oxydatum flavum** (via humid. parat.) 0'006—0'03! *p. d.* 1—2 r. dz. — 0'10! *p. die* w proszku, pig.; zew. jako zasypka, (czysty l. z innymi środkami) do nosa, krtani (1:8—50 sacch.), do maści (0'50—1'0:10—20), do maści do ocz (0'10—1'0:10—20): 1'0 = 6 h.

— **oxydat rubrum** (Merc. praecip. rubr.). 1'0 = 5 h. tak samo jak poprzedni, **Unguent. ophtalmicum** (Hydr. oxyd. flav. 0'10:50 Axung.).

— **oxydulat. nigr.** (Merc. solub. Hahnemani) 0'03—0'20 *p. d.* 2—3 r. dz. w proszku, pig., do maści (1'0—5'0:25).

— **phosphoricum oxydat.** 0'01—0'06 *p. d.* stopniowo w górę postępuj. w pig., proszk.

— **praecipit. album** zob. H. bichloratum.

— **salicylicum** trudno rozpuszcz. w wodzie zwykłej, łatwo w wodzie z dodatkiem soli; jako antiluet. wew. w pig. 0'01! *p. d.* 2—3 r. dz., do zastrzyk. podskórnie, śródmięśniowych (H. sal., kali carbon. āā 0'10:10 aq.). do okładów na owrzodz. syfilit. (0'5—3'0:1.000). 1'0 = 8 hal.

— **sulfoichthyolicum** (składa się Natr. sulfoichthyol. 10, Hydr. bichl. corrosiv. 3) zob. Ichtyol.

— **sulfuratum nigr.** (Aetiops mineral) 0'10—1'0 *p. d.* 2—3 r. dz. w pig., proszk. 1'0 = 4 h. — **H. sulfurat. rubr.** (cynober) wewn. taksamo, zewn. do maści, nakadzań i t. d. 1'0 = 20 h.

***Hydrargyrum tannicum oxydulat.** 0'05—0'10 *p. d.* 2—3 r. dz. (łatwo resorbuje się w pigułk., proszku, czasem wspólnie z acid. tannic. l. opium. 1'0 = 15 h.)

***Hydrastis canadensis** (radix-rhizoma) haemostat. 10'0 = 25 h., najczęściej używ. ***Extr. fluid. hydr. canad.** 0'30—2'50! (5—45 kropli) *p. d.* co 2 godz. aż do 10'0! *p. die* z winem, syrup. l. mixt. 10'0 = 34 h. — **Extr. hydr. canad. P. et D.** 2'50! *p. d.* — 10'0! *p. die* 10'0 = 55 h. **Extr. hydr. canad. siccum** 0'05—0'25 *p. d.* k. r. d. 0'10 = 20 h. **Hydrastininum hydrochlor.** wewn. 0'10! *p. d.* polecany w krwot. macicy; w krwot. płucnych; w padaczkę 0'01—0'02 *p. d.* 0'05—0'1 *p. die* zewn. do maści (0'50—2'0:5 Vaselini). 0'10 = 120 h.,

Hydrochinonum 0'50! *p. d.* 1'0 *p. die* w rozpuszcz. w proszku; zewn. (1—2%) do przestrzyk. w gonorrh., podskórnie (10% roztwór), do maści (1'0:30). 1'0 = 8 h.

Hydrogenium hyperoxydat. wew. jako **Aq. hydrog. hyperoxyd.** (woda utleniona) czysta l. z dodatkiem kropli acid. muriat. łyżeczk. polecana w błonicy do opatr., wzięwań, płókań. 100'00 = 50 h.

***Hydromel infantum** (zaw. inf. lax. Vienn. 30, Syri mannat 10) łyżeczkami 10'0 = 10 h.

***Hydroxylaminum mur.** w dermatoterapii. 1'0 = 22 hal.

***Hyoscyami folia** (herba) wew. 0'05—0'30!

p. d. — 10! *p. die* w pigułk., proszk., zewn. do okładów, lewat. (inf. 2'0:100), wzięwań (0'50—2'0:500), papierosów; 10'0=5 h. ***Extract. hyoscyami fol.** 0'02—0'10! *p. d.* — 0'50! *p. die* w proszk., pigułk., mixt., zewn. do przestrzykiwań. (1'0—3'0:100), wzięwań (0'05—0'30:100), do kąpieli (100—200 na kąpiel), do lewatyw (0'05—0'20 na lewat.), do liniment., maści (1'0—2'0:10), do czopków. 10'0=14 h. — **Extr. hyoscyami semin. siccum.** 0'05! *p. d.* 0'25! *p. die* 1'00=20'00 ***Ol. hyoscyami fol. coct.** 1'0—2'0 *p. d.* k. r. d. do nacierań, lewat. (5'0—30'0 na lewat.), 10'0=8 h. — **Semen hyoscyami** 0'05—0'20 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig. 10'0=4 h. — **Hyoscyaminum crystallis.** (alkaloid) wewn. 0'0005—0'001! *p. d.* — 0'004! *p. die* w proszk., pig., rozpuszcz., do zastrzykiw. podskór. (0'001 jako hypnoticum), do maści (1'0—3'0:10). 0'01=30 h. — **Hyoscinum muriaticum** 0'01=15 h. — **H. hydrobrom.** 0'01=15 h. — **H. hydrojodicum** 0'01=15 h. wewnątrz 0'0002—0'0007 *p. d.* — 0'001! *p. die* w pig., polecany do uspokojenia umysł. chorych; równy w dział. **Scopolaminie.**

Hypnalum (Monochloralantypirin) kryształki bez smaku, zapachu, łatwo rozp. w wodzie, jako hypnoticum 1'0—2'0 *p. d.* także u dzieci 1'0=25 h.

Hypnoacetin krst. perłowośniące rozp. w alkoholu. Używa się jako hypnoticum, antipyreticum 0'2—0'25 *p. d.*

Hypnonum (Acetophenon) 0'20—0'50 *p. d.* w kapsułk., perelk., (po 0.05 z dodatkiem gliceryny lub Ol. amygdal) w syropie, mikturze. 1'0=25 h.

***Ichthyocolla** zob. Gelatin. animal. 10'0=56 h.

Ichthalbin (białkan icht.). Proszek szaro-brunatny, bez smaku. Używane u dzieci w anemii, rachitis, żółtach itd. u dorosłych 2—3 razy dziennie przed jedzeniem 1'00—2'00 (dzieciom do 1'00 *p. d.*) 1'00=26 h.

Ichthyolum (Ammonium sulfoichthyolicum) b. rzadko wewn. używ. 1'0 *p. d.* — 4'0 *p. die*, najczęściej zewn. do maści (40⁰/₀, u dzieci 10⁰/₀), do podsk. zastrzyk. (0'10:10 Aqu.). 1'0=9 h. **Lithium sulfoichtyol.** 1'0=14 h. — **Natrium sulfoichtyol.** 1'0=12 h. — **Zincum sulfoichtyol.** 1'0=12 h. — **Hydrarg sulfoichtyolic.** wewn. w roztworze wodn. 15—20 kropli *p. d.* k. r. d. w chorob. przewodu pokarm., oddech., moczowego, zewn. do pędzłów, maści 1:50 itd.

Ingluvinum stosow. jak pepsinum. 1'0=40 h.

***Ipecacuanhae radix** 0'005—0'05 *p. d.* jako expect. styptic. diaphoret. cholag. itd.; 0'30—1'0 *p. d.* jako emetic. w proszk., pig., macer., infus (0'10—1'0:100—200 col. jako expector.; 1'50:100—200 col. jako emetyk) do lewat. w infus. (1'0—2'0:100). 1'0=14 h. — **Extr. ipecacuanh.** 0'05—0'20 w proszk., pig., rozpuszcz. — ***Pulvis ipec. opiatu** (**Pulv. Doveri**) zob. opium. — ***Syrupus ipecac.**

corrig. i adjuvans., czysty łyżeczk. jako expector. lub łyżkami jako emetyk. 10'0=12 h. — **Tinct. ipecae.** 5—15 kropli *p. d.* — 50 kropli, jako emetyk. — ***Trochisci ipecae.** (zaw. ipecacuanh. 0'005). 1—3 szt. jako expector. 10 szt.=12 h. — **Vinum ipecae.** kroplami (do 30) jako expect.; 15'0 jako emetyk. 10'0=30 h.

***Iridis florent. rad.** 0'50—2'0 *p. d.* k. r. d. jako expector, często jako constit. do pig., corrig. itd. — **Iridis versicolor. rad.** — **Extract. fluid. irid. vers.** 5—15 kropli *p. d.* — **Iridinum** 0'05—0'20 w pig. 0'01=10 h.

Itrol=Argentum citricum. Proszek lekki, trudno rozp. w H₂O używane jako antisepticum do ran jako zasyпка, albo w maści 1:50—1:100'00. W gonorrhoe w roztworze 1:4000. — 1'0=40 h. (Tylko zewnętrznie).

Jacaranda acutifolia, fructus (Arabicheo, Jarabisco, Paravisco) Antisyphiliticum. — Externe jako infusum do okładów.

Jaborandi folia wewn. infus. (3'0—6'0—8'0! : 100—200 coll.) do lew. infus. (3'0—10'0 : 100—200 coll.). 10'0=14 h.

***Jalapae tubera** 0'05—0'30 *p. d.* k. r. d. jako rozwaln., 0'30—0'50 *p. d.* jako purg., 1'0—3'00 *p. d.* jako drastic. na raz lub in dosi refracta w proszk., pig., powidełk. 10'0=15 h. — ***Resina jalap.** 0'03—0'20 *p. d.* k. r. d., 0'30—0'60 *p. d.* 1—2 r. d. (jako drasticum) w proszk., pig. 1'0=28 h. — **Sapo jalapinus** (składa się z Resina jalap., Sapo medic. āā 4) 0'30 *p. d.* k. r. d. czyste lub z kalomel., z aloe. i t. d. **Pilulae jalap.** (Jalap i Sapo jalap. 3) 2—10 szt. na raz, jako purgans: **Pilulae laxantes** zobacz Aloë.

***Jodoformium** wewn. 0'02—0'20! *p. d.* — 1'0! *p. die* w proszk., pig., kapsułk., w rozpuszcz. w eterze, także perełki jodoformowe (0'25 rozp. w eterze); zew. czysty, jako zasyпка na rany (5'0!), do wdmuchiwań czysty (lub z cukrem), rozpuszcz. w oliwie, alkoh., eterze, gliceryn., do nacierań, zakraplań, pędzlow., tampon. (1:20 Glycer.) jako spray (z eterem), do lewat. (1:50 białka), maści (1—5:30), do czopków (0'50—1'0) świeczek, gaza jodoform., wata jodoform. 1'0=14 h. — Do odwonienia jodoformu używamy Bals. Peruv., faba tonca, acid. carbol. i t. d.

Jodoformin proszek biały nierozpuszczalny. Używany zamiast jodoformu w wrzodach, lupus, i t. d. 1'0=20 h.

Jodolum (Tetraiodpyrrol) żółtawy proszek, trudno w wodzie rozpuszcz. zawiera 89% jodu, wewn. jako antiluet. 0'20! *p. d.* 0'6 *p. die* zewn. jak jodoform. 1'0=32 h.

Jodum wewn. 0'005—0'03! *p. d.* 2—4 r. dz. — 0'10! *p. die* w proszk., pig. lub rozpuszcz. w alkoh., eterze, gliceryn., w wodnym roztworze

nie Kali jodat.: zewn. do wzięwań (0'02—0'05 : 500 Aqu., K. jod. 1'0) rozpylony lub jako para (z waty) — do papieros., płóćkanka do ust, gardła (1:100—500), woda do ocz (0'05:100), do okładów, zmywań (2'0—5'0:100), do kąpieli (5'0—15'0 na kąpiel + 10'0—20'0 K. jod.), do przestrzyk. (0'05—0'50 jodi, 2'0—2'50 K. jod., 30'0—100'0 Aqu.), do maści (0'50—1'0:10—20) do liniment., plastr. (0'50—2'0:50); w rozczyinach zgęszcz., wodn., glycer., jako środek żrący. 1'0 = 10 h. — **Solutio jodi Lugoli causticum** składa się jodi 1, K. jod. i Aqu. $\bar{a}\bar{a}$ 2) i **Glycer. jodi caust.** (składa się z Glycer. 2'0, jodi, KJ. $\bar{a}\bar{a}$ 1'0) oba jako środki żrące.

***Tinct jodi** (Jodi 1, Alcoholi 16) wewn. 0'10—0'30! *p. d.* — 1'0! *p. die*; zewn. do pędzlow. skóry, błon śluz., czysta (lub z coll., glycer.) do okładów (1'0—5'0:25 Aqu.) do zakrapl. (0'50—1'0:100—200 Aqu.), do lewat. (1'0:10—20 Aqu.), do płókań, wzięwań 10'0 = 20 h. — **Tinct. jodi aether.** (Jodi 1, Aether 12). 1'0 = 4 h. — **Tinct. jodi fortior** (Jodi 1, Alcoh. 8).

Jodopyrin (Jodantipyrin). Igiełki bezbarwne, lśniące, w gorącej wodzie rozpuszczalne. Antifebrilicilicum i antisepticum. Przy febrze i polyarthrits 0'50—1'00 *p. d.* 1'0 = 32 h.

Jodothyrim Thyrojodin. Proszek biały używany w myxödema, psoriasis, syphilis i t. d. 3 razy dziennie 0'30—0'80; 1'00 = 115 h.

Jodum tribromatum w rozc. 1:300 polec. do rozpylań w błonicy. 1'0 = 15 h.

Jodum trichloratum wewn. z rozczyinu 0'10:120—150 łyżeczk., w dyspeps.; zewn. do przestrzyk. w blenorh. (0'10:120) 1'0 = 36 h.

Juglandis regia folia (antiscrophulos.) wewn. w decoct. 5'0—15'0:150) także jako species, zewn. jako zasyпка, do przestrzyk. (w infus. — do kąpieli). 300'0—500'0 na kąpiel. 10'0 = 4 h. — **Extr. juglandis** 0'20—0'50 *p. d.* k. r. d. 1'0 = 8 h. — **Juglandinum** 0'10—0'25 *p. d.* k. r. d.

***Juniperus fructus** (baccae juniperi) wewn. 1'0—2'50 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., powidełk., w infus. (10'0—15'0:150 col.) zewn. do wzięwań, nakadzań, kąpieli (w inf. 150'0—200'0:1500). 100 = 8 h. — ***Ol. Juniperi** 2—6 kropli *p. d.* k. r. d. zewn. do nacierań, maśc. 10 = 22 h. — ***Roob Juniperi** łyżecz. czysty lub w mixt. 10'0 = 16 h. — ***Spirit Juniperi** stosown. jak poprzed. 10'0 = 6 h. — ***Unguent. Juniperi.** 10'0 = 12 h.

Kalium aceticum siccum 0'50—4'0 *p. d.* k. r. d. w rozpuszcz. pig. — ***K. aceticum solutum** (Liq. kali acet.) 2'0—12'0 *p. d.* k. r. d. — 30'0 *p. die*, czysty lub w mixt. 10'0 = 10 h.

Kalium arsenicosum solut. (Liq. kali arsen.) zob. Acid. arsenicos.;

— **bicarbonicum** 0·20—1·50 *p. d.* w proszk., rozpuszcz., limoniad burzących; zewn. jako woda do ust (2·0—10·0:100), do przestrzyk., lewatyw. 10·0=6 h.

— **bichromicum**. (K. chromic. rubrum) b. trujący, wewn. rzadko używ. (0·01! *p. die*) zewn. jako środek żrący przy owrzodzeniach nowotworów, w 5% rozez. przeciw poceniu się nóg. 10·0=4 h.

— ***bromatum** wewn. 0·30—2·0 *p. d.* 2—4 r. d. 5·0—10·0! *p. die* (także 1·0—2·0 *p. d.* co godz. w epilepsyi) w proszk. lub rozpuszcz.; zew. do maści (1·0—5·0:10), czopk., pędzlow., (1:5), wziewań (1·0—10·0:500), przestrzyk. w blennorrh. (K. bromat. 1, glycer. 2, Aqu. 20), do lewat. (2·0—5·0:100) 10·0=15 h.

— ***carbonicum** (purum e tartaro) wewn. 0·10—1·0 *p. d.* 2—4 r. dz. — 5·0—10·0 *p. die* rozpuszcz. lub w saturacyi (1·0:15 octu lub succ. citri); zewn. jako woda do ocz (0·05—1·0:100) do wziewań (1·0—5·0:500). 10·0=10 h. —

***K. carbon. crudum** tylko zewn. do kąpieli (100·0—500·0 na kąpiel). 100=20 h. — ***K. carbon. solutum** (Liq. k. carbonici) zewn. do okładów, miejscowych kąpieli (2·0—25·0:1000), do przestrzyk., lewatyw, maści (1·0—5·0—10). 10·0=4 h.

— **chloratum** 0·20—5·0 *p. d.* k. r. d. w proszk. lub rozpuszcz. 10·0=5 h.

— ***chloricum** wewn. 0·10—1·0! *p. d.* k. r. d. — 8·0! *p. die* (u dzieci z większemi dawkami b. ostrożnie, najwyżej 1·0—2·0 *p. die*) w rozpuszcz.; zewn. jako płóćka do ust, gardła. (2·0—5·0:100), do wziewań (1·0—10·0:500), pędzlow. (1·0:5—10 glycer. lub syropu), przestrzyk., okładów. 10·0=5 h.

— **chromicum neutrale** zewn. w roztworze zgęszcz. jako środek żrący. 10·0=12 h.

Kalium cyanatum 98% wewn. 0·005! *p. d.* 0·02! *p. die* w rozpuszcz., także zew. do maści, opatr. 0·10=2 h.

— **ferrocyanatum** 10·0=6 h.

— ***hydrooxydatum fusum** (Kal. caustic. fusum — lapis causticus chirurgorum) wewn. 0·01—0·15 *p. d.* 2—3 r. dz., rozpuszcz. w alkohol. (Tinct. kalina); zewn. jako środek żrący in subst., woda do ocz (0·05—0·10:25), do zmywań, opatrunk. (2—4%), kąpieli miejscowych i ogólnych (30·0—100·0 na kąpiel). 10·0=20 h. — **Liquor Kali caustici** wewn. 1/2—4 kropli (0·02—0·40); zewn. jak poprzedzający, tylko w dawce dwa razy większej.

— ***hydrotartaricum** (Tartarus depuratus, Cremor tartari) wewn. 0·50—2·50 *p. d.* k. r. d., jako laxans 4·0—8·0 *p. d.* 1—2 r. dz., w proszk., powidl., kęsach, mixt.; zewn. jako proszek do ocz, zębów; do kąpieli (60·0—100·0 na kąpiel). 10·0=10 h. — **Serum lactis acidum** (K. hydrotart. 1·0:100 Serum lactis) łyżeczk.

***Kalium hypermanganicum** (permanganicum) **ery-**
stalisatum rzadko wewn. po 0'05—0'15 *p. d.* 2—3 r. dz.
rozpuszcz. w wodzie; zewn. w rozpuszcz. (0'50—1'0 : 200)
jako desinficiens, jako płókanie do ust, gardła (łyżkę
1⁰/₁₀ rozczynu na szklanę wody), do wziewań, rozpylań
(1¹/₂—1⁰/₁₀), do pędzlow. (5—10⁰/₁₀), zastrzyk. podskór. (1⁰/₁₀),
polecane też w ukąszeniu węzów jadowitych. 10'0 = 15 h.

— **hypochlorosum solutum.** (Aqua Javelli) tylko
zewn. 100'0 = 24 h.

— ***jodatum** wewn. 0'10—0'50 *p. d.* k. r. d. — 5'0—
15'0 *p. die*, rozpuszcz. l. w pig.; zewn. do wziewań i roz-
pylań, do płókania ust, gardła (0'50—5'0 : 100), do okła-
dów (1'0—2'0 : 100), do kąpieli miejscowych i ogólnych,
do nacierań (5'0—15'0 : 100 spirit.), do maści (1'0—5'0 : 20
— 25), do zastrzyk. podskór., miąższ. (0'50—2'50 : 5'0 1—2
strzyk. 1—3 r. dz.). 10'0 = 56 h. — **Ung. kali jodati**
(składa się Kali jod. 20, Natr. ichtyosulf. 0'25, Aq. 15,
Adeps suil. 165).

— ***natrio tartaricum** (Tartarus natronatus, sal Sei-
gnetti) wewn. 0'50—2'0 *p. d.* k. r. d. w proszk. l. roz-
puszcz.; jako lax. 15'0—50'0 w kilku dawkach, także w le-
watyw. (15'0—30'0 *p. d.*). 10'0 = 6 h.

— ***nitricum** (purum — saletra oczyszczona) wewn.
0'20—1'0 *p. d.* — 10'0 *p. die* w rozpuszcz., proszk.; zewn.
jak K. chloricum. 10'0 = 5 h. — **Nitrum tabulatum** (Sal
Prunellae) kołaczyki zaw. 0'20 K. nitr. *Charta nitrata.*

— **osmicum** 0'001 *p. d.* — 0'01 *p. die* w pig., pod-
skórnie 1⁰/₁₀ rozczyzn. 0'10 = 1 kor.

— **silicicum** (szkło wodne) wewn. 0'50—1'0 *p. d.* 2 r.
dz. w rozpuszcz.; zewn. do opatrunk. itd.

— ***stibio tartaricum** (Tartarus stibia-
tus, T. emeticus) wewn. 0'005—0'02 *p. d.* k. r. d.
(expect. diaphoret. i t. d.). 0'05—0'10—0'20! *p. d.*
10—15 minut (emetic.) w proszk., rozpusz-
czeniach, pastylk., mixt.; zewn. do opatr.,
okład. (0'05—1'0 : 100) jako woda do ócz. (0'10—1'0 :
100), do wcierań (10⁰/₁₀), lewat. (0'10—0'30 : 50—150
Aq.), do zastrzyk. w blennor. (0'10—0'20 : 100)
do czopków (0'10—0'30 : 5—10 B. Cacao), maść
(0'10—0'50 : 10) do maści drażniących (10—20 : 10).
1'0 = 3 h. — **Ung. Antenriethi** (Tartar. stib. 2, Ung. pa-
raff. 8). — ***Vinum stibiatum** (1 : 250 Malag.) 10—40 kro-
pli *p. d.* k. r. d.; jako wymiotne 15'0 *p. d.* 10'0 = 20 hal.

***Kal. sulfuratum** (Hepar sulfur. kalinum) wewn.
0'05—0'40 *p. d.* 2—4 r. dz. w pig., rozpuszcz., mixt. zewn.,
do zmywań (5—15⁰/₁₀), maści (1'0 : 5—10). 10'0 = 20 hal. —

***Kal. sulfur. pro balneo** zewn. jak poprzedni, do ką-
pieli (30'0—150'0 na kąpiel), 100 = 30 h.

— **sulfuricum** wewn. 0'50—2'50 *p. d.* k. r. d. — 8'0—
15'0 *p. die* jak lax. w rozpuszcz. l. proszku. 10'0 = 5 h.

— **tartaricum** (Tartarus tartarisatus) wewn. 0'50—

2'0 *p. d. k. r. d.* (jako diuret.) — 20'0 *p. die* w proszk., rozpuszcz., mixt. 10'0 = 20 h.

— **tartar. boraxatum** stos. jak poprzedni, 10'0 = 25 hal.

— **telluricum** 0'02—0'04 *p. d.* w pigułk. na noc przeciw nocnym potem suchotników. 0'1 = 60 h.

***Kamala** łupka z owocu *mallotus philip.* wewn. 8'0—12'0 *p. d.* roztarta z wodą lub w powidełk., mixt. 1'0 = 6 h.

Kava-Kava. (Rad. *piperis methystici*) inf. i decoct. 4—6⁰/₁₀

Kephir 300'0—1000'0 na raz przed l. po jedzeniu.

Keratinum używ. do obciągania piguł, które mają przejść żołądek niestrawione. 1'0 = 40 h.

Kola nuces (zawiera *Coffeinum*) inf. (50'0—100'0—300 coll.).

Kolanin (Glykozyd z orzechów Kola). Analepticum, diureticum. Używane w migrenie, newralgii, histeryi. W handlu otrzymuje się w pastylkach, zawierających 0'20 Kolanin.

***Kosso** (Kusso) wewn. 20'0 w 2 dawkach co 1¹/₂ godz. w mixt. lub tabletk. — **Kossinum crystal.** wewn. 0'50—1'0 *p. d.* (2—3 r. dz. co 1¹/₂—1 godz.) w proszk. pig. 0'10 = 40 h.

Kreosotal (Kreosot. carbonicum Heydeni) płyn gęsty do miodu podobny, zawiera 92⁹/₁₀ kreosotu, bez zapachu, nie szczypiący, nie drażni żołądka. 1'0 *p. d.* w tranie lub (dzieciom) w emulsyi 1'0 = 6 h.

***Kreosotum** wewn. 0'01—0'10! *p. d.* — 0'50! *p. die* w pigułk., kapsułk., mixt., zewn. w substancyi podobnie stosow. jak acid. carbonic. do okładów. (Aqu. kreosoti) do maści (1'0 : 10). 1'0 = 3 h.

Kreosotum oleinicum płyn żółtawy, w eterze, chloroform. i benzynie rozpuszczalny. Używa się w nieżycie płuc, zółzach i gruźlicy.

Kryofin kryształki białe, rozpuszczalne w H₂O. Antipyreticum, antifebrillicum, antineuralgicum. Używane w grypie 0'50 *pro dosi.* 1'00 = 30 h.

Kumys napój przyrządzany z mleka kłaczy kirgizkich, także z innego mleka.

Lactucae virosae hb. 10'0 = 6 h., jako Extr. 0'03—0'50! *p. d.* — 2 00 *p. die* w pig. 1'0 = 8 h.

Lactophenin chemicznie powinowaty z phenacetiną. — Antineuralg. (ischias), także hypnotic., proszek kryst. mało w wodzie rozpuszcz. 0'50—0'80—1'0 *p. d.* — 1'0 = 18 h.

***Lactucarium** 0'30! *p. d.* — 1'0! *p. die*, (jako hypnot. 0'50 *p. d.* — 2'0 *p. die*) w proszk., pig., emuls.; zewn. do collyr. (0'10—0'30 : 25). 1'0 = 12 h.

Laminaria (digitata) używ. do rozszerzania ujścia macicy itd. i przecik = 40 h.

***Lanolinum** do maści, jako constit. 10:0 = 15 h. —

Lanolinum anhydricum (bezwodn.) żółtawa masa, przezroczysta, stosow. tak samo. 10:0 = 20 h.

Lapides canerorum zob. calcium. carbon.

Lauri folia stos. jak folia aurantior. — ***Lauri fructus**, baccae 0:20—1:50 p. d. w proszk., w infus. (5:0—20:0 : 100 coll.) 100 = 30 h. — ***Ol. Lauri** do maści, liniment 10:0 = 6 h.

***Lavandulae flores** do rozmaitych species, kąpieli i t. d. 10:0 = 14 h. — ***Ol. Lavandulae** do maści, liniment. i t. d. 1:0 = 6 h. — ***Spirit. Lavandulae simplex** 10:0 = 5 h. — **Spir. Lavandulae compos.** do wachania, nacierań, zmywań itd.

Lecithinum. Masa biała do żółtawej, woskowata, w alkoholu, eterze i chloroformie rozpuszczalna. — **Tonicum** 0:2—0:3—0:5 pro die.

Leptandrae virginicae radix i więcej używane **Extract.** 0:50—4:0 p. d. czyste l. w mixt. (laxans l. drastic.).

Leptandrinum 0:015—0:12 w pig. jako laxan.

Levistici radix wewn. 0:50—2:0 p. d. k. r. d. infus., (10—15:0 : 150) jako diuret. 10:0 = 6 h.

***Lichen islandicus** wewn. 15:0—30:0 p. die, jako species, decoct. (5:0—10:0 : 100) l. galareta (1:0 : 3—6). 100 = 20 h. — **Lichen pulmonarius** i **L. island. ab amaritiae liberat.** stosow. jak poprzed. ***Gelatina lich. island.** 10:0 = 15 h. i ***pulverata** 10:0 = 20 h.

Lignosulf płyn gęsty, ułatwiający; do wdychiwań w przewł. chorob. płuc. i flaszka = 2 kor.

Lignum campechianum decoct. (5:0—15:0 : 100). **Extract. L. C.** 0:50—1:0 p. d. k. r. d.

***Lignum Quassiae** wewn. 1:0—2:0 w proszk., infus., l. maceracyi (3:0—15:0 : 100 wina). 10:0 = 3 h. — **Cort. Quass.** 10:0 = 4 h. stosow. tak samo. — ***Extr. Quass.** 0:2—0:6 p. d. k. r. d. w pig., mixt. — **Tinct. Quass.** 20—50 kropli p. d. i **Quassinum** 0:02—0:10 p. d. 2—3 r. d.

— ***Santali rubri** zewn. do nakadzań, proszków. do zębów itd. 10:0 = 2 h. — ***Ol. Santali ostindicum** 0:3 p. d. — 2:0 p. die w kaps. (jak bals. copaivae). 1:0 = 8 h.

— **Sassafras** 0:50—2:0 p. d. k. r. d. zwykle w decoct. (10:0—30:0 : 100—300 coll.) tak samo **Cort. L. S.** — **Ol. L. S.** 1—5 kropli k. r. d.

***Lini semen** wewn. w decoct. (5:0—30:0 : 100—300 coll.), zewn. w decoct. do lewat., przepiók., przestrzyk.: do kataplasm. 100:0 = 14 h. — ***Placenta sem. lini.** 100:0 = 10 h. — **Farina sem. lini.** ***Ol. lini** do lewat., nacierań, maści. 100:0 = 5 h.

***Linimentum ammoniatum**, **L. ammoniato camphor.** zob. Ammonia.

— ***saponato camphor.** (Opodeldoc) zewn. do nacierañ 10:0 = 6 h.

Lipanium stos. jak Ol. jecor. aselli. 10:0 = 20 h.

***Liquiritiae radix** wewn. w proszk., do spec., infus., jako consp., corrig. itd. 100:0 = 18 h. — ***Extr. liquir.** jako corrig., constit., expect. 10:0 = 32 h. — ***Succus liquir. depuratus.** 10:0 = 14 h. — ***Gelatina liquir. pellucida.** 10:0 = 12 h. — ***Pasta liquir. flava.** 10:0 = 12 h. — ***Pulv. liquir. compositus** (Fr. foenicul., Sulf. depurat. $\bar{a}\bar{a}$ 1, Rad. liquir., fol. sennae $\bar{a}\bar{a}$ 2, Sacchari 6). 10:0 = 12 h. — **Syrup. liquir.** 10:0 = 8 h.

***Liquor acidus Halleri** 3—20 kropli (0:30 = 1:0 p. d. k. r. d. czysty l. w mixt. (1:0—5:0 : 100), jako napój (5:0—10:0 : litr), do pędzlowań (1:0 : 10:0). 10:0 = 10 h.

Lythargyrum zob. Plumb. oxyd. fusum.

Lithium benzoicum 0:05—0:20 p. d. k. r. d. w proszkach, pig., rozpuszcz., do wziewań 0:50—2:00 : 100). 1:0 = 10 h.

— **bromatum** 0:20—5:0 p. d. k. r. d. w rozpuszcz., 1:0 = 12 h.

— ***carbonicum** wewn. 0:05—0:30 p. d. k. r. d. — 2:0 p. die w proszk., pastyl., rozpuszcz. (Aqua lith. carbon. 0:15 : 100 Aq.), w sztucz. wod. mineral. (z kal. l. natr. bicarb.); zewn. do płókań, wziewań (1—3 $\frac{0}{10}$). 1:0 = 15 h.

— **citricum** tak samo.

— **glycerino-phosphoricum.** Proszek biały, krystaliczny, łatwo rozpuszczalny w H₂O. Kilka razy dnia 0:50—1:00.

— **salicylicum** biały krystaliczny proszek bez zapachu, smaku słodkawego, łatwo rozpuszcz. w wodzie, winie; wewn. 0:50—1:0 p. d. 3—4 r. d. w proszk. l. rozpuszcz. 1:0 = 6 h.

— **sulfo-ichtyolicum** zob. Ichtyol.

***Lobeliae inflat. hb.** wewn. 0:20—0:50 p. d. (jako emet. 1:0—5:0 p. d.), częściej w decoct. (2:0—6:0 : 100). 10:0 = 8 h. — **Extract. fluid. lobel.** 5—20 kropli p. d.

***Tinct. lob. infl.** 0:50—1:0! p. d. — 5:0! p. die czysta l. w mixt. 10:0 = 12 h. — **Lobelinum** płyn żółty oleisty i częściej używ. **Lobelinum sulphur.** 0:02—0:06 p. d. — 0:20 p. die w asthmie zamiast tinct. lob. mało wybróbowany.

Loretin proszek żółty, krystal., nietrujący, bez zapachu, polecany zamiast jodoformu jako zasypka z talcum, amylum, 1:0 = 25 h. **Bismuthum loretinic.** środek antyssp. osuszający, jako zasypka w conj. phlyct i t. d. wewn. po 0:5 w rozvolnieniach. 1:00 = 25 h.

Losophan (Trijotkresol) zawiera 80% jodu, białe, kryst. igielki rozpuszcz. w chlorof., eterze, stosowany w chorobach skóry, herpes tons., pityriasis, eczema. w maści (3:0—5:0 : 100), w zasypce, 0:10 = 6 h.

***Lupulinum** 0:10—1:0 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., rozpuszcz., w maści (1:0:2—5). 1:0 = 6 h.

B- Lutidin (*B Aethylpyridin*) otrzymuje się z chinony. Płyn bezbarwny, w alkoholu i eterze rozpuszczalny. Antispasmodicum, narcoticum, antidotum strychniny.

Lycetol (*dimethylpiperazinum*) wewn. 0:50 *p. d.* 3 raz dnia, posiada podobne własności jak piperazina. 1:0 = 1 kor. 10 h.

***Lycopodium** wewn. 0:50 *pro dosi* w mixt. (5:0—10:0—100), w powidl.; zewn. jako consperg. 10:0 = 14 h.

Lysol płyn przezroczysty, oleisty, zapachu kreosotu, własności kw. karbolow., mniej trujący, do opatr. ($\frac{1}{2}$ —10/0). 10:0 = 7 h.

***Macis** 0:20—0:50 *p. d.* w proszkach, pigułkach; jako corrig. 10:0 = 20 h. — ***Ol. macid.** 1—2 kropli *p. d.* w rozpuszcz., w eterze 1:0 = 8 h. — **Tinct. m.** 10—20 kropli *p. d.* k. r. d. 10:0 = 15 h.

***Magnesia usta** zob. Magn. oxydata.

***Magnesium carbonicum** (Magn. carbonica alba) 0:20—2:0 *p. d.* k. r. d. w proszk., tablet., mixt., w wodzie (Aq. magn. carbon.); zewn. jako proszek do zębów; zasypka. 10:0 = 8 h. — **Pulvis Magnes. c. Rheo** stosow. tak samo.

— ***citricum** łyżeczkę w wodzie lub limoniadzie. 10:0 = 35 h. — ***Magn. citr. effervesc.** (składa się Magn. citr., Natr. bicarb. i acid. citric. i sacchar.). 10:0 = 18 h. —

***Potio magn. citr. effervesc.** (20:0) i doza = 1 kor. 10 h. — **Magn. boro-citricum** 10:0—25:0 *p. d.* in dosi refracta w proszk. l. rozpuszcz. 1:0 = 3 h.

— **lacticum** 0:50—2:0 *p. d.* k. r. d. (jako laxans 10:0—12:0 *p. d.*) w proszk., rozpuszcz. 1:0 = 8 h.

— **oxydatum** (Magn. usta) 0:2—2:0 *p. d.* k. r. d.; (5:0—6:0 *p. d.* jako laxans) w past., tablet., mixt., proszk.; zewn. do proszku do zębów. 10:0 = 26 h. — **hydrooxydatum** (Magn. hydrica) wchodzi w skład Antidot. arsenici albi; wew. 0:30—1:50 *p. d.* jako antacidum (2:0—5:0—10:0 *p. d.* jako purg.) w proszk., pastylk., mixt. 10:0 = 26 h. — **Magn. saccharata** (Magn. oxydat., 10:0 Syr. simpl. Aqu. aa 80) łyżeczkami jako środek rozwalniający.

Magnesium salicylicum 3:0—6:0 *p. d.* die stosow. w durze; (6:0—8:0 *p. d.* laxans). 1:0 = 8 h.

***sulfuricum** (Sal. Seidlitzensis) 1:0—3:0 *p. d.* k. r. d. w proszk. lub rozpuszcz. jako digestiv., w większych dawkach 10:0—50:0 w proszk. rozpuszcz. w wodzie zawierającej CO₂ jako laxans; (do lewatyw 15:0—30:0 na lewatywę) 100 = 20 h. — ***Magn. sulfur. siccum.** w dawkach nieco mniejszych, 10:0 = 6 h.

— **tartaricum** 0:50—1:0 *p. d.* w proszk. 2—4 r. dz. — **Maïdis stigma decoct.** (5:0—15:100 = col.) jako diu-

ret. — **Extr. fluid. M. st.** 0'50—1'0 *p. d.* 2—4 r. dz. — **Extr. M. ustilaginis fluid.** stosow. zam. *Secale cornut.* 10—20 kropli *p. d.* — 4'0 *p. die.*

Malakin (*Salicyl-p-Phenetidinum*) jasno-żółte drobne igielki w wodzie nierozpuszcz. stosowane jako antipyret, antireumat., ma działać dopiero w kilka godzin po zastosowaniu, polecane także jako anthelminticum 1'0 *p. d. k. r. dz.* 1'0 = 32 h.

***Maltum Hordei** w proszk. 0'50—1'0, w decoct. (10'0—20'0:100) do płukań, lewat., kapieli (1—2 klg. na kąpiel.) 100 = 24 h. — **Extract. Malti** łyżeczk. z mlekiem, winem; jako excip. dla różnych środków np. **Extr. M. ferrat.**, jodat. itd. 10'0 = 4 h.

Malvae folia 100 = 28 h. i ***flores M.** 100 = 30 h. wchodzi w skład species, decoct. (5—15:100).

Manganum chloratum 0'10—0'75 *p. d.* w rozpuszcz.; płókanek do ust, gardła (1—40/0). 10'0 = 10 h.

— **hyperoxydatum nativum** 0'10—1'0 *p. d.* w proszk., pig., do maści (1'0—3'0:10).

— **sulfuricum** 0'10—0'60 *p. d.* 2—4 r. dz. 2'0—4'0 *p. d.* zażyć w 2—4 dawkach w ciągu kilku godzin jako laxans; do maści (5—100/0). 10'0 = 10 h.

Manna wewn. 4'0—10'0 *p. d. k. r. d.*, w dawce 50'0—100'0 (u dzieci 30'0—50'0) jako laxans, w rozpuszcz., w powidełk. 10'0 = 6 h. — ***Syrup. mannatus** łyżeczk., jako corrig. 10'0 = 5 h.

Mastix (*Resina Mastich*) w dentystyce, także do plastrów. 10'0 = 24 h.

Matico folia 0'50—2'0 *p. d.* w proszk., pig.; w infus. (10'0—30:100). 1'00 = 10 h. — **Ol. M.** 1/2—1 kropli *p. d.* 0'10 = 12 h. **Titne. M.** 20—40 kropli *p. d.* 2—4 r. dz. 10'0 = 14 h.

Mel crudum i ***M. depuratum** wewn. 50'0—100'0 *p. d.* czysty lub rozpuszcz. jako laxans, mniejsze dawki jako expector.; zewn. do płókanek ust, gardła, pędzlow. katapl., lewatyw itd. 100 = 44 h. — ***M. rosatum** zewn. do pędzl., płókanek. 10'0 = 8 h.

***Meliloti herb.** do species, plastr. 100'0 = 18 h. — ***Empl. meliloti.** 10'0 = h.

***Melissae folia** infus. (5'0—25'0:160'0); do species, kapieli. 10'0 = 5 h. — ***Spirit. M. compos.** 20—40 kropli *p. d. k. r. d.*; do wachania, nacierań. 10'0 = 10 h.

***Menthae crispae** 10'0 = 6 h. i ***M. piperitae folia** 10'0 = 8 h., stos jak folia *Melissae*; — ***Ol. M. pip.** wewn. 1/2—3 kropli *k. r. d.* 1'0 = 24 h. — ***Rotulae M. pip.** 10'0 = 10 h. — ***Spiritus M. pip.** 20—30 kropli *p. d. k. r. d.* w mixt. (5'0—10'0:100); zewn. do wachania, nacierań. 10'0 = 8 h. — **Syrup. M. pip.** corrig, 10'0 = 6 h.

***Mentholum** wewn. 0'2—0'3 (nacierania 1'0:5'0—10'0 alkoh.), w formie laseczki (*Migrainestift*), także do wzięwań, pędzl. 1'0 = 8 h.

Methacetin (p. Oxymethylacet. anilid) blaszki kryst. w gorącej H_2O , alcohol, acetonie, chlorof., glycer. i w olejach tłustych rozp. Antipyreticum. Dorosłym 0'3—0'6! dzieciom 0'15—0'3! *p. d.* w proszkach.

Methylalum (Methylen — dimethylaether) rozpuszcz. w wodzie, alcohol., działa w maśc. liniment. (1'0:6—10) kojąco, podskórnie (1'0:4 Aq.) jako nasenny; antidot. dla strychniny.

Methylenblau wewn. 0'1—0'50 w zimnicy — podskórn. 0'02—0'08 w 2% roztworze

Methylum chloratum (Chlormethyl) zewn. do znieczuleń miejscowych stos. cienkim strumieniem na miejsce mające być znieczulonem. 1'0 = 10 h.

Migraenin mieszanina antipiryny, kofeiny, kw. cytryn. 1'00 *p. d.* co 2 godz. zwykle 1—2 proszk. przynoszą skutek 1'0 = 30 h.

Millefolii hrb. infus. (5'0—15'0:100) species, zewn. do kąpieli, lewatyw. 10'0 = 2 h. — **Extr. Mill.** 1'0 = 8 h.

***Mixtura oleoso balsamica** zob. Balsam vitae Hoffmanni.

***Mixtura sulfurica acida** zob. Liquor acidus Halleri.

Mollinum (składa się z tłuszczu 100, ługu potas. 40, gliceryny 30%) constit. do maści mydeł. 10'0 = 15 h.

Monobromphenylacetamid (Antiseptin) wewn. 0'1—0'25 w pig., proszku ma łączyć własności antifebryny i bromu stos. w gościecu z bólami — sprowadza łatwo sinicę.

Morphinum aceticum 0'03! *p. d.* 0'1 *pro die* 0'10 = 8 hal.

— ***hydrobromicum** 0'03! *p. d.* 0'10 *p. d.* polec. w miejsce chloralhydrat.

— ***hydrochloricum** (**muriaticum**) 0'005—0'03! *p. d.* — 0'12! *p. die*, 2—4 r. dz. w proszk., pig., rozpuszcz.; zewn. do pędzlow. (0'50—1'0:20—100) do lewatyw, (0'01—0'03 *p. d.*) do wzięwań, rozpylań (0'02—0'10:100) do czopków (0'005—0'02) do maści (1'0—5'0:50), do zastrz. podskórnych i mięszoowych (0'005—0'02!). 0'10 = 8 h. — **oleïnicum** jest to morph. hydrchl. rozp. w Acid. oleïnicum 0'05—0'10:3'0 używ. do wcierań.

— **phtalicum** do podsk. zastrz. 0'10 = 28 h.

— **sulfuricum** stos. jak mor. hydrochloricum. 0'10 = 8 h.

— **valerianicum** 0'10 = 20 h.

Morrhuum produkt tranu, zawierający w znacznej ilości jod, 0'20 *p. d.* w kapsułk. 4—6 kaps. dziennie dla dorosłych, 2—4 kaps. dla dzieci. 1'0 = 12 h.

Moschus tonquinensis 0'10—0'30—0'60 *p. d.* co 2—3 godziny (dzieciom 0'01—0'15 *p. d.*) w proszk., pig., powidełk., emulsi, do lewatyw (0'50—1'0 na lewat.) pod-

skórnice (0:30—0:60). 1:0 = 130 h. — **Tinct. Mosch.** 20—50 kropli k. r. d. 1:0 = 50 h.

Muscarinum 0:0005—0:002. *p. die* w pig. 1. podskór.

***Myristicae semen.** zob. *Nux moschata*:

***Myrrha electa.** (Gumi resina) 0:20—0:50—1:0 *p. d.* k. r. d. w prosz., pig., mixt., zawiesinie; do proszków do zębów do płókania ust, gardła, do maści, liniment. 10:0 = 14 h. — **Extr. m.** tak samo stosowany. 1:0 = 6 h. — ***Tinct. myrrhae** 10—40 kropli *p. d.* k. r. d.; zewn. do płók. ust, gardła (5:0—15:0:100), do pędzlow. 1:0—3:0—10:0 mel.), do przestrzykiwań (1:0—10:0:100), do maści (1:0:3:0—10:0). 10:0 = 10 h.

Myrtholum ciecz jasna, dość przyjemnej woni, antysept. stosow. wew. w zgorzeli płuc, bronch. putrida (0:30 *p. d.*) w kapsułk. co 2 godziny. 1:0 = 25 h.

Naftalan produkt dest. ze surowej nafty. Masa brunatnawa konsystencyi maści 10:0 = 30 h.

***Naphtalinum puris.** (alcoh. depurat.) 0:02—1:0! *p. d.* — 4:0! *p. die* w proszk., kapsuł., stosow., jako anti-diarrhoic, także w durze brzuszny, w nieżytach pęcherza; wewn. w maściach 1. rozpuszcz. w oliwie (1:0:10—15), do lewatyw. (1:0—5:0:100). 10:0 = 15 h.

Naphtalolum zob. *Betol.* 1:0 = 10 h.

***Naphtolum** (Beta naphtol), wewn. 0:2—0:5 *p. d.*, 1:2 *p. die*, zewnętrznie w rozpuszczeniu, w alkoholu, w oliwie (2:0—10:0:100), w maści (1:0—3:0:30:0) w mydłach (2:0—15:0:100). 10:0 = 20 h.

— **camphoratum** — stos. w gruźlicy do wstrzykiwań miąższowych w dawce 0:15 w oliwie — także zewn. z kocainą.

Narceinum 0:01—0:10 *p. d.* 2—3 gr. dz. w proszk., pig., rozpuszcz., do lewat., do czopk. (0:01—0:05), także podskórnice. 0:01 = 5 h.

Naregamiae radicis extr. fluid. 0:02—0:05 pr. d. k. jako expectorans dział. podobne do ipecac.

Natrium aceticum 0:50—4:0 *p. d.* w proszk., rozpuszcz., w mixtur. 10:0 = 10 h.

— **aethylatum** proszek biały krystaliczny w H₂O. alkoholu rozpuszczalny, używa się 33% roztworze alkoholowym do wypalania brodawek, w roztworze 25% w oliwie używa się w psoriasis i innych skórnych chorobach.

— **benzoicum** 0:20—1:0 *p. d.* — 15:0 *p. die* w proszk., rozpuszcz., pig., mixt.; zew. do wdmuchiwań, wzięwań (5%) rozpylań, pędzlow.; jako płókania, woda do ócz. 10:0 = 35 h.

— ***bicarbonicum** (Natr. carb. acidum, N. hydrocarbonic., Bicarbonas sodae) wewn. 0:30—1:50 *p. d.* k. r. d. w proszk., placuszk., mixt., saturacyi, w rozpuszczeniu (Aq. sodae); zew. do płókań, wzięwań (0:20—2:0:10:0), do kąpieli (150—400 na kąpiel). 10:0 = 4 h. — ***Pastillae**

e natr. hydrocarb. (Past. bilinenses s. de Vichy à 0.10. 10 pastyl. = 20 h. — ***Pulvis aërophorus** (anglicanus) (składa się Natri bicarb. 2.0 i osobno acid. tartarici 1.50). 10 doz. = 60 h. — ***Pulvis aërophorus laxans seidlitzensis** (Natri bicarb. 3.0, Sal Seignetti 10.0 i do tego Acid. tartaric. 3.0). 10 doz. = 1 K. 60 h. — **boracicum** zob. Borax veneta.

— ***bromatum** stos. jak Kali bromat. 10.0 = 16 h.
 — ***carbonicum purum** s. crystallisatum stosow. jak Natr. bicarbon. 100.0 = 24 h. — **Natr. carbon. crudum** zewn. do kąpieli ($\frac{1}{4}$ kilo — 1 kilo na kąpiel). 100.0 = 12 hal. — ***Natr. carbon. siccum** 0.20 — 1.0 *p. d. k. r. d.* w proszk., pig.; do proszku do zębów, do maści (1.0 — 2.0:20). 10.0 = 8 h. — **causticum solutum** (Liquor natr. caustici) stos. tak samo jak Liquor kali caustici.

— **chloratum** (sól kuchenna) wewn. 0.50 — 2.0 *p. d. k. r. d.* łyżeczk. rozpuszcz. przy krwiopluciu, w neurozach — także jako antidot.; zew. do lewatyw (1 — 2 łyżki na lewat.), do okładów suchych, oziębiających (1 soli, 2 śniegu lub lodu), do kąpieli (1 — 5 klg. na kąpiel), do wzięwań (1.0 — 10.0:500). 100.0 = 20 h.

Natrium chloricum 0.50 — 1.0 *p. d. 2 — 4 r. d.* w prosz., rozpuszcz. (3.0 — 5.0:100), do płókań, wzięwań jak Kali chloric. 10 = 8 h.

— **dithiosalicylicum** szary w wodzie łatwo rozpuszczalny proszek, wewn. 0.20 *p. d. 2 — 4* razy dnia w goścę staw. 1.0 = 10 h.

— **fluoratum** (fluorol) proszek biały krystaliczny w H_2O . rozpuszcz. Antisepticum, antispasmodicum, antiperiodicum. W gruźlicy, malarii, epilepsji 0.005 — 0.01 *p. d.* w rozczyinach, do opatrunków ran jako 0.5 — 10% rozczyzn., przy cystitis. vaginitis dalej do płókania ust w rozczyinach 0.5 — 10%.

— **hypochlorosum solutum** (Liquor natrii chlorati Javell'a) 0.20 — 1.0 (5 — 15 kropli) *p. d. k. r. d.*; zew. do płókań ust, gardła (3 — 10%), do przestrzykiwań (1 — 5%), do lewatyw (30 — 40 kropli), do kąpieli ($\frac{1}{2}$ — 1 klg. na kąpiel).

— **hypermanganicum** jak Kali hypermanganic.

— **hypophosphorosum** (subphosphorosum) 0.50 — 2.0 *p. d.* w rozpuszcz. 10.0 = 38 h.

— ***jodatum** jak Kali jodatm. 10.0 = 80 h. w b.

— **jodicum** sól rozp. w H_2O . 10.0 = 30 h.

— **lacticum**. 1.0 = 5 h.

— **nitricum** jak Kali nitricum. 10.0 = 5 h.

— **nitrosum** 0.05 — 0.15 *p. d.* rozp. w wodzie (w astmie, epileps.). 1.0 = 4 h.

— **paracreosotinicum** działa podobne do acid. salicyl. 1.0 — 1.50 *p. d.* — 4.0 *p. d.*, u dzieci 0.10 *p. d.*, 1.0 *p. d.* najlepsze skutki osiągnięto w gastroenteritis acuta u dzieci.

— ***phosphoricum** 0·50—2·0 *p. d. k. r. d.*; 20·0—50·0 jako laxans w proszkach lub rozpuszczeniu, 10·0 = 8 h.

— ***salicylicum** wew 0·50—1·0 *p. d. k. r.* (w ostr. gościu stawow. 1·0—2·0 *p. d. co godzina*) u dzieci 3·0! *p. die*, w proszk., pig., rozpuszcz., mixt.; zewn. do przestrzykiwań, lewatyw. 1·0 = 2 h. — **Nat. borosalicylicum** 0·50—2·0 *p. d. k. r. d.* rozpuszcz. w wodzie l. alkoholu.

— **santonium** wewn. dorosłym 0·1—0·20!; dzieciom 0·05—0·10! zamiast flor. cinæ 1·0 = 30 h.

— ***silicium** (Liquor natrii silicici) wewn. 0·10—0·25 *p. d. k. r. d.* w pig., rozpuszcz. (w wodach alkalicz.); zewn. do przestrzykiwań (1—20/0), do zmywań, opatrunki, lewat. 100·0 = 34 h.

— **subsulfurosum** 0·50—1·50 *p. d.* — 5·0 *p. die* w rozpuszcz. do kąpeli siarczan. (50·0—150·0 na kąpiel z dodatkiem 30·0—60·0 octu).

— **sulfoichthyolicum** zob. Ichthyol.

— **sulfo-phenylicum** krysz. białe lśniące w alkoholu rozp. Antisepticum. W gruźlicy, cholerze, tyfusie, dysenterji wewnątrznie 0·5—2·00 *p. d.* Externe przy gonorrhoe do iniekcji.

Natrium sulfo-salicylicum proszek biały, kwaskowaty w H_2O rozpuszczalny. Antipyreticum, antisepticum, antirhemat. Używa się jak Natr. salicyl.

— ***sulfuricum** crystall. (Sal mirabile Glauberi) 1·0—2·50 *p. d. k. r. d.* (jako laxans 10·0—50·0 *p. d.*) w proszku, emuls., w wodach mineral. (sztucznych), do lewatyw (10·0—50·0). 100·0 = 22 h. — **Natr. sulfur. siccum** w dawce 0 1/2 mniejszej. 10·0 = 8 h. **Sal thermar. Carolin. artific.** łyżeczkę aż do 15·0 *p. d.* w rozpuszcz.

— **tartaricum** jak kal. tar.

— **telluricum** w dawce 0·05 wewn. lub podskórnje celem zmniejsz. chorobowych potów. 0·10 = 64 h.

Nerium oleander i **Tinet. ner. oleandr.** działa podobnie jak *Folia digitalis* 10—15 kropli *p. d.*

Neurodinum antineuralg., antipyretic. 1·0 *p. d.* 1·0 = 35 h.

Neuralgin (Nevralgin). Używa się przeciw bólom głowy, reumat. i tyfusie 0·50 *p. d.* 1·00 = 10 h.

Nicotianæ folia (tytoń) wewn. 0·03—0·15 *p. d. k. r. d.* w proszk., pig., infus. (0·50—1·0:150), do lewatyw (0·50—2·0:100—150 coll.), do kąpeli (15·0—60·0 na kąpiel), do zmywań (5·0—10·0:100); jako woda do ocz. (inf. 0·50—1·0:25). 10·0 = 16 h. — **Nicotinum** 0·001—0·003! *p. d.* w rozpuszczeniu, w alkoholu lub klejkich pokarmach. 0·01 = 4 h.

Nitroglycerinum 10/0 sol. (Glonoinum) z 10/0 rozczynu alkohol. od 1—10 kropli. (0·0001—0·0005) powoli dawkę powiększając, 3 r. dz. przeciw stanom astmatycznym, w połowicz. bólu głowy, także podskórnje (20—30 kro-

pli, 10% alkohol. rozczyngu : 10 Aquae). 1:5 = 5 h. Nitr. intabula (*pr. d.* 0.0005) 1 szt. = 5 h.

Nosophen Jodophen, Tetrajodphenolphthalein. Proszek żółtawy w etherze, chlorof. rozp., Antisepticum, desiniciens. Używano w ozaena i rhinitis hypersecretoria, dalej jako 30% gaza. 1:00 = 50 h.

***Nux moschata** (semen Myristicae) stosow. jak Macis w dawkach 2 razy większych. — ***Ol. N. m. expressum** do maści, liniment, plastr. 1:0 = 4 h.

Oleum amygdalarum zob. Amygdalae.

— **animale aether.** (Dippelli) 5—20 kropl. postępując z dawką w górę, w pig., kapsułk. 1:0 = 5 h.

— ***Bergamottae** 1—4 kropl. *p. d. k. r. d.* 1:0 = 6 h.

— ***Cadinum** zob. Ol. Juniperi empyreumat. 10:0 = 4 h.

— ***Crotonis** wewn. 0.006—0.025! ($\frac{1}{2}$ —2 kropli) *p. d.* w pig., proszk., kapsułk., rozpuszcza, w emulsyi; zew. do nacierań (w równych częściach z olejami), do lewatyw (1—2 kropl. : 100—150 emulsyi). 1:0 = 8 h. **sapo croton.**

Ol. filicis aethereum otrzymuje się z Aspidium filix mas. Olejek żółtawy z czasem ciemniejszy, charakterystycznie pachnący rozp. w Aeth. i Alcohol. Przeciw tasiemcowi 0.75—1.6 *p. d.*

— **hydrargyri** (cinereum) gęsty olej złożony z 3 części rtęci utartej z lanoliną i 4 części Ol. olivarium — używany do podskórnych wstrzykiwań w leczeniu kiły. 0.10—0.15 *p. d.*

— **hyoscyami** zewn. do nacierań 10 = 8 h.

— ***Jecoris aselli** 1—8 łyżek (dzieci 1—4 łyżeczek.) *p. d.* 2—3 r. dz. czysty, w kapsułk., emulsyi, żelatynie, albo z żółtkiem z dodatkiem 10 kropl. Ol. menth. pip.; zewn. do nacierań lewat. jako excip. do rozmaitych środków. n. p. Ol. jecor. as. ferratum, jodoferratum itd. 100:0 = 24 h.

— ***Juniperi empyreumat.** (Ol. Cadinum 10.0 = 22 h.

— ***Olivarium.** ***provinciale** wewn. łyżeczk.; do liniment. emulsyi, ***commune** do nacierań, maści, plastrów, lewatyw.

— **Petrae italicum** zob. Petrol. 100:0 = 80 h. (str. 69).

— ***Pini pumilion.** zew. do nacierań, wziewań, rozpylań 10:0 = 40 h.

— **Rapae** jak Ol. olivar. 100:0 = 22 h.

— ***Ricini** wewn. $\frac{1}{2}$ —3 łyżeczek. (8.0—30.0) *p. d. k. r. d.* w mleku, herbacie, kawie, kapsułk., emulsyi, mixt., do lewatyw. 1—4 łyżki. 100:0 = 38 h.

— ***Santali** zob. Lignum Santali. 1:0 = 8 h.

— ***Terebinthinae** wewn. 5—20 kropl. (0.25—1.0) *p. d.* czysty w kaps., pig., emulsyi, mixt. (z eterem) jako antidot. w zatruciu fosforem: zew. do wziewań, płukań, lewatyw (3.0—15.0 : 150—200 emuls.), do opatr., nacierań,

pędzl. skóry, maści (1:3—5), do plastr. (1:5—8 żywicy), do mydeł. 100:0 = 26 h. — ***Ol. Tereb. rectificatum** stos. jak poprz. 10:0 = 4 h. — **Ol. Tereb. ozonisatum** 5—20 kropl. *p. d.* co 2—4 godz. z miodem l. żółtkiem; zew. jak poprzedni, działa silniej.

***Olibanum** (gummi resina) 0:20—1:0 *p. d.* k. r. d. w pig.; zew. do nakadzań, plastr. maści. 10:0 = 5 h.

***Ononidis spin. rad.** wew. 1:0—3:0 *p. d.* k. r. d. w proszkach, decoct. (10:0—25:0:150), do species. 100:0 = 28 hal.

***Opium** wewn. 0:008—0:15! *p. d.* k. r. d. — 0:50! *p. die* w proszk., pig., mixt., emulsyi, zew. w bólach zębów, do kataplasm., papierosów, maści (1:0—5:0:10—25), do czopków (0:10—0:20), do gałek pochw. (0:10—0:20), do lewatyw (0:03—0:10 najlepiej w emulsyi). 1:0 = 10 h. —

***Electuarium Theriaca** (Elect. aromaticum c. opio) $\frac{1}{2}$ —1 łyżeczki *p. d.* 3—4 r. dz. — **Emplastrum opiatum** (odontalgicum, składa się opii 1:20). — ***Extr. opii** 0:005—0:10! *p. d.* — 0:40! *p. die* w proszk., pig., pastyl., rozpuszcz.; do płókanek ust, gardła

(0:20—1:0:150), do wziewań, rozpylań (0:05—0:20:100), do przestrzykiwań (0:10—0:50:50), do lewatyw (0:05—0:10), czopków. (0:05—0:10), do maści (0:50—1:50:10), do podskórnych zastrzyk. (1:0:2—10). 1:0 = 20 h. — ***Tinct. opii simplex** (thebaica). 1:0 = 1 kr., ***Tinct. opii crocata** 1:0 = 2 h. (zawierają w 1 gramie 0:01 morfiny)

wew. 0:10—1:50! *p. d.* (3—25 kropli) — 5:0! *p. die*; zew. do płókanek ust, gardła (0:50—2:0:100), do wziewań, rozpylań (0:20—2:0:100) jako krople

do zębów, do pędzli. (czystal. 1:0:1—2 aquae), do ócz (czystal. 1:0:1—2 aqua), do przestrzykiwań (1:0—12:0:100), do opatrunków (2:0—6:0:100), do lewatyw (3—20 kropli na lewat.), do maści (1:0—5:0:25), — **Tinct. opii benzoica** (składa się: Opium, Acid. benz., camphor., Ol. anisi, spirit. dilut.) 20—60 kropli *p. d.* (1:0—3:0) 2—4 r. dz., dzieciom 5—20 kropli, w mixt., syrop. l. czysta 10:0 = 30 h. — ***Pulvis Do-**

veri (Pulvis Ipecacuanh. opiatus, składa się Opii, radix ipecacuanh. $\bar{a}\bar{a}$ 1, Sacch. 8) 0:10—1:50! *p. d.* — 5:0!

p. die. 1:0 = 3 h. — **Unguentum opii** (zaw. Extr. opii 0:10:20),

Orexinum hydrochloricum bezbarwne igiełki, rozpuszcz. we wodzie, smaku gorzkiego, stosow. jako stomachicum przy braku apetytu, 0:20—0:50 *p. d.* w opłatk., pig. 1:0 = 65 h. ostatnimi czasy pol. **Orex. basicum**

w tej samej dawce i **Orexinum tannic.** jako stomachicum dla dzieci na 2 godziny przed obiadem i kolacją

pó 0:50; 1:0 = 60 h.

Orphol Bismuthum β naphtholicum; w diarhoe 3 razy dziennie. 0'50—1'00. Dzieciom pół dawki. 1'0 = 20 h.

***Origani hb.** do spec., kataplaszm. 100'0 = 28 h.

Orthoform proszek biały, lekki, bardzo powoli i w małej ilości w H_2O rozp. — Używane w formie maści jako lokalne anaestheticum. 10'0 = 3 k. 30 h.

Oryzae amyllum i farina jako środek odżywczy i do celów kosmet. 100'0 = 40 h.

Ossa sepiae do proszk. do zębów. 10'0 = 8 h.

Ovum gallinaceum albumen et vitellum ovi jajo kurze.

***Oxymel simplex** dodatek do mixt. (15'0—30'0:100) jako napój (50'0—100'0:1000); zew. do płókanek, lewatyw (60'0—100'0 na lewatywę). 10'0 = 8 h.

— ***Scillae** zob. Bulbus Scillae.

Oxysparteinum (hydrochl.) wewnątrz. i podskór. w dawce 0'05 aż do 0'10 pr. d. zwalnia tętno i pobudza serce niezmieniając napięcia ścian naczyń — polecane w wadach sercowych.

***Paleae haemostaticae** (Pengawar Djambi). 1'0 = 10 h.

Pancreatinum (różne preparaty), zwykle od 0'50—15'0 p. d. w pig., z pokarm. mięsnymi, w lewatywie. 1'0 = 10 h.

Papainum (papayotinum) biały proszek z owoców Carica papaya, 0'1—0'3, poprawia trawienie istot białkow. zewn. do pędzl. (10%) w błonicy. 1'0 = 80 h.

Papaveris fructus (capsul.) immaturi wewn. w decoct. (5'0—15'0:100—200); zew. do okładów, kataplaszm. (w decoct. 10'0—20'0:100), do płókań, lewatyw. 10'0 = 10 h. — ***Flores papav. rhoeados** do species. 10'0 = 10 h. — **Ol. papaver** jak Ol. amygdal. 10'0 = 5 h. — **Semen papaver.** w emulsyi (5'0—15'0:100). 100'0 = 15 h. — ***Syrupus Diacodii** (Syrup. papav. albi, składa się: Tinct. papav. 50, rad. liquir. 25., Aq. font. 350 ad col. 250 + Sacchar. 400) łyżeczk., corrig. 10'0 = 8 h.

Papaverinum hydrochl. kryształki w wodzie rozp., wewn. dzieciom 0'005—0'03! w proszku z cukrem — zmniejsza ruchy peristalt. nie sprowadzając snu — wskazany, zamiast opium w biegunkach. 0'10 = 8 h.

Paraffinum liquidum płyn oleisty używ. jako constit. dla maści liniment. 10'0 = 5 h. — **Paraff. solidum** biała masa, topniejąca przy 78°, do maści, plastr. opatrunków itd. — **Charta paraff.** — **Unguent. paraff. s.**

Vaselinum (składa się z paraff. solidi 1, Paraff. liquid. 4) stosow. jak poprzed. 10'0 = 6 h.

Paraform (Par. formalin, Triformol). Masa niewydawnie krst. rozp. w H₂O — Antisepticum, adstringens w niezycie kiszek, tyfusie i cholera nostras 0'05—1'00 p. d. także w gruźlicy, tracheobronchitis itd. do inhalacji.

Paraldehydum jako sedativ. 1'0—2'0 p. d.; jako

hypnotic. 3'0—5'0! *p. d.* w 3—4% rozpuszcz. wodnem z dodatkiem sacchar. na 2—3 razy wyżyć, także w kapsuł., emulsi; antidot. w zatruciu strychniną; zewn. do czopków, lewatyw (4'0 na lewatywę). 10'0 = 44 h.

Pasta dentifricia dura (Pulv. sapon. venet. 20, Calc. carbon. 8, Carmin 0'20, Ol. menth. pip. 0'50, Spirit. vini 5).

Pasta dentifr. mollis.

Pelletierinum tannicum alkaloid z cortex punice granat. 0'20—0'50! *p. d.* et *p. die* w rozpuszcz., najlepiej w infus. sennae. 0'10 = 25 h.

Pengawar Djambi środek hemostatyczny.

Pental (Trójmetyletylen) plyn bezbarwny, nierozpuszczalny w wodzie, tylko w chloroformie, eterze, wyssoku, używ. do narkozy podobnie jak chloroform.

***Pepsinum** (solubile) 0'15—0'50 *p. d.* 2—4 r. dz. w proszk., rozpuszcz., kaps., (z dodatkiem kw. cytrynow., winnego, mlecznego) należy zażywać wśród jedzenia. 1'0 = 6 h. — **Vinum pepsini** łyżeczk. — **Syrup. pepsini** łyżeczkę *p. d.*

Peptonum bardzo wiele przetworów (fabr. Merck., Sanders itd.) łyżeczk. do rosół; do lewatyw. 1'0 = 8 h.

Pereirin alkaloid z kory Geissosperma Velozzi. Proszek stalowo-szary, gorzki, rozp. w zakwaszonej H₂O, aeth., alcoh., benzol. i chlorof. antifebrilicum co 2—3 godz. pigułkę à 0'15 podając równocześnie chininę w czasie wolnym od febrы.

Peronin (Benzylmorphinum hydrochloricum). Proszek biały rozp. w H₂O, rozcieńczonym alkoholu. — Narkotyk używany w kaszlu, w gruźlicy i katarze płuc, w astmie i w bólach reumatycznych 0'02—0'06! *p. d.* 0'20! *p. die.*

Phelandri fructus 0'50—2'0 *p. d.* k. r. d. w proszk., spec., infus. (5'0—15'0 : 100—200). 10 = 5 h.

Phenacetinum (Paraacetphenetidin) antipyr. 0'30—0'70 *p. d.*; 1'0 i wyżej *p. die* dzieciom 0'15—0'3 pr. d. jako antineuralg. w proszk., pigułk., kaps., także rozpuszczony w alkohol. 1'0 = 5 h.

Phenocollum hydrochloricum (Paramidoacetphenitidin) wew. 0'50—1'0 *p. d.* rozpuszcz. w wodzie jako antipyr., antirheumat. także w zimnicy 1'0 = 38 h.

***Phenolum** zob. Acid. carbolicum.

Phosphorus 0'0005—0'001! *p. d.* — 0'005! *p. die* rozpuszcz. w eterze, alkohol., oliwie, rzadko w pig., zew. (także w rozpuszcz.) do maści (0'05—0'30 : 25), do liniment. 0'10 = 2 h.

— **Ol. phosphor.** (1 : 80—100 oleum) 2—5 kropli *p. d.*

w mixt., emuls., kapsułk., także zewnątrz. do nacierań. — **Ol. jecoris. aselli phosphor.** (0'01 : 100 oliwy) łyżeczk. *p. d.* — **Aether phosphor.** (1'0 : 150) kropl.

***Physostigminum salicylicum** (Eserinum salicyl.) 0'0005—0'001! *p. d.* — 0'003! *p. die*

w pig. lub rozpuszczeniu; podskórnie w dawce 0'0005—0'001 *p. d.* (z rozczyntu 10%), do ócz kropl. (0'02—0'05 : 10 Aq.). 0'01 = 10 h.

— **sulfuricum** w dawkach, jak poprzedni.

Pierotoxinum 0'0005—0'001 *p. d.* — 0'02! *p. die* w pig., pastylk., rozpuszcz., zewn. w maściach.

Pichy-Pichy Extr. fluid., ciecz ciemnobrunatna, przyjemnego zapachu, mocno gorzka, zastosow. i wskazanie jak dla Balsam. Copaiv., Ol. Santali itd.

***Pilocarpinum hydrochloricum** alkaloid z Folia Jaborandi 0'01—0'03! *p. d.* 0'06! *p. die* w pig. rozczyntach (0'01—0'02 : 80) co godz. łyżeczkę polecany w błonicy u dzieci; podskórnie (20% rozczynt) w dawce 0'015—0'03! *p. d.* (dzieciom 0'001—0'01 *p. d.*); do ócz (0'10—0'20 : 10 Aq.) 0'01 = 4 h.

Pimpinellae radix stosow. jak Radix Imperat. — **Tinct. Pimp.** 10—30 kropli *p. d.* k. r. d. do płókań.

Piper album 10'0 = 10 h. — **Piper nigrum** 10'0 = 10 h. 0'20—1'0 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., w maceracyi (5'0—10'0 : 100 spirit. l. vini) także zewn. do maści.

Piperazinum (Diaethylendiamin) purum l. hydrochloricum, krystaliczne białe igielki łatwo w wodzie rozpuszcz., używa się w dnie, kamieniach pęcherza, w dawce 1'0—2'0 *p. die* w rozpuszcz. w wodzie (sodowej); także do przepłókiwań pęcherza (1—20%). Do okładów i zastrzykiwań podskórnych w miejsca obrzękle. 1'0 = 100 h.

Piscidiae Erythrinae radice cort. 0'50—1'0 *p. d.* 2—4 r. d. w proszku (sedatiw i hypnotic., dział podobne do opium). — **Extract. P. fluidum** 2'0—6'0 *p. d.* — 12'0 *p. die*.

***Pix liquida** (Resina empyrheumat. liquida) wewn. 0'30—1'50 *p. d.* 2—3 r. d. w pig., kapsułk.; zewn. do wzięwań, wcierań, (czysty lub z alkohol., tłuszczami, mydłem w stosunku 1 : 2—10), do maści (1 : 4—6), do plastrów (1 : 2 cera). 100 = 20 h. — **Aq. Picis** (picea) łyżeczk. — łyżk. 2—4 r. dz.: do wzięwań, przestrzyk. opatrunków, 100 = 20 h. — **Sapo picis.** 10'0 = 8 h.

Plantaginis herb. zwykle jako decoct. (15'0—50 : 100—200 col.). 10'0 = 4 h.

Platinum chloratum 0'02 *p. d.* 0'06 *p. die*.

***Plumbum aceticum** wewn. 0'005, 0'008—0'10! *p. d.* — 0'50! *p. die* w proszk., pig., rozp. mixt., emulsyi, w krwiopluciu od razu większe dawki (0'06—0'10 co dwie godziny); zewn. jako zasypka do wdmuchiwań do gardła, krtani (1 : 5—10 Sacchari), jako płókania do ust i gardła (0'10—0'50 : 100), do lewatyw. (0'10—0'50), do przestrzyk. (0'30—1'0 : 100), do pędzlow. (1'0—2'0 : 10), do wzięwań (0'10—1'0 : 100), do ócz (0'20—2'0 : 100), do okładów, zmywań (0'50—1'0 : 100), do

maści (10:5—10). 10:0=4 h. — **Plumb. acet. solutum** (10:6 Aqu.). — ***Plumb. acet. basicum solutum** (Liquor plumb. subacetic) zewn. do płóć. ust i gardła (0:50—1:50:100:0), do pedzłow., okładów zmywań, opatr. (w dawce 3—5 razy większej, jak plumb. acetic.); do ocz. (0:50—1:0:100), do przestrzyk. (2:0—6:0:100), do lewatyw (0:50—6:0 na lewat.), do maści (1:0:5—10), 10:0=3 h. — ***Aqua plumbi** (Plb. acet. basic. solut. 1, Aqu. 49 i ***Aq. plumbi spirituosa** czyli ***Aqua Goulardi** (Plb. acet. basic. solut. 2, Spirit. vini 5, Aquae 100) do okładów, zmywań, przestrz., lewatyw (100:0—200:0 na lewatywę). — ***Ung plumbi acetic.** 10:0=10 h.

— ***carbonicum** (Cerussa) zasypka, także do maści, plastr. 10:0=8 h. — ***Emplastr. Cerussae** (Empl. diachyl simpl., Cerussae aa 1, Ung. simplic. 70), 10:0=10 h. — ***Unguent Cerussae** (Emplastr. diachyl 1, Cerussae 1, Axungie 5). 10:0=10 h.

— **nitricum** stosow. jak Pl. aceticum.

— ***oxydatum fusum** (Lithargyrum). 10:0=8 h. do ***Emplastr. Diachyl. simpl.** 10:0=6 h. i ***Empl. Diachyl compos.** (Adhaesivum, Empl., Plumbi, Gum resina). — **Emplastr. Diachyl. linteo extens.** — **Ung. Diachyl. Hebrae.**

***Plumbum oxydatum** (hyperoxydatum) rubrum (Minium) 10:0=6 h. do ***Empt. Minii adust.** (Empl. fuscum camphor.) 10:0=10 h.

— **tannicum.** 1:0=3 h., do Unguent. plumb. tannici.

Podophylli peltati rad. 0:50—1:0 p. d. jako purg. 1:50—2:0 p. d. jako drastic. w proszk. — **Podophyllum** (resina P.) 0:05 p. d. w pig. jako purg., w zaparciu stolca nawykowem do stałego użytku 0:005—0:02 p. d. (dzieciom po 0:005—0:02 jako purg.) w pig., mixt., proszk., rozpuszcz., w alkoholu. 1:0=14 h. — **Podophyllotoxinum** 0:015! p. d. rozpuszcz. w alkoholu lub w pig. 1:00=20 h.

Protargol połączenie srebra z ciałami proteinowymi. Proszek żółtawy, rozpuszczalny w H₂O używany jako antisepticum i antigonorrhoeicum w 1/4—1/2% roztworze. 1:00=40 h.

Protonuclein proszek żółtawo-biały, rozp. w H₂O, antitoxicum. Używane w neurastenii, marasmus, malari, anemii, chorobach kobiecych itd. co 3—4 godz. 0:20—0:50. — **Externe** do obmywania wrzodów, ran itd. w roztworze wodnym (1:8).

Pruni virginianae cort. z niego Extract. fluid. P. v. 2:0—4:0 p. d. jako tonicum.

Pulmonariae folia stosow. jak folia Altheae.

***Pulpa prunorum** zob. Senna.

Pulsatillae herb. 10:0=4 h. — **Extr. P.** 0:05—0:20 p. d. — 1:0 p. die. w mixt., pig. 1:0=10 h. — **Tinct. P.** 10—40 kropl. — 3:0 p. d. — 10:0 p. die.

***Pulvis aërophorus** zob. Natrium hydrocarbonic.

***Pulvis ipecac. opiat. Doveri** zob. Opium

Pyoctaninum (Coeruleum, aureum) barwniki anilinowe, używane jako antisept. zewn. czysty jako zasyпка, w roztworze (1'0:1000), w maści (2'0/0). 1'0=24 h.

Pyretri romani rad. do płukania do ust, gardła, w decoct. lub infus. (3'0—10'0:100—200 col.). 10'0=5 h.

Pyridinum purissimum (antiasthmatic) 2'0—5'0 wydane na talerz ułatwia się (ciepłocie pokoju 20—25°), chory pozostaje w pokoju 20—30 minut; zastosować można 2—3 razy w ciągu dnia. 1'0=4 h.

Pyramidon (Dimethylamidoantypyrin). Proszek żółtawo-biały w H₂O rozp. Antypyreticum 0'20—0'50 p. d. 1'00=50 h.

Pyrantin (Phenosuccin). Igełki bezbarw., pryzm. trudno rozp. Antypyreticum, antyneuralgie 1'00—3'00 p. die. 1'00=40 h.

Pyrocinum (Acethylphenylhydrazin) proszek kryst. trudno w wodzie rozp. wew. 0'05—0'10 p. d. k. r. d. jako antypyret. po większych dawkach występuje haemaglobinuria

***Pyrogallol** zob. acid. pyrogallicum.

***Quebracho cortex.** 10'5=5 h. i **lignum Q.** 10'0=4 h. 0'30—0'50 p. d. w proszk., maceracyi lub decoct. (5'0—15'0:100—300 col.). — ***Extract. fluid. Q.** 1—2 łyżeczek p. d. 8'0 p. die. 1'0=10 h. — **Tinct. Q.** łyżeczk. czysta lub z pokarmami klejkami. 10'0=10 h.

Quebrachinum 0'05—0'10 p. d. w pig. lub rozp. w dusznościach z powodu wady serca. 0'10=290 h.

***Quercus cortex** wew. 0'50—1'50 w proszk., l. decoct. (15'0—25'0:120—200); zewn. do zasypek l. (w decoct.) do płókań gardła, ust, przestrzykiwań, kąpieli (1/2—1 klg. z 2 litrami wody zagotowane wlać do kąpieli). 10'0=2 h. — ***Semen (glandulae) quercus tostum** (1—3 łyżeczk. na filiżankę wody). 100'0=30 h.

Quillajae saponariae cort. decoct. (3'0—5'0:200 łyżeczkami). 10'0=3 h.

***Ratanhiae rad.** wew. 0'50—1'0 p. d. k. r. d. w proszk., pig., decoct. (5'0—15'0:100), zew. do proszków do zębów, w decoct. do płukania ust i gardła, przestrzykiwań i lewatyw. 10'0=6 h. — ***Extr. R.** 0'20—1'0 p. d. k. r. d. w pig., placusk., mixt.; płókanie do ust, gardła, (5—10'0/0), do pędzlowań (1'0—5'0:25), do okładów, zmywań, maści. 1'0=14 h. — ***Tinct. R.** wew. 20—40 krop. p. d. do płókań, pędzlowań 10'0=8 h.

Resorbinum mieszanina ol. amygd., cera, lanolinum, sapo i gelatina jako constituents do maści. 10'0=18 h.

Resorcinum (Dioxybenzol) wew. jako antiferment., antisept., antypyret. po 0'20—0'50! p. d. k. r. d. — 3'0! p. die. w proszk., w opłatkach, mixt., kapsułk., w rozpuszcz.; zew. jako środek żrący w substancyi l. w rozpuszcz.; jako woda do ocz. (2'0:100), do przestrzykiwań

pecherza (2'0—5'0—10'0:100), do cewki moczow. (2'0:100), do lewatyw (1'0:200), do wziewań (0'50—1'0:100), do maści (5'0:30). 0'1 = 9 h. **Aceton-resorcin** związek acetonu z resorciną, krst. białe pryzmat, rozpuszczalne w alkaliach. Zastosowanie i dawki jak resorcin.

Rhamni Frangulae cortex w inf. (10'0—30'0:100—200 col.).

— ***Purshiani cort.** zob. Cascara Sagrada. 10'0 = 5 h.

***Rhei chinensis rad.** (Rhabarbarum) jako stomachic. 0'10—0'50 *p. d.* k. r. d.; jako purg. 0'50—5'0 *p. d.* w proszk., pig., kapsulk., infus. (2'0—5'0:100), do lewatyw (10'0—20'0:100). 10'0 = 30 h. — ***Extr. rhei. ch.** 0'05—0'30 *p. d.* jako tonicum; 0'50—1'0 *p. d.* jako laxans w pig., rozpuszcz. 1'0 = 12 h. **Extr. rh. ch. compos.** (Extr. rh. ch. 3, Aloë, Sapo med., Jalapa *aa* 1) 0'10—0'30 *p. d.* jako stomachic., 0'30—0'50 *p. d.* jako laxans w pig. 1'0 = 10 h. — ***Syrup. rh. ch.** łyżeczk., łyżkami, do mixtur. 10'0 = 6 h. — ***Tinct. rh. ch. aquosa** 1/2—4 łyżeczk. *p. d.* k. r. d. 10'0 = 8 h. — ***Tr. rh. ch. vinosa** (Vinum rh. Darhelli) dawka jak poprzedni. 10'0 = 24 h.

***Rosae flores** 10'0 = 10 h. — ***Aqua rosae** 100'0 = 20 h. — ***Ol. rosae** 0'10 = 20 h.

***Rosmarini folia** do speci., zew. w infus. do zmywań, okładów. 10'0 = 2 h. — ***Ol. rosmarini** do maści, liniment. 1'0 = 12 h.

Rubi idaei fruct. 100'0 = 40 h. — ***Syrup. rubi idaei** 10'0 = 6 h.

***Rubidium bromatum** krst. przejrzyste, kwadratowe, rozp. w H₂O. Sedativum, hypnoticum. W chorob. serca 3 razy dziennie 0'18—0'30, w bezsenności, delirium tremens 0'3—0'6 *p. d.*

Rubidium jodatum krysz. w wodzie rozpuszcz. 5'0—10'0:200'0 Aquae 3 razy dnia łyżkę zamiast jodkaliu — nie wpływa na serce. 1'0 = 40 h.

Rutae folia 0'50—1'50 *p. d.* k. r. d. w proszk., infus. (10'0—15'0:100—200 col.); do płókań ust i gardła, lewatyw. 10'0 = 6 h. — **Aquae rutae** 100'0 = 24 h. — **Ol. rutae** 1—3 kropl. *p. d.* 1'0 = 12 h.

***Sabadillae fruct.** (semen) jako zasypka; do zmywań, lewatyw, maści (1'0:4—10), 10'0 = 12 h. — ***Ung. sabad.** (1'0:4'0). 10'0 = 12 h. — **Tinct. sabad.** zewn. do nacierań.

Sabinae summitates (frond.) 0'20—1'0! *p. d.* — 2'0! *p. die* w proszk., pig., infus. (2'0—8'0:100 col.); zewn. do zasypek, maści, do płókań, przestrzykiwań (5'0:100). 10'0 = 6 h. — **Extr. Sab.** 0'03—0'20! *p. d.* — 1'0! *p. die.* 1'0 = 20 h. — **Ol. Sab.** 1/2—3 kropl. *p. d.* 2—3 r. d. w oleosach., w pig. 1'0 = 3 h. — **Tinct. Sabinae** 20—60 kropl. *p. d.*

Saccharinum łatwo w wodzie rozpuszcz., 100—550 r. słodszy od cukru, stosow. tam, gdzie cukier przeciwska-

zany (diabetes), do osłodzenia bardzo gorzkich leków, jak strychniny, chininy. Sprzedawany w tabletkach. 1'0 = 15 h.

***Saccharum albissimum** 10'0 = 4 h. — ***Sacch. lactis** jako łagodny laxans 10'0—20'0 *p. d.* z mlekiem. 10'0 = 10 h. — **Syrup. simplex** 10'0 = 5 h.

Sal Carolinum fact. zob. natr. sulfuric.

— **Seidlitzensis** zob. Magn. sulfuric.

— **Seignetti** zob. Kal. natr. tartaric.

Salacetol połączenie kw. salicylowego z acetolem proszek białawy, krystal., w wodzie nierozp., antiseptic. stosowany wewn. w biegunkach, czerwonce 2'0 *p. d.* (dzieciom 0'50 *p. d.*), (w Ol. ricini) ma działać lepiej od salolu. 1'0 = 32 h.

***Salep tubera** 0'5—1'0 *p. d.* — 10'0 *p. die*, w proszk., decoct. (0'25—1'50:200—300 col.), w żelatynie (1'0:50); zewn. do lewatyw (w decoct. 2'0:100). — **Mucilago Salep** (1'0:100 Aq.) łyżeczk., łyżkami.

***Salicis cortex infus.** decoct. (10'0—25'0:100—200 col.) stosow. jak cortex Quercus. 100'0 = 22 h. — **Extr. fluid. salic. nigr.** (antiaphrodisiac) 3'0—5'0 *p. die*.

Salicinum 0'50—2'0 *p. d.* — 10'0 *p. die* w proszk., pig., mixt. 1'0 = 12 h.

Salicilamidum krystal. żółte blaszki, rozpuszcz. w eterze, wysokoku, wodzie mało; stosow. jak kw. salicylowy 0'15 *p. d.* co godzinę — 1'0 *pro die*; 1'0 = 24 h.

Salifebrin (Salicylanilid) proszek biały w alkohol. rozp. Antipyreticum dosis jak salipyrina.

Saligenin krst. bezwonne, gorzkawe w alkoholu i eterze, rozp. Antirheumaticum co 1—2 godz. 0'50—1'0. 1'0 = 24 h.

Salipirinum, Antipyrinum salicylic. (fabric. Riedel), biały proszek, krystal., trudno w wodzie rozpuszcz. 1'0 *p. d.* — 6'0 *p. die* w proszk., mixt., działa podobnie jak natr. salicylic.; także w przypadłościach miesiączk. 1'0 = 7 h.

Salocoll (Phenocollum salicylicum) 1'0 *p. d.* w proszk. jak Phenocoll. mur. 1'0 = 32 h.

Salithymoll proszek biały krystaliczny w alkoholu i eterze rozp. — Antisepticum 0'5—2'00 *p. die*.

Salolum (Phenolsalicylat) biały proszek, krystal., w wodzie nierozpuszcz. tylko w wysokoku, eterze, 1'0—2'0 *p. d.* — 18'0 *p. die*, w proszk., tabletk., mixt.; zewn. jako zasyпка (czysty, l. *aa* z amylum), rozpuszcz. w alkohol. l. eterze do płókań, okładów do maści. 10'0 = 35 h.

Salophenum (Acetylparamidosalol) zawiera 50% kw. salicyl. blaszki krystaliczne, bez smaku, zapachu, rozpuszcz. w eterze, alkoholu, mało w wodzie gorącej, w dawce po 1'0 *p. d.* 5'0 *p. die* stosow. jako antineuralg., antirheumat. 1'0 = 30 h.

Saluminum (sol. i insolubile) = Aluminium salicylicum do zasypek, wdmuchiwań do nosa w ozaena.

***Salviae folia** 0'50—2'0 *p. d.* w proszk. l. infus. (5'0—15'0:100—200 col.), jako płókania do ust, gardła (infus.), do przestrzykiwań, zmywań, itd. 10'0 = 4 h. — ***Aqua S.** 100 = 22 h. — **Extr. S.** 0'50—1'50 *p. d.* k. r. d. — **Ol. aether. S.** 1—3 kropli k. r. d.; do płókań, kropli do zębów itd. 1'0 = 12 h.

***Sambuci flores** podobnie jak flor. chamomil. w inf. (5'0—15'0:100—200). 10'0 = 4 h. — **Aqua S.** 100'0 = 30 h. — **Roob S.** (succus s. inspissatum) łyżeczk., do mixt., (10'0—30'0:100). 10'0 = 8 h.

Sanguinariae canadens. rad. 0'20—0'60 *p. d.* w proszk., pig., decoct. (2'0—5'0:100—200 col.) — **Sanguinarinum** 0'005—0'008 *p. d.* jako expector; 0'01—0'02 *p. d.* — 0'05 *p. die* jako emetocatharic.

Sanguis draconis (resina draconis) do plastr., zasyp.

Sanoform igielki białe rozp. w alkoholu, eterze i waselinie, używane zamiast jodoformu jako zasypka albo we formie 100/0 maści. 1'0 = 35 h.

Santali lign. zob. Lignum Santali.

***Santoninum** 0'03—0'10! *p. d.* — 0'30! *p. die* w proszk., pig., do lewaty w (0'05—0'10:50), do czopków (0'05—0'10). 0'10 = 3 h. — ***Trochisci S.** (0'025—0'05). 10 szt. = 20 h. — **Natrium santon.** 0'10—0'20 *p. d.* 2—3 r. dz. w proszkach, pigułkach — **Calcium santon.**

***Sapo kalinus, virid.** 100'0 = 20 h. — ***S. medicinal.** (amygdal.). 10'0 = 12 h. — ***S. venetus** (oleac). 10'0 = 3 h. — **S. jalapinus** wew. 0'10—0'30 k. r. d. w pig. 1'0 = 20 h. — **S. picis** 10'0 = 8 h. — **S. sulfuricus.** — ***Spiritus saponatus** 100'0 = 48 h. — ***Spir. saponis kalini** do nacierañ, zmywań, kąpiei (1/4—1 klg. na kąpiel). 100'0 = 64 h. — **Spir. saponato camphorat.** zewn. do nacierañ.

Saponariae herb. infus. (10'0—30'0:100—200 col.). — **Rad. sapon.** w decoct. i infus. 10'0 = 4 h. — **Extr. sapon.** 0'50—2'0 *p. d.* k. r. d. w pig., mixt.

***Sarsaparillae rad.** wewn. 1'0—2'0 *p. d.* w pig. w decoct. (15'0—60'0:250—300 col.); w macerac. alkohol. lub wodnej. 10'0 = 14 h. — ***Decoet. Sars. composit fortius** (Zittman). — ***Decoet Sars. Zittmani mitius** — **Extr. Sars.** 0'50—1'0 *p. d.* k. r. d. — **Syrup. Sars. compos.** (Roob Laffecteur) 1—2 łyżeczk. 2—4 r. dz.; wskazania jak decoct. sarsap.

***Sassafras rad.** wchodzi w skład species lignor. 10'0 = 4 h.

Scamonium halepense (resina) 0'05—0'15 *p. d.* k. r. d.; w pig., proszk., emuls. 1'0 = 10 h.

***Scillae bulbus** (rad.) wewn. 0'03—0'20—0'50! *p. d.* 3—4 r. d. w proszk., pigułk., decoct., infus. (1'0—3'0:100); zewnętrznie do maści (1'0:4'0), do okładów (w infus. 5'0—10'0:200). ***Acetum Sc.** 2'0—5'0 *p. d.* k. r. d. w mixt.;

zew. do zmywań, lewat., płókań. 10'0 = 5 h. — ***Extr. Sc.** 0'05—0'20! *p. d.* — 1'0! *p. die* w proszk., pig., mixt. 1'0 = 14 h. — ***Oxymel. Sc.** łyżeczk., do mixt. (10'0—20'0 : 100). 10'0 = 10 h. — **Tinct. Sc.** 10—20 kropli (0'50—1'50) *p. d.* k. r. d. 10'0 = 8 h.

Scopoliae lucid. folia jako **Tinct. scop.** (1'0 : 8'0 alk.); 20 kropli *p. d.*, do ocz jako midriatic. — **Scopolaminum hydrochloric.** stosow. podobnie jak atropin., w roztworze (1—20/0) nie podnosi parcia śródocznego, działa silniej niż atropin. wewn. 0'0002—0'0005! *p. d.* podsk. 0'0001 jako sedativ u umysł. chorych. 0'01 = 14 h.

Scoparinum 0'50—1'0 *p. d.* w proszk., pig., podskór. 0'03—0'06 *p. d.*

Sebum ovile constit. do maści, mydeł, czopk. itd.

***Secale cornutum** wew. 0'30—0'60—1'0! 5'0! *p. die* w pig., proszk., infus., decoct. (2'0—5'0 : 100), zew. w proszk., w infus. (2'0—5'0 : 100'0) do lewat., przestrzyk. 10'0 = 14 h. — **Extr. secal. cornuti** zob. Ergotin. 1'0 = 22 h. — **Tinct. sec. cornuti** 0'50—2'0 *p. d.* — 8'0 *p. die* w mixt.

***Senegae rad.** 0'50—2'0 *p. d.* w proszk., pig., infus. lub decoct. (5'0—15'0 : 100—200 col.). 10'0 = 14 h. — ***Syrup. S.** łyżeczk., do mixt. 10'0 = 10 h.

Sennae (alexandrinae) folia 0'30—0'50 *p. d.* k. r. d.; jako laxans 0'50—2'0 *p. d.* (1—2 razy), jako silny purgans 2'0—5'0 *p. d.* w pig., proszk., infus. (5'0—20'0 : 100). 10'0 = 10 h. — ***Fol. Sennae sine resina** (F. S. spirit. extract.). 10'0 = 16 h. — ***Electuarium lenitivum S.** łyżeczk. lub do mixt. 10'0 = 10 h. — ***Infus. Senn. composit.** (Aqua laxativ. Viennensis) łyżeczk. — łyżkami 50'0 *p. d.* 100'0 = 50 h. — ***Spec. laxant. St. Germain** łyżeczkę na filiżankę infus. 10'0 = 16 h. — ***Syrup Sennae c. Manna** (mannatus) łyżeczk. lub w mixt. 10'0 = 5 h. — **Acidum catharticum** 0'20—0'50 *p. d.* 2—4 r. dz. w proszkach, pig., mixt., podskórnie 0'20—0'30 *p. d.* (z roztworu alkohol.). 0'10 = 2 h.

***Serpylli herb.** do spec.; zewn. do okładów, kąpeli i t. d. 10'0 = 3 h. — **Ol. serp.** 2 krople *p. d.* k. r. d.; do maści. 1'0 = 8 h. — **Spirit. Serp.** zewn. 10'0 = 5 h.

Sesami oleum jak amygdal. 10'0 = 4 h.

***Sinapis Semen** wewn. 1'0—4'0 *p. d.* 2+3 razy dz. w proszk., infus. (2'0—10'0 : 100), macer. (5'0—15'0 : 100), z mlekiem (25'0—50'0 : 500); zewn. w infus. do płókań, ust. gardła, zmywań, okładów, kąpeli. (100'0—250'0 na kąpiel), do przyszydeł, kataplastm. 100'0 = 20 h. — ***Farina Sinap.** — **Ol. sinap.** 0'004—0'01 *p. d.* k. r. d. w emuls.; zewn. rozpuszcz. w alkohol. lub olejach (0'20—1'0 : 25). 1'0 = 20 h. — ***Spirit. Sinap.** wewn. 2—10 kropli *p. d.* k. r. d.; zewn. jako rubefac. 10'0 = 8 h. — **Charta sinap.** Kartka = 12 h.

Solaninum hydrochloricum 0'05—0'10! *p. d.* — 0'50

p. die w pig.. w proszk., podskórn. 0'05 *p. d.* (z 1⁰/₁₀ rozczynu). 0'01 = 8 h.

Solutol do dezynfekcyi. 100'0 = 48 h.

Solveol jako desinfic. i antiseptic. przewyższa w działaniu kreolinę, kw. karbol., nie jest trujący, (0'5⁰/₁₀ solveol daje te same usługi co 2⁰/₁₀ kwas karbol.). 10'0 = 10 h.

Solvin s. Polysolveol przetwór uzysk. z oleju rącznikowego stos. jako constituens do maści.

Somnal 1'0! *p. d.* jako hypnotic. 10'0 = 110 h.

Sozal proszek kryształ. rozpuszcz. w wodzie używ. w 1⁰/₁₀ rozczywie do okładów jak Liquor alum. acetic. 1'0 = 6 h.

Sozodolum; Kalium sozodolicum 1'0 = 30 h. —

Acidum sozod; Hydrarg. soz. żółty proszek nierozp. stosowany zewn. w kile i chorobach skórnych. 1'0 = 40 h.

Natrium sozodolic. proszek bez zapachu, podobnie stosow. jak jodoform w chorob. skór. i kile, w proszk., maśc., rozpuszcz. w wodzie i alkoh. 1'0 = 30 h. — **Zincum sozod.** adstring. i antisept. do przepłókiwań (1—2⁰/₁₀) pęcherza cewki; w maści (5—10⁰/₁₀) w odmrożeniach, wysypkach, w proszku jako zasypka w otitis med. 1'0 = 36 h.

Spartii scoparii herb. i flores w infus., decoct. (5'0—20'0:100—360), jako diuretic. — **Sparteinum suifuric** 0'01—0'02 *p. d.* 2—4 r. dz. — 0'10 *p. die* w pigułkach, rozpuszcz. w wodzie. 0'10 = 8 h.

Spasmodin; Sphacelotoxin otrzymywane ze *Secale corn.* Działa jak *Secale corn.*; podskórn. do 0'10! *p. d.*

***Species amaricantes** (Hb. absynth., centauri min., Flor. aurant. *āā* 20, Fol. trifol. fibr., rad. calam., rad. gent. *āā* 10, cort. cinam. 2'50) stosow. jak infus. (5'0—15'0:100 col.). 100'0 = 60 h. — **Spec. aromaticae** (Hb. salv., menth., pip., flor. lavand. *āā*) wewn. jak poprzedni; zewn. do okładów (w infus.) kąpieli ($\frac{1}{2}$ —1 klg.). 100'0 = 74 h. — ***Spec. aromat. pro cataplasm.** 100'0 = 92 h. — **Sp. diureticae** 2 łyżeczki na 6 filiż. wody a 4 filiż. col. wypić w ciągu dnia. — ***Spec. emollientes** do kataplasm. 100'0 = 48 h. — ***Spec. laxant St. Germain** zob. Senna. — ***Spec. lignorum** zob. Guajaci lign. — ***Spec. pectorales** zob. Althea.

***Spilanthis oleraceae hb.** 10'0 = 10 h. do ***Tinct. Spilanth. compos.** stosow. w bólu zębów, do płókań ust. 10'0 = 16 h.

***Spiritus aetheris** (Liquor mineralis Hoffmanni) 10—30 kropli czysty lub w mixt. 10'0 = 6 h. — **Spirit. aether. nitrosi** (Spirit. nitr. dulc.) wewn. kropl.; zewn. do płókań, pendzlowań. 10'0 = 6 h. — ***Spir. vini rectificatus** (concentratus). 100'0 = 32 h. — ***Spir. vini dilutus** 100'0 = 26 h. — ***Spir. vini Cognac.** 10'0 = 18 h. — **Spir. framenti.** 10'0 = 4 h. — **Spir solani tuberosi.**

Spongia compressa (gąbka); **Sp. carbolisata**: **Sp. tosta** (Carb. Spong.).

Stibium chloratum (Liquor stibii chlorat.; Butyrum antimonii) środek żrący. 10'0 = 36 h.

***Stibium sulfuratum aurant.** wew. 0'015—0'10 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., trochisci (po 0'03). 1'0 = 10 h.

— **sulfuratum nigrum** (laevigatum) 0'2—1'0 *p. d.* 2—4 r. d. w pig., proszk., trochisci (po 0'18). 10'0 = 6 h.

***Stramonii folia** wewn. 0'03—0'15—0'30! *p. d.* 3—4 r. dz. — 1'0! *p. die*, w proszk., pig., intus. (0'20—1'0:100); zewn. do palenia (Cigarettes antispasmodiques) do maści (1'0:10). 10'0 = 5 h. — **Extr. Str.** 0'01—0'10! *p. d.* — 0'40! *p. die*, zewn. do wcierań, wody do ocz. (0'50—2'0:100), do maści (1'0:25). — **Sem. Str.** 0'01—0'10 *p. d.* **Tinct. Str.** 5—10 kropli, (0'50!) *p. d.* — 2'0! *p. die*

Strontium bromatum krystal. igiełki łatwo rozpuszcz. w wodzie 1'0 *p. d.* — 4'0 *p. die*, w dyspeps, gastralg., hysterii. 10'0 = 40 h.

— **jodatum** w tej samej dawce co kalium jodat. i w miejsce tegoż

— **lacticum** proszek biały, ziarnisty, 1'0 *p. d.* 2—3 r. d. w chorobach nerek, białkomoczu u ciężarnych, także przeciw tasiemcowi. 1'0 = 5 h.

— **salicylicum** igiełki krystaliczne, białe, w H₂O i alkoholu trudno rozpuszczalne. Używane w reumatyzmie 0'6—1'00 *p. d.*

Strophanti hispidi (semen) w infus. lub decoct. zamiast digitalis. — ***Tinct. Stroph.** h. (1'0:20) 5—15 kropli (1'0) *p. d.* 2—4 r. d. (3'0!) *p. die*. 1'0 = 3 h.

— **Strophanthinum** bardzo silnie trujący, mało wypróbowany 0'0001—0'0005 *p. d.* rozpuszcz. w alkaliczn. wodach lub stos. pigułkach. 0'01 = 5 h.

***Strychnos nux vomica** (semen strychni) 0'03—0'12! *p. d.* — 0'50! *p. die* w proszk., pig., do lewatyw (w decoct. 0'25—0'50:100). — ***Extr. Str.** (nuc. vomic. spirit.). 0'01—0'05! *p. d.* — 0'15! *p. die* w proszk., pig. 1'0 = 28 h. — ***Tinct. Str.** (Tinct. nuc. vomic.). 0'10—1'0! *p. d.* — 3'0! *p. die*; zewn. do nacierań. 10'0 = 12 h. — **Tinct. nuc. vomic. aetherea.**

***Str. nitricum** 0'003—0'007! *p. d.* — 0'02! *p. die* w proszk., pig.; zewn. w rozpuszcz. w olejach lub maści (0'05—0'30:10), podskórn. (1'0/10 rozczyn.) 0'001—0'01 *p. d.* 1—2 r. dz. 0'01 = 2 h. — **Str. aceticum** i **Str. sulfuricum** stosow. jak **Str. nitricum** 0'01 = 2 h.

Stypticin (Cotarninum hydrochloricum) proszek żółtawy. rozp. w H₂O. — **Haemostaticum.** Używ. w krwotoku macicznym i dysmenorrhoe 2—3 razy dziennie 0'025—0'05, 4—5 d. przed menstruacją 0'10 = 40 h.

***Styrax liquidus** (Balsam Styr., Ambra liquid.) wewn. 0'50—2'0 k. r. dz. w pig. lub rozpuszcz. w alkoh.; zewn. do maści, liniment. *aa* Ol. Olivar. 10'0 = 10 h. — **Linimentum Styrax.** (Styrax 3, Ol. Oliv. 6, Spir. vini 1); — **Ungu. Styrac. sulfuratum** antiscabiotic.

Succinum jako proszek do kadzideł. 10'0 = 4 h. — **Ol. Suc.** 5—15 kropli *p. d.* k. r. d. w pig., kapsułk., jako krople do uszów, zębów itd. 10'0 = 12 h.

Sulfonalum kryształki bez smaku, zapachu, 1'0—3'0 *p. d.* jako hypnotic, aż 4'0! *p. d.* — 8'0! *p. die*, w pig., pastylkach, z gorącą herbatą, rosółem i t. d. 1'0 = 12 h.

***Sulfur sublimatum** i **Sulfur sublimat. depuratum** (flores sulfuris) wewn. 0'30—1'0 *p. d.* k. r. d.; jako laxans 2'0—8'0 *p. d.* w proszk., trochisci (po 0'18); wewn. do wdmuchiwań do gardła, krtani, do płókań w emulsyi (1'0—2'0 : 100), do nakadzań, maści (1'0 : 2—5). 10'0 = 8 h.

— ***Ung. sulfurat. antiscabiotic.** — ***Sulfur praecipitatum** (Lac. sulfuris, mleko siarczane) 0'10—0'50 *p. d.* k. r. dz. jako laxans 1'0—2'0. 10'0 = 15 h. — **Sulf. chloratum** do pędzlow. **Sulf. jodatum** wewn. 0'05—0'10 *p. d.* 2—4 r. d. w pig., glicerynie; zewn. do maści, mydeł. 1'0 = 20 h.

Syrupus Diacodii zob. Papaver.

— ***Menthae.** 10'0 = 8 h.

***Syrupus Mororum** 10'0 = 6 h.

— ***Rubi ideai** 10'0 = 6 h.

Talcum praeparatum zob. Alumen plumosum.

Tamarindi Pulpa tamarindorum cruda, zewnątrz. w decoct. (25'0—60'0 : 1000) jako napój; (8'0—50'0 : 100—300 Aqu.), jako laxans. — ***Pulp. tamar. depurata** 25'0—60'0 *p. d.* k. r. d. czysta lub mixt., powidełk.; do lewatywy. 10'0 = 10 h.

Tanaceti herb. 1'0—2'0 *p. d.* k. r. d. w proszk., infus. (10'0—20 : 100). **Flores T., Oleum Ta.** 1—2 kropli k. r. d. w alkoh. lub z olejami; zewn. do nacierań.

Tannalbin proszek żółtawy; 1'0 *p. d.* k. r. d. dzieciom — 0'5 *p. d.* w biegunkach, w gruźlicy jelit, w nephritis. 1'0 = 13 h.

Tannalum (Aluminium tannicotartar.) wewn. jako środek ściągający do zasypek, zadmuchowań, wcierań i pędzlowań (20%). 1'0 = 12 h.

Tannigen szary proszek nierozp. w wodzie rozszcza-pia się w jelitach, uwalniając kw. garbnik.; wewn. na koniec noża k. r. d.; zewn. do zadmuchowań. 1'0 = 20 h.

Tannoform proszek rozpuszczalny w alkaliach i alkoholu. Używa się w decubitus, eczema, pruritus, ulcus molle, hyperidrosis itd. jako zasypka, antisepticum. 10'00 = 70 h.

Taraxaci folia do species, decoct. (10'0—15'0 : 100)

— ***Rad. Tarax.** tak samo stos. — ***Extract. Tarax.** 10'0—30'0 *p. d.*

Tartarus boraxatus (kalium tartaric. boraxat.) 0'50—2'0 *p. d.* w rozpuszcz. (jako diureticum), 5'0—7'0 *p. d.* jako laxans.

— **depuratus** zob. kalium hydrotartaricum.

— **natronatus** zob. Kalium natrotartaric.

— **stibiatus** zob. Kalium stibiotartaric.

***Terebinthina** (communis) zewn. do maści, plastr. (1'0 : 3) 100 = 14 h. — ***Tereb. veneta.** wewn. 0'30—1'0 *p. d.* k. r. dz. w pig., emulsi; zewn. do przestrzykiwań. (1'0—4'0 : 100), wzięwań, maści, liniment., lewatyw (4'0—8'0). 10'0 = 5 h. — **Tereb. cocta** stos. tak samo. — ***Ol. Tereb.** 100 = 28 h. — ***Ol. T. rectificatum** 10'0 = 4 h. — **Sapo Tereb., Ungu. Tereb.** stosow. szczególnie w odmrożeniach.

Terpinolum płyn bezbarwny, lotny, w wodzie nierozpuszcz., stosow. w niezbytach dróg oddech. 0'10—0'50 *p. d.* w kaps. 1'0 = 4 h.

Terpinum hydratum 0'20—0'40 *p. d.* — 1'0 *p. dte.* w proszk., pig., mixt. 1'0 = 3 h.

Tetronalum krysz. rombiczne, bezbarwne, w wodzie słabo rozpuszcz., 1'0 *p. d.* jako hypnotic. 1'0 = 90 h.

Teucrinum (Teucrium Scordium) płyn ostrego smaku, zapachu czosnku) stosow. w miejscowej gruźlicy celem wywołania reakcyi, 3'0 na jedno zastrzyknięcie; wewn. 0'50 *p. d.* jako stomach.

Thallinum sulfuricum wewn. 0'20—0'50 *p. d.* jako antipyretic. rozpuszcz. w wodzie lub winie, z dodatkiem Syrup. cortic. aurantior.; zewn. do przestrzyk. 1—20/0 do świeczek. 1'0 = 80 h. — Tak samo stosuje się **Thall. tannicum** i **Thall. tartaricum** 1'0 = 70 h.

***Theae folia** — **Theinum** zob. Coffeinum.

Theobrominum natriosalicyleum zob. Diuretinum.

Thermodinum antipyretic. w dawce 0'50—0'70 *p. d.* (dla dzieci 0'20—0'30).

Thioform (Bismuthum dithiosalicyleum) 0'3 *p. d.* jako antyseptyk kiszkowy; zewn. czysty do zasypek na wrzody, oparzenia. 1'0 = 22 h.

Thiolum (fabric. Riedel) jako **Th. siccum** 10'0 = 55 h. brunatny proszek i **Th. liquidum** 10'0 = 30 h. ciecz ciemnobrunatna syropowata, oba łatwo w wodzie rozpuszcz. stosow. zewn. w rozpuszcz. (100/0) w ostrych zapalnych chorobach skóry.

Thiophendijodid, tabliczki kryształ., nierozpuszcz. w wodzie, stos. w proszku zam. jodof. lub jako gaza (100/0).

Thioresorcinum szary proszek nierozp. w wodzie polec. w miejsce jodoformu; do maści 50/0.

Thiosinaminum polecony do wstrzykiwań podskórnych w liszaju żrącym (lupus). 1'0 = 25 h.

Thujae frond. tylko zewn. jako zasypka.

Thymi herb. i **Ol.** stosow. jak Herb i Ol. Serpylli. 1'0 = 6 h.

***Thymolum** 0'05—0'10 *p. d.* k. r. d. jako antifermentativ.; 1'0—2'0! *p. d.* jako antifebril., antirheumatic, w proszku lub rozpuszcz. w alkohol., alkaliach; zewn. jak acid. carbolie. 1'0 = 12 h.

Thyreoidinum siccatum (Merk) w niskiej ciepłocie wysuszony i sproszkowany gruczoł tarczowy owcy. 0'1—0'2 *pro die* w proszku lub pastylkach postępując w górę aż do 0'4 *pro die* stos. w myxoedema. psoriasis. 1'0 = 32 h.

Thyroidin działający składnik gruczołu tarczowego, około 10% jodu zawierający (w handlu znajduje się mieszanina z cukrem w tym stosunku, że 1'0 mieszaniny zawiera 0'3 mg. jodu), 0'3 — *pro dosi* 1—3 razy dnia w proszku, tabletkach — najwyżej 2'0—4'0 *pro die*; dzieciom o połowę mniej. 1'0 = 1 kor. 15 h.

***Tiliae flores** 10'0 = 6 h. stosownie jak Flor. sambuci.

***Tinct. amara** (Hb. centauri, Fruct. aurant. immat., Rad. gent., Rhiz. zedoar) 20—60 kropli *p. d.* k. r. dz. 10'0 = 10 h.

Tinct. aromatica (Cort. cinam. Cas. 5, Rh. zing. 2, Fruct. cardam, Caryoph. aa 1 : 50 Spirit. diluti). 10'0 = 8 h. — **Tinct. aromat. acida.** 10'0 = 10 g.

Tolypyrinum (fabric. Riedel) kryształki bezbarwne, smaku gorzkiego, w wodzie rozpuszcz., działa podobnie jak antipyrina (antineuralg., antirheum.) 1'0 *p. d.* co godz. (4 proszki). 1'0 = 36 h.

Tolysalum (Tolypir. salicylicum) kryształy w wodzie rozpuszcz. działa podobnie jak poprzedni 1'0—2'0 *p. d.* co godz. (6'0! *p. d.*). 1'0 = 36 h.

Tormentillae rhiz. 0'50—2'0 *p. d.* k. r. d. w proszku, decoct. (5'0—20'0 : 100), zewn. do płókań, przestrzyk., okładów.

Tragacantha (gummi) wewn. 1'0—4'0 *p. d.*; zewn. jako emulg, constit.

Tribromphenol zob. Bromol.

***Trifolii fibrini fol.** 100'0 = 28 h. — ***Extr. Trif. f.** 10 = 36 h., stosow. jak Fol. i Extr. centauri.

Trionalum delikatne kryszkt., rozpuszcz. w letniej wodzie 1'0—1'50 *p. d.* w bezsenn. 1'0 = 25 h.

Trypsinum 0'10 = 20 h., stosow. jak pancreatinin.

Tumenolum. constit. dla maści, także rozpuszcz. w alkoh. jako tinct., pasta. stosow. w chorobach skóry. 1'0 = 10 h.

Tussol (Antipyrin. phenolo-glycolicum) proszek w wodzie rozpuszcz.; stosow. w krztuścu, w dawce do 1 roku 0'01; do 3 lat 0'10; do 5 lat 0'25 *p. d.* 1'0 = 30 h.

***Unguent. aromaticum Autenriethi** zob. Kal. stibiotartaric. 10'0 = 10 h.

— **basilicum** (z Terebin.). 10'0 = 8 h.

— **cereum** (cerae flav. 3. Ol. Oliv. 7).

— **emolliens*. zob. *Cetaceum*. 10'0 = 20 h.

— **simplex* zob. *Axungia*. 10'0 = 8 h.

Uranium nitric. żółte w wodzie rozpuszcz. kryształ. 0'05—0'1 *p. d.* 2 razy dnia aż do 0'5—1'0 *p. die* polecane w cukrówce.

Urethanum jako hypnotic. 1'0—3'0 *p. d.* także jako odtrutka w zatruciu strychniną (4'0—5'0) w proszk., (charta cerata), w kapsułk., w rozpuszcz. w wodzie; podskórnie 0'25 *p. d.* 1'0 = 12 h.

Uricedinum 1'0—2'0 *p. d.* k. r. d. w skazie moczowej. Mocz staje się alkalicznym. 10'0 = 50 h.

Uropherinum salicylicum (Lith. theobrom. salicyl.) 3'0—4'0 *p. die* w roztworze wodn.; moczopędny jak diuretinum. 1'0 = 45 h.

Urotropinum hexametylenotetramin, produkt kondenzacji formaldehydu z amoniakiem, w organizmie wydziela napowrót formaldehyd, 0'50 *p. d.* 0'10 = 3 hal.

***Uvae ursi folia** 0'60—3'0 *p. d.* k. r. d. w proszkach, decoct. (20'0—60 : 100 coll.) do species.

***Valerianae radix** 0'50—2'0 *p. d.* k. r. d. w proszk., maceracyi lub infus. (5'0—15'0 : 100); do lewatyw (w decoct.). 10'0 = 4 h. — **Aqua Valer.** — **Extr. Valer.** 0'50—1'0 *p. d.* w pig., mixt., do lewatyw. 1'0 = 4 h. — ***Ol. Valer.** 1—4 kropli *p. d.* k. r. d. 1'0 = 6 h. — ***Tinct. Valer.** 20—50 kropli *p. d.* 10'0 = 8 h. — **Tinct. Valer. aether.** 10'0 = 12 h. — **Tinct. Valer. ammoniata** 10'0—20 kropli *p. d.* k. r. d.

Validol. Płyn bezbarwny. Analepticum, antihystericum, stimulans, stomachicum, carminativum X—XV kropli *pro dosi.* 10'00 = 250 h.

***Vanillae fruct.** 0'05—0'60 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., infus. (3'0—5'0 : 100); zewn. jak corrig. consperg. 1'0 = 24 h. — ***Tinct. V.** 30—60 kropli *p. d.* k. r. d. 1'0 = 5 h. — **V. saccharata** (Elaeosacchar. V.). — **Vanillinum** 0'01—0'02 *p. d.* 2—3 r. dz. w proszk., pig., mixt. 0'10 = 25 h.

***Vaselinum** zob. *Paraffinum*.

Vasogen. Vaselinum oxygenatum. — używa się w połączeniu z kreoliną, jodoformem, ichtyolem itd. 10'0 = 30 h.

Veratri albi radix (rhiz.) 0'05—0'15—0'30! *p. d.* 1'0! *p. die* w proszk., pig., w infus. l. decoct. (0'30—1'0 : 100); zewn. jako proszek do wdychiwania do nosa, w decoct. do okładów, także do maści (1'0 : 5'0). — **Tinct. Ver.** 3—10 kropli *p. d.* z istotami klejkami; zewn. do pędzl.

***Veratrinum** wewn. 0'0005—0'001—0'005! *p. d.* — 0'02! *p. die* w pig., proszk., rozpuszcz. w alkoholu; zewn. do nacierania (0'10—0'50 : 10 alkohol.), do maści, podskórnie (0'001). 0'10 = 6 h.

***Verbasci flores.** — **V. folia** stosow. jak flor. i fol. *Malvae*.

Viburni prunifolii cort. jako Extr. 2'0—5'0 *p. d.* 1—4 r. dz.

***Violae tricoloris herb.** 1'0—5'0 *p. d. k. r. dz.* w proszk., infus., decoct. (10'0—15'0:100), succus recens; zewn. do okładów, kąpieli (infus.).

Xeroform zob. Bismuthum tribromphen.

Xylolum wewn. 15—30 kropli w kapsułk. 10'0 = 8 h.

***Zedoariae rad.** (rhiz.) stosow. jak Rad. zingiberis.

Zincum aceticum wewn. 0'03—0'10! *p. d. k. r. d.* = 0'30! *p. die* (jako środek wymiotny 0'50 aż do skutku); zewn. do płókań (1'0:100), do opatrunków, przemywań, przestrzykiwań (1'0—5'0:100), do cewki moczowej (0'25—1'0:100), do ucha (2'0—4'0:100), w maści (1'0—10'0). 1'0 = 2 h.

— ***chloratum** wewn. 0'003—0'01—0'015! *p. d.* — 0'10! *p. die* rozpuszcz. w wodzie, eterze lub piguł.; zewn. w substancji przeciw bólowi zębów, do opatrunków (1'0:100—500), do przestrzykiwań (0'25—0'50:100), do pędzłow. (0'10—1'0:25), do maści 1'0:10'0), jako pasta żrąca (1'0:4'0 pulv. rad. alth.). 10'0 = 10 h. — **Liquor. Landolfi s.** Aurum chloratum (Zinc., aur., stib., Brom. chlorat. *aa* 1, Farina tritic.).

— **cyanatum** 0'005! *p. d.* w prosz., pig., do maści, do ocz. (0'10:1). 0'01 = 2 h. — **Z. ferrocyanat.** 0'03—0'15 *p. d. k. r. d.* w prosz., — pig. 1'0 = 4 h.

***Zincum oxydatum** 0'05—0'20—0'40 *p. d. k. r. d.* — 2'0 *p. die* w pig., proszk., mixt.; zewn. jako zasypka, proszek do ocz. (1'0:1—5 sacch.), do wdmuchiwań do krtani, woda do ocz. (0'20—1'0:25), do maści (1'0—5'0:20), do czopk. (1'0:5'0). 10'0 = 10 h. — ***Unguent. Zinci oxydat.** 10'0 = 16 h.

— **phosphoratum** 0'001—0'005 *p. d.* 2—3 r. d. w pig., proszk., 0'10 = 3 h.

— **sulfocarbolicum** tylko zewn. do okładów. opatr. (1'0:100—200), do przestrzykiwań do cewki (0'05—1'0:100), do pochwy (0'10—1'0:100). 10'0 = 26 h.

— ***sulfuricum** 0'005—0'01—0'05! *p. d.* — 0'30! *p. die*; jako alter. i nauseos; jako emetic. 0'30—0'50—0'80! *p. d.* aż do skutku; zewn. do wdmuchiwań do nosa, krtani, ocz. (1'0:5'0 sacch.), do płókań gardła (0'10—0'50:100), do pędzłow. (1—20/0), do kąpieli, maści (0'10—1'0:100), jako środek żrący w pręcikach lub w zgęszczonym roztworze (1'0:2'0). 10'0 = 4 h.

— ***Collyrium adstring. luteum.** (Zinc. sulf. 1, Aqu. 100, Spirit. ammon. chlor., Camphor., Crocus). 10'0 = 6 hal.

— **valerianicum** 0'03—0'06! *p. d.* — 0'30! *p. die* w prosz., lub pig. 1'0 = 8 h.

***Zingiberis rad.** (rhiz) 0'30—1'50 *p. d. k. r. dz.* w proszk., pig., powidełk., infus. (5'0—20'0:100); zewn. do płókań (w infus. 10'0—15'0:100). 10'0 = 5 h. — **Tinct. Z.** 10—30 kropli *p. d.* 10'0 = 10 h.



NOWE ŚRODKI LECZNICZE

podał

Doc. Dr. Ign. Lemberger.

....

Acetopyrinum. Połączenie aspiryny z antipiryną; przedstawia proszek biały, woni słabej kwasu octowego, rozpuszcza się trudno we wodzie. Podaje się w dawkach 0'5—1'0 g. trzy do czterech razy dziennie w reumatyzmie, migrenie i t. p. a nie mniej jako środek przeciwgorączkowy.

Acoinum C. Acoiny są chlorkami fenylatów alkylowo-gwanidynowych. Używana »C«. akoina jest proszkiem białym krystalicznym bez woni rozpuszczalnym we wodzie w stosunku 6 : 100. Posiada własności w wysokim stopniu przeciwnie, a nadto jako środek miejscowo znieczulający: Acoini 0'05, cocaini mur. 0'1, sol. natr. chlor. (0'8%) 5'0. 1—2 przedziątek Prawatza.

Actol (mlekan srebrowy), przedstawia proszek biały, bez woni i smaku, rozpuszczalny we wodzie i w wysoku. Środek to działający przeciwnie; używany jest w roztworach 1 : 100 do 1 : 4000, w miejsce trującego sublimatu do obmywania rąk, pola operacyjnego, do przepiókiwania i t. p.

Agurinum (teobromino-octan sodowy), jest proszkiem rozpuszczalnym we wodzie; zawiera 60% teobrominy. Z powietrza przyciąga wilgoć. Aguryna działa szybko moczopędnie; szczyt działania objawia się po 2—3 dniach podawania. Dawka 1'0 g. 3 razy dziennie.

Albarginum połączenie gelatyny z azotanem srebrowym zawiera 15% Ag. We wodzie rozpuszcza się łatwo, działa obojętnie, ulega dyalizie. Znajduje zastosowanie do przepiókiwania i wstrzykiwania w roztworach 0'1 do 0'2%. W handlu mamy także kołaczyki po 0'2 gr.

Anaesthesinum jestto p-amido bęździnian etylowy i przedstawia proszek biały, lekki b. trudno we wodzie rozpuszczalny, łatwo rozpuszczalny w alkoholu, eterze,

benzolu i tłustych olejach. Działa znieczulająco. Dawka 0·2—0·5 gr. 3 razy dziennie w hyperaesthesia ventriculi, ulcus ventr., vomitus gravidarum; w czopkach i gałkach w cierpieniach pęcherza i cewki moczowej, haemoroid.; w maści w pruritus, intertrigo, eczema.

Anthrasol oczyszczona smoła pogazowa i jałowcowa (marka Knolla) stosowana w postaci 10—20% maści waselinej w eczema, pruritus, w cierpieniach skórnych na tle pasożytniczym i przewlekłym.

Argentum fluoratum (Tachiol). Antisepticum. W roztworze 0·02—0·03% używany do płókań żołądkow. pobudza ruchomość żołądka i przyczynia się do łatwiejszego trawienia. Również z cukrem mlekowym w dawce 0·0006 gr. w pół godziny po jedzeniu w przewlekłych nieżytach żołądka, w zatrzymaniu stolca połączonych z nieżytem jelit. W roztworze 0·01% w przebiegu ospy, zewnętrznie w postaci rozpylań lub okładów; następuje gojenie bez ropienia.

Asterol, jest połączeniem kwasu para-fenylosulfonowego z azotanem rtęciowo-amonowym i przedstawia proszek brunatnej barwy, który się rozpuszcza trudno w wodzie zimnej, łatwo zaś w gorącej. Rozczyn 4—5%^{0/00}, który równoważy 1%^{0/00} roztworu sublimatu nie ścina białka. Asterolu używa się jako środka przeciwnielego w miejsce sublimatu; asterol działa również trująco natomiast nie działa żrąco jak sublimat.

Beta-Eucainum hydrochloricum jest związkiem zastępującym w działaniu kokainę, a przewyższa tę ostatnią tem, że jest mniej trującą, roztwory dają się sterylizować, wkroplony roztwór betaeukainy nie wywołuje zmian akomodacji ani źrenicy. Do zabiegów okulistycznych i dentystycznych używa się 1—2% roztworu, do zabiegów ogólnie chirurgicznych 2—4%^{0/0}, do pędzlowań błon śluzowych 5%^{0/0}.

Benzosol, Benzylguajacol, guajacolum benzoicum, będzwinian guajacolu. Przedstawia kryształki bezbarwne, bez woni i smaku, bardzo trudno rozpuszczalne w wodzie, łatwo w chloroformie, eterze i wrzącym wyskoku. Środek dezynfekcyjny zalecany w gruźlicy płuc po 0·25 gr., trzy razy dziennie podnosząc tę dawkę powoli do 2·4 gr. *pro die*.

Bismal, Bismuthum methyleno digallicum. Proszek szaroniebieski, lekki, rozpuszczający się w alkaliach barwą pomarańczowo-czerwoną. Środek ściągający, podawany w biegunkach w dawce 0·1—0·3 trzy razy dz.

Bismutosa, proszek delikatny barwy białej bez woni i smaku. W treści żołądkowej nie doznaje zmiany. Jest to środek ściągający zalecany w biegunkach szczególnie u dzieci wewnętrznie lub lewatywie.

Bromocol połączenie glutyny, kwasu garbnikowego i bromu zawierające 20% Br. Stosują w postaci maści

20%, rozczyńu 10% i zasypki 10% w pruritus ani, scroti et vulvae, eczema, urticaria, prurigo etc.

Captol produkt kondenzacyjny aldehydu kwasu mrówkowego z chloralem przedstawia proszek brunatny, przyciągający wilgoć, rozpuszczający się łatwo we wodzie ciepłej i we wysokoku. W roztworze wysokokowym 1—20% używa się do zmywania głowy w seborrea capitis i defluvium capill. Także jako spirit. captoli compos.: Captoli, Chlorali hydrati, Acidi tartarici aa. 1.0. Ol. ricini 0.5, Spirit vini diluti 1000.0. Essenth. flor. aeth. q. s. S. Woda do włosów.

Cellotropinum (Ester benzoilowy arbutyny) przedstawia proszek biały, bez woni i smaku, trudno się rozpuszczający w wodzie, łatwiej w wodzie gorącej i alkoholu. Zalecają podanie tego środka w przebiegu chorób zakaźnych, a szczególnie w gruźlicy i żółtaczach. Działanie jego polega na tem, że się dostaje nierozłożony do obiegu krwi i nimfy i tam dopiero dozna je rozkładu i pobudzając wydzielność gruczołów przyczynia się do zwiększania się enzymów, które działając na żywą protoplazmę, ułatwiają tworzenie się alexynów. Cellotropina chroni zatem organizm przed zakażeniem przez wytwarzanie naturalnych istot ochronnych.

Chinaptol B naftolo-*a*-monosulfonian chininy — zawiera 42% chininy. Riegler zaleca go jako środek przeciwniepalny w durze brzuszny, gruźlicy jelit, dysenterji w dawce 0.5 grm.

Citarinum (Natrium anhydro-methyleno-citricum) podają w dnie w dawkach 2 grm. 3—4 razy dziennie.

Collargolum. (Argentum colloidalé Credé). Rozpuszcza się w stosunku 1:25 we wodzie barwą brunatną: roztwór posiada tę własność, że za dodatkiem białka lub gumy nie wydziela srebra w żołądku pod wpływem kwasu solnego lub mlekowego. Stosuje się: 1) w postaci rozczyńu 1:100—1:1000 do przestrzykiwań ran, pęcherza; albo z białkiem kurzem w przebiegu niezżytu żołądka lub jelit w roztworze 0.1—0.5:100.0 podając po łyżeczce kawowej względnie stołowej. 2) w postaci maści »Unguentum Crede« (Ung. collargoli) wcierając 1—3 gr. na dawkę raz lub dwa razy dziennie w skórę poprzednio dokładnie oczyszczoną lecz nieuszkodzoną. 3) W postaci Pilulae argenti Credé majorés po 0.01 Argent. colloidalé i minores, po 0.05 Argent. colloidalé podając maiores po 1—4 pigułek dziennie przed jedzeniem w schorzeniach rdzenia pacierzowego, minores zaś służą do zakładania do ran głębokich lub jam. W postaci baccili, suppositoria, globuli c. Argent. colloidal 2%.

Citrophen, (Cytrynian parafenetidyny) podają w dawce 0.5—1.0 gr. 3 razy dziennie dla dorosłych, a po 0.2—0.3 gr. dla dzieci, jako środek przeciwbólowy

i kojący bóle nerwowe, a więc w migrenie, gościecu, grypie, krztuścu i t. p.

Crurin, rodanek chinolino-bismutowy, stosowany do leczenia wrzodów podudzia poleca Jacobi w rzerzączce do wstrzykiwań w postaci emulsyi glicerynowej $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}\%$.

Digalen — „Digitoxinum solubile Cloetta”. Istota działająca z liści *Digitalis purpurea* identyczna z Digitoxiną lecz bezpostaciowa i ulegająca łatwo dialysie. W handlu przychodzi pod nazwą digalen roztwór tej istoty w 25% glicerynie, którego 1 cm³ odpowiada 0.3 miligrama digitoxyny bezpostaciowej. — Dawka: *pro dosz* 1 cm³ = 0.3 mg. 2 cm³ = 0.6 mg. !; *pro die* = 4 cm³ = 1.2 mg. !

Dioninum, chlorek etylo-morfiny. Przedstawia proszek biały krystaliczny, smaku słabo gorzkawego, łatwo rozpuszczalny w wodzie i wysokoku. Tak też dionina przewyższa w działaniu kodeinę. Stosowany przy kaszlu uporczywym w gruźlicy, niezycie oskrzeli i t. p. okazał się bardzo cennym środkiem uspakajającym. Dawka 0.02 gr. 2—3 razy dziennie.

Dormiol, (Chloral dwumetylo - etylo - karbinolowy) środek nasenny. Z powodu swojego smaku nie bardzo przyjemnego podaje się dormiol w kapsułkach po 0.5 gr.

Dymalum, (salicylan dydymowy) jest proszkiem delikatnym bez woni. Stosują go jako zasypkę lub też w postaci 10% maści lanolinowej, celem szybkiego gojenia ran, po oparzeniach, w przebiegu chorób skórnych jak eczema, psoriasis, impetigo contag, hyperhidrosis i t. d.

Empyroform, produkt kondenzacyjny formaldehydu i smoły przedstawia proszek brunatny, rozpuszczający się w acetonie i alkaliach żrących, szczególnie w chloroformie; woń posiada słabą. Stosują ten środek w chorobach skóry (psoriasis, prurigo, trichophytia i eczema) w postaci zasypek z tlenkiem cynkowym i skrobią lub w postaci 1—2—5—10 i 20% maści waselinowej lub pasty do pędzlowania 50% z talc. venet. i gliceryną a w końcu tynktury 5—10% z chloroformem i Tra. benzoe.

Enesol (związek salicylo-methyloarsino-rtęciowy). Przedstawia proszek biały, do 4% we wodzie rozpuszcz. dający się sterylizować. Pomimo że zawiera 38.40% rtęci i 14.4% arsenu jest bardzo mało trującym. W kile podają wstrzykiwania podskórne roztworu 3% po 2 cm³ dziennie; po 20 wstrzyknięciach następuje kilkodniowa pauza.

Eosotum, *Creosotum valerianicum* jest mieszaniną estrów kwasu koźłkowego z fenolami zawartymi w kreosocie. Przedstawia ciecz ruchliwą, w wysokoku i eterze rozpuszczalną. Gravitz poleca w gruźlicy płuc w postaci

kaps. gelatynowych po 0·2 gr. eosotu zawierających 3—6—9 sztuk dziennie.

Epicarinum, w postaci 5⁰/₀ maści lanolinowej albo też w maści ze szarem mydłem ze zawartością do 20⁰/₀ w leczeniu chorób skórnych i świerzbu ze skutkiem stosowany

Eucasinum, jest to związek sernika z amoniakiem, tworzący się przy przeprowadzaniu par amoniakalnych ponad sernikiem. 30—40 gr. eukasyny odpowiada 24—32 gr. białka. Przedstawia proszek delikatny, rozpuszczający się w wodzie z opalizacją. Środek odżywczy mający zmniejszać wydzielanie się kwasu moczowego.

Eupirinum, związek węglanu etylo waniliny z p. fenetidyną trudno we wodzie rozpuszczalny łatwo zaś w wyskoku, eterze i chloroformie. Jako środek przeciwgorączkowy działa szybko i pewnie, nie powoduje następstw przykrych, ani objawów zatrucia. Dawka 1·0—1·5 gr. *pro dosi* dorosłym, dzieciom 0·3—0·5 gr

Euporphinum (Apomorphinum methylobromatum), przedstawia kryształki igiełkowate lub łuskowate, rozpuszczalne łatwo we wodzie i wyskoku. Rozczyny jego ulegają trudniej rozkładowi jak apomorfiny. Odróżnia się od apomorfiny tem, że mniej pobudza do wymiotów i nie działa tak silnie na serce, tak że może być podawana bez szkody przez czas dłuższy. *Pro dosi* 0·005 gr. *pro die* 0·01—0·04 gr. Podają ją z małym dodatkiem morfiny w ostrym i przewlekłym nieżycie oskrzeli, astmie, zapaleniu płuc i gruźlicy płuc.

Europen, jodek isobutylo-ortokresolu, proszek żółty bezpostaciowy, zawierający 28·1⁰/₀ jodu. Środek zastępujący jodoform, stosowany w postaci maści 2·5—3·0—10⁰/₀ lub też w roztworze eterowym. Wskazania: leczenie chorób skórnych gruźliczych, chorób jamy ustnej ozaena, wrzodu miękkiego, kiły.

Euguform, produkt kondenzacyjny guajacolu i aldehydu mrówkowego stanowi proszek bezwonny, bardzo delikatny, który znajduje zastosowanie jako zasypka albo też w postaci maści 5—10⁰/₀ lub gazy euguformowej.

Exodinum, pochodny oxyantrachinonu, ciało nierozpuszczalne we wodzie a trudno w wyskoku. Środek przeczyszczający. W handlu przychodzi w kołaczykach 0·5 grm. Dawka dla dorosłych 1·0—1·5 grm. odpowiadające 2—3 kołaczykom, dzieciom jeden kołaczyk.

Faex medicinalis, drożdże piwne, we furunkulozie, acne, eczema chronicum, diabetes, zewnętrźnie w postaci okładów, wewnątrznie 3 razy dnia łyżeczkę.

Fersan, środek odżywczy zawiera 81·89⁰/₀ białka 0·12⁰/₀ kwasu fosforowego, a 0·37⁰/₀ tlenu żelazowego, jest to proszek barwy brunatnej, rozpuszczalny we wodzie zimnej i wyskoku rozcieńczonym. Fersan podaje się w ilości 3—4 łyżeczek dziennie, w tym celu rozrabia

się daną ilość z wodą i dodaje następnie do mleka, herbaty, rosółu, kakao i t. p.

Gluton, przetwór dyetetyczny z żelatyny. W cukrzycy, krwawieniach.

Gonorol zawierający alkoholowe składniki olejku santalowego, nie powoduje ubocznych działań na nerki i przewód pokarmowy jak olejek santalowy. Podaje się gonorol w postaci kropli lub w kapsułkach, w dawce 0.5 gr. do 6-ciu razy dziennie w rzerzączce i następow. schorzeniach pęcherza, cystitis, pyelitis, prostatitis.

Gonosan (Kawa santal) jest cieczą oleistą, żółtozieloną, przeświecającą, woni silnie aromatycznej, która jest rozczynem żywic z *Piper methysticum* (kawa-kawa) w czystym oleju santalowym. Używany w rzerzączce i zapaleniu pęcherza.

Guacamphol ester kwasu kamforowego z guajacolem przedstawia proszek biały, bez woni i smaku, który rozkłada się spożyty dopiero w alkalicznym soku jelit. W dawce 0.5 gr. podają go jako środek przeciwpotny w gruźlicy.

Guajacolum carbonicum, Duotal, węglan pyrokatichino metylowy. Przedstawia proszek krystaliczny obojętny, bez woni i smaku, w wodzie nierozpuszczalny. Przetwór ten nie działa żrąco i z tego powodu stosują go w gruźlicy w miejsce kreozotu i guajacolu. Dawka 0.5 gr. kilka razy dziennie do 6.0 gr. *pro die*.

Guajacolum phosphoricum i **Guajacolum phosphorosum** są to środki używane we Francji w gruźlicy płuc w dawce 0.5—1.0 gr. 1—4 razy dziennie.

Hedonal, (metylopropylocarbinol-uretan) środek nasenny. Podaje się go w dawkach 1.5—2.0 gr. w opłatkach w bezsenności nerwowej, również w melancholii, paranoi, paraliżie ogólnej i t. p. stanach.

Helmitol, połączenie bezwodnika metyleno-cytrynowego z urotropiną, podają z bardzo dobrym skutkiem w zapaleniach pęcherza. Przy dłuższem podaniu należy kontrolować moc, czy nie zawiera białka. Dawka 1.0 gr. trzy razy dziennie. Wskazania: Cystitis gonorrhoeica, pyelitis, phosphaturia.

Hetokresolum, cynamonian meta-kresolowy. Przedstawia proszek biały, krystaliczny, nierozpuszczalny w wodzie, ani glicerynie ani olejach tłustych, trudno rozpuszczalny w wyskoku, łatwo zaś w eterze. Jest to związek działający przeciwnie, stosowany do zasypek granulacji gruźlicznych już to w stanie czystym już zmieszany z jodolem lub jodoformem (2:1). Również do wstrzykiwań jako miészanka hetokresolu 2 cz., jodoformu 1 cz., wody 8 cz., (przetgotowanej lub też wody karbolowej). Należy pamiętać, że hetokresolu podobnie jak jodoformu sterylizować nie można.

Hetralinum (Dioxybenzolhexametylentetraminum).

Dawka 0·5 gr. 3—4 razy dziennie. Wskazania: Cystitis gonorrhoeica, phosphaturia, cystitis przy hypertrophia prostatae. Porównaj helmitol i urotropinę.

Holocainum, p - dwuetoxyethenyl - dwufenylamidyn jak i chlorek jego, jest środkiem znieczulającym miejscowo używanym zamiast kokainy do wykonania zabiegów operacyjnych ocznych. Po zakropieniu 2—3 kropel do oka 1% wodnego roztworu chlorku holokainy, następuje za 15 sekund znieczulenie takowego trwające 10 minut.

Hontinum, jest keratynowanym garbnikiem białkowym przedstawiający proszek barwy jasno brunatnej, bez smaku i woni, który się we wodzie nie rozpuszcza, częściowo zaś w wysoku i w roztworach alkalicznych. Działa wybitnie ściągająco i przeciwbiegunkowo. Zalecony ten środek w schorzeniach jelit szczególnie u dzieci. Dawka 0·5—1·0 gr. kilka razy dziennie; na dzień 3—4 gr. Dzieciom połowę tych dawek.

Hydrargyrum colloidal, Hyrgol przedstawia masę ziarnistą barwy czarnej, połysku metalicznego, w wodzie łatwo rozpuszczalną. Związek ten przewyższa inne związki rtęci z powodu swej łatwej wessalności, nadto, iż nie działa żrąco i pozwala na dokładne dawkowanie. Do wcierek służy 10% maść w dawce 3 gr., wewnątrznie pigułki zawierające po 0·10 gr. przetworu po 3—5 sztuk trzy razy dziennie, do wstrzykiwań podskórnych roztwór 1—2% wodny.

Ichtargan, związek ichtyolosrebrowy przedstawiający proszek barwy brunatnej, bez woni, zawierający 30% srebra. Środek ten zalecony jest jako przeciwrzęzczkowy do przestrzykiwań cewki w roztworze 0·02—0·2%. Ichtargan niszczy gonokoki.

Ichtoform, związek ichtyolu z formaldehydem. Jestto proszek ciemno-brunatnej barwy, woni przypominającej ichtyol; we wodzie się nie rozpuszcza z gliceryną tworzy zawiesinę. Środek ten stosuje się w biegunkach szczególnie w przebiegu gruźlicy jelit, zalecono również podanie ichtoformu w durze brzuszny bez lub też ze zastosowaniem kąpeli ichtyolowych. Dawki 0·30—0·5 gr. kilka razy dziennie. Zawiesinę ichtoformową w glicerynie stosują do tamponowania w przypadkach ginekologicznych i leczenia ran.

Igazol. Produkt kondenzacyjny aldehydu mrówkowego, trioxymetyleny i jodu. Wdechiwania pary igazolu przepisują w przebiegu gruźlicy. W pokoju pojemności 80 m³ należy wyparować z początku 2·0 gr. i zwiększać tę dawkę do 9 gr.; wdychiwać należy 2—4 godzin.

Isopral, alkohol trójhloroizopropylowy, krystalizuje w pryzmaty, posiada woń kamfory, a smak piekący aromatyczny. Środek nasenny, dawka 0·5—1·0.

Kresaminum (Trikesol - aethyleudiaminum) jest wodnym roztworem (25⁰/0) trójkresolów i (25⁰/0) etylenodiaminu. Kresamin zalecony w leczeniu chorób skórnych, znajduje obecnie zastosowanie w postaci inhalacji w przebiegu chorób dróg oddechowych. Do wzięcia używa się roztworu 2—20⁰/0 i stosuje się je przez 10—15 minut dziennie.

Lactagol. Związek otrzymany z nasion krzewu bawełnianego. Podanie jego powoduje u kobiet karmiących zwiększenie się ilości pokarmu i oddziaływa na zwiększenie się ilości tłuszczu i ciał azotowych w pokarmie. Podaje się 3—4 r. dziennie łyżeczkę kopiastą z mlekiem, kakao i t. p. *Pro die* 10—12 gr.

Lactopheninum, związek kw. mlekowego z parafenytydyną pokrewny z fenacetyną. Działa silnie przeciwgorączkowo. Stosują w zapaleniu płuc, durze brzuszonym, grypie i t. d. Dawka jako antipyreticum 0.5—1.0 gr. dorosłym, a 0.25 gr. dzieciom, jako antirheumaticum dorosłym *pro die* 5.0 gr.

Maretinum związek kwasu karbaminowego z m-tolylhydrazidem przedstawia proszek krystaliczny rozpuszczalny w wodzie gorącej. Środek przeciwgorączkowy. Podają w postaci proszków w dawce 0.5 raz dzień lub po 0.25 gr. dwa razy dziennie.

Mercuriol połączenie rtęci z kwasem nukleinowym drożdżowym, przedstawia proszek brunatnawy i zawiera około 10⁰/0 rtęci. W wodzie cieplej rozpuszcza się łatwo, a roztwór jego miesza się z białkowymi roztworami, nie tworząc strąków. Oprócz tego związku znane są w handlu również połączenia kwasu nukleinowego ze srebrem miedzią i żelazem — pod nazwą Nargol, Caprol i Ferrinol. Środek przeciwniepalny i ból uśmierzający. Polecają w roztworze 2⁰/0 lub maści 2—10⁰/0 jako środek przyranny; jako roztwór 1⁰/0 do przestrzykiwań pęcherza w niezłocie tegoż, a roztwór 2⁰/0 w rzerzaczce.

Mesotan, ester metoxylometylowy kwasu salicylowego, płyn oleisty prawie bez zapachu w przeciwieństwie do ol. gaultheriae. Ulega wessaniu przez skórę. Z oliwą jako lokalne antirheumaticum.

Natrium phenylo-propiolicum sól krystaliczna, rozpuszczalna we wodzie. Zalecają w gruźlicy płuc i krtani do wzięcia w postaci 1⁰/0—3⁰/0 roztworu wodn.; chory wzięwa dwa razy dziennie 200 cm³ roztworu w temperatur. początkowo 25—30⁰ C., a po kilku minutach przy temperatur. 42—45⁰ C.

Nicotinum salicylicum, Eudermolum, przedstawia kryształki bezbarwne, w wodzie i wysoku rozpuszczalne. Środek ten zalecony jest z bardzo dobrym skutkiem przeciw świerzbowi, mianowicie w postaci maści lanolinowej zawierającej 0.1⁰/0 salicylanu nikotyny.

Ta maść znajduje się również w handlu pod nazwą maści eudermolowej. Nicotinum salicylicum stosują również w eczema, herpes, impetigo i t. d.

Orexinum tannicum, proszek bez smaku i woni przepisywany celem zwiększenia chęci do jedzenia, jakiej brak w początkach gruźlicy płuc, niedokrewności, neurastenii, hysteryi, dyspesyi, również celem uśmierzania wymiotów u ciężarnych i po narkozie chloroform. W pierwszych przypadkach podają 1'0—2'0 gr. dwa razy dziennie godzinę lub dwie przed jedzeniem — dzieciom 0'25—0'5 gr. w drugim podaje się 0'3—0'4 gr. dwa razy dziennie przez kilka dni.

Perhydrol, nadtlenek cynkowy jest proszkiem białym nierozpuszczalnym we wodzie, zawierającym 50% Zn O₂ i 50% Zn O; w dotknięciu z kwasami wytwarza dwutlenek wodoru na czem polega jego działanie przeciwnie i bakteryobójcze. Stosują w postaci zasypek lub też jako maść: Perhydroli 10 gr. Ungt. parafini 90'0 Mfung. W postaci maści nie należy go mieszać z tłuszczami roślinnymi lub zwierzęcymi.

Peruol, Antiscabiosum. Także w postaci mydła 40%.

Peruscabinum, produkt syntetyczny. Przeciw świerzbowi.

Phorxal (Dr. Hofmeister). Rozpuszczalne ciało białkowe, otrzymane z krwi wołów tucznych, zawiera 0'25% P, 0'63% Tc₂ O₃.

Protylinum Roche. Ciało białkowe bogate w fosfor, należące do paranukleinów. Przedstawia proszek żółtawy, bez woni i smaku, we wodzie prawie nierozpuszczalny, łatwo w alkaliach. Zawiera 12'98% N i 2'70% P (6'18% P₂ O₅). Posiada własność łączenia się z halogenami i metalami. W handlu znajduje się także Br.-protylin, Fe-protylin i I-protylin. Dawka dla dzieci czystej protyliny 1—2—3 łyżeczek, dorosłym 2—4 łyżecz. dziennie. Wskazania: struma, morb. Basedovi, rachitis, osteomalacia, scrofulosis, neurastenia.

Purgatol (Purgatin) dwuocian anthrapurpuryny. Proszek żółty, krystaliczny, nierozpuszczalny we wodzie i rozcienn. kwasach, łatwo rozpuszczalny w alkaliach. Rozpada się na części składowe dopiero w jelitach przy czem część trójoxyanthrachinonu przechodzi w mocz i zabarwia go krwistoczerwono. Na jelita działa przyspieszając ruch robaczkowy. Dawka 0'5—1'0 gr.

Purgen, Purgo, Fenoltaleina działa przeczyszczająco i bywa szczególnie dla dzieci zalecany. Dawka 0'05—0'1.

Pyramidon, jest dwumetylo-amido-antipyriną przedstawiającą biały proszek bez smaku. Jest to środek przeciwgorączkowy. W lecznictwie znajdują również zastosowanie połączenia pyramidonu z kwasem kamforowym już to w postaci soli obojętnej już soli kwaśnej.

Pyramidon podają w dawce 0·25—0·3 gr. 3 razy dziennie; kamforan pyramidonowy kwaśny (pyramidon bicamphorat.) w dawce 0·75—1·0 gr., a obojętny w dawce 0·5—0·75 gr.

Pyrosalum, jest salicylo-octanem antypiryny, przedstawia kryształki igiełkowate białe. Działanie jak fenolu w dawce 0·5 gr. dwa do sześciu razy dziennie.

Resaldol, jest związkiem aldehydu chloro-metyleno salicylowego z resorcyną; proszek bezpostaciowy żółty, który się ani we wodzie ani w rozcieńczonych kwasach nie rozpuszcza, z cieczami alkalicznymi natomiast rozpada się i działa wtedy już to jako *antisepticum* już to jako *adstringens*. Stosowany w niezbytach jelit ostrych i przewlekłych. Dawka 3 gr. dziennie.

Resorbinum, mieszanina dobra jako podstawa do maści, szczególnie rtęciowej.

Salipyrinum, związek antypiryny z kwasem salicylowym stanowi proszek krystaliczny biały. Środek przeciwgorączkowy, działa skutecznie w ostrym i przewlekłym goście stawowym, bólach nerwowych, grypie. Dawka 1·0 gr. 3—6 razy dziennie, dzieciom połowę.

Salophenum, Acetparamidosalolum, salicylan octoparamidofenyłowy. Przedstawia kryształki bezbarwne w wodzie nierozpuszczalne, łatwo rozpuszczalne w eterze i alkoholu. Środek podawany w goście stawowym ostrym w dawce 4—6 gr. dziennie, w nerwobólach, influenzy, zmniejsza również w dawce po 1·0 gr. bóle porodowe.

Sidonal, jest związkiem kwasu chinowego z piperazyną. Wprowadzony do organizmu powoduje zmniejszenie się kwasu moczowego, a w miejsce tego pojawia się w moczu kw. hippurowy. W dniu w dawkach dziennych 5·0 gr.

Stypticinum, indentyzuy z chlorkiem kotarniny przedstawia kryształki bezbarwne, rozpuszczalne we wodzie. Środek tamujący krwotoki stosowany zamiast hydrastyny w krwotokach macicznych również w krwotokach nosowych i po wyrwaniu zęba. Dawka 0·05—0·10 gr. Kilka razy dziennie.

Styptol, ftalan kotarniny. Energiczniejszy od poprzedniego i tańszy. Dawki takie same.

Styracol. Cynamonian gwajakolowy, kryształki nierozpuszczalne w wodzie. Antiptisicum nie trujący. Dawka 1·5 *pro die*. Stopniowo co 3 dni 0·5 *pro die* więcej.

Sublaminum, jest to związek siarkanu rtęciowego z etylenodiaminem, który tworzy białe igiełki, łatwo we wodzie rozpuszczalne. Działa przeciwnie w tej samej mierze co sublimat (1·7 gr. sublam. — 1·0 gr. sublimatu) przewyższa zaś ten ostatni tem, że rozczyn jego nawet 1:50 nie działają żrąco na naskórek i nie powodują wyprysku łuszczącego się, nie ścinają (10/0

białka ani mydła i nie działają na nikel, ani na zimno ani gorąco. Wskazania te same jak sublimatu do desinfekcyi. W handlu kołaczyki 10 gr.

Sulfosot-kreozotosulfonian potasowy — ciecz brunatna, syropowata, bez woni, łatwo rozpuszczalna we wodzie. Podaje się w postaci syropu (Syrup. sulphosot.) 2—3 łyżeczek dziennie, w nieżytach oskrzeli, szczytów i gruźlicy płuc i zółzach. Jestto środek tani zastępujący w działaniu drożdże, np. tiokol, sirolinę.

Tachiol = Argentum fluoratum.

Tannochrom, jest to związek składający się z tlenku chromowego, taniny i resorcyiny i znany jest w handlu jako proszek (Tannochromum liquidum). Stosują do leczenia ran, owrzodzeń, jako zasypkę 50% lub 5—10% maść lanolinową. Rozczyn 0.25—0.5% stosują w rzeźączce do wstrzykiwań do cewki, pochwy. Mięszanina tannochromu, kwasu salicylowego i łożku zproszkowanego jest skuteczną zasypką przeciw nadmiernemu poceniu się nóg i rąk.

Tanocol, środek przeciwbiegunkowy, sprzedają w postaci pastylek czekoladowych.

Tannoform, związek kwasu garbnikowego z formaliną używają w mięszance z Talc. venetum 1:2 jako zasyпка przy nadmiernem poceniu się w ogólności, a w szczególności przeciw nocnym potem u suchotników.

Theocinum, pochodna ksantyny, syntetyczna teofilina. Patrz poniżej.

Theophylinum, 1,3 — Dimetylxanthinum. Proszek biały krystaliczny działa silnie moczopędnie. Dawka 0.2—0.4 gr. W handlu znaną jest również sól sodowa Natrium theophyll. i sól podwójna Natrium theophyllino-salicylicum.

Thigenol, związek zawierający 10% siarki stanowi ciecz brunatną, syropowatą, bez woni, która się we wodzie i glicerynie całkowicie rozpuszcza. Użycie go w stanie czystym lub w postaci maści, past wskazane jest w różnych chorobach skóry (Eczema, acne, intetriga, scabies i t. d.) w gościecu stawowym i mięśniowym — analogicznie jak ichtyol.

Tiocol, przetwór gwajakolowy zawierający 52% gwajakolu. Przetwór ten nie posiada woni, we wodzie się rozpuszcza, na błony śluzowe nie działa, łatwo ulega wchłonięciu i nie działa trująco. Tiocol podają w zapaleniu płuc, w nieżycie oskrzeli, w przebiegu gruźlicy, zółzów, jako środek przeciwbiegunkowy. Szczególnie nadaje się w praktyce dziecinnej.

Triferrinum, związek paranukleinowo-żelazowy otrzymany z sernika, łatwo ulega wchłonięciu nie upośledzając akcyi trawienia. Podają ten środek w niedokrewności, w blednicy, ze skutkiem dobrym uzyskując zwiększenie się ilości haemoglobiny do 90%.

Trigeminum związek pyramidonu z wodnikiem butylochloralu, używany jako środek ból uśmierzający w bólach nerwu trójdzielnego, w bólach głowy, w migrenie, influenzy, po zatruciach alkoholowych, nikotyna i morfiną, w bólach zębów, pulpitis, periostitis i t. p.

Urosinum, Lithium chinicum, związek litu z kwasem chinowym znajdujący się w handlu jako rozczyń 50% lub też w kołaczykach po 0.5 Lith. chinicum. Zalecają w dnie — w dzień ostrego napadu 6—10 kołaczyków na dzień zażyć, a później przez kilka tygodni po 4—6 kołaczyków *pro die*.

Urotropinum (Hexametylen tetraminum). Produkt kondensacyjny amoniaku i formaldehydu, w przebiegu nieżyty pęcherza, wśród duru brzuszego, jako silnie bakteryobójczy. 3—5 gr. dziennie.

Validolum, związek kwasu kozłkowego z mentolem stosują jako analepticum, w różnych stanach histeryi, w migrenie po ostrych zatruciach alkoholowych, w nerwicach odruchowych, gastralgii i jako stomachicum. Znany i stosowany jest związek validolu z kamforą: Validolum camphoratum.

Valyl, kwas dwuetyloamido-koźłkowy ponieważ łatwo ulega utlenieniu znajduje się w handlu w kapsułkach żelatynowych po 0.125 gr. walyłu. W histeryi, neurastenii, hypochondryi, newralgii po 4—6 kapsulek dziennie.

Veronalum, kwas dwuetylobarbiturowy. Środek nasenny 0.25—0.75 *pro dosi*, w ciepłej herbacie lub mleku.

Yohimbinum „Spiegel“, jest alkaloidem z kory Yohimbehe, który się łatwo rozkłada pod wpływem powietrza i światła, z tego też powodu używa się w lecznictwie chlorek yohimbiny. Podają w niedomodze płciowej — per os 10—15 kropeł trzy razy dziennie, 1% rozczyńu wodnego, albo też 3—4 kołaczyków po 0.005 gr. chlorku yohimbiny, także stosują iniekcye podskórne $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ strzykawki 3 razy dziennie rozczyńu 1% wodnego. Nadmierne dawki yohimbiny powodują ślinotok, co może być wskazówką ostrzegającą przy podawaniu tego leku.

Najwyższe dawki środków leczniczych

których lekarz przekraczać nie powinien
nie oznaczwszy wykrzyknikiem (!).

	pro dosi	pro die
Acidum arsenicosum	0'005	0'20
» carbolicum	0'10	0'50
Apomorphinum hydrochloricum	0'01	0'05
Aqua amygdalarum amarum concentrata	1'50	5'00
» laurocerasi	1'50	5'00
Argentum nitricum	0'03	0'20
Atropinum sulphuricum	0'001	0'003
Cantharides	0'05	0'20
Chloralum hydratum	3'00	6'00
Chloroformium	0'50	1'00
Cocainum hydrochloricum	0'10	0'30
Codeinum mur.	0'05	0'15
» phosph.	0'10	0'40
Coffeinum	0'20	0'60
Cuprum sulfuricum qua emeticum	0'40	—
Extractum aconiti radice	0'03	0'12
» belladonnae foliorum	0'05	0'20
» cannabis indicae	0'10	0'30
» colocynthis	0'05	0'20
» conii herbae	0'20	0'60
» hyoscyami foliorum	0'10	0'50
» opii	0'10	0'40
» scillae	0'20	1'00
» secalis cornuti	0'50	1'50
» strychni	0'05	0'15
Folia belladonnae	0'20	0'60
» digitalis	0'20	0'60
» hyoscyami	0'30	1'00
» stramonii	0'30	1'00
Fructus colocynthis	0'30	1'00
Herba conii	0'30	2'00
Hydrargyrum bichloratum corrosivum	0'03	0'10
» bijodatum rubrum	0'03	0'10
» jodatum flavum	0'05	0'20
» oxydatum flavum	0'03	0'10
Jodoformium	0'20	1'00
Jodum	0'03	0'10
Kreosotum	0'10	0'50
Lactucarium	0'30	1'00
Morphinum hydrochloricum	0'03	0'12

	pro dosi	pro die
Oleum crotonis	0'05	0'10
Opium	0'15	0'50
Paraldehydum	5'0	10'0
Phenacetinum	0'50	3'0
Phosphorum	0'001	0'005
Physostigminum salicylicum	0'001	0'003
Pilocarpinum hydrochloricum	0'03	0'06
Plumbum aceticum	0'10	0'50
Radix aconiti	0'10	0'50
» belladonnae	0'07	0'30
Santoninum	0'10	0'30
Secale cornutum	1'00	5'00
Semen strychni	0'12	0'50
Solutio arsenicalis Fovleri	0'5	2'00
Stibium kalio-tartaricum	0'2	0'50
Strychinum nitricum	0'007	0'02
Sulfonalum	4'0	8'0
Thallinum sulfur	0'20	1'50
Tinctura aconiti radiceis	0'50	1'50
» belladonnae foliorum	1'00	4'00
» cantharidum	0'50	1'00
» colchici seminis	1'50	5'00
» digitalis	1'50	5'00
» jodi	0'30	1'00
» lobeliae	1'00	5'00
» opii crocata }	1'50	5'00
» simplex }		
» strophanth	1'00	3'00
» strychni	1'00	3'00
Veratrinum	0'005	0'02
Vinum colchici seminis	1'50	5'00
Zincum sulfuricum qua emeticum	0'80	—

Waga różnych dawek.

Łyżeczka cieczy waży mniej więcej 3—5 gr. Łyżeczka cukru, soli, siarki 2'5—5 gram., proszków różnych 2'50. Łyżka wody 15 grm. Łyżka syropu 20'0. Garść nasion 70—80 gr. Garść liści 20—30 gr. Szczypta kwiatu 2 gr. Litry wody destyl. 1000'0; litr spirytusu 850; litr chloroformu 1480; litr oliwy 920'00; szklanka 200—250'0; kieliszek 25—50 gr. Na 1 gr. idzie kropel wody 16, wysokości 40, nastojów wysokich (Tinct.) 25, eteru 50, chloroformu 25, kwasów rozcieńcz. 16, olejów tłustych 20, olejów eterycznych 25, ulopków 12.

Dawki przeciętne dla dzieci (pro dosi).

L E K I	Do 1 roku	od 1—5 lat	od 5—10 lat
Acetanilidum	0'02	0'05	0'1
Acetum Digitalis	—	5 gtt.	10 gtt.
Acetum Scillae	—	5 gtt.	15 gtt.
Acidum benzoicum	—	0'03	0'05
Acidum hydrobromicum	—	—	30 gtt.
Acidum tannicum	—	0'005	0'01
Aether	—	3 gtt.	5 gtt.
Aether aceticus	2 gtt.	5 gtt.	10 gtt.
Alumen	0'01	0'05	0'1
Ammonium bromatum	0'15	0'25	0'3
Ammonium chloratum ferrat.	—	0'03	0'05
Antipyrinum	0'2	0'3	0'5
Apormof. hydrochlor. emet. . .	0'0007	0'0025	0'0045
expect.	0'0004	0'0015	0'0025
Aqua Amygdalar. amararum . .	—	1—5 gtt.	5—10 gtt.
Argentum nitricum	0'001	0'003	0'005
Atropinum sulphuricum	—	0'0001	0'0002
Bismutum subnitricum	0'05	0'1	0'3
Bromoformium	2-3 gtt.	3-4 gtt.	4-6 gtt.
Camphora trita	0'0075	0'01	0'02
Chininum ferro-citricum	—	0'05	0'1
Chinin. hydrochlor. antipir. . .	0'1	0'3	0'5
antispas.	0'05	0'15	0'2
Chloralum hydratum	0'1	0'25	0'45
Codeinum phosphoricum	0'0002	0'002	0'005
Coffeinum	—	0'02	0'04
Coniinum hydrobromicum	0'0005	—	—
Cuprum sulphuricum	—	0'1	0'15
Curare	0'0001	—	—
Extractum Belladonnae	—	0'001	0'003
Extractum Filicis	1'0	2'0	5'0
Extractum Opii	—	0'005	0'02
Extractum Secalis cornuti	—	0'03	0'05
Extractum Strychni	—	0'002	0'005
Ferrum reductum	—	0'005	0'01
Flores Koso	—	2'0	5'0
Folia Digitalis	—	0'02	0'03
Hydrargyrum bichloratum	0'0001	0'0002	0'0003
Hydrarg. chloratum antisyf. . .	0'002	0'005	0'01
laxans.	0'01	0'02	0'03

LEKI	Do 1 roku	od 1—5 lat	od 5—10 lat
Hydrarg. tannicum oxydulat.	0'005	0'02	0'03
Hydrochinon	0'05	0'2	0'3
Kalium bromatum	0'1	0'3	0'5
Kalium chloricum } pro die	1'0	2'0	3'0
Kalium jodatum }	0'1	0'5	1'0
Kreosotum	0'005	0'01	0'02
Liquor Ferri sesquichlorati pro die	0'3	0'5	0'5
Liquor Kalii arsenicosi . . .	—	0'05	0'1
Morphinum hydrochloricum .	—	0'001	0'003
Naphtalinum	0'05	0'2	0'2
Natrium paracresotinicum .	—	0'25	0'5
Natrium salicylicum pro die	1'0	2'0	3'0
Phenacetinum antipyr. . . .	—	0'1	0'3
antispasm. . .	0'001	0'05	0'1
Pilocarpin. hydrochlor. (inj.)	0'001	0'002	0'004
Plumbum aceticum	0'003	0'005	0'01
Phosphorus	—	0'0001	0'0002
Podophyllum	—	0'005	0'015
Pulvis Ipecacuanhae opiatu	—	0'005	0'02
Radix Ipecacuanhae emetic.	0'05	0'1	0'2
Resorcinum pro die	0'1	0'4	0'5
Santoninum	—	0'01	0'02
Syrupus Ferri jodati	1 gtt.	5 gtt.	10 gtt.
Strychninum nitricum (inj.) .	—	0'0005	0'001
Tartarus stibiatus	—	0'0075	0'01
Thallinum sulphuricum . . .	0'01	0'02	0'03
Tinctura Opii simplex	0'025	0'05	0'2
Tinctura Strophantii	0'02	0'05	0'10
Urethanum	0'05	0'1	0'2

Porównanie dawki leków według rozmaitego wieku chorych.

Dawki zmieniają się mniej więcej, jak następuje:

aż do ukończonego 1 roku $\frac{1}{20}$ — $\frac{1}{10}$
od 2 do 4 „ $\frac{1}{8}$
„ 5 „ 7 „ $\frac{1}{5}$
„ 8 „ 10 „ $\frac{1}{4}$
„ 11 „ 14 „ $\frac{1}{2}$

Począwszy od roku 50 należy dawki dawki znowu zmniejszać tak, iż u starców między rokiem 60 a 70 należy znów dawać tylko $\frac{1}{3}$ dawki dla osób dorosłych.

Kobietom podaje się wogóle mniejsze dawki, mniej więcej $\frac{2}{3}$ tej, jaką się przepisuje mężczyznom odpowiedniego wieku.

Tablica brzemienności.

Ostatnia regularność	Dzień porodu	Ostatnia regularność	Dzień porodu
Styczeń 1	Paździer. 8	Lipiec 5	Kwiecień 12
» 5	» 12	» 10	» 16
» 10	» 17	» 15	» 21
» 15	» 22	» 20	» 26
» 20	» 27	» 25	Maj 1
» 25	Listopad 1	» 28	» 4
Luty 1	» 4	Sierpień 1	» 8
» 5	» 8	» 5	» 12
» 10	» 12	» 10	» 17
» 15	» 22	» 15	» 22
» 20	» 27	» 20	» 27
» 25	Grudzień 1	» 25	Czerwiec 1
Marzec 1	» 6	» 28	» 4
» 5	» 10	Wrzesień 1	» 8
» 10	» 15	» 5	» 12
» 15	» 20	» 10	» 17
» 20	» 25	» 15	» 22
» 25	» 30	» 20	» 27
» 28	Styczeń 2	» 25	Lipiec 2
Kwiecień 1	» 6	» 28	» 5
» 5	» 10	Paździer. 1	» 8
» 10	» 15	» 5	» 12
» 15	» 20	» 10	» 17
» 20	» 25	» 15	» 22
» 25	» 30	» 20	» 27
» 28	Luty 2	» 25	Sierpień 1
Maj 1	» 5	» 28	» 4
» 5	» 9	Listopad 1	» 8
» 10	» 14	» 5	» 12
» 15	» 19	» 10	» 17
» 20	» 24	» 15	» 22
» 25	Marzec 1	» 20	» 27
» 28	» 4	» 25	Wrzesień 1
Czerwiec 1	» 8	» 28	» 4
» 5	» 12	Grudzień 1	» 7
» 10	» 17	» 5	» 11
» 15	» 22	» 10	» 16
» 20	» 27	» 15	» 21
» 25	Kwiecień 1	» 20	» 26
» 28	» 4	» 25	Paździer. 1
Lipiec 1	» 8	» 28	» 4

Tablica rozwoju płodu.

Wiek w mie- siącach	Wzrost w cen- tym.	CieŜar w gra- mach	Stan powłok zew- nêtrznych	Punkty i stopieñ kostnienia
1—1½	1—1.5	1—3	{ Przeświecająca purpurowo-czerwona skóra bez włosów.	Punkty ko- stnienia w oboj- czyku i szczêce dolnej.
1½—2	2—5	5—10	{ Zaczyna się rozwijać błona źreniczna	Zjawiają się w szczêce dol. bro- dawki zębowe.
2—3	5—10	25—50	{ Tworzenie się paz- nogci oraz łóŜyska paznogciowego.	Punkty ko- stnienia w ko- ści siedzeniów- (os. ischii).
3—4	10—15	50—150	{ Narządy płciowe zewnêtrzne zaczynają się różniczkować.	{ Skostnienie kości piętowej.
4—5	15—20	200—250	{ Płeć jest już wyra- źna, wyrastają włosy na brwiach i głowie.	{ Punkty kostn. w kości skoko- wej i łonowej.
5—6	20—30	250—400	{ Ciało pokrywa pu- szek (lanugo), pazno- gcie stają się rogowe.	{ 3—4 punkty kostnienia na mostku.
6—7	30—35	500—1000	{ Puszek okrywa ręce i nogi. Błona źrenicz- na najwyraźniejsza.	{ Skostnienie ostatnich krę- gów k. krzyŜo- wej.
7—8	35—40	1000—1500	{ Zaczyna się tworzyć pokład tłuszczowy (panniculus adiposus).	{ Punkty kostn. w kłykciowej epifizie kości u- dowej.
8—9	40—45	1500—2000	{ Skóra już nie prze- świeca, wyróżnia się naskórek; powłoki ze- wnêtrzne mają barwę błado-różową. Cała skóra pokryta jest mazią płodową. Błona źreniczna zanika. Wo- rek mosznowy zaczyna się marszczyć, a szpa- ra sromowa zamykać.	{ W szczêce dol- nej 4 zupełnie oddzielone doł- ki zębowe (lu- nulae).
Płód dono- szony	45—50	3000—3500	{ Skórę pokrywa grub- sza warstwa mazi pło- dowej. Paznogcie wy- stają poza końce pal- ców. Błony źrenicznej brak. Pepek nieco ni- żej środka długości ciała.	

Oznaczenie okresu ciąży.

- Miesiąc I** (księżycowy). Macica nieco powiększona, okrąglejsza, część pochwowa nieco rozpulchniona, ilość śluzu większa. Błona śluzowa przedstonka i pochwy zachowuje się podobnie jak w czasie regularności.
- Miesiąc II.** Z końcem miesiąca macica dochodzi do wielkości średniej pomarańczy i jest wyraźnie grubsza. Dno macicy opada nieco ku przodowi; występuje wyraźnie rozpulchnienie i zasinienie części pochwowej, błony śluzowej pochwy i przedstonka. Sutki stają się pełniejsze, zrazy gruczołowe zaznaczają się wyraźniej. Obwódka i linia biała ciemnieją.
- Miesiąc III.** Macica miękka wzrasta prawie do wielkości główki noworodka, wypełnia główną część miednicy małej i dnem dochodzi do górnego brzegu spojenia łonowego. Czasami daje się słyszeć szmer maciczny. Ze sutek można już zwykle wycisnąć kilka kropel kleju.
- Miesiąc IV.** Dno macicy dochodzi ku końcowi miesiąca na szerokość 2—3 palców ponad spojenie. Przy sprzyjających warunkach można wy badać balotujący płód i wysłuchać ruchu płodu.
- Miesiąc V.** Pod koniec miesiąca macica dochodzi na szerokość dwóch palców poniżej pępka. Matka uczuwa ruchy płodu a niekiedy można już słyszeć tętno płodu.
- Miesiąc VI.** Macica wzrasta do wysokości pępka. Części płodu wyczuwalne, tętno i ruchy płodu wyraźne.
- Miesiąc VII.** Dno macicy ku końcowi miesiąca sięga na szerokość 2—3 palców ponad pępek. Części płodu można wyraźniej wy badać. Część pochwowa pozornie się skraca. Pępek się wygładza. U pierwiastek zaczynają się tworzyć pręgi na skórze dolnej części brzucha. Obwód brzucha przez pępek = 91 cm., w środku pomiędzy spojeniem a pępkiem 94 cm., odległość spojenia łonow. od wyrostka mieczykowego = 42 cm.
- Miesiąc VIII.** Dno macicy dochodzi do połowy odległości pomiędzy pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym. Powłoki brzuszne u pierwiastek mocno napięte tak, że poza dno macicy nie można wtłoczyć palców; pępek wygładzony. Część pochwowa skrócona leży wysoko. Położenie płodu daje się już z łatwością oznaczyć. Obw. brzucha w wysokości pępka 95 cm., poniżej pępka 97 cm., odległość pomiędzy spoj. a wyrostkiem mieczyk. 43,5 cm.

Miesiąc IX. Dno macicy dochodzi najwyżej w okolice dołka podsercowego. U pierwiastek w drugiej połowie główka często wstępuje odcinkiem do miednicy małej. U wieloródek szyjka zwykle drożna, aż do ujścia wewnętrznego.

Obwód przez pępek 97,5, poniżej pępka 99 cm., odległ. pomiędzy spoj. a wyrostkiem mieczyk. 44 cm.

Miesiąc X. Dno macicy opada ku przodowi obniża się tak, że mniej więcej stoi w tej samej wysokości jak z końcem ósmego miesiąca: Powłoki brzuszne powyżej dna macicy mniej napięte, tak, że i u pierwiastek można objąć palcami dno macicy od tyłu. Pępek wypukłony. U pierwiastek główka wstępuje odcinkiem do miednicy małej, wypukła i rozszerza sklepienie przednie i skraca pochwę.

Obwód brzucha na wysokości pępka 99 cm., poniżej 100 cm., odległ. spoj. od wyrostka mieczyk. 45,5.

Tablica wyrzynania się zębów

w warunkach normalnych.

A. Zęby mleczne.

Dwa środkowe siekacze dolne w 6—8 m.

4 siekacze górne, z początku środkowe
potem boczne » 10—12 »

4 pierwsze zęby trzonowe oraz siekacze
boczne dolne wyrzynają się w porządku następującym: naprzód 2
przednie trzonowe górne, potem 2
boczne siekacze dolne i w końcu
2 przednie trzonowe dolne » 15—18 »

4 kły — naprzód 2 górne potem 2 dolne » 18—24 »

4 górne trzonowe » 30—36 »

B. Zęby trwałe.

4 pierwsze trzonowe duże wyrzynają się w 6—7 roku

4 siekacze środkowe » 7—8 »

4 siekacze boczne » 8—9 »

4 pierwsze trzonowe małe » 9—11 »

4 drugie trzonowe małe » 10—12 »

4 kły » 11—13 »

4 trzonowe duże » 12—14 »

4 zęby mądrości » 17—25 »



WODY NORMALNE

wyrobu K. Rząca i Chmurski w Krakowie.

Wskazania i leczenie według

Prof. W. Jaworskiego *).

Wody te mają na celu wprowadzić do ustroju chorego potrzebne sole mineralne, jak to staramy się uskutecznić przez podawanie wód mineralnych rodzimych, lub naśladowanych. Składniki mineralne znajdują się w roztworze przesyconym kwasem węglowym w rozcienczeniu takim, z którego najłatwiej sobie je przyswaja organizm.

Wody te mają nazwę *normalnych numerowanych* (*normalis numerata*) i dlatego przy zapisywaniu ich należy podać wraz z nazwą wody wyraz »normalna«. Fiaszki opatrzone są rysunkiem **ryby**, na który trzeba zwrócić uwagę chorego, chcąc uniknąć falsyfikatów, lub pomyłek z wodami mineralnymi naśladowanymi.

I. Normalna mineralna ($\text{Na Cl } 5,5$ Na. bic $3_{10} : 10_{1000}$ soli suchych). Służy do mineralizacji ustroju i jako bardzo słabe *eccoproticum*. Rano na czczo po 1 szklance 2—3 razy w odstępach 15—20 minut.

II. Alkaliczna normalna słabsza ($\text{Na}_2 \text{CO}_3 4_{10} : 5_{100}$ soli s.). Wskazanie: *diathesis uratica*; *arthritus uratica*; *pyelitis*, *cystitis*; *gastritis acida*, *pyrosis*; *icterus catarrhalis*; *pharyngitis* (do płukania). Rano na czczo po 1 szklance 1—3 razy o ciepłocie pokojowej, lub po ogrzaniu. Również do picia w dzień w $\frac{1}{2}$ —1 godziny po jedzeniu. Odpowiada: Vichy, Biliny, Fachingen, Salzbrunn, Borżom.

*) Prof. W. Jaworski: Nauka o chorobach wewnętrznych. Tom III. Zeszyt 4. Kraków 1905.

III. Alkaliczna normalna mocniejsza (Na_2CO_3 8,0 : 10⁰/₀₀ soli s.). Działa silniej alkalizująco niż Nr. II. Wskazania te same, użycie w ilości o połowę mniejszej, niż Nr. II.

IV. Słona normalna słabsza (Na Cl 8,0 : 10⁰/₀₀ soli s.). Wskazanie: *enteritis mucosa c. obstipatione; obstipatio habitualis min. gr.* Po 1 szklance rano na czczo 2—3 razy. Odpowiada: Kissingen (Rakoczy), Wiesbaden.

V. Słona normalna mocniejsza (Na Cl 13,0 : 15⁰/₀₀ soli s.). Działa silniej niż Nr. IV. Wskazanie i sposób użycie ten sam co Nr. IV.

VI. Alkaliczno-słona normalna (Na_2CO_3 1,30, Na Cl 1,0 : 2,50⁰/₀₀ soli s.). Wskazania: *laryngitis* (wziewania), *gastralgia*, *dyspepsia*; *nephritis chronica*, *pyelitis*, *cystitis*. Po 1/2—1 szklanki 2—3 razy na czczo. Wśród dnia jako napój dyetyczny po 1/2—1 szklanki na raz. Odpowiada: Ems, Gleichenberg, Luhacovice, Selters, Apollinaris, Glesshübler, Krondorfer.

VII. Glauberska normalna mocniejsza (Na_2SO_4 7,5 : 10⁰/₀₀ soli s.). Jednorazowe *eccoproticum*; *haemorrhoides*; *hyperaemia et degeneratio adiposa hepatis*; *obesitas*; *hyperaemia cerebri*. Po 1 szklance 2—3 razy na czczo. Dla wypróżnienia rannego na noc 2 szklanki. Odpowiada: Abazienbad (Ferdinandsbrunn), Tarasp-Schuls (Luciusquelle).

VIII. Glauberska normalna słabsza (Na_2SO_4 2,4, Na_2CO_3 1,4 : 5⁰/₀₀ soli s.). Wskazanie: *gastritis mucosa*, *enteritis chron.*, *icterus catarrhalis degeneratio adiposa hepatis*, *diathesis uratica*, *cystitis*, *obesitas*. Rano na czczo po szklance 1—3 razy ogrzana; może być stosowana wśród dnia po 1/2—1 szklanki kilka razy. Odpowiada: Karlsbad, Francensbad (Salzquelle), Tarasp (Luciusquelle).

IX. Magnowa normalna (Mg CO_3 7,0 : 20,0 soli s.). Używa się jako jednorazowe *eccoproticum*, następnie: *pyrosis c. obstipatione*, *coprostasis*, *haemorrhoides*, *obesitas*. Na czczo po 1 szklance 2—3 razy. Jako środek przeczyszczający naraz 2 szklanki. Odpowiada wszystkim wodom gorzkim jak Hunyady-Janos etc.

X. Wapniowa normalna (Ca CO_2 2,20 : 10⁰/₀₀ soli s.). Działa moczopędnie. Wskazania: *enteritis diarrhoica* (ogrzana), *gastritis c. diarrhoea* (ogrzana), *nephritis chronica*, *pyelitis*, *rhachitis*. Po pół szklanki 2—3 razy na czczo. W chorobach przewodu pokarmowego ogrzana tylko pół szklanki rano na czczo i wśród dnia w godzinę po jedzeniu. Odpowiada: Marienbad (Rudolsfquelle), Wildungen, Salvator, Weissenburg.

XI. Litowa normalna (Li_2CO_3 2,0 : 5⁰/₀₀ soli s.). Wskazania: *diathesis uratica*, *arthrilis uratica*. Na czczo po 1—2 szklanki; podczas dnia kilka razy po 1/2—1 szklanki. Silniejsza od wód rodzimych: Salvatorquelle, Baden-Baden, Franzensbader Natáliequelle, Dürkheim.

XII. Jodowa normalna słabsza (Na J 1,5 : 3,3⁰/₁₀₀ soli s.). Wskazania: *scrofulosis, metritis, rhachitis, syphilis (gumma)*. Na czczo po 1/2—1 szklanki 1—3 razy, lub 3 razy dziennie. Zawiera więcej jodków od: Goczałkowice, Hall, Kreuznach, Königsdorf-Jastrzęb, Lipik.

XIII. Jodowa normalna mocniejsza (Na J 4,0 : 5⁰/₁₀₀ soli s.). Wskazania, sposób użycia ten sam co Nr. XII.

XIV. Bromowa normalna słabsza (Na Br 4,0 : 5,0⁰/₁₀₀ soli s.). Wskazania: *hysteria, neurasthenia*. Trzy razy dziennie po 1/2—1 szklanki.

XV. Bromowa normalna mocniejsza (Na Br 9,0 : 10⁰/₁₀₀ soli s.). Działa silniej, niż Nr. XIV.

XVI. Żelazista normalna (Pyrof. Fe Na 1,00 : 3,3⁰/₁₀₀ soli s.). Wskazania: *chlorosis, anaemia, chloranaemia, reconvalescentia*. Na czczo 1/2 szklanki i jeszcze 2 razy dziennie po 1/2—1 szklanki po jedzeniu. Odpowiada: Čudowa-Pyrmont, Francensbad, Schwalbach, Königswart, Spaa, Marienbad (Ambrosiusquelle), Reinerz, Elster (Moritzquelle).

XVII. Arsenawa normalna (KAs O₂ 0,015 (10 mg. ac. arsen.) : 2,500⁰/₁₀₀ soli s.). Wskazania: *anaemia, cachexia, scrophulosis, lymphomatosis, malaria, psoriasis*. Po 1/4—1/2 szklanki 3 razy dnia po jedzeniu. Odpowiada: Levico, Roncegno, Srebrénica.

XVIII. Arseno-żelazista normalna (KAs O₂ 0,009, Pyrof. Fe Na 0,500 : 2,500⁰/₁₀₀ soli s.). Wskazania i sposób użycia ten sam co Nr. XVII.

XIX. Dyetetyczna normalna. Służy za napój dyetetyczny.

XX. Kwaskowata normalna (Ac. phosphor. offic. 0,5 Acid. hydrochl. dil. off. 0,5 : 1,5⁰/₁₀₀ soli s.). Służy za napój dyetetyczno-orzeźwiający.

XXI. Stołowa normalna. Służy za napój dyetetyczny. Tak Nr. XIX jak i XXI odpowiada: Giesshübler, Krondorfer, Apollinaris.

Wody normalne organiczne numerowane.

XXII. A. Aqua alcalina effervescens mitior (różowa). (Natrii bicarbon. 5,0, Natr. salicyl. 2,0, Natr. biborici 1,0, ciał stałych 8⁰/₁₀₀). Wskazanie: *gastritis acida c. ectasia ventriculi, flatulentia fermentativa, icterus catarrhalis, cholelithiasis, cystitis, diathesis uratica, arthritis chronica diabetes mellitus*. Rano na czczo po 1/2 szklanki 1—3 razy. równocześnie po 1/2—1 szklanki podczas dnia; jako *anti-fermentativum* lub *antacidum* w godzinę po jedzeniu.

XXIII. B. Aqua alcalina effervescens fortior (różowa). (Natr. bicarbon. 8,0, Natr. salicyl. 2,5, Natr. biborici 2,0, ciał stałych 12,5⁰/₁₀₀). Silniejsza od poprzedniej. Wskazania te same co przy XXII. Używa się w ilości o połowę mniejszej, aniżeli XXII.

XXIV. C. Aqua calcariae effervescens mitior. Woda ziemna słabsza numerowana (Calcii carbonici 2,0, Calcii salicylici 2,0, ciał stałych 4,0^{0/100}). Działa jako *obstipans*. Używa się w: *enteritis diarrhoeica nephritis chronica, pyelitis, rhachitis*. Po 1½ szklanki rano na czczo 1—2 razy; równocześnie podczas dnia po 1½ szklanki 2—3 razy po jedzeniu. W stanach biegunkowych należy wodę pić po ogrzaniu.

XXV. D. Aqua calcariae effervescens fortior. Woda ziemna mocniejsza numerowana (Calcii carbonici 2,2, Calcii salicylici 3,0, ciał stałych 5,2^{0/100}). Działanie silniejsze, aniżeli poprzedniej. Wskazania i sposób użycia ten sam w ilościach o połowę mniejszych.

XXVI. E. Aqua magnesiaie effervescens numerata (Magnesiaie carbonicae 5,0, Magnesiaie salicylicae 1,0, ciał stałych 6,0). Działa jako *eccoproticum, antacidum* i słabe *antifermentativum*. Rano na czczo po szklance 1—2 razy, albo na noc. Równocześnie podczas dnia po 1½—1 szklanki po jedzeniu przez kilka tygodni.

F. Aqua ferri bicarbonici effervescens (ex tempore parata) 1—2 łyżeczek syropu żelazist. (Rp. *Ferri sulfurici crystalisati recentis* 2,5—5,0, *Solve in agnae destill. fervida* 10,0, *dein adde syrupi simplicis* 100,0, *M. d. s.* Syrop żelazisty) daje się do szklanki, dolewa wody Nr. II pół szklanki i wypija za pomocą rurki szklanej. Taką porcję 3 razy dziennie na pół godziny przed jedzeniem we wszystkich tych chorobach, gdzie chcemy użyć przetworów, lub wód żelazistych.



PODREČNIK TERAUPETYCZNY.

Abortus. Poronienie. Przy poronieniu nawykowym, należy wykazać przyczynę. Z chorób ogólnych najczęściej wywołuje je kiła, która wymaga energicznego leczenia swoistego podczas ciąży. Inne skazy ogólne wymagają też leczenia swoistego. Z przyczyn miejscowych najczęściej wywołują poronienie tyłozgięcie macicy, dające się podczas ciąży leczyć; jakoteż zmiany zapalne błony śluzowej, mięszu macicy i jej otoczenia. Gdy przyczyny poronień nawykowych przy badaniu nie łatwo nam odnaleźć, natenczas polecimy ciężarnej nadzwyczaj spokojne zachowanie się, zabronimy jej wszelkich forsowniejszych ruchów. jazdy, zwłaszcza koleją, a nawet dłuższy czas polecimy jej pozostawanie w łóżku.

Każde krwawienie w ciąży, dla którego przy badaniu nie znajdziemy wyraźnej przyczyny, zapowiada możliwość poronienia, a skoro do krwawień dołączają się bóle w krzyżach i dołem wtedy mówimy o poronieniu groźącym. W tych przypadkach kładzie się chorą do łóżka, zaleca się jej absolutny spokój, dyetę lekko strawną, przeciw skurczom macicy podaje się środki odurzające, najlepiej w formie czopków odbytniczych.

Rp. Extr. opii aquosi. 0·04. But. Cacao q. s. ut. f. supp. anale. D. t. Nr. VI. S. 2—3 czopków dziennie użyć lub też:

Rp. Morphi muriat. 0·015; But. Cacao q. s. ut. f. supp. anale. D. t. Nr. VI. S. 2—3 czopków dz. użyć.

Krwawienie skąpe nie wymaga żadnego lekowania, w krwawieniu obfitszem wolno podawać tylko środki działające na błonę śluzową, a nie na miąższ macicy, jako to:

Rp. Extr. fluid. hydrast. canad. 20·00. S. 3 razy dnia 15—20 kropel zażyć, lub też:

Rp. Pastil. stipticini fabr. Merck à 0·05; Dntur N. 40. S. 3 razy d. po 2—3 pastylek zażyć.

Rp. Styptol à 0·05 Pastill. S. 4 razy dziennie 1—2 pastylek.

Niewolno natomiast przy grożącym poronieniu podawać sporyszu, jakoteż środków przeczyszczających, drażniących, okładów zimnych, lub też używać tamponady pochwy. Natomiast bardzo groźny krwotok nawet przy poronieniu grożącym będzie zmuszał nas do użycia tamponady pochwy. Użyjemy tamponów, albo z gazy aseptycznej, albo z gazy jodoformowej, pierwsze będziemy musieli usunąć po 12, drugie po 24 godzinach.

Tamponady należy dokonywać z wszelkimi możliwymi kautelami aseptyki.

Przy poronieniu w toku będącym niema również wskazywania do żadnych zabiegów, ani też do jakiegokolwiek lekovania, z wyjątkiem znacznego krwotoku zniewalającego do tamponady szyi i pochwy, ewentualnie do ręcznego wydobywania jaja płodowego i objawów zakażenia, które również nakazują poronienie jak najszybciej ukończyć.

Zatrzymanie łożyska lub resztek jaja płodowego po poronieniu, zniewala do ręcznego usunięcia ich z macicy, a dopiero gdy to jest niemożliwe, można użyć tepej łyżeczki celem ich usunięcia. Postępowanie ściśle przeciwnie.

Po ukończeniu poronienia i dokładnem przestrzykaniu macicy w razie niedowładu macicy można podać wewnątrz 2—3 gr. sporyszu, lub też ergotyny Wernicha podskórną w ilości 1—2 gr.

Tamponowanie szyi po poronieniu niezakaźnem jest zbyteczne.

Acne rosacea. Trądzik różowaty. Usuwać przyczyny wewnętrzne. Wewnątrz:

Rp. Ichthalbin v. Ichtyol. 15'0; Pulv. et ext. Liquirit. $\bar{a}\bar{a}$ ad pill. 100. S. 3 razy dnia 2—6 pigulek.

Miejscowo: Przez dzień zmywać często rozcieńczonym kw. octowym lub cytrynowym lub smarować 20% roztworem wyskokowym tanniny a na noc przykładac:

Rp. Lanolini 0'5; Vaseline. flav. 10'0; Aq. dest. 20'0; Ichtyol. 2'0. S. Ciasto chłodzące.

Obok tego krótkie okłady (8—10 sek.) z gorącej wody, potem puder. W okresach późniejszych nacięcia nożykiem lub elektroliza.

Acne vulgaris. Trądzik. Dyeta, leczenie przyczyn wewnętrznych.

Miejscowo: wyciskać zaskórnik i krosty; częste mywanie w dzień mydłem przetłuszczonem resorcynowo-lubnaftolowo-siarczanem tiosinaminowem lub sap. natr. peryoxydat. Na noc posmarować maścią:

Rp. Sol. Calcii chlorat. (10'0); Naftalini $\bar{a}\bar{a}$. 45'0. Mf. Ung. S. Maść na noc;

Rp. Adip. lanae 50'0; Vaseline. flav. 10'0; Hydrogen. peryoxyd. 20'0; Hydrarg. sublim. cor. 0'03; Bism. oxychlorat. 0'5—1'0. Mf. ung. S. Maść na noc;

Rp. Lact. sulf. 10'0; Lanolin. p. 2'50; Aceti 7'50;
Vaselin fl. 5'0. Mf. ung. S. Maść na noc.

Agrypnia. Bezsenność. Uwzględnić przyczyny: Anaemia, Hysteria, Neurastenia, Dyspepsia.

Przy anemii na wieczór wino, piwo, przy nawalach derivantia, letnie kąpiele, odpowiednia dyeta, unikanie męczącej umysłowej pracy, wczesne jadańie wieczerzy, nacieranie ciała wodą z octem itd. Gdy te środki nie pomagają:

Rp. Chloralhydrat 3—5'00; Aq. dest. 100'00; Succiliquir 20'00; Chloroform gtt. 3. MDS. Połowę na raz, drugą za $\frac{1}{2}$ godziny.

Rp. Sulfonali 1'00; Tal. dos. 5. S. Na jedną do trzech godzin przed spaniem proszek z herbatą lub rosółem. (Przy dłuższem używaniu intoxic!).

Rp. Kali bromati 0'25; Castor. canad. 0'05; Sacchari 0'30; Mfp. tal. dos. X. S. 3 proszki dziennie. (A. na tle nerwowem).

Rp. Chloralmid 3'00; Aqu. dest.; Syr. simpl. $\bar{a}\bar{a}$ 30'00.

Rp. Hyoscini hydrojodici 0'01, Extr. Gent. q. s. ut. f. pill. N. 50. S. Na noc 2—3 pigulek.

Polecany też bywa przetwór Bromidia 1—2—3 łyżeczek na noc.

Rp. Trional. 1'0. S. 1—2 proszków w mleku, rosółem itp.

Rp. Paraldehyd. 4'0; Mucilag. Salep.; Syr. cort. Aurant. $\bar{a}\bar{a}$ 20'0; Aq. font. 40'0. S. połowę na raz, po 2 godz. drugą.

Rp. Bromipin 100% f. c. vitell. ov. N. II. emuls. add. ol. menth. pip. gtt. 5. na noc. 1—3 łyżeczek.

Rp. Dionin. 0'02—0'03 p. dos. DS. w krop. lub proszku na noc.

Rp. Hedonali 0'5—1'0—1'5—2'0 pro dosi.

Rp. Veronali 0'25—1'0 pro dosi.

Alcoholismus. Zatrucie wysokokowe. *Acutus* zobacz: Otrucia.

Chronicus. Leczenie tylko w zakładach mozebnie. Zupełne usunięcie alkoholu; leki nasenne, przede wszystkim chloral i sulfonal; kąpiele letnie. W lżejszych stopniach pomaga: *Tra opii simpl.*

Rp. Strychnin nitr. 0'05; Aqu. dest. 15'00. DS. do iniekcji. Dzien. 1—2 inj. po 0'50 płynu. Równocześnie natr. brom.

Rp. Extr. nuc. vom. 0'50; Spir. vini 5'0; Acid. phosphor. dil. 10'0. S. 3 razy dnia po 10 kropli.

Alopecia areata. Łysina plackowata. Cierpienie nader uporczywe.

Rp. Vereatrin 0'40; Spir. vini rectific. 90'0; Spir. Lavandul. 30'0; Glicerín. p. 15'0. S. codziennie pędzl. miejsca zajęte (Kaposi).

Rp. Chrysarobini 2'0—4'0; Lanolin. anhydr. 3'00. S. Codziennie natrzeć, aż do podrażnienia (Crocker) ostrożnie ze względu na conjunctivitis).

Rp. Sublimat. corros. 0'1—0'3; Spir. vin. rectific. 4'0; Ol. terebinth. 25'0. S. Codzien. wcierać (Crocker).

Rp. Chloral hydrat. 5'0; Aether. sulfur. 25'0; Ac. acetic. crystal. 1'0—5'0. Co 2 tygodnie dobrze wcierać, — codziennie zaś wrywać włosy w otoczeniu i wcierać 5'0 salol w wysoku.

Amenorrhoea. Brak miesiączki. Badać dokładnie i szukać przyczyny. Pamiętać o możebności ciąży. W przypadkach haematometra zabieg operacyjny. Jeżeli przyczyną chlorosis, scrophulosis, tuberculosi, anaemia, polysarcia, zastosować odpowiednie leczenie, uregulować dyetę i uważać na stolec.

W przypadkach niedostatecznego rozwoju macicy, albo w przypadkach nadmiernego zwinięcia się tejże po porodzie: wstrzykiwanie ciepłe, elektryzowania macicy, kąpiele nożne, gorące, upusty krwi z części pochwowej, powtarzane w czterotygodniowych odstępach, szczególnie gdy są molimina menstrualia. Codzienne zakładanie sondy, pendzlowanie części pochwowej nastojem jodu, mięsienie wzdłuż kręgow ledźwiowych i krzyżowych. Żelazo wewnątrznie, luteina, ovaraden (Knolla), zmiana powietrza, powietrze górskie, Krynica, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

Rp. Extr. aloes 1'00; Pulv. myrrhae q. s. ut. f. pill. Nr. 50. S. 3 r. dnia 2—3 pigułek.

Rp. Acid. arsenic. 0'06; Ferri sulph. exsicc. 2'00; Piper nigr.; Aloes; Myrrh. aa. q. s. f. pill. Nr. 60. S. 2 r. dz. pigułek po jedz.

Rp. Kali hypermang. 1'00; Butyr. cacao 1'00; Pulv. cacao q. s. ut. f. pill. 50 S. 3 r. dnia 1—2 pigułek, lub podaje się w czasie molimina construalia.

Rp. Capsul. elasticar. tenentium 0'02 Apioli Nr. XX. S. Rano i wieczór kapsułkę zażyć (Baillot i Barbette).

Rp. Mangan sulphur. 5'00, Bolus albae q. s. ut. f. pill. Nr. 50. S. 1—2 pigułek dziennie po jedzeniu.

Anaemia. Niedokrwistość. Jeżeli skutek krwotoku: leki wzmacniające i podniec. W razie grożącego zapadu wino Sherry, Szampańskie, czarna kawa, eter, oraz: podskórne wstrzyknięcie roztworu soli 0'70'0 w ilości 500—700'000. Enemy z wody słonej, które można dawać, gdy chory nawet nieprzytomny. Najpierw enema ciepła dla oczyszczenia kiszek, następnie z wody słonej: na 1/2—1 litra wody gorącej 1/2—1 łyżeczki soli, zatrzymać przez pół godziny, powtarzać w pierwszych dniach po krwotokach co godzinę, w dalszych, co 2—6 godzin.

Na przemian można dawać enemy, ożywcze (2 na dzień) 200 cm.³ ciepłego mleka lub nietłustego rosółu

z pół łyżeczką soli i żółtkiem, łyżeczką somatozy, kieliszkiem wina czerw.

Rp. Aether. sulphur. 10'00; Camphor. 1'00. DS. Wstrzyknąć 1—3 wstrzyk.

Rp. Olei camphorati 10'00. DS. $\frac{1}{2}$ wstrzykawk. Przy dłużej trwających A. według wskazań: uwzględnić dokładnie przewód pokarmowy w szczególności usta (zęby) i żołądek; arsen (Woda Gubera Levico), żelazo, wino, pobyt na świeżem powietrzu. Wody żelaziste, Krynica, Żegiestów, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

Rp. Liquor ferri album. 50'00. DS. 2 razy dz. łyżeczkę.

Rp. Ferri hydrog. reduct. 5'00; Acid. arsen. 0'10; Pulv. althaeae, Mel. depur. āā qu. s. f. pill. Nro 120. S. 3 pig. dz.

Rp. Granul. natr. arsenic. āā 0'001, — S. 3 razy dziennie po 1—2 perełek zażywać po jedzeniu.

Rp. Haemoglobina po 0'20 na dzień w formie pastylek Dra Pfeifferra.

Rp. Calcar phosphoric 10'00; Haemoglobin 1'00—2'00; Extr. Strychni 0'10; Div. in dos. 20. S. Dziennie 5 proszków.

Wody pyrofosforan. Syr. ferr. mang. pept. fabr. Matula. Ferrophosphat »Matula«. Pastill. jodo ferrati comp. Jahr. Pill. Blaudi — Fersan — Alboferrinum.

U dzieci leczyć przyczynowo: Zaburzenia w trawieniu, kila, krzywica, zolizy, zimnica.

Angina diphterica zob. **Diphteritis.**

Angina pectoris zob. **Stenocardia.**

Angina catarrh. acuta. Ostry nieżyt gardła. Ciepłe płókanie z naparu korzeni ślazowych.

Rp. Infus. fol. Salviae e 20'0 ad 200'0; Trae opii simpl. 1'0. MDS. Płókanie.

Rp. Decoct. rad. Althaeae 200'0; Trae laud. simpl. gtt. XV; Syr. moror. 20'0 MDS. Płókanie.

Rp. Kali chlorici 5'0; Aq. destill. 300'0; Spir. menth. pip. gtt. II. MDS. Płókanie.

Rp. Acidi salicylici 1'0; Kali chlorici 2'0; Aq. destill. 300'0. MDS. Płókanie.

Rp. Alum. crud. 5'0; Aq. destill. 200'0; Trae laud. simpl. 1'0. MDS. Płókanie.

Rp. Hydrogen. hyperoxydat. 3'0 300'0. MDS. Płókanie.

Angina phlegmonosa. Ropowica gardła. Otworzenie ropnia w stosownym czasie: dnia następnego w razie objawów zatrzymania się ropy, należy zgłębnikiem, zerwać zlepiające się brzegi otworu.

Angina tonsill., catarrhalis, follicularis. Zapalenie migdałków, nieżytowe, mieszkowe. Ciepłe płókania.

Rp. Kali hypermang. 1·0; Aq. destill. 300·0. DS.
Woda do ust.

Rp. Natri salicylici 1·0; Aq. destill. 200·0. S.
Płókanie.

Rp. Aq. calcis 200·0. S. Płókanie.

W przypadkach przewłocznych dla zmniejszania powiększonych migdałków:

Rp. Arg. nitr. cryst. 1·0; Aq. destill. 30·0; Da in
vitr. nigr. S. Pendzlowanie.

Rp. Extr. sec. cornuti 1·0; Trae jodi 4·0; Glyce-
rini 30·0. S. Pendzlowanie.

Anorexia. Brak łaknienia. U osób niedokrewnych, gruźliczych i neurasteników — świeże powietrze osobliwie górskie i na morzu; kąpiele rzeczne, masaż. W ciężkich przypadkach histeryi leczenie w zakładzie — odosobnienie, ewentualnie żywienie sondą — przepłókiwanie żołądka. Odpowiedia dyeta. — U błędniczych żelazo, arsen, kwas solny. Na tle histeryi i neurastenii leczenie bromem.

Tra. amar.; Tra. nuc. vomic.; Tra. chinae comp.; Extr. gentian; Decoct. condurango; Tra. rhei vinos.

Rp. Orexin basic. s. tannic. 0·3—0·5. S. 2 razy
dziennie na godzinę przed jedzeniem w opłatku
lub wsypać na język i popić wodą.

Aphthae (Stomatitis aphthosa). Zapalenie pryszczyczkowe ust. Pendzlowanie 10% roztworem kali chloricum, 1½% roztworem acid. tannici, 5% Boraxem. Tra. Myrrhae. Tra. Ratanhia.

Rp. Succu citri; Syrup rub. Id. āā. 10·00. S: Do
pendzlowań.

Rp. Argenti nitrici 1·00; Aq. dest. 50·00. MDS.
Do pendzlowań.

Wewnętrznie:

Rp. Kali chlorici 1·00; Aq. dest. 80·00, Syrup. rub.
id. 20·00. MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Uporczywie trzymające się plamy lapisować lub przypalić sinym kamieniem. Obob tego zimne napoje, podawanie kawałków lodu, unikanie gorących i twardych potraw.

Apoplexia s. Haemorrhagia cerebri. Rażenie, udar, krwotok mózgowy. Łóżko, głowa wysoko ułożona, okład lodowy na głowę, okład zimny na serce, u dobrze odżywionych upust krwi (100—500 gr.). U osób białych, ze słabym pulsem nacierania skroni środkami drażniącymi, synapizma na okolicę serca, wachanie amoniaku. Nadto dać zaraz lewatywę z octu, mydła lub soli tak, żeby nastąpiło silne przeczyszczenie; nacieranie kończyn. W razie silnych objawów podrażnienia lewatywy z 1—2 gram. chloralu, iniekcye podskórne 0·01—0·02 morph. mur. Jeżeli tętno słabe i jest zapad, wino, kawa czarna, kamfora, eter podskórnie, digitalis, synapizm.

Gdy udar minął, nie pozwalać wstawać z łóżka, okład lodowy w dalszym ciągu na głowie, stolce regulować, wody gorzkie Hunyadi Janos, Morszyńska, Saratica; chłodne pożywne napoje, limoniady, zupy, mleko w pierwszych dniach po napadzie — później jaja, bulion. W razie bezsenności chloral, sulfonal, a ze środków wewnętrznych digitalis lub Tinct. Strophanti dla uspokojenia akcyi serca.

W kilka tygodni po ataku, kali jodatam, elektryzowanie kończyn porażonych, masowanie, ruchy bierne.

Rp. Inf. fol. Sennae e 15'0 ad 200'0; Sal. amar.; Syr. rub. idaei $\bar{a}\bar{a}$. 25'0; S. Co godz. łyżkę.

Rp. Inf. rad. Rhei e 15'0 ad 150'0; Ol. ricin. 20'0. MDS. Na dwie lewatywy.

Rp. Inf. fol. Sennae e 20'0 ad 200'0; Magnes sulfur. 20'0. MDS. Na lewatywę.

Rp. Tinct. Cantharid. 5'0; Ol. Terebinih. 25'0. M. S. Do nacierañ. W zastarzałych przypadkach:

Rp. Strych. nitr. 0'005; Aq. dest. 10'0. S. Codzień 1 strzyk. 1-gramów.

Arteriosclerosis. Stwardnienie tętnic. Przede wszystkim Kal. jod. a w miarę potrzeby równocześnie albo naprzemian z środkami nasercowymi, nitrogliceryna. Uwzględnić: Lues, Diat. uric. Tabes, Morb. Brightii, Diabetes, Ołowicę.

Zamiast K. j. można dawać:

Natr. jod. S. Na dzień 1—1'5—3'0 gr.

Jodvasogen 60% 3'00. S. 5—8—12—20 kr. 3 r. dziennie w mleku lub wodzie jakiejś burzacej (sodowej, szczawnikowej itp.) używać miesiącami. Na J. ma tę wyższość nad KJ., że nie sprowadza tak łatwo zatrucia (nieżyty błon śluzowych). W razie wystąpienia objawów zatrucia jodem: Natr. sulfanilicum 6:200. 3 łyżki dziennie.

Powiększać ilość moczu i wydalanie wapna przez nerki:

Rp. Natr. carb. 10'0; Ac. lactic. q. s. ad saturat. dein adde Ac. lact. 10'0; Syr. simpl. 10'0; Aq. d. ad 200'0. MDS. Przez dzień wyżyć.

Przeciwwskazane tylko w końcowym okresie lub wobec znacznego zaniku nerek.

Arthritis vide Rheumatismus articulorum.

Arthritis urica. Podagra, Dna; Zapalenie stawów dnawe, moczanowe. Leczenie dyetyetyczne. Ograniczenie pokarmów co do ilości i jakości. Wolno jeść mięso chude, o ile możliwości tylko białe, mleko, jarzyn sporo, unikać tłuszczu i mącznych potraw a głównie napojów wyskokowych. Do picia szczawy lub zwykła woda z dodaniem kwasu. Wskazany jest ruch na świeżem powietrzu, wycieczki w góry, gimnastyka. Ze środków wewnętrznych polecają: Tinctura lub Vinum colchici po 10—20 kropli 3—4 razy

na dzień, Natrium salicylicum lub Antipyrina 2—3 grm. pro die. Aspirina (Beyera).

W razie silnych bólów wcierać maść z narkotykami, na wewnątrz morfinę lub podskórnie.

Następnie picie wód: Salvator, Bilińska, Vichy, Kissingen, Ems, Neuenahr, Obersalzbrunn, Dürkheim, Homburg, litowa sztuczna Rzący i Chm. — otyłym zaś osobom można polecić Marienbad, Karlsbad, ewent. leczenie na miejscu w Karlsbadzie, kąpiele z dodatkiem soli borowinowej Mattoniego.

Rp. Chloroform 10·00; Aq. colonien. 20·000; Tr. Aconiti 10·00. DS. Do nacierań.

Rp. Extr. Belladon. 2·00; Lanolini 20·00. Mf. ung. DS. Wcieranie.

Rp. Lithii jodat. 0·25; Extr. et pulv. gent. *aa.* q. s. f. pil. 20. S. 3—4 pig. dziennie.

Rp. Lithii carbonici 0·10; Sacchari 0·20; Mfp. de tal. dos. 20. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Lithii. citric. 5·0; Aq. d. 125·0; Ac. citric. 0·5; Syr. citr. 30·0. MDS. 2—3 razy dziennie łyżkę.

Rp. Natrii lithiosalicyl. 1·00; D. tal. dos. XII. S. 3—4 pr. dziennie.

Rp. Solut. lysidini 50% 10·0; Aq. destillat. 200·0 in vitr. nigr. S. 2—6 łyżek dziennie w wodzie alkalicznej zażywać.

Rp. Piperazin po 0·25 na dawkę, dziennie 1—3 gr.

Rp. Urosin 10 pastylek dziennie odpowiadający 5 gr. kwasu chinowego (przez 4—8 tyg.).

Rp. Sidonal (Piperazinum chinicum), 0·5. T. d. X. S. 10 proszków dziennie.

Rp. Salol; Aether *aa.* 4·00; Collodii 30·00. S. Pen-dzlować miejsca bolesne.

Rp. Antinervini (Radlauer) 0·50 in pastill. compress. S. Kilka razy dnia zażywać.

Przy białkomoczu:

Rp. Urotropini 0·50 td. XII. S. 3 pr. dz. zażywać.

Ascaris lumbricoides. Glista dżdżownicowata. Zabraniać pokarmów mącznych, natomiast mleko, mięso.

Rp. Santonin 0·15 (—0·20); Ol. ricini 50·00. MDS. Co 2 g. łyżkę.

Rp. Santonin; Calomel. *aa.* 0·01—0·03; Pulv. rad. rhei 0·15; Sacchari 0·20; Mfp. dtur. tal. dos. Nr. 6. Rano i wieczór proszek.

Rp. Pulv. sem. cinæ 4·50; Pulv. rad. jalap. 2·50; Mfp. divid. dos. Nr. 5. DS. Co ½ godz. proszek.

Użyć można też trochisci santonini po 0·025 santoniny.

Asthma bronchiale. Dychawica. Usunąć przyczynę (np. polipy na nosie, choroby kobiece).

Podczas samego napadu, chorego rozebrać (zwłaszcza zdjąć stanik lub gorset), umieścić go w przestronnym

pokoju, gdzie dobre świeże powietrze. Najprędzej działają narcotica, podać więc na wewnątrz albo Chloralhydrat 2'00 na raz, lub wstrzyknąć morfinę. Mniej pewnie działa morfina na wewnątrz. Polecieć choremu podczas napadu mocną czarną kawę, gorące okłady lub synapizma na klatkę piersiową i łydki. Kilka kropli amylnitritu do wachania, lub pirydiny na spodeczek wyłać i tem oddychać, polecają też Kali jodat. w dawkach 1—3'00 na dzień, atropinę, lub extr. quebracho. Jeżeli narcoticum nie może być podane a wśród napadu słyhać liczne rżenia, świsty i fuczenia, to podać należy emeticum n. p. apomorfine podskórnice lub na wewnątrz. W ciężkich napadach można się uciec do narkozy chloroformowej. Po przejściu napadu leczyć chorobę główną i pozostały zwykle po napadzie nieżyt oskrzelowy, odpowiednimi środkami. Również skutecznie działają przetwory jodowe w połączeniu z bromowymi.

Rp. Extr. fluid. Quebr. 25'00. DS. 2—3 łyżeczki dziennie.

Rp. Vini stibiati; tinct. lobel. infl. āā. 5'00; Morph. mur. 0'10. DS. 3 r. na dz. po 15 kropli.

Rp. Vini stibiat; Trae lobel. āā. 5'0; Liq. ammon. anis. 1'0. MDS. Co $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ godz. 10 kropli.

Rp. Aphomorphin chlor. 0'05; Acidi hydrochlor. dill. gits. X.; Aq. menth. pip. 50'00; Syrup. 20'00. MDS. Co 2 godz. $\frac{1}{2}$ łyżeczki.

Rp. Kali jodati 10'00; Tinct. stram. 8'00; Extr. liquir. 4'00; Syrup. scill. 30'00; Aq. destill. 250'00. S. 3 razy dziennie łyżkę w szklance wody.

Rp. Paraldehyd 2'00—3'00; Aq. destill. 100'000. Syr. simpl. 20'000. S. Na 2 razy użyć w przeciągu $\frac{1}{2}$ godziny.

Rp. Antinervin (Radlauer) 0'50; Sacch. albi. 0'50, dent. tal. dos. N. XII. S. Co 2 godziny proszek.

W razie napadu:

Rp. Chloral. hydrat. 3'00; Syr. simpl. 30'0. DS. Na raz użyć.

Rp. Amylnitrit. 5'00; Ol. foenicul. 10'00. S. W napadzie 2—5 kropli nalać na chustkę i wdychać.

Rp. Natri-nitrosi 2'00; Aq. dest. 120'0. DS. 4 razy na dzień łyżeczkę.

Rp. Kali jodati; Tinct. lobel infl. āā 10'00; Extr. opii 0'10; Aq. destil. 180'00. DS. CO 2 godz. $\frac{1}{2}$ łyżki.

Rp. Extr. Bellad.; Pulv. Belladon. āā. 0'30; f. pil. N. 30. Na wieczór 1—2 pigulek.

Rp. Lobelin 0'01; Extr. liquir. 5'0; f. pill. N. quinque. S. Co 2 godz. pigułkę.

Rp. Jodopyryni 0'5 t. d. X. S. 3—4 pr. dz.

Rp. Pyridini puri 5'0. S. 10—20 kropli wzięwać aparatem Sieglowskim.

Rp. Pyrenol 10'0; Aq. dest. 200'0. S. 3 łyżki dz.

Radzą też w początku napadu pendzlować w głębi nosa:

Rp. Tinc. Naregamiae; Aq. lauroceras. $\bar{a}\bar{a}$. 10'00.
S. 2—3 razy dnia po 10 kroppli.

Rp. Cocain mur. 1'00; Aq. dest. 20'00. DS. Do pendzlowania.

Rp. Folior. belladon. 0'3; — hyoscym. 0'15; — stram 0'15; Extr. opii aquos. 1'5; Aq. laurocer. 0'5. MDS. Jako tytoń do papierosów (Trousseau).

Atelectasis pulmonum. Niedodma płuc. U noworodków ciepła kąpiel, zimne polewanie i nacieranie ciała. Dzieci takie należy często nosić, budzić ze snu. Obok świeżego powietrza, ogrzewać gorącemi flaszkami w pościeli, couveuse.

Rp. Liquor. ammon anis. 1'00; Aq. destil. 50'00; Syrup Sachari 15'00. MDS. Co godz. łyżeczkę.

Rp. Aetheris sulfur. 10'00. DS. Jedną lub 2 krople we wodzie.

Rp. Camphorae rasae 0'10; Mucil. gumm. 50'00. S. Co godzinę łyżeczkę.

Balanitis i Balanopostitis. Zapalenie żołądź i napletka. Czystość, przemywania 3% roztworem kw. borowego, $\frac{1}{2}$ % kali hypermang. i zakładanie waty suchej, obok tego użyć można:

Rp. Tannini; Amyl. trit. $\bar{a}\bar{a}$ 15'0. Mfp. S. Zasypka. Albo pendzlowanie owrzodzeń roztworem 1—5% arg. nitr.; 5—10% resorcyiny.

Przy stulejce przestrzykiwać słabymi przeciwnymi płynami ($\frac{1}{2}$ % roztworem lapisu). Przy znacznym obrzęku napletka zimne okłady, wreszcie nacięcie napletka lub przecięcie brzegu.

Bartholinitis. Zapalenie gruczołów przedstonkowych. a) acuta.

Obok leczenia rzeżączki pochwy (przestrzykiwania), spokój, okłady zimne obok ciepłych kąpeli nasiadowych, a gdy obrzęk się zwiększa, szerokie nacięcie na wewnętrznej stronie wargi sr. mniejszej (z góry na dół) lub nakłócie, wypuszczenie ropy i wstrzyknięcie do wewnątrz 1—2% azotanu srebrowego.

b) chronica.

Wstrzyknięcie $\frac{1}{2}$ —1% rozt. azotanu srebr. do ujścia gruczołu zapomocą strzykawki Anel'a, lub gdy sprawa dawna, wycięcie gruczołu albo nacięcie i wyłyżeczowanie.

Blennorrhoea urethrae. Wiewiór — tryper. a) acuta anterior.

W okresie początkowym użyć można metody Janeta (tylko w okresie podostrym!). Gdy objawy bardzo ostre, zalecić odpowiednią dyetę, częste przemywania prącią, uwaga na stolec i środki wewnętrzne.

Rp. Decoct. Sem. lini 500'0; Syr. Diacodii 10'0. S. Co godzinę łyżkę.

Rp. Decoct. fol. Uvae Ursi 25·0 ad 500·0; Syr. simplic. 25·0; Tct. Opii. 1·50. S. W ciągu dnia ciepłe wypić.

Rp. Natr. bicarbon. 5·0; Sacch. albi. 30·0; Succ. citri gtt. 3. S. W litrze wody przez dzień wypić.

Przeciw częstym zwodom prącia i zmazom nocnym:

Rp. Kali bromat. 10·0; Lupulini 1·0; Camphor. trit. 0·10; Mf. f. pulv. div. in dos. Nr. X. S. Na noc 1—2 proszk.

Równocześnie podawać można Balsam Copaiv. lub Ol. Santali po 0·5, 3—4 razy dziennie.

Jeżeli objawy nie są zbyt ostre polecić można wstrzykiwanie:

Arg. nitric. 1 : 5000—3000, Argentamin 1 : 5000—3000 (w aptekach istnieje 100/0 rozc.), Alumnol 1—30/0, Argonin 1½—40/0, Protargol ½—10/0, Itrol 1 : 10000—5000, Largin ¼—10/0, Thal. sulfur. 3—50/0, Kal. hypermang. 1 : 5000—3000.

Wszystkie te środki wstrzykiwać należy po poprzednim oddaniu moczu i przepłukaniu cewki, 3—4 razy dziennie, a gdy wypływ staje się śluzowym i dwoinki z niego znikną, zmniejszać ilość dzienną wstrzykiwań płynem silniejszym, wreszcie pozostawiając jeden z tych środków raz dziennie, zalecić wstrzykiwanie środków ściągających:

Rp. Ammon. sulfoichtiol. 1—20/0; Zinc. sulfocarb. ¼—10/0, Alumin crudi ¼—10/0, Resorcin. resubl. 3—40/0;

w końcu środki osadowe:

Rp. Plumb. acet. basic. sol. 0·5—10/0, Bismuth. subnitr. ¼—10/0, Ac. tannic. 0·1—0·5.

b) acuta anterior et posterior.

Środki higieniczne dyeta, spokój. Wewnętrznie:

Rp. Extr. fluid. Kawa-Kawa 20·0. S. 3 razy dnia po 20 kropli.

Rp. Salol. 0·50; Dent. tal. dos. XXX. S. 4—6 pr. na dzień.

Rp. Extr. cubeb, alcohol. 20·0; Tct. aromat. acid. 5·0. S. 4 razy dnia po 20 kropli.

Rp. Herb. Herniar.; Fol uvae ursi āā 30·0. S. Na herbatę.

Przy znacznem parciu i krwawieniu: czopki morfinowe, kąpiele nasiadowe ciepłe, a wewnętrznie:

Rp. Ferri sesquichlor 2·0; Aq. destilj. 200·0; Syr. cinnamon. 20·0. S. Co 2 godz. łyżkę.

Rp. Ergotini 1·0; Laudani p. 0·10; Sacch. albi 2·0; Div. in dos. Nr. X. S. Co dwie godz. proszek.

c) chronica.

Prawie zawsze całej cewki, dlatego po przekonaniu się, czy nie istnieją powikłania (cavernitis, periurethritis, strictura, prostatitis), które leczyć należy równocze-

śnie, przepłukiwać całą cewkę zapomocą cewnika miękiego lub metalowego (Ultzmana) płynami w ilości 150—200 gr., albo rozcżynami zgęszczonymi wkraplaczem Guyon'a lub Ultzmana. (Płynty, patrz przy cystitis). Gdy sprawa trwa długo, użyć obok przepłukiwań ciężkich sond metalowych.

Bronchiectasis. Rozdęcie oskrzeli. Świeże i dobre powietrze, jeżeli można pobyt na wsi lub w górach.

Leczenie nieżytu oskrzelowego. Jeżeli suchy nieżyt, dawać środki wykrzuśne, apomorphina, senega, ipecacuanh., stib. sulph. aurant. z dodatkiem morfiny. Jeżeli wydzielina b. obfita, to środki ściągające, jak tanina, atun, plumb. acet. na wewnątrz lub do wzięwań, albo też środki balsamiczne, w szczególności ol. terebinth. 10—20 kropli dziennie z mlekiem; w przypadkach znacznej wydzieliny można dojść do 40—50 kropli na dzień. — Dyeta pożywna — dużo mleka, masła, ewentualnie ol. jecoris. aselli. do 60 gr. dziennie.

Rp. Bals. peruv. 5'00; Aq. dest. 120'00; Syrup amygdalini; Mucil. g. arab. *aa.* 10'00. Co 2 g. łyżkę.

Rp. Ol. terebinth. 0'5—2'0; Menthol. 0'25; Aq. dest. 120.00. DS. Do inhalacji.

Rp. Terpinol 3'00; Extr. et pulv. liquir. q. s. ut. pil. N. 30. S. 4—5 pig. na dzień.

Rp. Myrtoli 0'15; c. Glicer. q. s.; ut f. capsul. gelat N. 20. S. 3—4 kapsułki na dzień.

Rp. Eucalyptol. 0'1—0'3; D. T. dos. L. ad caps. gelat. S. 6—10 kabs. dziennie.

Wreszcie pobyt nad morzem lub w miejscach klimatycznych.

Bronchitis acuta. Ostry nieżyt oskrzeli. Wewnątrznie środki rozdzielające, wykrzuśne, wobec silnego kaszlu suchego, środki odurzające, balsamica i wody mineralne alkaliczne: Szczawnicka, Giesshübler, Bilińska, Krościenko, wody miner. sztuczne Rzący i Chmurskiego.

Rp. Natri bicarb. 5'00; Morp. mur. 0'10; Mfp. div. in dos. XII. DS. 3 proszki dziennie.

Rp. Inf. rad. ipec. 0'50 : 200.00; Syr. cort. aurant. 15'00. MDS. Co godzina łyżkę.

Rp. Inf. seneg. e 6'00 : 200'00; Syr. simpl. 20'00. DS. Co godzina łyżkę.

Rp. Inf. rad. Quillajae e 5'00 ad 200'00; Liq. ammon. anis. 2'00; Syr. Seneg. 2'00. DS. Co godzina łyżkę.

Rp. Natri bicarbon. 5'00; Sulph. aur. antimon. 0'20; Morph. mur. 0'10; Mfp. div. in dos. XII. DS. 3 proszki dziennie.

Rp. Morph. mur.; Apomorphin mur. *aa.* 0'10; Aq. dest. 15'00; MD. in vitr. nigr. S. 3—4 r. dnia po 10 kropli.

Rp. Apocodein mur. 0'10; Aq. lauroc. 10'00. MDS. Po 10 kropli.

Rp. Apomorphin hydrochl. 0'05; Acid. hydrochl. gtts. 10; Aq. menth. pip. 50'00; Syr. simpl. 15'00. MDS. Co 2 godz. $\frac{1}{2}$ —1 łyżeczki.

Rp. Pulv. Doveri; Sacch. albi $\bar{a}\bar{a}$. 3'00; Mfp. div. in dos XII. DS. 3 proszki dziennie.

Rp. Extr. hyosc. 0'15; Aq. dest. 70'000; Syr. simpl. 20'000. S. Co 2 godziny łyżeczkę.

Rp. Codeini phosp. Knoll. 0'40—0'60; Aq. destill. ad 200. DS. Co 2 godziny łyżkę.

Rp. Natri bicarbon. 5'00; Terpin hydrat. 1'00; Codein mur. 0'20; M. fd. div. in dos XII.

Rp. Peronin 0'2; Sacch. 0'25 t. d. XII; S. 3 pr. dziennie.

Rp. Dionin 0'2; Aq. lauroceras. 10'0. S. 3 razy dziennie 15—20 kropli.

Rp. Codeini phosph. 0'02—0'03; Natri bicarbon. 0'50. M. f. pulv. S. Co 3 godziny proszek.

B) chronica. Dobre powietrze, unikanie dymu, kurzu, pożywna dyeta, środki lekko przeczyszczające. Jeżeli można, wysłać na zimę do cieplejszego klimatu, w lecie pobyt na wsi lub zdrojowiskach. Inhalacye soli (20/0) z dodatkiem Ol. terpent. Ol. pini pumilionis. Picie wód Szczawnickich, Krościeńskich, alk. sztuczna Rzacy i Chm. Expectorantia: Ipeka, Apomorphin. Przy Bronchoblenorrhoea: Ol. Terebinth. dziennie dwa razy po 5—10 kropli z mlekiem, lub w kapsułkach. W razie duszności bańki suche, synapizmy.

c) foedita.

Rp. Ol. eucalypti 15'00; Ol. lavandul. gtts. X. S. Po 10 kropli do inhalacyi.

Rp. Tinct. eucalypti alcoh. 2'00; Syr. codeini 20'00; Syr. tolu 20'00; Aq. 80'00. DS. Po łyżeczce wyżyć w ciągu 24 godzin.

Rp. Myrtoli 1'50; Exhibe in caps. gelat. N. 10. Rano i wieczór kapsułkę.

Rp. Tinct. benzoës 1'00; Mixt. gummos. 120'00. DS. Jak wyżej.

Rp. Terpin hydrat. 3'0; Pulv. et rad. liquir. $\bar{a}\bar{a}$. q. s. ut f. pill. Nr. X. S. 3 pigułki dziennie.

U dzieci:

Dzieciom z nieżytem oskrzeli bez gorączki, woda Szczawnicka, Krościeńska lub sztuczna Rzacy i Chmurs. z mlekiem.

Rp. Inf. ipecacae e 0'10 ad 80'00; Ammon. muriat 1'00; Aq. lauroc. gtts. X.; Syrup simpl. 15'00. DS. Co godzinę łyżeczkę.

Rp. Kali vel. Natri jodati 0'50—1'0; Aq. destillat 80'0; Syr. Senegae 20'0. DS. Co godzinę łyżeczkę. Nieżyty oskrz. na tle krzywicy lub zołzów, wyma-

gają użycia tranu, żelaza i jodu. Inhalacya z wód alkalicznych, pobyt w miejscach lesistych i górzystych, lub nad morzem. Dyeta posilna, łatwo strawna (mleko, jaja, mięso siekane). W razie n. o. z gorączką, trzymać dziecko w pokoju, środki wykrztuśne.

Jeżeli wyksztuszanie skąpe *Natr. jodat.* 0'50:100'00. Wdychiwanie pary. Jeżeli wydzielina obfita, dodać do Senegi *Liquor amm. anis.* W razie ustania wyksztuszania, sinicy: flor. benzoës, wino mocne, cognac, ciepłe kąpiele z zimnemi polewaniami. Dzieci małe często nosić na rękę.

Rp. *Terpini hydrat* 1'0; *Spirit. vin. rectific.* 10'0; *Aq. destill.* 100'0; *Syr. aurant.* 15'0. *MDS.* Co 2 g. łyżeczkę.

Carcinoma oesophagi. Rak przełyku. Rozszerzanie cieśni zgłębnikami, aby chory mógł przełykać. W razie bólu przy przełykaniu (*dysphagia*) kołaczyki:

Rp. *Cocain. mur.* 0'005; *Menthol* 0'01; *Sacch. q. s. ut. f. pastilla.* S. W razie potrzeby wziąć kołaczyk. Lepsza *eukaina*, ponieważ nie spowodza zatrucia. Dawka może być w kołaczyku 0'01 i więcej.

Carcinoma uteri. Rak macicy. Wycięcie macicy tylko całkowite, drogą pochwy, w razie nieznacznego nacieku w tkankach około macicznych, wycięcie macicy drogą laparatomii lub cięcia poza otrzewnowego. Wstrzykiwania odrażające:

Rp. *Kali hypermang.* 10'00; *Aq. dest.* 150'00. *DS.* Pół łyżki na litr wody.

Rp. *Acidi carbol.* 20'00—30'00; *Aq. dest.* 1000'00. *DS.* Do wstrzykiwań.

Gdy plamy krwawe:

Rp. *Ac. pyrolign. crudi* 300'00. *DS.* 3—5 łyżek na litr wody do wstrzykiwań.

Rp. *Creolini* 20'00. *DS.* 10 kropli na litr wody.

Rp. *Ferri sesquichl. sol.* 10'00; *Aq. dest.* 100'00. S. Zewnętrznie.

Nadto gdy to nie wystarcza, zakładanie gazy jodoformowej do pochwy.

W przypadkach krwotoków spokój i tamponowanie pochwy. W przypadkach nienadających się do operacyi wykrobanie nowotworu i przyżeganie *cum ferro candente*, termokauterem i t. d. albo środkami chemicznymi silnie żrącymi. W nowszych czasach polecają 18—20% roztwór wodny ferropyriny (*Knoll*), którym napawa się małe tampony i przykładają na miejsca krwawiące; ferropyriny można użyć w tym celu w proszku na tamponach. Podawać wewnątrz:

Rp. *Natr. chlorici* 20'0; *Syr. flor. Naphae* 30'0; *Aq. dest.* 100'0. S. 2—6 łyżek w przeciągu 24 godz., a równocześnie stosować miejscowo:

Rp. Natr. chlorici; Bismut. subnitr. $\bar{a}\bar{a}$ 10'0;
Jodoformi 4'0. S. Stosować do tamponów lub:

Rp. Jodoformi 1'0; Natri chlorici; Glycerini $\bar{a}\bar{a}$.
20'0. S. Na tamponie założyć.

Wreszcie przeciw bólowi należy podawać środki kojące: morfinę, opium i t. d.

Carcinoma ventriculi. Rak żołądka. W przypadkach nienadających się do zabiegu operacyjnego leczenie jest przypadkowe, zmierzające do podtrzymania sił chorego za pomocą lekko strawnej a pożywnej dyety, oraz usuwania bólów przez podawanie środków odurzających. Prócz tego wskazane jest podawanie kwasu solnego, którego żołądek rakowato zwyrodniały najczęściej nie wydziela, oraz podawanie przetworów Condurango, przeciw objawom dyspeptycznym. W razie towarzyszącego rozszerzenia żołądka lub krwotoków vide: Dilatio ventriculi, Haematemesis.

Rp. Acid. hydrochlor. 3'00; Pepsini german. solub. de Rostock 2'0; Aq. dest. 200'00; Syr. simpl. 15'00.
DS. Po każdym jedzeniu 2 łyżki zażyć.

Rp. Tinc. nuc. vom. Acidi hydrochl. $\bar{a}\bar{a}$ 10'00. DS.
Po każdym jedzeniu 15 kropli w szklance wody.

Rp. Tinct. chinae comp.; — rhei vin $\bar{a}\bar{a}$ 30'00;
Tinc. nuc. vom. 3'00. 3 razy dz. po 15–20 kropli.

Rp. Vini Condurango (fabr. Matula) 100'00. DS.
3 łyżeczki dziennie.

W razie wymiotów:

Rp. Decoct. Condurango e 15'00, ad 180'00; Trae rhei vin. 5'00; Resorcin 2'00; Syr. cortic. aurant. 20'00. S. Co godz. łyżkę.

Rp. Cocaini muriat. 0'20; Aq. dest. 10'00. DS.
W razie wymiotów 10 kropli zażyć.

Rp. Argenti nitr.; Extr. bellad. $\bar{a}\bar{a}$ 0.50; Aq. dest. 30'00. DS. 3 razy dnia 10–15 kropli.

Rp. Antinosin 1'00; Dent. tal. dos. Nr. XX.
S. Proszek rozpuszcz. w litrze wody do płókania żołądka.

W razie bólów podaw. na wewnątrz morf. lub codeinę.

Rp. Codeini mur. 0'10–0'15; Sacch. albi 2'0; Mfp. div. in. dos. Nr. V. S. W razie bólów 2 proszki.

Cardialgia. Ból żołądka. Znaleść przyczynę bólu i takową starać się usunąć. Najczęściej: ulcus ventriculi, carcinoma ventriculi, chlorosis, i u hysteryczek, neurasteników lub jako »crises gastriques«.

W razie napadu ciepły okład na żołądek, synapizmy na dołek podsercowy, wstrzyknięcie podskórne morfiny, narcotica jak opium z bismuth. subnitricum. Cocaina 0'01–0'02 p. dosi, Belladona, Chloroform i t. p. Nadto uregulowanie dyety.

Rp. Tinc. opii croc. 5'00; Tinct. castor. 10'00;
Tinct. valer. aeth. 15'00. MDS. 3 razy dz. po 10 kr.

Rp. Morphii mur. 0'005; Bismut. subnitr. 0'30; Mfp. dtur. tal. dos. 10. W razie bólu co 2 godz. proszek.

Rp. Extr. strychni 0'01; Bismut. subnitr.; Magnes. carb. $\bar{a}\bar{a}$ 0'20; Sacc. 0'10; Mfp. tal. dos. X. S. Co 2 godz. proszek.

Rp. Tinct. strychni; Tinc. opii $\bar{a}\bar{a}$ 5'00. DS. Co 2 godz. po 10 kropli w razie silnego bólu.

Rp. Cocain mur. 0'15; Aq. dest. 120'00; Syr. aurant 30'00. S. Co $\frac{1}{4}$ godz. łyżeczkę.

Rp. Chloroformii 1'00; Aq. dest. 150'00. MDS. Co 1—2 godz. łyżkę.

Rp. Bismut. valerian. Bismut. subnitr. $\bar{a}\bar{a}$ 2'00; Extr. nuc. vom 0'50; Extr. gentian. q. s. f. pill. 50; Obduc. gelat. S. 2—3 pig. na czczy żołądek.

Rp. Zinci ferro hydryocyan. 0'20; Sacch. albi 4'00; Mfp. div. in dos. Nr. XII. S. Co 2 godz. proszek.

Prąd stały z anodą na dołek podsercowy, lub też przerywany na 6 do 10 minut. Przeplókiwanie żołądka ciepłą wodą na 38—40°.

Cardiopalmus, Hyperkinesis cordis. Kołatanie serca. Usunięcie przyczyny; najczęściej stan ogólnie nerwowy, osłabienie lub zatrucie kawą, herbatą i tytoniem. Nadto leczenie blednicy, niedokrewności i ogólnego osłabienia zwykłemi środkami. Podczas napadu przy silnej akcji serca, okład lodowy na serce, spokój, wstrzymanie się od wszelkich podniecających napojów, natomiast przy słabem działaniu serca, podać wino, cognac, czarną kawę, herbatę, nadto:

Rp. Coffein citrici 0'10; Dtur. tal. dos. Nr. 4. S. W razie napadu 1 proszek.

Rp. Tinct. Veratri viridi. 1'00; Aq. dest. 80'00; Syr. cort. aur. 20'00. S. 3 łyżki dziennie.

Rp. Sparteini sulph. 0'05; Sacchari 0'30; Mfp. d. tal. dos. tres. S. W razie napadu 1—2 pr.

Rp. Theobromin 0'10; Sacchari 0'20; Mfp. dtur. tal. dos. X. S. 4—5 pr. dziennie.

Rp. Trae strophanti; Trae digital. $\bar{a}\bar{a}$ 5'00. DS. Podczas napadu 10—15 kropli raz lub dwa dzien.

Rp. Tinc. convall. maj. 8'00; Tr. digital. 2'00. DS. 3 razy dziennie po 10 kropli.

Rp. Trochisci nitroglyc. 0'001. S. W napadzie pół pastylki lub całą zażyć.

Rp. Nitroglycerin 0'20; Spiri vini 20'00. MDS. Zacząć od 1—10 kropli 3 razy dz. (w łyżce wody).

Osobom zaś nerwowym:

Rp. Kali bromat. 1—2 gram. na raz lub też:

Rp. Trae Valerian. aeth. 10'00. S. 3 r. dz. po 15—20 kr. Podskórne wstrzyk. morfiny $\frac{1}{2}$ —1 ctgr.

Rp. Morphii muriat. 0'10; Aq. sterilis.; Glycerini $\bar{a}\bar{a}$ 5'0. DS. Do wstrzykiwań.

Catarrhus intestinorum. Nieżyt jelit. *Acutus.*

Wskazane jest leżenie w łóżku, ścisła dyeta, okład ciepły na brzuch i środek przeczyszczający, najlepiej ol. ricini. W razie silnych bólów, leki odurzające; gdyby po kilku wypróżnieniach po środku czyszczącym biegunka nie ustąpiła, przetwory makowca, także leki osłaniające i ściągające.

Chronica. Leczenie powinno być przyczyniowe, uważać należy na dyetę, która powinna być lekko strawną, unikać zaziębień (opaska flanelowa na brzuch). Woda karlsbadzka, Kissingen, Wildungen, w razie zaparcia środki lekko czyszczące (Saratica), lewatywy codziennie.

U dzieci łączy się zwykle z objawami ze strony żołądka. Patrz: Gastroenteritis.

Rp. Bismuth subnitr.; Tannin; Resorcin \overline{aa} 0'30; M. f. pulv. T. dos. Nr. XII. S. 3 proszki dziennie (t. zw. Bizmutan).

W razie: tenesmus wstrzyknąć do kiszki stolcowej za pomocą strzykawki Oidmann'a 5 gramów płynu:

Rp. Mur. Morp. 0'3; Atropin. sulph. 0'01; Aq. dest. ad 100'0; lub Extr. opii 1'5; Extr. Bellad. 0'5; aqua dest. ad 100'0.

Rp. Saloli 0'25; Laud. puri 0'02; Mfp. dtur tal. dos. X. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Bismut salicyl. 0'25; Resorcin 0'15; Laud. pur. 0'01; Mfp. tal. dos. VII. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Decoct. rad. salep. 200'00; Laudani puri 0'05; Syr. diacodii 20'00. MDS. Co godz. łyżkę.

Rp. Ichthalbini (Knoll) 0'20—0'50; Dent. tal. dos. Nr. XII. DS. Co 4 godz. proszek.

Rp. Decoct. ligni campech. e 20'00 ad 200'00; Laud. liq. syd. gtt. XX; Syr. cort. aurant. 20'00. S. Co 2 godziny łyżkę.

Rp. Decoct. rad. rathan. e 15'00 ad 150'00; Tinct. laud. simpl. gtt. XX; Syr. cinnamon. 15'00; S. Co 2 godz. łyżkę.

Rp. Tanini puri 1'0; Morphii mur. 0'10; Sacch. albi 5'00; Mfp. div. in dos. Nr. X. S. 3 pr. dziennie.

Rp. Tannoform. 0'30; Dt. d. Nr. XII. S. Co 3 godz. proszek.

Rp. Tannalbini (Knoll) 0'50—1'0; Dent. tal. dos. Nr. XII. S. 4 proszki dziennie.

Rp. Extr. opii 0'02; Tannini 0'10; Naphtalin 0'25; Mfp. d. t. d. XII. DS. 2—3 proszków dziennie.

Rp. Pulv. Doveri 1'00; Extr. colombo; Sacch. albi \overline{aa} . 2'00; Mfp. div. in dos. X. DS. Co 2 godz. proszek.

Rp. Benzonaphthol. 0'25—0'50; Dent. tal. dos. in capsul. amyl. Nr. XX. S. 4 proszki dziennie.

Rp. Tanocol 1'00 k. r. d. Tabl. czekol. z tanakol.

Rp. Honthin. 1'0 T. d. XII. S. 3—6 p. dziennie.

Rp. Tannigen 0'30—0'50; Dent. tal. Nr. X. S. 3 proszki dziennie.

Catarrhus laryngis zob. **Laryngitis**.

Catarrhus pharyngis zob. **Pharyngitis**.

Catarrhus ventriculi acut. Ostro nieżyt żołądka. Jeżeli w żołądku znachodzi się jeszcze treść, która ostro nieżyt wywołała, najstosowniej przepłókać zaraz żołądek, poczem chory powinien 2—3 dni zachować ścisłą dyetę.

Jeżeli aspiratora pod ręką niema, należy podać środek wymiotny.

W razie, gdy przypuszczamy, że treści w żołądku niema, wystarcza ścisła dyeta, i tylko gdy cierpieniu temu żołądka towarzyszy ta sama zmiana w jelitach, wskazane są środki przeczyszczające. Zresztą leczenie jest czysto przypadkowe, gdy silne bóle w okolicy żołądka występują, wskazane są środki odurzające, w razie pragnienia: kwaski, woda sodowa, giesshüblerska etc.

Wobec nadmiernego pobudzenia do wymiotów przy żołądku czczym połykanie kawałeczków lodu i Kokaina 0·005—0·01 na raz.

Jako środki wymiotne:

Rp. Pulv. rad. Ipecac. 2·00; Div. in dos. VI. DS. Co kwadrans proszek aż do wystap. wymiot.

Rp. Tartari stibiati 0·05; Aqu. dest. 50·00. S. W 2-ch porcyach w przeciagu 10 minut zażyć.

Rp. Natr. bicarb. 2·0; Tinct. nucis vom gtts. decem Aq. destill 150·00; Syr. cortic. aurant. 15·00. S. Co godz. łyżkę.

Rp. Resorcín. resublim; Acidi muriat. dil. āā. 2·00; Aq. destill. 200·00; Syr. cort. aurant. 20·00. S. Co 2 godz. łyżkę.

Rp. Apomorphini mur. 0·10; Aqu. dest. 10·00. DS. Podskórnje $\frac{1}{2}$ —1 strzyk.

Przeciw wymiotom:

Rp. Cocain. mur. 0·10; Aqu. destill. 10·00. DS. 10—15 kropli na raz zażyć.

Przeciw bólom:

Rp. Morph. mur. 0·10; Aq. dest. 10·00. S. 10 kr. na raz zażyć.

Catarrhus ventriculi chronicus. Przewlekły nieżyt żołądka. 1. *Acidus*.

Dyeta pożywna lekko strawna z wykluczeniem potraw korzennych, kwaśnych, tłuszców, jarzyn, napoi wysokowych i CO₂ zawierających.— Wewnętrznie wskazane są środki alkaliczne, woda karlsbadzka, Vichy lub szczawnica (źródło Magdaleny), przepłókiwania żołądka rozczynami soli alkalicznych, lub wodą karlsbadzką; w razie silniejszych bólów w dołku podsercowym środki odurzające.

2. *Mucosus*.

Wskazana jest dyeta lekko drażniąca, a więc nieco napojów wysokowych, kwasków organicznych, mięso

w możliwym rozdrobnieniu, najlepiej więc siekane. Wewnętrznie środki gorzkie i kwas solny. Masaż żołądka, elektryzowanie.

Ad. 1.

Rp. Sal. therm. Carolin factic. lub originalis 100'00. S. Na czczo łyżeczkę w $\frac{1}{2}$ szklanki ciepłej wody.

Rp. Natrii biboracici; Magn. ustae.; Strontii bromati $\bar{a}\bar{a}$. 5'00. MD. 3 razy na dzień na koniec noża — $\frac{1}{2}$ łyżeczki w godzinę po jedzeniu.

Rp. Natri bicar. 15'00; Magn. carbon. 10'00; Calcar. carbon. 5'00; MD. in scatula. S. 3 razy dnia na koniec noża zażyć.

W razie bólów:

Rp. Morph. mur. 0'10; Aquae laurocer. 10'00; MD. in vitr. nigro. S. W razie bólu 10 kr. zażyć.

Rp. Tinct. nuc. vom. gtts. X; Aq. lauroceras 10'0. S. Dwa razy dnia po 10 kropli.

Rp. Codeini 0'02; Natri bicarb. 0'25; Magnes. carb. 0'10; Mfp. d. tal. dos. X. S. W razie bólu 2—3 proszki dziennie.

U alkoholików aqua chlori:

Rp. Aquae chlori 8'00; Decoct. Altheae 165'00. MDS. Co 2 godziny łyżkę zażyć.

Ad. 2.

Rp. Trae amar. Acid. hydrochl. dil. $\bar{a}\bar{a}$. 15'00. MDS. Po każdym jedzeniu 20 kr. w łyżce wody zażyć.

Rp. Acid. hydrochl. 3'00; Pepsin solub. german. de Rostock 2'00; Aqu. dest. 200'00; Syr. cort. aurant. 15'00. MDS. Po każdym jedzeniu 2 łyżki zażyć.

Rp. Stomachinum fabr. Matula.

Catarrhus vesicae zob. **Cystitis**.

Cephalalgia zob. **Hemicrania**.

Chlorosis. Blednica. Usunąć przyczynę blednicy. Pożywienie posilne, ale łatwo strawne. Świeże powietrze, w ciężkich przypadkach łóżko — w lżejszych mierny ale systematyczny ruch. Należyte wysypianie się, nieprzeciążanie chorych ani fizyczną ani umysłową pracą. Szczególną mieć uwagę na zaburzenia żołądkowe, i jeżeli takowe istnieją, przedewszystkiem starać się je usunąć.

Rp. Tinct. malat. ferri; Tinct. Chin. comp. $\bar{a}\bar{a}$. 25'00. DS. 2—3 łyżeczki na dzień.

Rp. Ferri sulfur. pur.; Kalii carbon. $\bar{a}\bar{a}$. 15'00; Gi. Tragacanth. q. s. ut. f. pill. Nr. 120; Consp. pulv. cinam. DS. 3 r. na dzień 2—5 pig. (Blanda pigułki).

Rp. Ferri sulfur. sicc. 6'00; Kali carbon. sic. 5'00; P. altheae 3'00; Mel. crud. q. s. ut. f. pill. N. 120. DS. 3 r. na dzień po 2 pig. (Pigułki Valetta).

Rp. Aloes 2'00; Ferri pulv. 8'00; Pulv. rad. rhei 4'00; Mucil. gum. ar. q. s. f. pill. pond. 0'10; Consp. cinnamon. S. 2 razy dzien, po 3 pig. (przy równoczesnem zaparciu).

Rp. Ferropyrin (Knoll) 0'60; Acidi mur. dil. gutt. quinque, Pepsini german. 5'0; Aq. destill. ad 200'0. MDS. Po jedzeniu łyżkę.

Rp. Ferri carbon. sacch.; Sacch. albi; Natri bicarb. *āā*. 3'00; Myrrh. pulv.; Pulv. rad. rhei *āā*. 2'00; Mfp. D. ad sculat. S. 2—3 razy na dzień na koniec noża.

Rp. Ferri oxydati sacch. 10'00; Pulv. rad. gent. 5'00; Extr. gent. q. s. ut. f. pil. Nr. 100. S. 3 razy po 2 pigułki, następnie 3—4 do 10.

Rp. Ferri reducti 10'00; Magn. carbon.; Succ. liquir. *āā*. 4'00; Glyc. q. s. ut. f. pil. Nr. 100. S. 3 razy po 2—4 pig. po jedzeniu.

Rp. Ferri oxydati dialys. 5'00; Sol. arsen. Fowler. 1'50; Aqu. dest. 150'00; Aqu. menth. pip.; Syr. cinnam. *āā*. 15'00. DS. 3 r. na dzień po łyżce stołow.

Rp. Ferri arsenic. cum Ammon. citrico 0'02; Sacch. albi 3'00; Mfp. Div. in dos. N. XX. S. 2 pr. na dzień.

Rp. Ferri lactici; Sacch. albi; Elaeosacch. cinnamom. *āā*. 0'20; Mfp. D. tal. dos. N. XX. in charta cerat. S. 3 razy dziennie proszek po jedzeniu.

Rp. Pyrophosph. ferri et sodae, Sacch. albi *āā*. 0'20; Mfp. D. tal. dos. N. XX. S. 3—4 pr. na dzień.

Rp. Liqu. ferri album. 50'00. DS. 3 razy po łyżeczce od kawy.

Rp. Chinini ferro-citrici 1'00, solve in Vin. malagens. 200'00. DS. 3—4 łyżek dziennie.

Rp. Haemol pulverati 25'00; Da in scatula. S. 3 razy dnia na koniec noża zażyć.

Rp. Ferratin. 1'00; Dent. tal. dos. Nr. XV. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Haemogallol. pulv. 25'00; Do. in scatula. S. 3 razy dnia na koniec noża zażyć.

Rp. Ferropyrin. 1'00; Aq. destill. 150'000; Syr. cort. aurant. 30'00. S. 3 łyżki dziennie.

Rp. Pastill. Trifferini fabr. Knoll à 0'30 scal. orig. S. 3 pastylki dziennie wśród jedzenia.

Liquor mangan. ferri peptonati wyrob. Matuli w Podgórzu, pastilli jodo-ferrati comp. Jahr.

Obok tego przetwory arsenikalne jak Sol. Fowlera, woda Gubera, Levico, Roncegno 2—3 łyżeczki na dzień, następnie i 2—3 łyżek. Wody żelaziste: Zegiestów, Krynica, Francensbad i t. d. kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

Cholelithiasis. Kamica żółciowa. Uregulować dyetę, uważać pilnie na stolce, unikać siedzącego trybu życia, natomiast używać dużo ruchu, unikać uciskania wątroby przez gorset, paski i t. d.

Podczas napadu okład ciepły na okolicę wątroby, oliwa w ilości 100—150 grm. naraz. Ciepłe kąpiele,

wstrzykiwanie morfiny samej lub z atropiną, czopki odbytnicowe — a w bardzo silnych bólach nawet nar-koza chloroformowa. — W przypadkach gdzie napady kolki bardzo często się powtarzają, zabieg operacyjny — zresztą wskazanie do operacji bardzo trudne.

Rp. Aether. sulph. 15'00; Ol. Terebinth. rectific. 10'00. DS. 3 r. dnia po 15—20 kr. (Środek Duranda).

Rp. Extr. belladon. 0'10; Aqu. dest. 20'00. MDS. W napadzie co $\frac{1}{2}$ godz. po 15 kropli.

Rp. Morph. mur. 0'10; Aqu. dest.; Glycerini $\bar{a}\bar{a}$. 5'00. MDS. Do podskórnych wstrzyk., w jednej strzykawce 0'01 morfiny.

Rp. Natri salicyl. 0'50; Extr. bellad. 0'01; Mfp. dtur. tal. dos. N. 10. S. 4 pr. dz. w wodzie sodow.

Polecają też glicerynę w dawce 20—30 grm. w razie napadu. W dawce 5—15 grm. w wodzie alkalicznej kilka razy dziennie dla zabezp. od napadu, lub:

Rp. Ol. olivar. optim. 200'00; Cognaci 20'00; Vitelli ov. N. 2; Menthol. 0'20. DS. W przeciągu godziny na 2 razy użyć.

Rp. Eunatrol (natr. oleinic.) 5'0; Glycerini terr. silic. $\bar{a}\bar{a}$. q. s. uf. pill. XX. S. 3—4 pigułek dzien.

Rp. Natri salicyl. 1'00; Natri sulphur. 3'00—5'00; Mfp. Dtal. dos. N. XV. S. 2—3 proszki dziennie stosownie do ilości wypróżnień.

Cholera. W pierwszym okresie choroby środki przeczyszczające, a z tych przede wszystkim kalomel. Po kilku obfitych wypróżnieniach, wywołanych środkiem czyszczącym, przetwory makowca. W przypadku, gdzie są już wymioty, rozwolnienie, odrazu przejść do przetworów makowca, chorego ułożyć w łóżku, okłady rozgrzewające, środki podniecające: herbata z rumem, cognakiem itp. Ciepłe kąpiele. Następnie przejść do enteroklysy według Cantaniego: w wodzie przegotowanej o ciepłocie 30—40° C. rozpuszcza się tanninę 10:1000 lub też Acid. salicyl. 10/0; lejkiem Hegara wlewa się do kiszek 1—2 litrów z wysokości 2 metrów. Powtarzać co kilka godzin. Jeżeli pomimo tego następuje zapad (stad. algidum) stosować hypodermoklykę z wody destylowanej i sterylizowanej (wodę trzeba w tym celu $\frac{1}{2}$ godz. gotować w kółbce zatkanej korkiem z waty). Na 2 litry takiej wody daje się 6'00 Natri carbon. i 8'00 Natri chlorati ogrzewa do 40° C. (zachować ostrożność co do antiseptyki). Zresztą leczenie przypadkowe, rozcieranie wysokiemi, spirit, camphoratus; przeciw kurczom inj. morfiny (1—2 ctgr.) w razie wymiotów: wino szampańskie, zimna woda sodowa kwaśna, kawa czarna, polykanie lodu, kokaina. W razie zapadu środki podniecające, inj. podsk. eteru, ol. camph. Desinfekcyja stolców i wymiocin.

Rp. Trae chinae comp. 25'00; Chinin. mur. 1'00; Acid. mur. 1'50; Trae Opil 6'00; Trae Valer. aeth.

12'00; Trae nuc. vom. 1'50; Ol. menth. 1'50. DS. Co godz. 15 kropli.

Rp. Cocain mur. 0'30; Aqu. dest. 130'00; Creosoti gtt. 15; Acid. mur. dil. gtt. 50; Syr. simpl. 30'00. S. Co 2 godz. łyżkę.

Rp. Acid. hydrochl. 2'00; Cocain. mur. 0'12; Tinct. Opii 2'00; Aq. dest. 170'00; Syr. simpl. 30'00. DS. Co godz. łyżeczkę, dopóki wymioty trwają, później rzadziej (lekarstwo trzymać w lodzie).

Rp. Tinct. cinnamom. 20'00; Tinct. opii croc. 0'75; Bismut. subn. 5'00; Mixt. gumm. 100'00; S. Co godz. łyżkę (w biegunkach początk.).

Rp. Tinct. opii croc. 6'00; Vini ipecac. 4'00; Trae valerian. aeth. 12'00; Ol. menthae pip. 1'00. DS. 15 kr. w herbacie z mięty.

Rp. Camphor. 1'00; Aether. acet. 15'00; Trae opii 3'00. DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. 10 kropli.

Dujardin Beaumetz radzi: 1) aby chorego ogrzać napojami, kawą, herbatą z rumem itp. 2) przeciw bieguncce:

Rp. Moschi opt. 0'30; Ol. menthae gtt. 1; Aether sulf. 15.0. S. Co godzinę 10 kropli.

Rp. Acidi lactici 10'00; Syr. simpl. 20'00; Tinct. cort. aur. 2'00.

Całość wlać do litra wody i co kwadrans 3 łyżki podać. Przeciw wymiotom pigułki lodowe lub:

Rp. Tinct. valerian. 5'00; Laudan. sydenham. 1'00; Liquor Hoffmann 5'00; Ol. menth. pip. gtt. V. MDS. Po 25 kropli, ile razy przychodzi skłonność do wymiotów lub parcia na stolec.

Cholera infantum. Choleryna dziecięca, zob. Gastroenter. acuta i acutiss.

Chorda. 1) Dyeta mleczna. 2) Uregulowanie stolca. 3) Zimne okłady i kąpiele systematycznie przeprowadzane, gdyż chwilowo użyte, działają raczej rozdrażniająco; 4) *antiaphrodisiaca*:

Rp. Camphor. rasae 0'20; Mixt. gummosae 100'00. MDS. Co 2 godz. łyżkę.

Rp. Lupulini puri 0'10; Camphor. rasae 0'01; Extr. Lupuli q. s. ut. f. pill. dtr. tal. dos. N. XII. DS. 6 pigulek dzień. Gdy to bezskuteczne, iniekcya morfiny (0'01—0'02).

Rp. Lupulini puri 0'10; Sacchari 0'30; Mfp. dtur. tal. dos. N. 10. DS. 3 proszki dziennie.

Rp. Extr. opii. aq. 0'10; Bytyri Cacao q. s. ut. f. supp. Nr. 5. S. Wieczór 1—2 czopki.

Rp. Amylenhydrat 5'0; Aquae flor. aur. 50'0; Syr. cort. aur. 30'0. S. Na noc zażyć połowę.

Chorea minor. Płásawica, taniec św. Gwinnona — św. Wita. Dobre odżywianie, pobyt na świeżem powietrzu, gimnastyka lecznicza, chociaż w cięższych przypadkach w samym początku, lepiej dzieci trzymać

w łóżku. Zabronić nauki, dozwoić dużo spać. Jeżeli na tle niedokrewności, blednicy, reumatyzmu podawać przetwory chininy i żelaza, w ostatnim przypadku, przetwory salicylu. Kąpiele letnie, siarczane, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa) (24—26°); prąd stały. Rozpylanie eteru na kręgosłup. W cięższych przypadkach w celu uspokojenia można podawać chloral, urethan, sulfonal, aby wywołać dłuższy sen, wreszcie w bardzo ciężkich przypadkach stosowano punkcya lumbalną z korzystnym wynikiem.

Rp. Solut arsen. Fowleri; Trae ferri pomati $\bar{a}\bar{a}$. 5'00. DS. 3 r. dnia po 2—3 kropli po jedzeniu.

Wody arsenowe: Gubera 2—3 łyżek, Levico i t. d.

Rp. Antipirini 0'50; DS. Nr. XX. S. 3 proszki dziennie używać.

Rp. Chloral. hydrat, 4'00; Natri bromati 2'00; Aqu. dest.; Syr. aurant. $\bar{a}\bar{a}$. 25'00. MDS. 3 r. dz. łyżeczkę.

Rp. Natri bromati 0'20; Chinini ferrocitrici 0'10; Sacch. 0'20; Mfp. Dtur. tal. dos. Nr. XV. DS. 3 proszki dziennie.

Rp. Syr. valerian. bromat. comp. Jahr.

Rp. Sulfonali 0'25—0'50; Dtur. tal. dos. Nr. V. S. Na noc proszek.

Rp. Zinci valerian. 0'50; Sacch. alb. 2'0; M. f. p. div. in pp. V. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Flor. zinci 0'50; Pulv. valerian. 0'25; Pulv. gum. 10'0; Mfp. Div. pp. Nr. XXX. S. 3 pr. dzien.

Rp. Ferri carbon. sacch. 2'0; Oxyd. zinci 1'0; Sacch. alb. 10'0. Mfp. S. 3 r. dnia na koniec noża.

Rp. Exalgin 1'00; Solve in spir. menth. pip. 5'00; Aquae tiliae 120'00; Syrup. aurant. 30'00. MDS. 3 razy dziennie łyżeczkę.

Rp. Physostigm. sulf. 0'01; Aquae destill. 10'0. S. Wstrzykiwać początkowo $\frac{1}{2}$ strzykawki, później 1—2 strzyk.

Cirrhosis hepatis. Marskość wątroby. Leczenie polega na podawaniu środków lekko czyszczących, najlepiej solnych, uregulowanie diety, z której napoje wyskokowe wykluczyć należy, polecając też ścisłą dietę mleczną; jeżeli chory przebył kilę, to należy zastosować wcierki szaruchy, a potem kal. jodatum.

Przeciw nagromadzeniu się płynu w jamie brzusznej, środki moczące, gdy te nie są dostateczne i wobec indicatio vitalis, nakłóćie powłok brzusznych i wypuszczenie płynu.

Rp. Theobromini natrosalicyl. (vel Diuretin) 0'50; D. tal. dos. N. XV. DS. 5 proszków dziennie.

Rp. Calomelanos 0'10; Sacch. albi 0'30; Mfp. Dtur. tal. dos. N. XV. DS. 5 proszków dzien. Przyczem jednak należy zwrócić baczną uwagę na dżiasła.

Rp. Agurin 0·5 d. t. d. XII. S. 6 proszków dzien.

Rp. Agurin 6·0 Aq. menth. pip. 200·0. S. w ciągu 2 dni wyżyć.

Rp. Inf. fol. Digit. 1·00:200; Liqu. kali acet. 20·00; Trae cort. aurant. 25·00; MDS. Co godz. łyżkę.

Rp. Inf. juniperi 15·00:200·00; Syr. simpl. 15·00. DS. Co godz. łyżkę.

Rp. Kali jodati 10·00; Aq. dest. 200·00. MDS. 2 łyżki dziennie.

Colica flatulenta. Morzysko. Najczęściej przyczyną niestrawności i kolki jest za częste podawanie piersi i uspakajanie dziecka piersią. Polecieć regularne karmienie co 3 godz. w dzień i 2 razy w ciągu nocy.

W napadzie: wilgotne ciepłe okłady na brzuch, smarowanie ciepłą oliwą, lub maściami aromatycznymi. Wprowadzić do kiszki stolcowej kateter (powyżej sphincter internus). Lewatywy z ciepłej wody z oliwą. Rumianek lub herbata z mięty, łyżeczkami.

Rp. Calomel. 0·01—0·03; Sacchari 0·20; Mfp. dtur. tal. dos. Nr. V. S. Co godz. proszek.

Rp. Natri benzoici 0·20; Aqu. dest. Aqu. foenicul. āā. 30·00; Trae laudani gtts. duas.; Syrup. simpl. 15·00. DS. Co godzinę łyżeczkę.

Rp. Chloral. hydrat. v. Urethan 0·50; Aqu. dest. 80·00; Mucilag. gum. arab. 20·00. MDS. Na 2 lewatywy w razie bólesci lub drgawek.

Colica menstrualis vide Dysmenorrhea.

Combustio. Oparzenie. Gdy tylko rumień istnieje wystarcza puder i okład.

Rp. Liquor. alumin. acet. 300·0. S. Do okładów.

Rp. Aqua calcis; Ol. lini āā 75·0. S. Zewnętrznie.

Rp. Airol. 2·0; Vaseline. flav. 20. M. f. ung. S. Maść. Podobnie Dermatol, Jodoform, Nosophen, Europhen.

Rp. Acid. borici 4·50; Mag. bismuth. 9·0; Lanoln. Libreichi, Vaseline. fl. āā 45·0. M. f. ung. S. Maść.

Rp. Cocain. muriat. 0·20; Aq. dest. 10·00. S. do pendzlowania.

Rp. Ichtyol. 4·0; Aq. calcis. 30·0; Lanol. Libreichi; Vaseline. fl. āā. 15·0. M. f. ung. S. Maść.

Rp. Ichtyol. 5·0; Naftalan 50·0. S. Zewnętrznie.

Rp. Bismuthi subnitrici 9·0; Acidi borici 5·0; Naftalan 80·0. M. f. ung. S. Maść.

Condylomata accuminata. Kłykciny stożkowate. Jeżeli na wąskiej szypule najlepiej odciać nożyczkami, gdy liczne, odpalić żegadłem Paquelin'a. Jeżeli drobne i w mniejszej ilości lub na żółędzi, łecznicze i t. p. smarować trzy razy dnia c. tinct. jodi lub tinct. ferri sesquichlorati, zasypywać:

Rp. Pulv. frond. sabin; Alumin. crudi āā 10·0; Cupr. sulf. 5·0. S. Puder, albo wypalić: Acid.

bichloroacet. concentr. p.

Condylomata lata zob. **Syphilis**.

Congelatio. Odmrożenie. W świeżem odmrożeniu nacieranie śniegiem w chłodnem miejscu aż do ogrzania i przeniesienie następnie do ciepłego pokoju, później pendzlowanie nalewką jodową.

Rp. Naftalani 50'o. S. Zewnętrznie.

Gdy istnieją pęcherze, usunąć je i maść:

Rp. Hydr. praecipit. alb. 2'o; Vaseline. flav. 30'o. M. f. ung. S. Maść.

Rp. Argent. nitr. 1'00; Vaseline. flav. 10'o; Bals. peruv. 1'o. M. f. ung. S. Maść. Jeżeli skóra obrzękła:

Rp. Ammon. sulfoicht.; Resorcin. alb.; Tannin. $\bar{a}\bar{a}$ 1'o; Aqu. dest. 5'o S. Do pendzlowania.

Rp. Resorcin. resub. 2'o; Mucil. gummi arab.; Aqu. dest. $\bar{a}\bar{a}$ 5'o; Talc. pulv. 1'o. S. Do pendzlow.

Przy zgorzeli opatrunek przeciwnilny, usunięcie części zgorzelinowych, okłady z wody gulardowej lub Liqu. alum. ac. Gdy sprawa dawniejsza, starać się usunąć zastój żylny przez wywołanie przekrwienia czynnego, i obmywanie wyskokiem, kąpiele ciepłe z wody octowej lub ciepłe kąpiele piaskowe — obok tego:

Rp. Ichthalbin (v. Ichtyol) 20'o; Glycerin. p.; Collodi p. $\bar{a}\bar{a}$ 10'o. S. Co wieczór zapendzlować.

Rp. Tct. jodi; Tct. gallar. $\bar{a}\bar{a}$ 10'o; Collodi p. 50'o. S. Do pendzlow. po podniesieniu kończyny ku górze.

Rp. Calcar. chlor. 1'o; Ung. paraffin. 9'o; M. f. ung. subtil. d. in vitro fusco. S. Na noc wcierać przez 5 minut (nos, palce).

Coryza. Nieżyt nosa, sapka. Siąkanie bez nieżyty wskutek oddechania zimnem powietrzem, silnego światła i t. p. usuwa ucisk palcami nozdrzy.

Siąkanie i nieżyt usuwają: Olejek terpentynowy, 2—5% roztwór wyskokowy mentolu, świeża tra jodi wzięwane. Dalej wdmuchiwanie do nozdrzy proszków rozmaitych za pomocą »autoninsufflatora« (po prostu dwie rurki szklane połączone w środku rurką gumową):

Rp. Camphorae; Ac. tannic. $\bar{a}\bar{a}$. 2'o; Mf. p. subtiliss. S. Proszek do nosa.

Rp. Cocain. mur. 0'2; Menthol. 0'1; Sacch. lact. 30'o. Mf. p. subtiliss. S. 4—5 razy dziennie wdmuchiwać do nosa.

Do wdmuch. użyć można natrium i zincum sozojodol, renoform. Wewnętrznie: chinin., salicyl., antipyrin., salipyrin.

Croup vide **Laryngitis croup**.

Cystitis. Zapalenie pęcherza mocz. Najczęściej przy sprawie rzeżączkowej.

Jeżeli objawy ostre: spokój, okłady ciepłe na okolice pęcherza i międzykrocze, kąpiele nasiadowe ciepłe, dyeta mleczna, niedrażniąca, bez napojów wyskokowych, uregulowanie stolca.

Przeciw parciu na moc.

Rp. Morph. muriat. 0'01; Extr. bellad. 0'02; But. Cacao 1'50; M. f. supp. d. t. d. Nr. VI. S. 2—3 czopków na dzień.

Rp. Lupulini 0'20; Extr. bellad. 0'01; Extr. Opil aquos 0'005; Sacch. albi 0'30; M. f. pulv. d. t. Nr. XII. S. 3—4 proszki na dzień.

Rp. Mixt. gummos. 500'0; Tinct. laudani spl. gtt. XV; Aqu. laurocer. 10'0. S. Co godz. łyżka. Przy bardzo znacznem parciu wstrzykiwanie morfiny.

Wody alkaliczne (Glesshübler, Bilińska, Salvator) tylko wtedy, gdy mocz wybitnie kwaśny; lepiej dawać do picia napary z ziół.

Rp. Fol. Uvae ursi; Herb. Herniar.; Chenop. Ambrosioides *aa*. 10'0; Div. in dos. N. X. S. porcyę naparzyć w filiżance wody.

Przeciw krwawieniu:

Rp. Liqu. ferr. sequichlor. 2'0; Aqu. dest. 175'0; Syr. cortic. aurant. 25'0. S. Co godzinę łyżka.

Rp. Ergotini Bonjean 1'0; Sacch. alb. 2'0; M. f. pulv. div. in dos. Nr. X. S. 4—6 proszków. dzień.

Rp. Extr. hydrast. fluid.; Vini malagensis *aa* 30'0; Syr. Cinnam. 15'0. S. 1—4 godz. po łyżce.

Rp. Ac. tannic. 0'1; Salol. 0'5; D. t. dos. N. XV. S. Co 2 godz. proszek.

Gdy objawy gwałtowne miną podawać Ac. salicyl. (5—6 proszków po 0'50), Natr. salicyl. (3—4 r. d. po 1'0), Salol. (5—6 r. d. po 0'5), Natr. benzoic. (5—6 r. d. po 0'25), Urotropin (4—6 r. d. po 0'50), Helmitol (3—4 r. d. po 0'50).

W postaci przewlekłej, gdy wykluczono kamień pęcherza, nowotwór lub zwięźenie cewki, podawać jeden z powyższych środków obok leczenia miejscowego t. j. przepłókiwań (za pomocą cewnika) opróżnionego pęcherza płynami:

Rp. 2—4% acid. boric.; $\frac{1}{4}$ —10% argent. nitric. 1—2% argonin; $\frac{1}{4}$ —10% argentamin; $\frac{1}{2}$ —2% protargol; $\frac{1}{2}$ —2% largin; $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ % itrol (argent. citric.) 1:5000 sublimat.

Cewnika użyć można albo miękkiego Nelatona, lub metalow. najlepiej Ultzmann'a. Gdy zaś chory nie znosi większych ilości płynu w pęcherzu, wkraplać za pomocą wkraplacza Ultzmann'a lub Guyon'a płyny zgęszczone:

Rp. 1—5% argent. nitric.; 5—10% argonin; 5—10% protargol; 1—3% itrol, w ilości 20—30 kropli. Gdy znaczny osad, ciągnący się: 5% Natr. chlorat. w obfitej ilości dwa razy dziennie pęcherz przepłókać. W rozpaczliwych przypadkach drenowanie pęcherza. Przy c. tuberculosa obok środków ogólnie przy gróźnicy używanych:

Rp. Creosot. 0'05; Jodoform. 0'01; Natr. arsenic.

0'001; Pulv. benzoic. qu. s. ut. f. pill.; D. tal. pill.
Nr. 50. S. 2 pigułki dwa razy dnia.

Do pęcherza zaś wkraplać:

Rp. Hydrarg. sublimat. corr. 1:5000:3000 S.
30—50 kropli do pęcherza wkraplać.

Rp. Guajacol p. 5'0; Ol. olivar. 100'0. S. 1—2 r.
na dzień po 1—2 ctm.

Rp. Jodoform. 1'0; Ol. olivar. 100'0. S. Jak wyżej.

Rp. Jodoform. 20'0; Glycerin. 10'0; Aqu. dest. 6'0;
Tragacanth. 0'25. S. Łyzeczka na 150 gr. wody
letniej do przestrzykiwania pęcherza, połowę zo-
stawić jak najdłużej.

Delirium tremens pot. zob. **alcoholismus.**

Diabetes insipidus. Moczówka prosta. Po-
żywna dyeta, mierne użycie napojów. Leczenie hydro-
patyczne, pobyt w górach. Kąpiele morskie, przetwory
bromowe.

Rp. Infus. valerian. e 5'00, ad 100'00; Natri bro-
mati 1'00; Syrup. 15'00. MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

Rp. Amylen-hydrat. 1'—; D. in caps. gelatinos.
Nr. XII. S. R. i w. zażywać.

Rp. Codeini phosphor. 0'10; Syr. simpl. 30'00.
MDS. 3 razy dz. łyżeczkę.

Rp. Camphor. monobrom.; Extr. valer. āā. 5'00,
ut f. l. ar. pil. N. 30. S. 2—3 pigułek dziennie.

Diabetes mellitus. Cukrzyca (Moczówka cu-
krowa). Tylko pożywienie złożone z mięsa, jaj i mleka,
ostatnie w małej ilości; tłuszcze korzystne. Dużo ruchu.

Chleba najwyżej 100—150 grm. na dzień, z jarzyn
wolno szpinak, sałatę, zielony groszek i fasolkę, kała-
fiory, szparagi kapustę; z mącznych jedynie trochę ryżu.
Do picia: kawa, herbata osłodzona saccharyną, która
nawet w większych ilościach nie szkodzi, kwaskowate
wina, wódka, cognac, woda sodowa.

Jeżeli przy dyecie mięsnej występują zapady i grozi
choremu coma diabeticum, to podawać wtedy większe
ilości sody, liq. kali acet.; dyeta mieszana.

Z lekarstw najlepiej jeszcze działa woda Karlsbadzka,
potem Vichy, Neuenahr, spore dawki opium do 1'0—2'0
pro die. Do osłodzenia płynów używa się pigułek
z saccharyny.

Rp. Saccharini 3'00; Natri carb. sicc. 2'00;
Manniti 50'00; f. pill. N. 100. S. Pigułkę na 1/2—1
szklanek płynu.

Rp. Acid. lacticum. 5'00—10'00 pro die.

Rp. Acid. carbol. 5'00; Aqu. dest. 150'00; Aqu.
menth. pip. 50'00. DS. 3—4 łyżeczki na dzień.

Rp. Codeini 0'05; Dtal. dos. Nr. XX. S. Na dzień
3—4, lub:

Rp. Opil puri 0'50; Natr. bicarb. 5'00; Mfp. Div.
in dos. Nr. XV. S. 3—4 na dzień.

Rp. Extr. fol. myrtillor 5'00; Extr. et pulv. gent. q. s. f. pil. N. 50. S. Od 3 piguł. dzien. do 10—12.

Rp. Jodoformii, Extr. lactucae sativ. *aa.* 1'00; Cumarin 0'10; M. ut f. pill. N. XX. S. 2—3 pigułki na dzień.

Rp. Pilocarpini mur. 0'10; Aqu. dest. 10'00. DS. Podskórnice $\frac{1}{2}$ —1 strzyk.

Rp. Lith. salicyl. 5'0; Lith. benzoic. 10'0; Succ. et pulv. liquirit. q. s. ut f. pill. N. centum. S. 5—6 pigulek dziennie.

Rp. Natr. salicylic. 10'0; Aq. dest. 200'0. S. 4 łyżeczki, zwłaszcza w bólach.

Rp. Aspirini 1'0; T. d. XII. S. 1—3 pr. dziennie.

Rp. Flor. benzoës; Pulv. gummos. *aa.* 2'0; M. f. p. Div. in dos. N. X. S. Co 3 godz. proszek.

W razie coma diabetic. środki podniecające, wstrzykiwanie eteru, ciepła kąpiel ze zlewaniem głowy zimną wodą. Venesectio, infusye z natr. bicarb. (5'0)

Diathesis urica zob. Arthritis urica.

Dilatatio ventriculi. Rozszerzenie żołądka. Gdy przyczyną cierpienia jest zwężenie odźwiernika bliźnowate, lub nowotworowe, wskazany jest zabieg operacyjny.

Chwilową poprawę osiągnąć można przez systematycznie, dłuższy czas stosowane przepłókiwanie żołądka, raz lub 2 razy dziennie roztworem kwasu borowego lub salicyl. resorcyny, lub w razie oddziaływania kwaśnego roztworem sody, soli lub wody karlsbadzkiej.

W razie bólów wskazane są środki odurzające i to lepiej podskórnice niż wewnętrzne.

W razie, gdy przyczyną cierpienia jest zwiotczenie ścian żołądka, należy przepisać dyetę pożywną, w małych ilościach a często podawaną z wykluczeniem o ile możliwości płynów; co dzień naczczo uwolnić żołądek za pomocą aspiratora żołądkowego od zalegającej treści, a w razie towarzyszącego nieżytu żołądka, takowy stósownie leczyć.

Skutecznie też działają zabiegi wodolecznicze, mięsienie i prąd indukcyjny, w okolicę żołądka stósowane.

W celu wzmocnienia mięśni żołądka: ipecacuanha 0'02—0'05 w przeciągu 24 godzin, raz w pół godziny po jedzeniu, drugą dawkę (0'01) po całej godz. Extr. belladon, po 0'01—0'02 na dawkę.

Przy zaparciu stolca: przed jedzeniem dwie łyżeczki: Sulphat magnes., Cremor tartari, et flor. sulphur. *aa.* p. aeq.; lub Natr. bicarb., Magn. carb. *aa.* 6,00, pulv. Red. Rhei 3,00 na noc na koniec noża. Lewatywy z gliceryny. Jeżeli po jedzeniu występują bólesci, poleca się 2—4 łyżek wody chloroformowej lub morfinę z magnezją lub sodą. Przeciw wzdęciu: kreda, węgiel, magnesia w bardzo małych ilościach.

Diphteritis s. Angina diphteritica. Błonica gardła. Odróżnić postać pierwotną, czyli błonicę od postaci następowych t. j. zapaleń dyfterytycznych (błonicowatych). Pierwsza przy małej gorączce, szarych, grzybowatych nalotach bez znaczniejszych bólów gardła, bez obrzęku gruczołów szyjnych, prowadzi najczęściej do dławca (laryngitis diphteritica), druga odznacza się głębokimi owrzodzeniami gardła, obrzękiem gruczołów szyjnych, wysoką gorączką lub też ciepłotą subnormalną, objawami ogólnego zakażenia.

I. Rozpoznawszy błonicę, należy jak najwcześniej zastrzyknąć surowicę przeciwbłoniczą. Surowicę przyrządzają dzisiaj w takich dawkach, że w jednej flaszce mieści się tysiąc jednostek uodporniających, chociaż ilość surowicy wynosi w surowicy Bujwida 2—5 cm³, Paltauf'a 10 cm³. Wobec rozwiniętej błonicy należy zastrzyknąć naraz 2 flaszeczki; w przypadkach ciężkich 3 flaszeczki. Gdy po 24 godzinach naloty nie okazują tendencji do oddzielania, a tembardziej, gdy się szeregają, należy dawkę powtórzyć.

Zastrzyknięcie robi się w powłoki brzuszne, w udo lub w skórę klatki piersiowej (w okolicy pachy) odpowiednią strzykawką, poprzednio przez gotowanie wyjałowioną.

Wczesne zastrzyknięcie surowicy zapobiega szerzeniu się błon na krtani, stwierdzonem też jest powszechnie, że pod wpływem surowicy nie przechodzą przypadki lekkie w ciężkie postacie (septyczne), jak to dawniej często spostrzegano.

Wobec błonicy pierwotnej; postaci lekkiej zachować się po skutecznionem zastrzyknięciu, zupełnie wyczekując, w szczególności unikać zabiegów, mogących wywołać obrażenie błony śluzowej gardła, co najwyżej polecić wewnętrznie:

Rp. Acidi phosph. dil. 2'0; Syr. rub. id. 20'0; Aquae d. 100'0. S. Co 3 godziny łyżeczkę, lub:

Rp. Natri salicyl 2'0; Syr. rub. id. 20'0; Aquae dest. 100'0. S. Co 2 godziny łyżeczkę.

30% roztwór kali chlorici lub acidi borici do płókania, odpowiednia lekka a posilna dyeta, trochę wina.

II. Wobec błonicy z rozpadem i objawami ogólnego zakażenia należy obok zastrzykiwań surowicy w dawkach większych (najmniej dwie flaszeczki) leczyć miejscowo i wewnętrznie:

Leczenie miejscowe: Okłady z lodu na szyi (w woreczkach gumowych), pić wodę z lodu z dodatkiem wina czerwonego, lody owocowe. Później przy rozpadzie błon lub zgorzeli, można przejść do ciepłych okładów i katalplazmów.

Rp. Natr. sosojodolic. S. do insufflacyi.

Rp. Natr. sosojodolic. Flox sulphur. $\bar{a}\bar{a}$. S. do insufflacyi.

Piókania:

Rp. Aq. calcis, Acid. salicyl. 10/0, Ac. boricum 20/0, Kali chloric. 20/0, Thymol. $\frac{1}{2}$ 0/0, Menthol $\frac{1}{2}$ 0/0.

Rp. Kali chlorici 10·0; Aquae dest. 400·0; Extr. opii aquos 0·40; Syr. simpl. 20·0. S. Piókanie.

Mniejszym dzieciom przestrzykuje się gardło dużą strzykawką.

Pendzlowania wykonywać o ile możności łagodnie.

Rp. Solut. acid. citr. e 10·00: ad 50·00;

Rp. Resorcin 30·0; Glycerin. 30·00. S. Co 2 godz. pendzlować.

Rp. Acidi salicyl. 0·50—1·00; Spir. vini. q. s.; Glycerin. 400·00; Infus. fol. eucalypti 60·00. DS. Co godz. zwilżać watą zamoczoną w tym płynie, miejsca bł. zajęte.

Rp. Acidi karbol. cryst.; Acid. citric. cryst.; Trae jodi $\bar{a}\bar{a}$ 3—5·00; Franz-Cognac. 100·00, MDS. Co 2 godz. pendzlować.

Rp. Ferri sesquichl.; Glycerin. $\bar{a}\bar{a}$. 10·00. DS. Pendzlowanie 3 razy dziennie.

Rp. Sublimati corros. 0·05; Aqu. dest. 50·0; Acid. tartar. 0·25. S. Pendzlowanie.

Rp. Acidi boracici 5·0; Glycerini puri; Aquae dest. 10·0. S. Pendzlowanie.

Rp. Chloral hydrat. 10·0; Aquae dest. 20·0. S. Co $\frac{1}{2}$ godz. pendzlować.

Rp. Jodi puri 0·40; Spirit. 20·0; Chloroformii 2·0. S. Pendzlowanie.

Rp. Liqu. Ferri sesqu. 1·00; Aquae dest. 10·0—50·0. S. Pendzlowanie.

Wziewania:

Rp. Merc. subl. corr. 0·02; Aquae dest. 200·0. S. Do inhalacyi.

Rp. Sol. hydrogen. superoxyd. 20/0. S. Do inhal.

Rp. Acid. lactici gtt. 40; Aquae dest. 200·0. S. Do inhalacyi.

Rp. Aquae calcis; Aquae dest. $\bar{a}\bar{a}$. 150·0. S. Do inhalacyi.

Przy leczeniu ogólnem należy być ostrożnym ze środkami przeciwgorączkowemi, wcześniej podawać kofeinę, kamphorę, w razie zapadu podskórnie.

Rp. Chinin. muriat. 0·50—1·50; Ammon. chlorati 1·00; Aquae dest. 60·00; Syrup rub. id. 20·00. DS. 3 razy dziennie na łyżeczkę.

Rp. Antipyrin 1·50—2·00; Cognaci 20·00; Aquae dest. 80·00; Syrup. simpl. 20·00. DS. Co 3 godz. łyż.

Rp. Kali chlorici 2·0; Aquae dest. 80·00; Tinct. ferri sesquichl. gtt. XX; Syrup. rub. id. 20·00. DS. Co 2 godziny łyżeczkę.

Rp. Tinc. myrrhae 4'00; Glycerini 8'00; Aquae dest. ad. 200'00. MDS. Co godz. łyżeczkę.

Rp. Dcti. cort. chinae e 5'00 ad 100'00; Aq. chlori 10'0; Syrup sacchari 20'00. DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Rp. Pilocarpin muriatic. 0'01; Pepsin 0'20; Acid. muriat. dil. gtss. V; Aq. dest. 80'00; Syrup simpl. 20'00. DS. Co godz. łyżeczkę.

Rp. Hydrarg. cyanati 0'01; Aquae dest. 1'00; Syr. aurant. 20'0. MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Rp. Camphor. 0'30; Mixt. gumm. 80'00; Syrup sacchari 20'00. DS. Co godz. łyżeczkę, (zwłaszcza w formie septycznej).

Rp. Aether. acet. 5'00; Ol. cinamom. 1'50. DS. Co 2 godz. 3—5 kropli.

Rp. Hydrogen. superoxydat 2'0; Aq. dest. 130'0; Glycerini 3'0. MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Nadto w razie osłabienia czarna kawa, stare wino, cognac, nacierania octem lub winem.

W razie obrzęku gruczołów szyjnych okład z Liquor alum. acetic. Gdy wystąpi dławiec, stosować leczenie podane przy laryngitis cruoposa.

Przy porażeniach po błonicy należy stosować elektryzowanie, roborantia.

Dysmenorrhoe. Dolegliwe miesiączkowanie. Wykazanie przyczyny (przyczyna mechaniczna, dalej, czy przyczyna w macicy; czy w jajnikach). Unikać ruchu bezpośredniego przed i podczas peryodu, zaziębień, szkodliwych wpływów moralnych. Regulować dytetę i stolec. Jeżeli chora niedokrewna lub skrofuliczna, odpowiednie leczenie stanu chorobowego ogólnego. Leczenie kąpielowe: Iwonicz, Rabka, Krynica, kąpiele borowinowe, (Mattoniego sól borowinowa).

Podczas boleści spokój, suche ciepło na okolicę podbrzusza, środki kojące jak: lewatywy z Tra. opii simpl. (15 kropli na lewatywę albo Chloral hydrat 1'0 na lewatywę). Czopki do kiszki stolcowej, zawierające codeinę, opium lub morphium, wstrzyknięcie morphiny pod skórę, u osób silnych, krwistych, po jednej piławce na wewnętrzną powierzchnię obu ud, pendzlow. nastojem jodu ud.

W cięższych przypadkach należy zbadać dokładnie miejscowo narząd płciowy przez odbytnicę, albo jeżeli możebne przez pochwę.

Najczęstszą przyczyną bolesnego miesiączkowania, bywa niedrożność przewodu szyi macicy.

Niedrożność pochodzić może ze zmiany położenia macicy jak n. p. zagięcia tejsze, z wrodzonej wężkości przewodu, z krętego przebiegu tegoż.

W tych razach zazwyczaj napotyamy równocześnie niepłodność.

W przypadkach takich wskazanem jest leczenie mechaniczne, polegające na wyrównaniu zagięcia macicy,

na rozszerzaniu przewodu szyi macicy sposobem tępym, wprowadzanie zgłębnika lub rozszerzaczy na ten cel zbudowanych, do jamy macicy. Jeżeli te sposoby nie prowadzą do celu, wskazanem jest rozszerzenie macicy sposobem krwawym (Hysterostomatomia) najlepiej modo Eosner-Mars.

Rlektryzowanie według metody Apostolego.

Rp. Extr. hydrast. canad. fluid. 2 razy dziennie po 25 kropli na 8 dni przed regularnością.

Rp. Chloral. hydrat. 8'00; Kali brom. 10'00; Aq. camphor. 200'00. S. Co 2 lub 4 godz. łyżeczkę.

Rp. Trae thebaicae; Trae belladonae; Trae hyoscyami; Trae valerianae; Trae stramoni *āā*. 10'00. S. 3—4razy dnia po 15—20 kropli.

Rp. Kali bromati; Antipirini *āā* 10'00; Extr. viburni prunifol. fluid. 20'0; Aq. destill. 120'0; Syr. cort. aurantiae *āā* 30'0. DS. 2—4 łyżek dziennie. Polecają też czopki.

Rp. Extr. opii aquos. 0'02; Extr. belladonae 0'01; But. cacao q. s. ut f. l. art. supposit. S. Czopki.

Rp. Trae vibur. prunifol.; Trae piscid. erythr. *āā* 10'0. S. 4 razy dnia 20 kropli w wodzie zażyć.

Dysenteria. Czerwotka. W czasie epidemii uni-kać niestosownego pożywienia. Ścisła desinfekcyja wy-próżnień.

Dyeta ścisła, kleik, rosół, mleko. Słabszym można dozwoić bulion z jajem, wyciągów mięsnych, wina.

Oseski zostawić przy piersi, karmiąc regularnie co 3 godziny.

Leczenie rozpocząć należy od środków przeczyszczających, calomel, ol. ricini, dorosłym 2—4 łyżek dziennie. Później środki ściągające, miejscowe przepłukiwania kiszki letnimi rozczynami. Starcia około odbytnicy tro-skliwie oczyszczać i zasypywać pudrem salicylowym.

Codziennie kąpiel ciepła. Ciepłota kąpieli 27° przez 5—10 minut. Okłady wysychające, kataplazmy, zawijania ciepłe sprawiają ulgę.

Rp. Calomelanos 0'05; Sacchari 0'20; Mfp. dtr. tal. dos. N. VI. S. Co godz. proszek.

Rp. Acidi salicyl 10'00; Opii pulv. 0'20; Mfp. div. in dos. N. X. DS. 3 pr. dziennie.

Rp. Natri salicyl 0'50; Laudani 0'05; Mfp. dent. tal. dos. N. X. DS. 3 pr. dziennie.

Rp. Natri salicyl 5'00; Aqu. dest. 80'00; Trae laud. gtts. X.; Syrup simpl. 20'00. MDS. Co 3 go-dziny łyżkę.

Rp. Saloli p. 5'0; Bismuth. salic. 2'0; Mfp. Div. in dos. N. X. S. 3 pr. dziennie.

Rp. Rad. rhei 6'0; Rad. ipec. 2'0; Inf. Aq. fervid. q. s. ad. colat. 120'0; adde: Gumi arab. 4'0; Syr. althaeae 30'0. S. Co godz. łyżkę.

Do lewatywy używa się: sól kuchenna (0·50/0), Acid. salicyl. (0·50/0), Thymol (0·100/0).

Rp. Argenti nitrici 0·05; Aq. dest. 200·0. DS. Na 2 razy w lewatywie zastosować.

Rp. Tannini 5·00; Aq. dest. 500·00. S. Na 2 lewat.

Rp. Liquor. alum acet.; Aq. dest. $\bar{a}\bar{a}$ 100·00. DS. Na 2 lewatywy.

Po lewatywach jakoteż w razie silnego parcia dać czopki:

Rp. Butyri cacao 0·50; Trae opii guttam; Mf. supposit. d. t. Nr. X. S. 2—3 dziennie.

Rp. Extr. bellad. 0·10; Morphii mur. 0·05; Butyr cacao q. s. f. sup. N. V. S. 1—2 czopków dziennie (dorosłym).

W przypadkach przewlekłych podawać dalej lewatywy, i środki lekko ściągające.

W razie zapadu: Cognac, wino, kamfora, eter.

W okresie zdrowienia przechodzić zwolna do pokarmów: jaja, skrobane mięso i t. d.

U dzieci rozpocząć leczenie od ol. ricini, lub calomelu, następnie:

Rp. Bismut. salicyl 1·00; Pulv. Doveri 0·20; Sacchari 2·00; Mfp. div. in dos. N. X. DS. 3 proszki dziennie.

Rp. Chinini tannici; Bismut. salicyl. $\bar{a}\bar{a}$ 1·00; Laudani 0·10; Mfp. div. in dos. N. X. S. 3 pr. dzien.

Przeplókiwanie z acid salicyl. 0·50/0, thymol 0·100/0, kwas borowy 20/0; w przypadkach cięższych wcześniej wstrzykiwać surowicę przeciwczerwonkową.

Dyspepsia. Niestrawność. Przedewszystkiem wykryć przyczynę cierpienia i dokładnie zbadać funkcję żołądka i kiszek.

Cierpienie to stoi najczęściej w związku z czynnościowem, nadmiernem wydzielaniem soku żołądkowego, lub z niedomogą wydzielniczą żołądka.

Stosownie do tego w 1-szym przypadku wskazane są środki alkaliczne, wody: Karlsbad, Vichy, Szczawnicka Magdaleny, w 2-gim kwas solny i środki gorzkie.

W innych razach zboczenia w wydzielaniu soku żołądkowego nie ma, tylko błona śluzowa żołądka jest nadczułą, a w tych przypadkach należy przed jedzeniem podawać środki znieczulające (cocaina) i zapomocą przeplókiwań żołądka zmniejszać przeczulicę błony śluzowej, można też podawać przetwory bromowe.

Prócz tego należy zwrócić uwagę na ogólny stan chorego, u anemicznych wskazane są środki żelaziste (Krynica, Żegiestów, Francensbad i t. d.), u neurasteników i hysterycznk skutecznem bywa leczenie wodolecnicze, wyjazd nad morze lub w góry.

Rp. Natri bicarbon; Magn. carbon.; Kali carbon. $\bar{a}\bar{a}$. 5·00; Pulv. rad. Rhei 7·00; MD. in scatula. S.

3 razy dnia na koniec noża zażyć, w razie jeżeli jest nadmierne wydzielanie soku żołądkowego.

Rp. Sal. therm. Carolin. 100'00. DS. Co dzień rano łyżeczkę w pół szklance ciepłej wody.

Rp. Strontium brom. 2—3'00. Po obiedzie i po kolacyi.

W razach niedomogi wydzielniczej:

Rp. Acid. hydrochl. 3'00; Pepsini German. solub. de Rostock 2'00; Aq. dest. 150'00; Syr. Simpl. 15'00. MDS. Po każdym jedzeniu 2 łyżki zażyć.

Rp. Acid. hydrochl. dilut. Trae absinthi $\bar{a}\bar{a}$. 15'00. DS. Po każdym jedzeniu 20 kropli w łyżce wody zażyć.

Rp. Orexin basic. 0'30; Dent. tal. dos. N. 5. S. Jeden proszek rano zażyć.

Rp. Stomachinum fabr. Matula; Vinum Condu-rango fabr. Matula.

Rp. Trae ferri pomati 25'00; Trae Rhei vinosae; Trae amarae $\bar{a}\bar{a}$. 15'00. MDS. 3 razy dnia po łyżeczce zażyć.

Rp. Ferri carb. sacchar. 5'00; Extr. nucis. vomicae 0'50; Pulv. et extr. Rhei $\bar{a}\bar{a}$. q. s. ut f. pill. N. 100. DS. 3 razy dnia po 2 pigułki zażyć.

u osesków:

Regularne karmienie co 3—4 godz. Przy sztucznem żywieniu zwrócić uwagę na jakość mleka i zarządzić odpowiednie żywienie, ewentualnie wrócić do piersi. — Nie odłączać wśród dyspepsyi.

Rp. Ol. Ricini lub Calomel (0'01—0'03). Przez 12—24 godzin ścisła dyeta.

Rp. Natrium benzoicum (2—3'00). Co 2 godziny łyżeczkę.

Rp. Naphtalini p. 0'50; Aq. chamomilae; Mac. gum. arab. $\bar{a}\bar{a}$. 50'00; Ol. meth. pip. gtt. unam. MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Rp. Kreosoti gtt. V.; Aq. dest. 50'0; Syrup. simp. 20'0. MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

W razie wzdęcia bolesnego, wprowadzić kankę lub miękki kateter do odbytnicy. Jeżeli wymioty nie serowate, cuchnące, wskazują na brak kwasów: Acid. mur. (0'30:50'0) lub:

Rp. Pepsin 1'00; Ac. muriat. gtts. tres.; Aquae dest. 90'00; Syr. simpl. 15'00. S. Przed pokarmem łyżeczkę.

Rp. Acid. lactic. 1'0; Aq. dest. 100'0; Syr. simp. 20'0. S. Co 3 godziny łyżeczkę.

Przy kwasocie: Aq. calcis, calcaria phosphor, tribasica pur, po 1'00. Przy Intertrigo towarzyszącem zmywanie wodą mydłą.

Rp. Magnes. ustae 5'00; Talci praepar. 20'00;

Acid. salicyl. 0·20; Mixt. oleoso-balsam. gtt. X.
Mf. p. DS. Do posypywań.

Eclampsia infantum. Drgawki dziecięce. Uwzględnić przyczyny: Początki chorób ostrych i zakaźnych, użycie środków odurzających, przepalenie głowy, kolki brzuszne, zaburzenia w trawieniu, robaki, choroby dróg moczowych (phimosi), koklusz, skurcz głośni, ciała obce w nosie, zranienia.

Wśród samego napadu zimne okłady (woda z octem) na głowę co parę minut, lewatywy, gorczyczniki na kark i łydki, w razie długotrwałych drgawek wdychanie chloroformu (ostrożnie!) kilka kropel na chusteczce trzymać pod nosem. Lewatywy z chloralu.

Środek przeczyszczający (Calomel) — dyetę, w razie powtarzających się napadów.

Rp. Chloral. hydratis 1·00; Natri bromati 1·00; Aq. dest. 60·00; Syrup sacchari 15·00. MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Rp. Chloral hydratis 0·50; Aq. dest. 80·00; Mucilag. gum. ar. 20·00. MDS. Połowę do jednej lewat.

Rp. Calomelanos 0·30; Sacchari 2·00; Mfp. div. in dos. N. X. DS. Co godz. proszek.

Rp. Kali bromat. 2·0; Ammoni brom. 1·0; Aqu. dest. 100·0; Syr. simpl. 30·0. MDS. 4 łyżeczki dz.

Eclampsia parturient. Drgawki porodowe. U ciężarnych okazujących cierpienie nerek, znaczniejsze obrzęki, podawać środki moczopędne (kali aceticum, acidum benzoicum), środki wypróżniające, środki napotne, mleczna dyeta. Kąpiele ciepłe (46°—38° C.) ostrożnie. Diuretinum fabr. Knoll.

Podczas napadu ułożenie w łóżku otoczonym materacami, aby chorą uchronić od obrażeń; wdechiwanie tlenu, przed wystąpieniem szczykościsku, wsunąć język do jamy ust i między szczęki wsunąć kawałek drzewa okrytego płótnem. Ruchów nie krępować. Znieczulić chorą silnymi dawkami narkotyków, morfiną podskórną 0·02 do 0·03 lub chloral w lewatywie (2·0). Gdy się chora budzi lub napad występuje, ponowić dawkę. Można użyć chloroformu do wdychania, ale tylko wtedy, jeżeli stwierdzić możemy pewną okresowość w występowaniu napadów np. napady występują regularnie co 20 lub 15—10 minut, wtedy minutę naprzód podać chloroform. Po napadzie kąpiel ciepłą 30° R., potem zawinąć w prześcieradło i koc, aby wywołać poty. Lewat. silnie czyszczące.

Podczas ciąży napady mogą ustać i ciąża być donoszona, dlatego tylko w razach, gdy powyższe leczenie niepomaga, napady występują zbyt często, albo grozi obrzęk płuc, wzniecenie porodu przedwczesnego (założenie świeczki elastycznej do macicy, niektórzy radzą przebicie pęcherza płodowego).

Jeżeli napady występują podczas porodu, można chlo-

roformować, używa się narkotyków, jak wyżej, Można podawać narkotyk, a oprócz tego, ilekrotnie występują objawy zwiastunowe napadu, chloroform. Unikać częstego badania wewnętrznego, aby nie drażnić chorej. Jeżeli są warunki do łagodnego ukończenia porodu, to takowy ukończyć. Zabiegów gwałtownych, w celu rozwiązania rodzącej używać nie należy, chociaż w ostatnich latach zdanie się zmieniło w tym względzie i radzą w każdym przypadku o ile można najprędzej w uspieniu ukończyć poród (Dührsen, Zweifel). Można przed rozwiązaniem puścić do 500 gram. krwi w razie, gdy tętno mocno napięte. Po upuszczeniu krwi należy wlać do żył 500—1000 gramów fizyologicznego roztworu soli kuchennej. Jeżeli napady występują w połogu, postępowanie jak podczas ciąży.

Rp. Amyleni nitrosi 5'o; Ol. foeniculi 10'o. MDS. 2—5 kropli do wdychiwań na chustce (amylnitrit).

Rp. Laudani p. 0'20; Sacch. albi 5'o; Mfp. div. in dos. N. X. S. Co $\frac{1}{2}$ godziny proszek.

Eczema. Wyprysk. Przedewszystkiem uwzględnić moment etyologiczny, usunąć więc zaleźnie od przypadku szkodliwe czynniki zewnętrzne, a więc wodę i światło, wpływ wilgotnego powietrza, drażnienia przez odzież. Gdy wyprysk słoneczny (e. solare) polecić nosić kobietom weloniki żółte lub zielone, mężczyznom parasole.

Przy wyprysku ostrym, szczególnie, gdy istnieje śaczenie, pilnie pudrować:

Rp. Talci venet.; Amyl. trit. āā. 50'00; Zinc. oxyd. 5'o. S. Puder.

Rp. Zinc. oxyd.; Magist. bismuth. āā. 15'00; Ceruss. 7'50; Talc. venet., Amyl. orizae āā. 30'o. S. Puder.

Rp. Zinci oxyd.; Amyli āā. 25'o; Naftalan 50. Mf. ung. S. Zewnętrznie.

Do zasypek nie dawać olejków eterycznych.

Gdy wyprysk zajmuje całe ciało, zawinąć chorego w zapudrowane prześcieradło i skrzętnie zasypywać pudrem.

Jeżeli skóra obrzękła, suche zimno (przrząd Leiter'a) lub często zmieniane okłady:

Rp. Liqu. alumin. acet.; Aq. ferwid. āā. 150'o. S. Do okładania.

Rp. Plumb. acetic. 7'o; Atumin. crud. 2'o; Aqu. dest. 200'o. S. 2 litrami wody rozcieńczyć do okł.

Rp. Resorcin. resubl. 10'o; Aqu. feruid. 500'o. S. Do okładów.

Rp. Ac. thymic. 0'50; Aq. dest. 500'o. S. Do okł.

Gdy znaczne śaczenie:

Rp. Ac. carbol. liquefact. gtt. XL; Spir. vin. rect. 20'o; Glycerin p. 8'o; Zinc. oxyd.; Amyl. trit. āā. 10'o; Aq. fontis. 250'o. S. Woda do obmywania.

Przy eczema papulosum acutum lub gdy istnieje znaczne swędzenie nawet przy sączącym, zwilżać kilka razy dnia wyskokiem i pudrować:

Rp. Ac. carbolic. (s. salicyl.) 2'0; Spir. vini rect. 150'0; Spir. coloniensi.; Spir. lavandul.; Glycerin. p. *aa.* 25'0. S. Zwilżać zamoczoną watą.

Rp. Ac. carbolic. (s. salicyl.); Glycerin. p. *aa.* 2'0; Balsam. peruvian. 1'0; Spir. vini rect. 200'0. S. Jak wyżej.

Zamiast wyskoku użyć można:

Rp. Talc. venet. pulv.; Amyl. tricit. *aa.* 100'0; Glycerini p. 40'0; Aq. plumbi 200'0; M. f. liniment. S. Rozcieńczyć taką samą ilością wody i pendzli.

Rp. Zinci oxyd.; Amyli *aa.* 15'0; Naftalan 50'0; Acidi salicyl. 1'0. S. Zewnętrznie.

Przy eczema squamosum parę razy dnia smarować maścią i zapudrować lub obwiązać opaską, usunawszy poprzednio łuski za pomocą oliwy lub wazeliny.

Rp. Mercur. praecipit. alb. 3'0; Ung. Glycerin. 30'0; M. f. ung. S. Maść.

Rp. Salol. p. 2'0; Ol. olivarum; Axung. porcin; Lanolin. anhydr. *aa.* 25'0; M. f. ung. S. Maść.

Rp. Resorcin. resubl. 5'0—10'0; Zinc. oxydat.; Amyl. tritic.; Vaselin flavi; Lanolini p. *aa.* 25'0; M. f. ung. S. Maść.

Rp. Menthol. 1'50; Saloli 2'0; Ol. olivar. 3'0; Lanolini anhydr. 50'0; M. f. ung. S. Maść na ręce.

Rp. Ac. boric. (v. Salicyl) 3'0; Zinc. oxydat.; Amyl. trit. *aa.* 25'0; Vaselin flav. 50'0. S. Pasta (najwięcej używana).

Rp. Ol. rusci; Sulf. praec. *aa.* 5'0; Naftalan 50'0. S. Zewnętrznie.

Rp. Resin. benzoë pulver. 5'0; Axung. porcin. 160'0; Dingere, cola et adde; Zinc. oxyd. 25'0; M. f. ung. S. Maść Wilsona.

Gdy skóra gładka, mało zaczerwieniona, pendzlować raz na dzień ostrożnie.

Rp. Ol. rusci 50'0; (albo Anthrasoli 50'0); Spir. vin. rect.; Aether. sulf. *aa.* 75'0. S. Do pendzlow.

Rp. Ammon. sulfoichotyl. (s. Thiol) 50'0; Spir. vin. rect.; Aether. sulfur. *aa.* 75'0. S. Do pendzli.

Rp. B. naphtol. 1'0; Spir. vini rect. 100'0. S. Do pendzlowania.

Rp. B. naphtol. 0'50; Ung. emoll. 25'0; M. f. ung. S. Maść.

Gdy maść zadrażnia, zasyzywać pudrem.

Przy wyprysku przewlekłym należy strupy i łuski usunąć, i naciek w skórze doprowadzić do wessania.

Gdy wyprysk sączący (e. madidans) przykładąć na wązkich kawałkach płótna rozsmarowaną maść

dwa razy dziennie, poczem obwiązać watą i opaską, przedtem jednak zmyć dokładnie mydłem szarem i wodą ciepłą, co później wedle potrzeby powtórzyć należy.

Rp. Emplast. diachylon simpl.; Ol. olivarium $\bar{a}\bar{a}$. 50'o; M. f. ung. S. Maść Hebry.

Rp. Emplast. diachyl. simpl.; Vaseline. flav. $\bar{a}\bar{a}$. 50'o; M. f. ung. S. Maść Kaposi'ego.

Rp. Empl. saponat. 80'o; Ol. olivarium 20'o; Ac. salicyl. 2'o—5'o. S. Przykładać na kalikocie.

W celu usunięcia strupów przykładać na kawałkach płótna oliwę, maść Hebry, Kaposi'ego.

Rp. Naftalini 50'o; Ung. Wilsoni; Amyl. trit. $\bar{a}\bar{a}$. 25'o. S. Zewnętrznie.

Rp. Empl. saponat. 100'o; Leni calore fusso adde: Ac. salicyl. 10'o; M. f. empl. S. Plaster salicylowy (Pick'a).

Dla usunięcia pozostałości po maści i rozmiękłego przyskórka, zmyć spiryt. mydłanym lub mydłem szarem, poczem usuwać naciek w skórze przez smarowanie dziegciem, ichtyolem, naftolem.

Rp. Ichtyol 2'o; Glycerini 8'o; Naftalani 20'o, S. Zewn.

Rp. Ichthalbini (Knoll) 3'o; Aq. destill.; Glycerini $\bar{a}\bar{a}$. 20'o, S. Zewnętrznie.

Gdy wystąpi podrażnienie, maść obojętna (m. cynkowa, borowa, Hedry) i puder, poczem na nowo środki drażniące.

Gdy wyprysk uporczywy, szczególnie na rękach, zapendzlować c. kali caustico 1:2, poczem maść lapi-sowa 10/0 lub

Rp. Ol. rusci albo Anthrasoli 2'o; Naftalani 50'o. S. Zewn.

Zapendzlować raz dziennie, następnie maść cynkową lub pastę borową.

Rp. Ol. rusci; Sulf. praec. $\bar{a}\bar{a}$. 5'o; Naftalani 50'o. S. Zewn.

Jeżeli wyprysk trwa uporczywie czas dłuższy lub często powraca skutkiem jakiejś choroby ustrojowej (scrophulosis, chlorosis, dysmennorrhoea i t. p.) leczyć chorobę podstawową.

Eczema seborrhoicum. Wyprysk łojotokowy. Gdy znaczne sączenie pudrować; utworzone strupy, namoczyćwszy je przez kilka godzin oliwą, usunąć za pomocą mydła:

Rp. Spir. saponato-kalin. 100'o. S. Mydło.

Gdy skóra bez strupów, czysta polecić maście:

Rp. Resorcin, resubl. 5'o; Zinc. oxydat.; Amyl. tritic. $\bar{a}\bar{a}$. 25'o; Vaseline. fl. 50'o; M. f. pasta. S. Maść.

Rp. Xeroformi 1'o—5'o; Naftalani 20'o—50'o. S. Zewnętrznie.

Gdy skóra przychodzi do stanu prawidłowego, na noc przykładąć masę, a przez dzień zmywać.

Rp. Resorcin. resubl. 10'0; Spir. vin. rect. 100'0; Spir. coloniens. 50'0; Bals. peruvian. 2'0. S. Co-dziennie głowę zwilżać.

Rp. Sulfur. praecipit. 12'0, Camphor. trit. 1'0; Mucilag. gum. arab. 6'0; Aqu. calcis. Aqu. rosarum *aa.* 100'0. S. j. wyżej.

Przytem zalecać można do mycia głowy mydeł Eichhoff'a: resorcynowego, resorcynowo-siarkowego i naftolowego.

Emphysema pulmonum. Ró z e d m a p ł u c. Prze-ważnie leczenie symptomatyczne.

Unikanie zaziębień, przemoczenia nóg, wogóle wszystkiego, co może spowodzić lub powiększyć nieżyt oskrzelowy. Główne zadanie leczyć nieżyt oskrzelowy przez pobyt na świeżem górskiem powietrzu, picie wód w Szczawnicy, Reichenhall, Krościenku; na wewn. pulv. Doveri, amonium muriat, tannina z morfiną, stibium sulphurat. aurant. z morfiną, apomorfin. Inf. ipecacuanhae lub radix senegae, przetwory balsamiczne jak: Balsam peruv., tolutanum, ol. terebinth., terpinol, terpinhydrat (3'00: na 30 pigułek, z tego 1—3 pig. dziennie).

Leczenie w gabinetach pneumatycznych lub za pomocą przyrządów Waldenbura lub Gaigla i Majera (Würzburg) lub Schnitzlera, lub w Truskawcu w zakładzie inhalacyjnym.

U ludzi otyłych można polecić picie wód Karlsbadzkich lub Kissingen. Przy osłabieniu akcji serca, podawać obok środków wyksztusnych i nasercowe. Uważać na wypróżnienia, w razie braku tychże, podać odpowiednie środki.

Dyeta pożywna, ale nie wzdymająca.

Rp. Terpinoli 3'00; Extr. et pulv. liquir. q. s. ut. f. pil. N. 30. S. 3—4 pigułek dziennie.

Rp. Apomorph. hydrochl. 0'05; Morphii mur. 0'03; Acidi mur. gtts. X., Aqu. dest. 180'00; Da in vitro nigro. S. Co 3 godziny łyżkę.

Rp. Stibii sulph. aurant. 0'30; Morph. mur. 0'10; Natri bicarb. 5'00; Mfp. div. in dos. N. XV. S. 2—3 pr. dziennie.

Rp. Gutt. Fol. digit.; Bulb. scillae; Stibii sulphur. aurant. *aa.* 1'50; Extr. pimpinellae q. s. ut. f. pil. N. 60. DS. Co 2 godziny pigułek.

Rp. Ol. terebinth. 2'00; Aq. menth. pip. 150'00; Mucil. g. arab. 30'00. DS. Co 2—3 godziny łyżkę.

Rp. Extr. belladon. 0'1; Pulv. rad. ipec. 0'2; Sacch. alb. 3'0; Mfp. Div. in dos. N. X. S. 3 proszki dzień.

Rp. Extr. hyoscyam. 0'15; Aqu. dest. 70'00; Syr. simpl. 10'00. DS. Co 2—3 godziny łyżeczkę.

Przy dyspnoe:

Rp. Extr. quebracho aq. 5'00; Aq. destil. 50'00.

S. Co 3 godziny łyżeczkę zażyć.

Rp. Quebrachin 0'50; Extr. glycyrrhizae q. s. ut.

f. pil. N. X. S. 4—5 pigulek dziennie.

Endocarditis. Zapalenie wsięrdzia. Leczenie objawowe a więc: Spokojne leżenie w łóżku, dyeta płynna niepodniecająca. Na okolicę serca okłady zimne lub worek z lodem.

Na wewnątrz, cardiaca, zwłaszcza digitalis, strophanthus, w razie bólu mierne dawki morfiny.

Przy znacznem osłabieniu: kawa czarna z koniakiem, wino mocne, kamfora lub eter podskórnie wstrzyknięty. Coffeina lub teobromina po 0'10 na dawkę, 1'00 pro die, obok innych środków nasercowych jak convalaria, sparteina i t. d.

Przy gorączce wysokiej, mierne dawki antypyretyków z obawy groźnego zapadu najlepiej razem z coffeiną lub teobrom.

Rp. Infus fol. digit. e 1'50 ad 150'00; Coffeini citrici 1'50; Liquor. kali acet. 50'00; Succ. liquir. 10'00; S. W ciągu 2 dni użyć.

Rp. Tinct. strophanti; Aq. lauroc. āā. 0'40. S. 3 razy dz. po 10—20 kropli.

Rp. Pulv. fol. digit.; Calomelanos āā. 0'40; Sacchari 3'00; Mpf. div. in dos. X. S. Co 3 godziny proszek.

Endometritis. Zapalenie błony śl. macicy.

a) Ostry nieżyt: spokojne leżenie w łóżku, środki lekko wypróżniające, okłady wysychające na brzuch. W razie bólów, czopki cum laudano lub cum morphio.

b) Przewlekły nieżyt wymaga jużto leczenia ogólnego, (kapsle z soli borowinowej Mattoniego) itd. już też leczenia miejscowego.

W tym celu można używać wprowadzania środków żrących przypiekadłem Chiarego, albo za pomocą sondy owiniętej watą i napojonej n. p. cum Trajodi. cum liquore ferri sesquichl. itd. Przeplókiwanie macicy po dokładnem rozszerzeniu szyi za pomocą cewnika Bozemanna, Olshausena, i t. d. rozczykami: kwasu borowego, karbolowego, formaliny. Schulze radzi przedtem rozszerzyć macicę sposobem tym. Wprowadzanie pręcika Spigelberga lub Fritscha owiniętego watą napojoną roztynem chlorku cynku 10—50%, przyczem należy pod tylną wargę macicy podłożyć watę napojoną 10% roztynem sody, aby spływający chlorek cynku nie sparzył bł. śl. pochwy. Klien poleca co 3—8 dni wprowadzanie do szyi za pomocą odpowiedniego instrumentu (Uteruspistole) patyczków zrobionych z cukru mlecznego, gumy arabskiej, białka, gliceryny, które zawierają 20% argentum solubile.

Wprowadzanie na przeciku owiniętym watą rozczynu 50% kw. mlekowego.

Rp. Alum. 2'50; Trae. jodi; Alcohol aa 25'0. S. Zewnętrznie.

Rp. Naftalani 50'0. S. Zewnętrznie.

De przestrzykiwań używa się obecnie $\frac{1}{2}$ —10% rozczynu formaliny. Wprowadzanie do jamy macicy przecików zawierających jodoform, taninę itd. Wprowadzanie do jamy macicy gazy jodoformowej w postaci długiego paska, którego jedna część wypełnia macicę, druga zaś sterczy do pochwy.

Jako nowy sposób uważać należy przyżeganie bł. śluzowej za pomocą pary wodnej 100° C. 1—1½ minuty, ku czemu wymyślono przyrządy (Snegirieff, Panecki, Cinkus).

Gdy te sposoby nie wystarczają, wyskrobanie jamy macicy (Abrasio mucosae).

Nadżerki części pochwowej należy goić przyżeganiem za pomocą: nastoju jodowego, azotanu srebrowego w laseczce, cuprum sulphuricum w kryształach, 50% zincum chlorat. acidum nitricum fumans, który się stosuje ostrożnie za pomocą przecika szklanego albo asbestowego. W ostatnich czasach polecają zakładać do pochwy gałki składu:

Rp. Europhen 0'05; Ol. amygdal. gtt. nonnull.; Butyr. cacao 2'50; Mf. globulus vagin. N. I. (frigid parat).

W przypadkach dawnych owrzodzeń z przerostem gruczołowym, najlepiej wyskrobać ostrą łyżeczką dno wrzodu i przypiec następnie, do czego użyć można ferum candens, thermocauter Paquelina, galvanocauter lub wyciąć nadżerkę.

Enteritis follicularis. Zapalenie grudek chłonnych jelita. Odstawione dzieci wrócić do piersi. Mieszanka śmietankowa Biederta lub zupa Liebiega za pokarm. Kleik jęczmienny, kawa żołądz. mąka Kufeka, kakao żołądziowe wyrobu Jahra w Krakowie.

Przeplókiwanie jelit 1% wodą słoną, 3% Acid. boricum. 10% Natr. salicyl. Liquorem alum. acetici 10%. Toż i na wewnątrz.

Rp. Liquor. alum. acet. 30'00; Aq. dest. 50'00; Syrup. 20'00. S. Co 2 godziny łyżeczkę.

Rp. Ichthalbini 0'20—0'10 p. dosi 3—4 r. dziennie.

Rp. Chinin tannic. 0'05—0'10 pro dosi.

Rp. Thiocol 0'30; T. d. Nr. XII. S. 3 pr. dziennie zażywać.

W razie boleści i parcia Extr. opii aq. 0'01 pr. dosi, u dzieci (starszych) 0'001—0'005! pr. dosi, k. r. dz., Tra opii według wieku.

Enterocatarrhus zob. **Catarrhus intestini.**

Enuresis nocturna. Mimowolne moczenie no-

cne. Uwzględnić powody: ascaridy, oxyuris, phimosis, pavor nocturnus, zboczenia w odżywianiu, onania.

2. Zimne obmywania, kąpiele nasiadowe chłodne od 5—20 minut, na wieczór; wstrzymywać od napojów. Polecać przez dzień wstrzymywać mocz.

Polecają unikać spania na wznak, lub tak ułożyć chorego, aby była podwyższoną miednica. Prąd stały, a mianowicie wprowadzić ważką elektrodę metalową (nasmarowaną oliwą) do odbytnicy (u dziewcząt do pochwy) drugą elektrodę zwilżoną na spojenie kości łonowych lub perineum, prąd słaby można zwolna wzmacniać — elektryzować przez 5 minut. Antipiryna po 0'50—1'00 na noc między 9 a 11 godziną przez 14 dni z rzędu.

Rp. Atropin sulphur. 0'05; Aq. dest. 30'00. DS. Po tyle kropli ile dziecko ma lat, 0 4 i 7 godzinie wieczorem.

Rp. Extr. chinae aqu. sic. 5'00; solve in; Aqu. dest. 100'00; Natri bromati 2'00; Trae bellad. gtts. X.; Syrup. sacchari 20'00. MDS. 3 razy dziennie łyżkę.

Rp. Extr. bellad. 0'05; Extr. nuc. vomic. 0'10; Mfp. div. in dos. N. X. DS. Na noc jeden proszek.

Rp. Strychnini nitrici 0'01; Sacchari 10'00; Mfp. div. in dos. aequal. N. XX. S. Na noc proszek.

Rp. Extr. fluid. rhuris. arom. 10'00. S. 5—10 kropli 2 razy dziennie podawać we wodzie.

Rp. Trae rhuris arom. 10'00. S. 2 razy dnia 10—15 kropli.

Rp. Lupulini; Ferr. carb. saccharat.; Sacch. aa 6'0. S. 3 r. dziennie na koniec noża.

W razie nadęłości pęcherza, podać na noc chloral na zewnątrz lub też w lewatywie. Polecają też przyszczydła przyłożyć na kark. Skrofulicznych i źle odżywionych leczyć zarazem chininą i środkami żelazistymi:

Rp. Ferratini 0'20, in pastill. compress. S. 1—2 past. dziennie.

Rp. Pastilli jodo-ferrati, comp. Jahr. (scatula orig.).

Ephelides. (piegi). Zupełnie i trwale usunąć się nie dają, na pewien czas usuwa:

Rp. Hydrarg. bichlor. corr. 0'50; Aqu. dest. 50'0. S. Przez 4 godz. zamaczaną szmatkę przykładąć.

Rp. Hydrarg. bichl. corr. 0'50; Collodii p. 50'0. S. Na noc posmarować.

Rp. Hydrarg. bichlor. corr. 0'50; Emuls. amygdal. 100'0; Tct. benzoës 5'0; Aqu. naphae 50'0. S. Wieczór wcierać.

Gdy wystąpi zadrażnienie pudrować:

Rp. Bismuth. nitr. basic. 10'0; Talc. venet. pulv. 20'0; Baryt. sulfur. praecip. 30'0; Ol. rosar. gtts. 2. S. Puder.

albo przykładać na noc masę na płótnie:

Rp. Ac. Salicyl. 2'0; Ung. emolient. 40'0; Tct. benzoës 1'0; M. f. ung. S. Maść.

Rp. Naphtol. b. 5'0—10'0; Zic. oxydat.; Amyl. trit. *aa*. 12'50; Vaselin. flav. 25'0; M. f. pasta. S. Godzinę codziennie wcierać. Rano po starciu maści pudrować.

Epididymitis. Zapalenie najądrza. Wstrzymać leczenie miejscowe rzeżączki. W okresie ostrym zalecić spokój, dyetę, uregulowanie stolca. Worek mosznowy za pomocą poduszcзки podnieść ku górze i kłaść zimne okłady z lodu lub przyrządem Leiter'a; gdy chory ich nie znosi, okłady ciepłe z gorącej wody lub z mąki siemienia lnianego. Przeciw bólowi smarować:

Rp. Extr. opii. aquos. 1'0; Ung. simpl. 20'0; M. f. ung. S. Maść.

Rp. Extr. bellad. 1'0; Ung. simplic. 20'0; M. f. ung. S. Maść.

Rp. Guajacol. 2'0—5'0; Ung. simplic. 30'0; M. f. ung. S. Maść.

Rp. Extr. belladon. 0'15; But. cacao q. sl. ut. f. supp. Nr. X. S. 2 czopki dziennie.

Przy bardzo silnych bólach wstrzykiwanie morfiny, a gdy znaczne hydrocele, nakłócić trójgrańcem. Gdy ból się zmniejsza (tylko przy ucisku) okłady zimne przetrzymywać, wreszcie przejść do okładów wysychających i ciepłych.

Gdy chory nie może leżeć, założyć umiejętnie suspensorium Horanda lub Neissera, przykrywając moszna watą i płótnem kauczuk.

Rp. Tct. jodi; Tct. gallar. *aa* 10'0. S. Do pędzlowania.

Rp. Naftalani 30'0. S. Zewnętrznie.

Rp. Ichtyoli 2'0; Naftalani 30'0. S. Zewnętrznie.

Rp. Empl. hydrarg.; Empl. saponat. *aa* 20'0. S.

Rozsmarować na płótnie i przykładać na mosznę.

Wreszcie założyć opatrunek Fricke'go z opasek plastra przylepcowego.

Epilepsia. Padaczka. Starać się wykryć przyczynę padaczki i takową o ile można usunąć, zwłaszcza przy epilepsji odruchowej.

Chory nie powinien fizycznie lub umysłowo nateżać się, unikać napojów wysokich, żyć higienicznie, uważać na regularny stolec, nie pijąc kawy, herbaty, mało lub wcale nie palić, unikać wszelkich gwałtownych wzruszeń.

Podczas aury położyć chorego do łóżka, porozpinać ubranie a podczas napadu czuwać przy nim. Nieraz kilka wdechów parą amylinitritu, podanie cognacu, wina, może wstrzymać napad. Podczas bardzo silnego napadu można robić inhalacje chloroformowe.

Jako środki polecane przeciw epilepsyi przedewszystkiem: kali bromatum po 2—5 do 10 i 15 gr. na dzień, lub mieszanki bromowej:

Rp. Ammon. bromati; Natri brom.; Kali brom. $\bar{a}\bar{a}$. 3'00—5'00; Aq. dest. 200'00. DS. 2—3 łyżek dz.

Rp. Syr. valerian. bromat. comp. Jahr. Bromocoll w dużych dawkach.

Rp. Argenti nitrici 0'50; Pulv. et extr. acor. q. s. ut f. pil. Nr. 50. S. 4—10 pigulek dziennie.

Rp. Decoct. artemisiae e 15'00 ad 200; Kali bromati 10'00—20'00.

Podawać też można valerianę w proszku (0'50—2'00) pro die, albo jako infusum e 10—15'00 na 200'00. Belladona w pigułkach np.:

Rp. Extr. belladon.; Fol. bellad. $\bar{a}\bar{a}$. 1'00; Extr. et. pulv. liquir. q. s. u. f. pill. Nr. 100. S. Codziennie 2—3 do 6—7 pig.

Następnie Zincum oxyd. 0'05—0'20 p. dosi, w połączeniu z innymi środkami, lub atropinę na wewnątrz:

Rp. Zinci oxydati 0'05; Rad. valer. 2'00; Extr. hyoscyam. 0'06; Ol. valerianae 0'05; Mfp. D. tal. dos N. X. Da in charta cerata. S. 3 proszki na dzień.

Rp. Atropini sulphur. 0'01; Aqu. dest. 10'00. DS. 2—3 razy na dzień po 10 kropli (uważać na źrenicę!).

Rp. Bromalin 10'00; Div. in dos. Nr. X. S. 2—4 proszki dziennie.

Dalej przetwory arsenikalne jak: Sol. Fowleri, woda Levico, Roncegno.

Przytem można zastosować procedury hydropatyczne i elektryzowanie prądem stałym n. sympaticus. Podczas status epilepticus można robić inhalacje chloroformowe lub eterowe.

Rp. Aethyleni brom.; Spir. vini rectif. $\bar{a}\bar{a}$. 5'00; Aquae menth. pig. gutt. II. S. 3 razy dziennie po 5—10 kropli w $\frac{1}{4}$ szklanki mleka.

Epistaxis. Krwawienie z nosa. Kauteryzacja broczącego naczynia, najlepiej z um. acido nitrico fumante, zapomocą pręcika drewnianego dość ostro, następnie tamponada gazą taninowo-jodoformową. Tamponada watą nasyconą: Salutio adrenal. hydrochlor (1:1000). Tamponada od przodu dobrze wykonana zupełnie wystarcza.

Rp. Ferropyrini (Knoll) 5'0; Aq. destillat. 500'00; DS. Do przepłókiwania nosa.

Dla chorych cierpiących na drobne częste krwawienia:

Rp. Alum. crud. pulv. 10'00; Aq. dest. 500'00. DS. Codziennie nos przepłókiwać.

Erysipelas. R ó ż a. Uwzględnić punkt wyjścia cho-

roby i leczeniem tegoż zapobiec nawrotom. Ogólne leczenie jak w każdej chorobie gorączkowej. Miejscowe:
 a) Na głowie: Po dokładnem zmyciu skóry (wodą z mydłem a następnie wyskokiem) zastosować co 3 godziny spray z

Rp. Ichtyol. 20:0; Aether. dep. 30:0; lub:

Rp. Resorcin. resubl. 5:0; Aether. dep. 50:0; aż do ustąpienia gorączki i zblednięcia skóry. Obok tego worek z lodem na głowę.

b) Na twarzy: Skórę zmyć (jak powyżej) a następnie okłady z 10:0 roztworu wodnego ichthyolu lub 5:0 roztworu wodnego rezorcyny lub też wcierać 15:0 maść ichthyolową (albo 5:0 maść rezorcynową) zawsze w kierunku dośrodkowym. Jessner poleca pendzlowanie:

Rp. Acid. tannici; Camphorae aa 2:0; Aether. dep. 15:0. S. Zewnętrznie.

c) Na kończynach i tułowiu: Po dokładnem zmyciu skóry wcieranie co 2 godziny (zawsze dośrodkowo) 30:0 maści ichthyolowej lub 10:0 rezorcynowej. Jeżeli róża ogranicza się do nieznacznej przestrzeni można zastosować 10:0 collodium rezorcynowe.

Erythema exudativum multiforme. Rumień wielokształtny wysiękowy. — **Erythema nodosum.** Rumień guzowaty. Leczenie tylko objawowe. Przy znacznem swędzeniu:

Rp. Ac. salicyl. (s. carbol.) 3:0; Spir. vin. rect. 150:00; Glycerin. p. 5:0. S. Zwilżać nacieki i pudrować.

Rp. Menthol. 0:50; Spir. vin. rect.; Spir. coloniens. aa 50:0. S. j. w.

Gdy gorączka wybitna: Natr. salicyl. 3:0—5:0 na dzień; Phenacetin. 2:0—3:0. Miejscowo: okłady Leiter'a, z wody kolońskiej, z aqua plumbica, z liq. alumin. acet.

Favus. Strupień woszczykowaty. Chorych odosobnić, bo F. łatwo przenieść się daje. Rozmiękczyć strupy (scutula) za pomocą oliwy, tłuszczów.

Rp. Ac. carbolic. 2:0; Ol. Olivarum 100:0. S. Zewnętrznie.

Rp. Naphtol. 0:50; Glycerini p. 100:0. S. Zewn., poczem zmyć na drugi dzień głowę spirytusem mydlanym i wodą letnią.

Następnie wrywać włosy za pomocą szczypczyków w miejscach chorobowo zajętych i ich otoczeniu (na 1/2 cm.) równocześnie wcierać środki przeciwpałozynicze:

Rp. Hydrarg. sublim. corr. 0:10; Spir. vin. rect.; Glycerin. aa 75:0. S. Zewnętrznie.

Rp. Ol. cadini.; Ac. salicyl. aa 2:50; Resorcin. resubl. 5:0; Sulf. praecipit. 10:0; Vaselin. flav.; Lanolin. p. aa 15:0. S. Zewnętrznie.

Rp. Thymol. 0:1. Chloroform. 15:0; Ol. olivar. 30:0. S. Zewnętrznie.

Rp. Ol. rusci; Sapon. virid. $\bar{a}\bar{a}$ 50'0; Spir. vin. rect. 100'0. S. Zewnętrznie.

Postępować tak kilka tygodni, a gdy głowa się oczyści lub wystąpi zadrażnienie, pauza, po której na nowo, jak poprzednio.

Pirogoff poleca po codziennem zmyciu głowy golić chore miejsca i co 24 godzin przykładać:

Rp. Kali carbon. 4'0; Flores sulph. 15'0; Pic. liquid. $\bar{a}\bar{a}$ 50'0; Axung. porc. 100'0; Mf. ung. S. Maść.

Febris intermittens. zob. **Intermittens.**

Fluor albus, blenorhoea vaginae, leukorrhoea, catarrhus vaginae. Białe upławy, nieżyt pochwy. Zwrócić uwagę na przyczyny wywołujące, lub podtrzymujące zapalenie (gwałtowne spółkowanie, pasorzyty, ciała obce, jak tampony, krążki, zapalenie wyśszych dróg rodnych).

Ostry okres: Polecieć spokój, środek wypróżniający, nie używać środków drażniących do przepłukiwań. Letnie przestrzykiwania z wody przegotowanej z dodatkiem soli, lub kwasu borowego 2—3%.

Przewlekły nieżyt: Leczyć choroby ogólne: Niedokrewność, żołądki, blednicę. Wstrzykiwania środków ściągających 1, 2, 3 razy dziennie.

Rp. Plumbi acet. b. pur. 2'00; D. t. dos. X. S. Proszek do litra wody.

Rp. Plumb. acet. b. solut. 100'00. S. 2 łyżki na litr wody.

Rp. Acidi salicylici 20'00; Alum. crudi 10'00; Zinci sulphur. 30'00; Mfp. D. in scatula. S. Na koniec noża do $\frac{1}{2}$ litra wody.

Rp. Creolini 15'00. S. 5—10 kropli na litr wody do wstrzykiwań.

Rp. Aceti pyrolig. crudi 500'00. S. 2—3 łyżek na litr wody.

Rp. Solveli 50'00. S. 2 łyżeczki na litr. wody.

Rp. Sol. formalini 10% 100'00. S. Łyżeczkę na litr wody.

Rp. Alumol 1'50; D. t. pulv. X. S. Proszek na litr wody.

Rp. Acidi tannici 60'00; Alcohol absolut.; Kreosoti $\bar{a}\bar{a}$. 30'00; Aq. destill. 240'00. S. Łyżeczkę na litr wody ciepłej do wstrzykiwania.

Rp. Acid. lactici; Aq. destill. $\bar{a}\bar{a}$ 50'0. S. Łyżkę na $\frac{1}{2}$ litra wody.

Polecają tampowanie górnej części pochwy gazą, którą zmienia się co 24 godzin przez kilka dni, poczem pendzluje 5% roztynem arg. nitricum.

Do przysposabiania roztynów należy użyć wody przegotowanej. Gdy powyższe wstrzykiwania nie usuwają cierpienia, można we wzierniku oczyścić pochwę

i zapendzlować np. octem drzewnym, półtorachlorkiem żelaza, siarkanem miedziowym 10% i to można powtórzyć kilkakrotnie, ale nie częściej, jak raz na 3 dni, wogóle, gdy już odczyn po poprzednim zabiegu minął. Po zapendzlowaniu nadmiar leku splukuje się letnią wodą i zakłada tampony z waty. Można też zakładać na tamponach w kształcie walców proszki: acid. salycilicum, alumen, jodoform z dermatolem, zincum sulphur. w połączeniu z amylum. Wreszcie kąpiele z dodatkiem soli borowinowej Mattoniego.

Rp. Amon. sulfoichthyl 5'00; Glycerini 100'00. S. Płyn do tamponowania.

Rp. Glycerini 100'00; Tannini 3'00. S. Do tamponowania.

Gangraena pulmonum. Zgorzel płuc. Świeże powietrze, częste przewietrzanie pokoju; chory powinien leżeć w łóżku, dyeta pożywna i podniecająca (przetwory wyskokowe), jeżeli niema przeciwwskazań.

Na wewnątrz środki wyksztusne i balsamiczne (bals. peruv., bals. toltan.). częste wziewania z ol. terebinth. 1'0—3'0 na 200 wody lub ol. pini pumilionis polonicae po 10—15 kropli na kieliszek wody do maszynki inhalacyjnej Siegla. Lub też kwas karbolowy 2% do wziewań, ale w takim razie uważać na mocz, czy nie wystąpi zabarwienie ciemne. Również wziewanie z thymolu 0'20 z dodatkiem kwasu borowego 3'0 na 100 wody.

Rp. Kreosoti fagi opt. 2'00; Tinct. absynth. comp.; Spir. vini cognac 50'00; Vini malag. 150'00. S. 3 razy dnia łyżkę w wodzie ocukrzanej zażyć.

Rp. Cortic. chin. reg. 20'00; Macera p. horas sex cum vin. gallic. 180'00, dein filtra et adde: Tinct. nervin. ton. Bestuscheff 2'00; Aq. cinnamoni, Syr. cort. aurant. *aa.* 20'00. S. Co 2 godziny łyżkę.

Rp. Terpinol. 3'00; Natr. benzoici 2'00; Sacch. albi. q. s. ut f. pil. N. 30. S. Co 2 godziny pigułkę.

Rp. Menthol. 3'00; Sacch. alb.; Gum. arab. *aa.* 2'00; Aq. dest. q. s. ut. f. pill. N. XX. S. co godz. pigułkę.

Rp. Myrtoli 0'20; Dtal. dos. N. X. in caps. gel. S. 3 r. dnia po jednej kap.

Rp. Ol. terebinth. rect. 3'00; Mucil. gum. arab.; Syr. simpl. *aa.* 25'00; Sensim terendo affunde, Aqu. dest. ad 150'00. S. Co 2 godziny łyżkę.

Do spluwaczki przykrytej szczelnie wlewać 5% kw. karbolowy lub 2% kreolinę.

Gastreactasia zob. **Dilatatio ventriculi.**

Gastroenteritis u dorosłych patrz **Catarrh. ventriculi, Catarrh. intestinum.**

Gastroenteritis. Zapalenie żołądka i jelit. U dzieci; zapobieganie: przestrzegać czystości i świeżości mleka, nie odłączać dzieci w miesiącach letnich.

W chwili wybuchu choroby nie dawać żadnego pokarmu, nawet piersi, przez 24—48 godzin, a podawać przegotowaną wodę, lekki odwar herbaty na zimno. Celem usunięcia wymiotów przepłókiwanie żołądka wodą przegotowaną z dodatkiem soli (10/0), natr. benzoicum lub bicarbonicum. Równocześnie podawać:

Rp. Acidi mur. diluti gtt. X; Aq. distill. 100:00.

MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

Rp. Acidi lactici 100; Aq. destill. 100:00. MDS.

Co 3 godz. łyżeczkę.

Jeżeli obok wymiotów są silne rozwolnienia, wtedy do herbaty dodawać czerwonego wina, odwar z borówek suszonych. Z początku podać oleum Ricini lub:

Rp. Calomelanos 0'01—0'02; Sacch. lactis 0'15;

Mfp. dent. tal. dos. N. VI. S. Co 3 godz. proszek.

Gdy stwierdzimy znaczne wzdęcia brzucha, stolce mocno cuchnące, wtedy stosować można:

Rp. Kreosti gtt. II; Aq. cinnamoni 80:000; Syr.

simpl. 20:00. MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

Rp. Natri benzoici 2'00; Aq. destill. 90:00; Syr.

simpl. 10:00. S. Co 3 godz. łyżeczkę.

Rp. Resorcini 0'20; Aq. chamomill. 80:00; Syr.

simpl. 20:00. MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Rp. Thiocoli; Sacch. albi aa. 0'05—0'20; Dent.

ital. dos. N. X. S. Co 4 godz. proszek.

Rp. Saloli; Bismuthi salicylici aa. 0'10; Sacch.

albi 0'20; Mfp. dent. tal. dos. Nr. X. S. Co 4 godz.

proszek.

Jeśli rozwolnienie nie ustaje, należy przy ścisłej diecie stosować:

Rp. Trae coto gtt. V; Aq. destill. 50:00; Trae

laud. simpl. gtt. II. MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Rp. Ichthalbini lub Tannalbini (Knoll) 0'10—0'25;

Dent. tal. dos. Nr. XII. S. 4 proszki dziennie.

Rp. Bismuthi subnitrici; Sacch. albi aa. 0'10; Pulv.

Doveri 0'01—0'02; Mfp. dent. tal. dos. Nr. XII. S.

Co 3 godz. proszek.

Rp. Hydrarg. bijodati 0'01; Kali jodati 0'30; Aq.

dest. 90:0; Syr. simplif. 10:0. MDS. Co godzinę

łyżkę.

Jeżeli wymioty i rozwolnienie nie ustają i wytwarzają się objawy, które nazywamy Cholera infantum, wtedy: czarna kawa, herbata z rumem lub koniakiem, szampan co 1/2 godz. łyżeczkę. Kąpiele ciepłe, lub kąpiele gorzyczyczne (łyżkę farinae sinapis w woreczku płóciennym), nacieranie dzieci aż do zaczerwienienia skóry, ogrzewanie kończyn i pościeli wstrzykiwanie podskórne rozczynu fizjol. soli kuch. 30—50 gr., wstrzykiwanie podskórne eteru.

Rp. Cognaci 10:00; Aq. dest. 180:00; Syr. sacch.

20:00. MDS. Co 1/2 godz. łyżeczkę.

Rp. Liquor. ammon. anisati; Spir. aether. aa.
10'00. MDS. Co $\frac{1}{2}$ godz. 3—5 kropli.

Rp. Aether sulfur. 2'00; Mixt. gummos. 100'00;
Aq. cinnamom.; Syr. simplic. aa. 10'00. MDS. Co
godz. łyżeczkę.

Rp. Coffeini n. benzoic. 0'10; Cognaci opt. 10'00;
Liquor. amm. anis. gutt. XV; Syr. simpl. 20'00;
Aquae cham. 80'00 MDS. Co godzinę łyżeczkę.

Gdy stan ostry przemienie, wracać powoli do poda-
wania pokarmów początkowo płynnych i klejkich.

Nadto można stosować lewatywy lub wysokie wle-
wania 5% kw. borowego, tanniny 0'5—1: 100, lub:

Rp. Argenti nitr. cryst. 0'10; Decoct. tub. salep.
50'0. DS. połowę na 1 lewatywę.

Lewatywy można także robić z krochmalu z doda-
tkiem natr. salicyl. w razie parcia z dodatkiem trae
laud. 1—2 kropli. Jeżeli po przebyciu ostrego stanu wy-
twarza się zaparcie, zob. obstipatio alvi.

Gastroent. chronica. Przewlekłe zapalenie
jelita żołądka. Dokładne wywiady o poprzednim
żywieniu. U dzieci sztucznie żywionych, karmionych
obficie amylaceami usunąć takowe.

Jeżeli cierpienie wystąpiło, przy dyecie mlecznej,
usunąć mleko na jakiś czas, a zastąpić kleikami lub
mieszaną śmietankową. Zwrócić baczną uwagę na jakość
i sposób przygotowania mleka. 3—4 godzinne odstępy
w karmieniu. Starszym rosół mocny, kakao, kakao żo-
łądziowe (Jahr). Wzbronić tłuszczy, jarzyn. W celu
zmniejszenia wzdęcia i pobudzenia do lepszego krążenia
okłady wysychające. Podać najpierw środek przeczysz-
czający (Ol. Ric.) i zarządzić 24 godzinną ściętą dyetę
(wodę przegotowaną, lekką herbatę) a następnie:

Rp. Aq. foeniculi 75'00; Bismut. subnitr. 2'00;
Aq. calcis 6'00; Syr. flor. aurant. 15'00. MDS. Co
2 godz. łyżeczkę.

Rp. Infus. rad. colombo e 0'50: 75'00; Bismut
subnitr. 2'00; Syr. flor. aurant. 15'00; MDS. Co 2
godz. łyżeczkę.

Rp. Ichthalbini (Knoll) 0'10—0'25. S. 3 proszki
dziennie.

Rp. Chinin tannici 0'05—0'10; Pulv. Doveri 0'01—
0'02; Sacch. 0'15; Mfp. tal. dos. N. 10. S. 3 proszki dz.

Rp. Bismut. salic. 0'05—0'10; Pulv. Doveri 0'02;
Sacchari 0'15; Mfp. dt. tal. dos. 10. S. 3 proszki
dziennie.

Rp. Saloli 3'00; Pulv. Doveri 0'15; Bismut. sali-
cyl. 2'00; Mfp. div. in dos. X. S. 4 proszki dzien.

Rp. Tannin. 0'02; Aq. dest. 80'00; Vini tokay
15'00; Glycerin. 10'00; Trae opii gtts. tres. S. Co 3
godziny łyżeczkę.

Rp. Tannigen 0'20; Dt. d. Nr. VI. S. 3 proszki
dziennie.

Rp. Tannalbin 0'20—0'50; Dt. d. Nr. VI. S. 3—4
proszki dziennie.

Rp. Tanalbin 0'2—0'5; Pulv. Doveri 0'01—0'02;
Mfp. dtales d. Nr. XII. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Honthin 0'5; T. dos. XII. S. 3—6 pr. dzien.
Starsze dzieci mogą używać wody karlsbadzkiej na
ciepło (Sprudel), wina chinowego, przetworów żelaza.

Gingivitis. Zapalenie dziąseł. Usunąć przy-
czyny (Periodontitis, epulis, stomacace), gdy przyczyną
rtęć, zaprzestać leczenia rtęcią, kąpiele obok leczenia
miejscowego:

Rp. Kali chloric. 10'0; Aqu. dest. 500'0. S. Płó-
kanie.

Rp. Alumin. crud. 5'0—10'0; Aqu. dest. 500'0. S.
Płókanie.

Rp. Ac. Salicyl. 2'50; Spir. vin. rect. qu. s. ad
sol.; Aqu. dest. 500'0. S. Płókanie.

Rp. Ac. thymic. 0'50; Aqu. dest. 500'0. S. Płó-
kanie.

Po jedzeniu (przynajmniej 3 razy na dzień) powinien
chory czyścić zęby miększą szczoteczkę i proszkiem na
zęby, poczem smarować dziąsła:

Rp. Tct. rathan.; Tct. gallar. āā 20'0. S. Do pen-
dźlowania dziąseł.

Rp. Tct. spilanth. olerac.; Tct. opii simpl. āā.
10'0; Aqu. dest. 20'0. S. Zewnętrznie.

Gdy wystąpi zgorzel brzegu dziąseł zapuszczać na-
lewkę jodową między brzeg dziąseł, a zęby.

Haematemesis. Wymioty krwawe. Przed-
wszystkiem należy uwzględnić przyczynę krwotoku.
Chory powinien jak najspokojniej leżeć i wstrzymać się
od pokarmów przynajmniej 24 godzin, a nieraz 1—2 ty-
godni. Jeżeli osłabienie jest znaczne, lewatywy odżywcze.

Na okolicę żołądka okład lodowy, kawałki lodu do
połykania i środki przeciw-krwotoczne, obok laudanum,
kokainy lub morfiny w takich dawkach, aby znieść cał-
kiem pobudliwość żołądka.

W razie zapadu eter podskórnice, lub ol. camphora-
tum lub też rozczyn soli jako hypodermokliza.

Gdy wzmagająca się ostra niedokrewność wskazuje,
że krwotok nie ustępuje, wstrzykiwania podskórne prze-
tworów sporyszowych.

Po ustąpieniu krwotoków dłuższy czas spokojne le-
żenie w łóżku, dyeta płynna, mleko zimne łyżkami, a
obok tego leczenie przyczynowe.

Rp. Tannini puri 0'50; Opii puri 0'10, Sacchar.
albi 3'00; Mfp. div. in dos. N. V. S. Co 2 godziny
proszek; lub opium w czopkach.

Rp. Liqu. ferri sesquichlor. guttas 10; Aqu. dest.

200'00; morph. mur. 0'05; Syr. simpl. 15'00. MDS. Co godzinę łyżkę.

Rp. Alum. crud. 1'00; Extr. opii aq. 0'20; Elaeosacch. menth. pip. 3'00; Mfp. div. in dos. Nr. X. S. Co 3 godz. proszek.

Rp. Extr. secal. cornut 2'00; Spir. dilut.; Glycerini $\bar{a}\bar{a}$. 5'00. DS. $\frac{1}{4}$ — do jednej skrzykawki podskórnice. Podawanie na wewnątrz: Sol. adren. hydrochl. (1:1000) z aqua menthae pin. $\bar{a}\bar{a}$. Co 2 godziny 5—10 kropli.

Rp. Ferropyrini (Knoll) 1'0; Aq. destillat. 100'0. S. Co trzy godziny łyżkę.

Haemoptoe. Plucie krwią — krwioplucie. Bezwzględny spokój, ułożenie chorego na wznak w łóżku, w pokoju o miernej ciepłocie, lekkie przykrycie. Wzbroń wszelkich ruchów.

Pokarmy tylko płynne, zupełnie chłodne (najlepiej mleko). Wstrzymywać się od kaszlu, a jeżeli kaszel trwa, to spore dawki morfiny 1—2 ctg. na raz. Chorego nie badać. Na piersi łód w worku gumowym lub pęcherzu; połykać małe kawałki lodu. Obok tego do zażywania: Plumb. aceticum z opium $\bar{a}\bar{a}$. 0'03 na dawkę, ferropyrin lub też liquor ferri sesquichl. 25 kropl. na $\frac{1}{2}$ szklanki wody, z tego łyżkami; lub też extr. secal. cornuti. pulv. secal. corn. $\bar{a}\bar{a}$. 2'00 na 30 pig., z tego co 2 godziny pigułek.

W cięższych krwotokach wstrzyknąć ergotyne (Bombelon) $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki na raz lub podać atropinę w dawce 0'0002.

Przy podniesionej akcyi serca, radzą inf. digitalis.

Rp. Extr. secal cornuti; Acidi tannici $\bar{a}\bar{a}$. 1'20; Pulv. et extr. gent. $\bar{a}\bar{a}$. q. s. ut f. pill. Nr. 20. DS. Co 2 godziny pigułek zażyć.

Rp. Inf. secal. corn. e. 1'00 ad. 150'00; Tinct. laud. simpl. gtt. V; Syr. capill. vener 20'0. S. Co $\frac{1}{2}$ godz. łyżkę.

Rp. Ergotini puri, Acidi tannici $\bar{a}\bar{a}$. 1'50; Extr. opii aquos 0'05; Extr. liquor. q. s. ut f. pill. Nr. 20. S. Co 3 godz. pigułek.

Rp. Extr. haemostat. 1'00; Morphii muriat. 0'10; Elaeosacch. foenicul. 2'00; Mfp. div. in dos. Nr. X. S. Co 2 godziny proszek.

Rp. Hydrastinini 0'25; Sacch. lact. 3'00; Mfp. div. in dos. X. d. in charta cerat. S. 3 proszki dziennie (następnie 2—1).

Rp. Ergotin dialys. Bombelon 2'00; Aqu. dest. 20'00; Acid. carbol. gtt. tres. MDS. Do wstrzykiwań (1 strzykawka Prawaza zawiera 1 decigr.)

Rp. Ergotin; Chinin. sulph. $\bar{a}\bar{a}$. 2'00; Pulv. fol. digit.; Extr. hyosc. $\bar{a}\bar{a}$. 0'20; Mf. pil. N. XX. S. Co 2 godziny pigułek.

Polecają też wstrzykiwania z atropiny:

Rp. Atrop. sulfur. 0'01; Morph. mur. 0'20; Aqu. dest. 10'00. D. $\frac{1}{2}$ —1 strzykaw. wstrzyknąć.

Rp. Extr. fluidi hydr. canad. 10'00. S. Po 30—40 kropli, kilkc razy dziennie.

Rp. Ol. terebinth. 0'30; Dtal. dos. Nr. XX. in caps. gelat. S. Co 2 godz. kapsułkę.

Rp. Ferropyrini (Knoll) 2'0; Aq. destillat. 100'0. DS. Co 2 godz. łyżkę.

Haemorrhoides. Krwa w n i c e. Starać się o należyte wypróżnienia przez podawanie środków lekko przeczyszczających, wodę karlsbadzką, wodę gorzką itp.

Gorące kąpiele nasiadowe, kąpiele borowin. (Mattoni). Irrygacye odbytnicy usuwają czasami cierpienie.

Sonda chłodząca t. zw. przyrząd Arzbergera. Oprócz tego można próbować czopków z ergotyny, chrysarobiny, lewatyw ściągających, wstrzykiwań czystego kwasu karbolowego do guzów.

Jedynie pewnym środkiem jest tylko operacya. Guzy wypadnięte należy odprowadzić do wnętrza, jeżeli jednak już przeszły w stan zapalny lub zgorzeliowy, najlepiej ograniczyć się do posypywania proszkiem jodoformowym i okładów z octanu glinowego.

Przeciwno uporczywemu swędzeniu najskuteczniejsze są zmywania wyskokiem.

Rp. Pulv. liquir. comp. 50'00. S. Łyżeczkę wieczór zażyć.

Rp. Sal. thermar. carolinens. 50'00. S. Łyżeczkę w szklance letniej wody rozpuścić.

Rp. Extr. secal. corn. 2'00; But. cacao q. s. f. 1. a. supposit. N. X.

Rp. Chrysarobin 0'80; Jodoformii 0'30; Extr. bellad. 0'60; Vaseline. 15'00. Mf. ung. S. Maść.

Rp. Plumb. acetici 0'25; Extr. opii aquos 0'05; But. cacao q. s. ut. f. supp. Dtal. dos. N. X. S. 2—3 czopki przez dzień.

Rp. Calomel 2'00; Morphini 0'15; Bism. submitr.; Vaselinei *aa.* 25'00; Glycerini 8'00; M. f. ung. S. Zewnętrznie.

Rp. Cocain hydrohl. 1'00; Morphii sulf. 0'20; Atropin sulfur. 0'10; Tannin. 0'20; Vaseline 30'00. Mf. ung. S. Po wypróżnieniu posmarować.

Rp. Extr. hamamel. virg. fluid. 0'20; Butyri cacao 10'00; Ol. amygdal. 7'50. Mfung. S. W razie krwotoków posmarować. Suppositoria haemorrhoid.

«Anusol» (scatul. ovigin).

Helminthiasis zobacz **Ascaris. lumbr., Oxyuris, Taenia.**

Hemicrania. Ból głowy połowiczny. Migrena. Uwzględnić: ogólne osłabienie, choroby nerwów, chor. narządów trawienia, zboczenia płciowe. W czasie

napadu spokój. Masowanie czoła i skroni (można użyć maści z mentolem lub kokainą). Smarowanie przecikiem z mentolu.

Rp. Chinin. muriat. 0'25; Coffeini natro-salic. 0'10; Sacchari 0'20; Mfp. dtur. tal. dos. N. 10. DS. W czasie napadu co godzinę proszek (użyć 2—3).

Rp. Antipyrini 0'10; Coff. natr. sal. 0'10; Dtal. dos. N. X. S. 1—2 pr. na dzień w czasie migreny.

Rp. Phenacetin 0'50; Chinin. 0'20; Mfp. dtr. tal. dos. N. 10. S. Jak wyżej.

Rp. Natri salicyl. 0'10; Dtur. tal. dos. N. 10. DS. Jak wyżej.

Rp. Euphorin 4'00; Div. in dos. N. 10. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Coffeini citrici 1'00; Phenacetin 2'00; Sacchari 1'00; Mfp. div. in dos. N. 10. DS. Co 2 godz. proszek; lub: Pyramidon 0'25 pro dosi.

Rp. Phenacetin 0'40; Natr. salicyl. 0'60; Mf. pulv. t. dos. aeq. N. VI. S. W razie bólu i proszek zażyć, po godzinie drugi.

W razie, jeżeli głowa przy migrenie jest chłodna — robić gorące kompresy.

Rp. Pastae guaranae; Sacch. albi $\bar{a}\bar{a}$. 2'00; Mfp. Div. in dos. N. 5. S. Jeden lub dwa proszki podczas migreny.

Rp. Mentholi 0'50; Spir. vin. gal. 10'00. DS. Do nacierania skroni.

Rp. Chinin. muriat. 5'00; Pulv. fol. digital. 1'50; Extr. gent. et pulv. q. s. f. pil. N. 30. DS. Na noc pigułkę.

Rp. Solut. arsen. Fowleri 5'00; Trae ferri pomat. 10'00. S. 2 razy dziennie 5—10 kropli po jedzeniu.

Rp. Ferratini 0'20; Chinin. mur. 0'10; Sol. ars. Fowleri gtt. II. in past. compress. S. Dwie pastylki dziennie.

Woda arsenikalna Gubera.

Rp. Ammon bromati 1'00; Kali bromati; Natri bromati $\bar{a}\bar{a}$. 2'00; Aqu. dest. 180'00; Syr. aurant. 20'00. MDS. 3 razy dziennie łyżkę.

Rp. Migraenini 1'00; D. T. dos. III. W razie bólu i proszek zażyć.

Herpes simplex. Opryszczki. Najlepiej utrzymywać sucho zasypując pudrem salicylowym lub dermatolem, xeroformem. Na genitaliach prócz tego obmywać kilka razy (3—4) dziennie 20% kwasem borowym.

Herpes tonsurans. Liszaj wyłysiający. Chorego odosobnić od otoczenia. Jeżeli H. ogroniczony na skórze niepokrytej włosami: rozcierać mydło szare (sapo virid.), rozmydlić i pozostawić przez 24 godzin; tak robić przez kilka dni, póki nie wystąpi zadrażnienie, wtedy puder.

Rp. Chrysarobin. 5'0; Lanolin, anhydr. 25'0; Adip. suill. 10'0; M. f. ung. S. Maść.

Rp. Anthrarobin. 5'0; Traumaticin. 25'0. S. Zewnętrznie.

Rp. Anthrarobin. 10'0; Spir. vin. rect.; Spir. Lovand. $\bar{a}\bar{a}$. 25'0. S. Pendzlem wcierać. W uporczywych przypadkach:

Rp. Lenirobin; Eugallol $\bar{a}\bar{a}$ 5'0; Chloroformii 50'0. S. Zewnętrznie.

Rp. Merc. sublim. corr. 0'50; Aqu. dest. 200'0. S. 2—3 razy dziennie wcierać.

Rp. Naphthol. 1'50; Spir. saponato-kal.; Vasel. flav. $\bar{a}\bar{a}$. 15'00. S. Zewnętrznie.

Gdy H. maculosus universalis: ciepłe kąpiele mydlane i smarowanie ostrożne częściowe poprzednim środkiem, albo:

Rp. Naphthol. 6'0; Sapon. virid. 300'0. S. Przez 2—3 dni 2 razy dziennie nacierać i pudrować, w końcu kąpieł.

Przy H. t. capilitii, postępowanie jak przy favus (zmycie głowy, epilacya, środki przeciwpasożytnicze).

Rp. Ol. Rusci 15'0; Spir. saponat. kalin. 25'0; Lact. sulfur. 10'0; Spir. lavandul. 50'0; Bals. peruvia. 1'50; Naphtol B 0'50. S. Zewnętrznie.

Rp. Formalini 25'0. S. Pędzlow. codziennie miejsca zajęte.

Przy h. t. vesiculosus, tylko pudrować.

Herpes zoster. Półpasiec, pasówka. Chronić skórę zajęta od tarcia ubrania, zasypywać pudrem 5—10 razy dziennie.

Rp. Ichtyol. 5'0; Zinc. oxyd. 15'0; Amyl. tritic. Talc. venet. $\bar{a}\bar{a}$ 40. MS. Zasyпка.

lub okleić klejem cynkowym.

Rp. Gelatin. alb.; Zinc. oxydat. $\bar{a}\bar{a}$ 15'0; Glycerin. 25'0; Aq. destillatae. 45'0. S. Klej cynkowy.

Okleja się raz na tydzień, a w przerwie kąpieł letnią. Gdy h. gangraenosus często (codziennie) zmieniane opatrunki jodoformowe.

Hydrocephalus. Wodogłowie. — H. acutus. Zimne okłady, wcieranie szaruchy po (2'0—4'0 dziennie na głowę i kark), wewnętrznie podać Colomel, (0'01—0'03 co godzinę).

Dzieciom silnym można postawić 2—4 pijawek. W razie drgawek chloral (0'50—1'00 pro dosi). Synapizm na łydki i kark. Leczenie krzywicy i żołądów.

H. chronicus. Maść n. p. 10% jodoformowa, wewnętrznie Natr. jodatum. Leki moczopędne (Kali aceticum, Juniperus) leki przeczyszczające. Wypuszczenie płynu przez nakłócie lędźwiowe (punctio lumbalis) dające się kilkakrotnie wykonać bez niebezpieczeństwa.

usuwa objawy pochodzące od wzmożonego ucisku śród-czaszkowego.

Hyperemesis gravidarum. Wymioty nie powściągające ciężarnych. Zbadać dokładnie ciężarną w celu, czy się nie da wykazać przyczynowe cierpienie: tyłopochylenie, tyłozgięcie ciężarnej macicy, lub inne zmiany narządu płciowego, lub innych organów, jak nieżyt żołądka, białkomocz, i w takich razach leczenie przyczynowe.

W przypadkach, gdzie żadne zmiany wyraźne wykazać się nie dadzą, należy używać środków zrazu łagodniejszych, później coraz silniejszych, z tych, które bywają zalecane. Uregulowanie i zmiana diety, picie śniadania w łóżku, jedzenie z rana pokarmów ostrych jak n. p. kawałek śledzia, albo picie koniaku zaraz po przebudzeniu. Dyeta mleczna, podawanie pokarmów chłodnych, woda sodowa, wody mineralne alkaliczne, połykanie kawałeczków lodu. Kawa mrożona, lody, wino szampańskie przy jedzeniu. Stomachica, pepsyna, kwas solny. Spokój, leżenie w łóżku. Zmiana warunków otoczenia.

Rp. Cerii oxalici 0'05; S. 1—2 pig. na dzień.

Rp. Mag. Bismuth 1'50; Natri bicarb.; Sacch. albi $\bar{a}\bar{a}$. 2'00. Mf. pulv. div. in dos. X. DS. 3 razy dnia proszek.

Rp. Kali bromati; Natri bromati; Ammon. bromati $\bar{a}\bar{a}$. 3'00; Aq. dest. 200'00; D. in vitr. nigro. S. Rano i wieczorem po łyżce w wodzie sodowej.

Rp. Cerii valerianici 0'05. S. 5 pig. dziennie.

Rp. Orexini basici 0'30; D. t. dos. XII. S. 3 pr. dziennie.

Rp. Cocain. muriat. 0'03; Antipyrini 1'0; Aquae dest. 100'0. S. Co $\frac{1}{2}$ godz. łyżeczkę.

Rp. Trae jodi; Chloroformi $\bar{a}\bar{a}$. 5'0; S. Rano i wieczór wśród jedzenia 5 kropli z wodą.

Rp. Kreosoti; Ol. amygd. dulc. $\bar{a}\bar{a}$ 2'50. S. 3—4 razy dnia 5 kropli w mleku.

Rp. Cocaini muriat. 0'10; Aq. dest. 100'00. DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. pół łyżeczki.

Rp. Cocaini muriatici 0'10; Aq. dest. 10'00. DS. 3—4 razy dziennie 10—15 kropli.

Rp. Menthol. 1'00; Spiritus vini 20'00; Aq. dest. 150'00. S. Co godz. łyżkę.

Narkotyki jak opium, morfina, chloral, jużto przez usta, jużteż podskórnice lub w lewatywach.

Lodowe okłady, synapizmy, rozpylanie eteru na okolicę żołądka. W cięższych przypadkach odżywianie przez odbytnicę.

Gdy te środki nie prowadzą do celu, stosowanie na część pochwową belladony lub kokainy w postaci maści.

Rp. Cocaini muriat 1'0; Extr. Belladonn. 0'25;

Vaselini 15'o. Mfung. S. Do smarowania części pochwowej i ujścia.

Gdy chora nie zatrzymuje zupełnie pokarmów i zachodzi obawa o życie, wskazanem jest, wzniesienie poronienia, co jednak *ex consilio* winno być postanowione.

Hyperidrosis. Poty nadmierne. Przy ogólnem poceniu unikać częstych kąpieli, napojów rozgrzewających, ciepłego odzienia i wstrząśnień umysłowych. Przeciw swędzeniu zwilżać wodą kolońską, octem, następnie pudrować.

Przy miejscowej h. (nogi, ręce, pachy i części płciowe) zmywania:

Rp. Ac. tannic. 1'o; Spir. vini rect. 200'o. S. Zewnętrznie.

Rp. Decoct. cont. quercus e 20'o ad 200'o. S. Do zmywania.

Rp. Extr. aconiti 1'o; Spir. vini rect. 200'o. S. Zewnętrznie.

W pachy i pachwiny zasypywać przytem puder, albo:

Rp. Spir. cologn. 15'o; Mixt. oleosobalsam; Aq. dest. *aa* 25'o. S. 2 razy dnia pendzlować po zmyciu.

Gdy na stopach wystąpią przechłody i owrzodzenia, zalecić ob. codziennych kąpieli, częste zmiany pończoch:

Rp. Ung. diachyl. Hebrae 60'o; Naftalani 30'o. S. Raz dziennie owijać stopy, każdy palec z osobna płótnem rozsmarowanem maścią przez 10—14 dni, potem kąpiele letnie codziennie i zasypywać:

Rp. Alumol.; Dermatoli *aa* 4'o; Amyl. trit. 15'o. S. Zasyпка.

Rp. Tannoform. 10'o; Talc. venet. 20'o. S. Zasyпка.

Rp. Naphthol 5'o; Zinc. oleinici 30'o. S. Puder.

Gdy przechłody zagojone, zalecić pendzlowanie nóg:

Rp. Ac. chromic. 50%—100% lub. Ac. picronitr. 20%.

Rp. Glycerin. p. 10'o; Ferr. sesquichlor. 30'o;

Essent. bergammot. gtt. 20. S. 2 razy dnia pendzl.

Rp. Naphthol. 1'o; Glycerin. p. 2'o; Alcohol. abs. 20'o. S. 1—2 razy dziennie zapendzlować, po pendzlowaniu zawsze pudrować.

Unna rozróżnia dwie postacie:

1. Gdy ręce i nogi chłodne, bo krążenie nieprawidłowe, wtedy wieczór kąpiele letnie z octem, spir. kamforowym, gorczycą, — potem:

Rp. Ol. terebinth.; Ammon. sulfoichthyol. *aa* 5'o;

Ung. zinc. oxyd. 10'o; M. f. ung. S. Maść, rano zmyć i puder.

2. Gdy ręce i nogi ciepłe skutkiem przekrwienia, wtedy wieczór letnie kąpiele i wcierania:

Rp. Ammon. sulfoicht. 5'o; Aq. dest. 50'o; Lanolini anhydri. 20'o. S. Rano zmyć mydłem ichtyol. przefiltrowanem.

Wewnętrznie podawać:

Rp. Pulv. agaric. alb. 2'0; Sacch. alb. 5'0; M. f. pulv. div. in dos. Nr. 20. S. 2—3 pr. dziennie.

Rp. Agaricin. 0'02; Sacch. alb. 3'00; M. f. p. div. in dos. Nr. 10. S. Co 3 godziny proszek.

Rp. Atropin. sulf. 0'01; Gumm. tragacant. 1'50; Glycerin.; Pulv. Livurit. $\bar{a}\bar{a}$ qu. s. ut. f. pill. 20. S. 2 pigułki dziennie.

Hysterya. H i s t e r y a. Zwrócić uwagę na zmiany w poszczególnych organach, zwłaszcza w narządzie moczopłciowym.

Chorą leczyć psychicznie i starać się zyskać zaufanie. Jeżeli jest anaemia, chlorosa, to odpowiednio leczyć. U dzieci: polecić rodzicom nie zwracać uwagi dziecka na jego cierpienia, usunąć z pod wpływu osób dorosłych szczególnie chorych, wprowadzić w warunki i otoczenie wiekowi dziecka odpowiednie, przebywanie ciągle w towarzystwie dzieci i t. p.

W cięższych przypadkach, chorego umieścić w odpowiednim zakładzie i leczenie systematyczne przeprowadzić.

W mniej wybitnych, leczenie w zakładach wodo-leczniczych, zimne nacierania, kąpiele letnie, kąpiele borowinowe (sól borowinowa Mattoniego) i inne procedury. Elektryzowanie prądem stałym, lub faradycznym daje nieraz dobre skutki.

Ze środków wewnętrznych wszystkie nervina, jak asa foetida, castoreum, valeriana, camphora bromata, zincum valerianicum i wiele innych. Obok tego pobyt na wsi, w górach lub kąpielach morskich, higieniczne życie, dyeta pożywna niepodniecająca.

Podczas napadu hysterycznego raptowne zlanie wodą twarzy, silny prąd elektryczny, chłodna kąpiel, chloral w lewatywie lub na wewnątrz. W razie bezsenności sulphonal 1—2 gram. na noc, amylenhydrat 2—3 gram. w wodzie.

Obok tego zalecaną bywa mieszanka bromowa.

Rp. Somnali 10'0; Aq. dest. 45'0; Syr. rub. id. 20'0. MDS. Na noc łyżkę zażyć.

Rp. Pyramidon bicamphor. 0'5; T. dos. V. S. 2 proszki dziennie.

Rp. Amon. bromat.; Natr. bromat.; Kali brom. $\bar{a}\bar{a}$. 3'50; Aq. dest. 200'00; DS. Rano i wieczór po $\frac{1}{2}$ —1 łyżce w herbacie lub mleku.—Injekcye Sperminum Poëhle (scat. origin.).

Rp. Tinct. nuc. vom. 1'00; Tinct. castorei 2'00; Aqu. lauroc. 10'00. DS. 3 razy po 10 kropli.

Rp. Castorei mosc. 0'50; Sacch. alb. 2'0. M. f. p. Div. in dos. Nr. X. S. Dwa proszki dziennie.

Rp. Tinct. castorei; Tinct. valerian. $\bar{a}\bar{a}$. 2'0; Tinct.

asae foetid. 5'0; Tinct. opii croc. 1'0. S. 3 razy dnia po 10 kr. zażywać.

Rp. Trionali 1'0; Dent. tal. dos. Nr. V. S. Na noc 1—2 proszki.

Ichthyosis. Rybia łuska — r. skóra. Kąpiele ciepłe lub parowe, usuwanie łusek przez zmywanie mydłem szarem — po kąpieli nacieranie całej skóry 1—20% maścią naftolową, 30% maścią borową lub nawet obojętnym tłuszczem.

Icterus. Żółta czka. Leczenie powinno być przede wszystkim zastosowane do przyczyny cierpienia (vide Catarrhus gastro-duodenalis, Cholelithiasis, Cirrhosis hepatis, Carcinoma hepatis etc.). Zresztą leczenie przypadkowe, w razie bólów w okolicy wątroby, okład ciepły i wstrzykiwania podskórne morfiny.

Swędzenie skóry łagodzą ciepłe kąpiele z dodatkiem sody i zmywania 20% kwasem karbolowym, z dodatkiem sody, lub rozczyń:

Rp. Acidi carbol. 10'00; Chloral. hydr. 5'00; Aq. dest. 500'00. S. Do nacierania.

Rp. Menthol. 2'00; Spir. vini 50'00. S. Do nacierania. Dyeta przeważnie mleczna i rosółowa (unikać mięsa).

Rp. Infus. rad. rhei e 10'00 ad 180'00; Magnes. ustae 5'00; Syr. simpl. 20'00. MDS. Co 2 godz. łyżkę.

W chronicznych przypadkach wody Karlsbad, Marienbad. Przeciw bieguncie Bismut, Dover, opium. Przytem amara np.

Rp. Fol. trifol. fibrin; Hb. millefolii; Centaur. min.; Fol. menth. pip.; Fruct. foenicul. $\bar{a}\bar{a}$. 30'00; Mf. Species. S. Herbata: 1—2 łyżek na $\frac{1}{2}$ ltr. wody.

Rp. Natri salicyl. 1'00; Natri sulfur. 3'00; Dtal. dos. N. XII. S. Na dzień 1—2 proszki, żeby wypróżnienie wywołać.

Rp. Podophylin 0'01; Extr. bellad. 0'01; Extr. nuc. vom. 0'02; Extr. et pulv. gent. $\bar{a}\bar{a}$. q. s. ut. f. pill. Dent. tales Nr. 20. S. 2—3 pigułki na noc.

Ileus. Niedrożność jelit. Jeżeli przyczyną niedrożności jelit jest zwężenie, okręcenie, uwiązgnięta przepuklina, nie wiele można się spodziewać z leczenia środkami wewnętrznymi, trzeba przystąpić do zabiegu operacyjnego, przedtem jednak należy przez podawanie przetworów makuwca uspokoić gwałtowne ruchy jelit i za pomocą dużych lewatyw próbować przywrócić drożność. Lewatywy z wody sodowej: łączy się syfon z sondą do odbytnicy włożoną i powoli wypróżnia. Gdy powodem niedrożności jelit jest uwiązgnięta przepuklina, należy starać się ją odprowadzić. Jeżeli niedrożność jelit pochodzi z wgłobienia, udaje się często za pomocą przetworów makuwca i lewatyw drożność przywrócić. W nowszych czasach polecają prócz tego, wypróżnienie żołądka za pomocą aspiratora żołądkowego. Gdy te środki nie

skutkują, nie należy długo zwlekać z zabiegiem operacyjnym.

Gdy przyczyną cierpienia jest zaparcie kału, a nie ma objawów zadrażnienia otrzewnej, należy podawać środki przeczyszczające w dużych dawkach, w razie przeciwnym lub gdy środki czyszczące nie skutkują, przetwory makowca, układ lodowy na brzuch, kawałki lodu do połykania, zresztą leczenie przypadowe.

Impetigo patrz **Eczema**.

Influenza. Grypa. Najpierw środek przeczyszczający (calomel 0·50 pro dosi, dzieciom 0·05—0·10). Dalej leczenie objawów, środki przeciwgorączkowe, chinina, antipyrina, phenacetyna, coffeina, szczególnie, gdy bóle głowy zbyt silne, natr. salicylicum (zwłaszcza dzieciom).

Przeciw nieżytom oskrzeli inf. ipec. cum natro benz., codeinum. Starcom zaraz podać wino i środki wzmacniające.

Rp. Chinini mur. 0·35; Salipyrin 0·50; D. t. dos. XII. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Salophen 0·50; Dent. tal. dos. Nr. X. in past. compress. S. 3 pastylki dziennie.

Rp. Aspirini Beyer 0·15—0·30; Dent. tal. d. Nro X. S. 3 proszki dziennie.

Intermittens. Zimnica. W okolicach zimniczych przestrzegać przed ukłóciem komarów, użycie siatek ochronnych. Zimnicę ludzką przenosi tylko gatunek anopheles. W czasie napadu leżenie w łóżku. Przed napadem wiadomym, na 5 godzin chinina.

Częste napady wymagają zmiany miejscowości.

Rp. Chinini muriatici 0·50; Dtur. tal. dos. N. V. S. Przed napadem proszek.

Przez kilka dni, chociażby napad się nie powtórzył, rano i wieczór po proszku.

Jeżeli chory chininę wymiotuje, można ją dać w lewatywie z krochmalem lub:

Rp. Chinini mur. 3·00; Antipyrin 2·00; Aq. dest. 6·00. MDS. Do wstrzykiwań podskórnych.

(1 strzykawka = 0·3 chin. mur.). Jeżeli chory nie znosi chininy, podawać euchininę, błękit metylenowy.

Rp. Euchinini 1·5—2·0 = 1·0 chinin. hydrochlor.

Rp. Methyleni coerulei 0·1, 0·2—0·5.

Przy dłuższym trwaniu:
Rp. Decoct. cort. chinae e 10·00 ad 180·00; Sol. arsen. Fowleri 1·00; Syrup. sacchari 20·00. MDS. 4 łyżki dziennie.

Rp. Sol. arsen. Fowleri 5·00; Trae chinae comp. 15·00. S. Rano i wieczór po 5 kropli, postępować co dzień o jedną kroplę, aż do 20-tu.

Rp. Decoct. fol. eucalypt. gl. e 10·00—20·00 ad 150·00; Syr. cor. aurant. 20·00. S. Co godz. łyżkę.

Rp. Sol. Fowleri; Tinct. eucalypt. glob. āā. 10·00.

DS. Po obiedzie i kolacyi 6—20 kropli w kieliszku wody.

Rp. Ferratini 0'20; Sol. Fowleri gtt. 1—3; Dent. Ital. dos. X, in past. compress. S. 2—3 past. dzien. Dzieciom:

Rp. Chinini muriat. 0'10—0'30.

Rp. Euchini 0'20—0'50; Dent. tal. dos. N. VI. S. Co 3 godz. proszek.

Rp. Chinin. muriatici 0'25; Buthyri cacao 0'50; Mf. supposit. dtur. tal. N. V. S. Przed napadem na 3 godziny czopek, a później po jednym przez kilka dni.

Intertrigo. W y p r z e n i e. Dla zmniejszenia pocenia, swędzenia i sączenia zakładać watę między stykające się powierzchnie skóry i pudrować:

Rp. Zinc. oxydat. 2'0; Pulv. semin. lycopod. 20'0. S. Zasyпка.

Rp. Alumin. plumos.; Pulv. rad. ireos flor. $\bar{a}\bar{a}$ 25'0; Amyl. orizae 50'0. S. Zasyпка.

Rp. Amyli 10'0; Naftalani 30'0. S. Zewnętrznie.

Gdy jest zaczerwienienie, przeczossy, rozpadliny na skórze, wtedy maścić albo wcierać i pudrować, albo przykładając na płótnie pastę Unny:

Rp. Sulfur. praecip. 2'0; Zinc. oxydat. 3'0; Terr. siliceae 1'0; Adip. bensoat. 14'0; Mf. u. DS. Maść.

Rp. Ammon. sulfoicht. 5'00; Zinc. oxydat. 10'0; Empl. diachyl. comp.; Lanolin. anhydr. $\bar{a}\bar{a}$ 50; M. f. ung. S. Maść.

Rano maść zetrzeć watą, a przed założeniem świeżej, przemyć.

Rp. Merc. sublim. corr. 0'1; Aq. dest. 200'00. S. Zewnętrznie.

Rp. Plumbi acet. 1'0; Aq. dest. 100'00. S. Zewnętrznie (lub do okładów).

Zwrócić uwagę na trawienie.

Ischias. R w a k u l s z o w a. Wynaleźć przyczynę.

Jeżeli na tle malaryi, to chinina, arsen; jeżeli wskutek zaziębienia: kąpiele ciepłe, łaźnia parowa, leżenie w łóżku, ciepłe utrzymywanie nóg, środki odwodzące: wzdłuż nerwu kulszowego, jak: pendzlowanie zgęszczonym kwasem solnym, suche bańki, tinct. jodi, synapizmy, vesicatoria, naftalan, obok tego masaż, prąd elektryczny stały (anoda na miejsce bolesne), rozpylanie eteru przyrządem Richardsona, na wewnątrz antipiryna. Natr. salicylicum, phenatecyna, salipyrina, salol, betol, lub kali jodatum w dawkach kilkagramowych dziennie.

W razie silnych bólów iniekcye morfiny.

Rp. Acid. hyperosmici 0'10; Aq. dest. 10'00. S. $\frac{1}{4}$ strzykawki Prawaza.

Jeżeli neuralgia się zmniejszy, chorego można wysłać do kąpiel: Swoszowice, Krzeszowice, Lubień, Cie-

plíce czeskie, Trenczyn, Piszczany, Busk, Truskawiec; kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa). Polecane też bywają z dobrym skutkiem kąpiele w łimanie odeskim.

W przypadkach ciężkich uciec się można do naciągania nerwu.

Rp. Antipyrini; Chinini muriat. \overline{aa} . 0'50. S. 3 pr. dziennie.

Rp. Euphorin 0'40; Dtur. tal. dos. 20. S. 2—3 razy dziennie.

Rp. Salophen 1'00; D. tal. dos. Nr. 10. S. Co 2 godziny proszek.

Rp. Analgeni 0'50; D. tal. dos. N. 10. S. 3—5 pr. dziennie.

Rp. Betoli 3'00—5'00; Sacchari 3'00; Mfp. div. in dos. N. X. S. 4 proszki dziennie.

Rp. Salol 0'50—1'00; Dtr. in capsul. amylac.; D. tal. dos. N. X. S. 3 pr. dziennie.

Z dobrym skutkiem pomazywania skóry w przebiegu nerwu kulszowego kwasem solnym zgęszczonym co dzień lub co drugi dzień. Następnie opatrunek z waty i opaski. Takich pomazań zastosować 4, 5 i więcej w razie potrzeby, uważając jednak, aby zbyt nie skóry nie zadrażnić.

Laryng. catarrh. acuta. Ostry nieżyt krtani. Środki napotne, okłady wysychające, w samym początku wzięwania zimne rozpylaczem Richardsona, lub też wzięwania z przyrządu Siegla, używając do tego alunu czystego 10% z dodatkiem 0'10% morfiny; podobnie boraksu lub soli kuchennej.

U dzieci: *Pseudocroup*.

Wzięwanie pary wodnej lub słabych rozczynów soli, natr. carbon., ammon. mur. jużto z inhalatora, jużto trzymając dzieci nad parą. Ciepłe okłady na szyję, kaptaplazmy. Podawać dużo ciepłych napojów, herbaty, mleka, w ostateczności środki wymiotne.

Rp. Inf. ipecac. e 2'0 ad 40'00; Tart. stib. 0'05; Syrup 10'00. MDS. Co 10 minut łyżeczkę.

Rp. Cupri sulfur. 0'20; Aq. dest. 40'00; Syrup 15'00. DS. Co 10 minut łyżeczkę.

Rp. Extr. hyoscyam. 0'20; Aquae amygd. amar. 5'00; Mucil. gummi arab. 20'00; Syrup emulsiv. 30'00; F. linctus. S. Co 2 godziny łyżeczkę dla złagodzenia kaszlu.

Rp. Dct. altheae 100'0; Sal. ammon. depur. 1'0; Syr. capilli vener. 10'0. DS. Co godzinę łyżeczkę.

Dzieci skłonne do P. w czasie niepogody trzymać w domu.

Laryngitis chronica. Przewlekły nieżyt krtani. Leczenie wzięwaniami nie wystarcza, należy stosować leczenie miejscowe, zwracając równocześnie uwagę na zachowanie się gardła, jamy noso-gardłowej

i nosa. U dzieci zwrócić uwagę w kierunku żółtów. Po-
być nad morzem lub w górach, płókanie i picie szcza-
wnickiej Józefiny. W przypadkach lżejszych zadmuchi-
wania do krtani z czystego alunu, lub alunu z morfiną.

Rp. Alum. crudi; Sacch. lactis *aa.* 5'00; Morphii
mur. 0'10. DS. Do zadmuchiwań krtaniowych.

Laryngitis diphter. Błonica krtani. Ponieważ
dławiec (krup prawdziwy) jest prawie zawsze tylko bło-
nicą krtani, przeto stosować należy surowicę przeciw-
błoniczną i to w dawce większej, 2—3 flaszeczek, wyniki
tego leczenia w dławcu są bardzo dobre.

Nie używać ani upustu krwi, ani pija-
wek, pryszczydeł. Lekkie środki przeczyszczające.

Wziewania z aparatu Siegla jużto wody wapiennej,
jużto podanych niżej środków, z początku co 3 godziny,
w braku przyrządu inhal. nachylać dziecko nad wodę
parującą.

Leczyć błonice, jak podano przy *Diphteritis*, a gdy
występują objawy ścieśnienia krtani (stenosis), przyczem
i błony zaczynają się odrywać, dawać środki wykrztuśne.

W razie upadku sił: wino, cognac, czarna kawa
z rumem, kamfora. Jeżeli przy wdychu i wydechu sły-
chać rżenia z odrywających się błon, wtenczas można
dać środek wymiotny.

Gdy się jednak ścieśnienie krtani wzmacnia, wystę-
puje zapadanie dołków nadobojczykowych, zaciąganie
się dołka podsercowego, bezgłos i napady duszności —
nie zwlekać z wykonaniem intubacji lub tracheotomii.

Rp. Inf. ipecac. e 0'20 ad 80'00; Kali chlorici
1'00; Syrup. rub. id. 20'00. MDS. Co godzinę łyżeczkę.

Rp. Ammon. muriatici 1'00; Aquae dest. 200'00.
DS. Do inhalacji.

Rp. Acidi lactici 2'00; Aqu. dest. 300'00. DS. Do
inhalacji.

Rp. Sublim. corrosivi 0'05; Aqu. dest. 300'00. DS.
Do inhalacji.

Rp. Acidi borici 30'00; Resorcini p. 15'0; Aquae
dest. 1000'0. MDS. Do inhalacji.

Rp. Infus. ipecac. e 0'20 et 100'0; Pilocarp. mur.
0'02; Syr. rubi idaei 15'00. MDS. Co pół godz. łyżeczkę.

Rp. Pilocarpin 0'02; Ammon. carb. 2'00; Kali
chlor. 2'00; Cognaci 20'00; Syr. senegae 25'00; Aq.
dest. 170'00. DS. Co godz. 2 łyżeczki.

Rp. Inf. senegae e 3'00 ad 80'00; Liquor amon.
anisati 1'00; Syrup. simpl. 15'00. MDS. Co godz. łyżecz.

Rp. Inf. ipecac. e 1'00 ad 50'00; Tart. emetic.
0'05; Syrup rubid. 10'00. MDS. Co 5 minut łyżeczkę
aż do wymiotów.

Laryngospasmus. Kurcz głośni. Najczęstszą
przyczyną jest krzywica (craniotabes), więc leczyć ją

odpowiednio (fosfor). W razie napadu zbryzgiwania twarzy zimną wodą i wewnątrznie:

Rp. Kali bromati 1'00; Aquae destill. 80'00; Syr. simpl. 20'00. MDS. Co 3—4 godz. łyżkę.

Rp. Chloral hydrat 2'0; Aqu. destill.; Mucilag. gum. arab. $\bar{a}\bar{a}$. 50'00. S. Co 2 godz. łyżeczkę aż do ustania napadów.

Rp. Pastilli jodo-ferrati comp.; Jahr scatula orig.

Leukaemia. Białaczka. Przyczyna niewiadoma. Leczenie prawie zawsze bez skutku.

Podawać należy chininę z żelazem lub dodatkiem arszeniku. Po dłuższem używaniu zmienić na ol. eukalyptusowy i piperynę, lub polecić pić wodę Gubera, Levico, Roncegno lub Mitterbad, kąpiele borowinowe (Mattoni), Krynica, Żegiestów, St. Moritz, Francensbad.

Żywieć chorego forsownie, pobyt na świeżem powietrzu najlepiej górskim, mierny ruch, zresztą leczenie symptomatyczne.

Radzono inhalacye z tlenu 30—50 litrów dziennie.

Rp. Piperini 5'00; Ol. eucalypti e fol. rec. 10'00; Chinin muriat. 4'00; Extr. et pulv. liquir q. s. ut f. pil. N. 100. S. 4—8 pigułek dziennie.

Rp. Chin. mur. 5'00; Ferri carbon. sacch. 4'00; Natri arsenicosi 0'10; Extr. et pulv. gent. q. s. ut f. pill. N. 100. S. 1—2—5 na dzień.

Wstrzykiwania podskórne:

Rp. Ac. arsenic. 1'0; Liq. natr. caust. 5'0; Coque ad solut.; Aq. dest. steril. 95'0. S. Do wstrzykiwań. Zacząć od $\frac{1}{10}$ strzykawki Pravaza, stopniowo więcej, aż do całej strzykawki. Wstrzykiwania są bolesne!

Lupus. Toczyń, liszaj żrący. a) erythematosus, liszaj rumieniowaty.

Po dokładnem zmyciu mydłem szarem, pędzlować codziennie aż do podrażnienia:

Rp. Kali jodat. 1'0; Jodi pur. 0'1; Glycerin. p. 10'0. S. Zewnętrznie.

Rp. Ac. salicyl.; Ac. lactic. $\bar{a}\bar{a}$. 0.5; Resorcin. resubl. 0.75; Spir. vin. rect. 30'0. S. Zewnętrznie.

Rp. Sol. arsenic. Fowl. 1'0; Aqu. destill. 6'0. S. Zewnętrznie.

Rp. Emplast. hydrarg.; Emplast. saponat. $\bar{a}\bar{a}$. 15'0. S. Na płótnie rozsmarować i codziennie przykładać. Gdy zmiany uporczywe, wyskrobać lub wypalić żegadłem Paquelina.

b) vulgaris.

Zależnie od umiejscowienia wyskrobać dokładnie i wypalić żegadłem Paquelina albo wyciąć i pokryć sposobem Thierscha:

Albo stosować plaster rtęciowy lub salicyłowy (10—20%).

Rp. Ac. pyrogalic. 5'0; Vaseline flav. 50'0; M. f. ung. S. Przykładać aż do podrażnienia.

Albo stosować maść Unny przez 2—3 dni:

Rp. Ac. salicyl.; Ligu. stibii. chlor. $\bar{a}\bar{a}$. 2'0; Creosoti; Extr. cannab. ind. $\bar{a}\bar{a}$. 4'0; Adeps. lanae. 8'0; M. f. ung. S. Maść zielona Unny.

Poczem: maść borową, cynkową, lub lapisową, a po zagojeniu znowu zieloną.

W postaciach przerostowych użyć można przez parę godzin:

Rp. Kal. caust.; Calcar. ustae.; Sapon. virid.; Aq. dest. $\bar{a}\bar{a}$. 2.50. S. Po nasmarowaniu przyłożyć zamoczony wacik wielkości tego miejsca, które ma być zniszczonem.

Gdy istnieją tylko pojedyncze guzki, przypalać je laseczką lapisu lub kołeczkami zamaczanymi w liq. stib. chlor.

Obok leczenia miejscowego zalecać i ogólne, świeże powietrze, żelazo, arszenik, tran, jod i kąpiele w solankach jodowych.

Malaria vide **intermittens**.

Meningitis cerebro-spinalis epidem. Zapalenie opon mózgoworządowych nagminne. Leczenie objawowe. Rozpocząć podaniem kalomelu, w dużych dawkach, a następnie dbać, by były dobre codzienne wypróżnienia. Lód na głowę i na kark, lub zastosować przyrząd Leitera, pijawki, bańki wzdłuż kręgosłupa. Wcieranie szaruchy na ogoloną głowę lub maści jodoformowej. Wstrzykiwanie morfiny, chlorał i natrium bromatum, natrium jodatum (1—2 gramów dziennie). Przeciw gorączce: antipiryna, acid. salicyl., salipyr.

Przeciw wymiotom pigułki lodowe, cocain. muriatic. (1:10, po 5 kropli).

Rp. Jodoformii 5'00; Vaselini 50'00. Mfung. DS.

Wcierać 2 razy na dzień w głowę.

Rp. Chlorał. hydrat. 5'0; Aq. dest.; Syr. aurant.

$\bar{a}\bar{a}$. 50'0. S. Co 2 godziny łyżkę.

u dzieci:

Zimne okłady na głowę, wcieranie szaruchy (2'00—4'00) w tyłogłowie i kark. Wewnętrznie kalomel (0'01—0'03 co godzinę), pryszczydła, — pijawki, punctio lumbalis. W razie drgawek chlorał w lewatywach. Przeciw wymiotom pigułki lodowe. Po uspokojeniu unikać gwaru, rażącego światła; dyeta z początku ścisła, później pożywna, ciepłe kąpiele 35° C. z okładem zimnym na głowę $\frac{1}{2}$ —1 godz. 1—2 razy dnia.

Przetwory jodowe, natrium jodatum 1'0 co 2 godz. łyżeczkę, wcieranie 10'0 maści jodoform.

Meningitis tuberculosa. Zapalenie opon mózgowo-kręgosłupowych. W pierwszych chwilach przeciw podrażnieniu mózgu natr. bromat. (1—2 gramów pro die)

zimne okłady na głowę. Pokój zaciemnić. Lewatywy i środki przeczyszczające. Pokarmy dawać często w małych ilościach. Baczność na oddawanie moczu.

Rp. Calomelanos 0'03—0'05—0'1; Sacchari 2'00; Mfp. div. in dos. N. 10. DS. Co godz. proszek.

Rp. Kali v. Natr. jodat. 1'00—2'00; Aqu. destill. 100'00. MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Rp. Natri bromati 1'00—2'00; Aqu. dest. 100'00; Syrup sacch. 20'00. MDS. Co 2 godz. 2 łyżeczki.

W razie wielkiego rozdrażnienia lub drgawek:

Rp. Chloralhydrat. 1'00; Natri bromat. 1'00; Aqu. dest. 80'00; Syrup cort. aurant. 20'00. MDS. Co godzinę łyżeczkę.

Rp. Urethani 1'50; Natri brom. 0'50; Aqu. dest. 100'00; Syrup simpl. 15'00. MDS. Co godz. łyżeczkę.

Rp. Jodoformti 2'00; Lanolin; Vaseline aa. 10'00. Mf. ungu. DS. Wcierać w tyłogłowie.

Metritis. Zapalenie macicy. W przypadkach ostrego zapalenia macicy: spokojne leżenie w łóżku, u osób silnych kilka pijawek na okolicę podbrzusza, zimne okłady, worek lodowy, nacinanie części pochwowej macicy:

Środki solne wypróżniające. W razie bólesci maść:

Rp. Extr. bellad. 2'00; Vaselini flavt 30'00; Mf. ungtu. DS. Zewnętrznie.

Rp. Extr. opii aquosi 0'10; But. cacao q. s. ut f. l. artis suppositoria ad anum N. V. DS. Co 3—4 godz. czopek.

Po ustaniu bólów, okłady wysychające na brzuch zamiast lodu.

W przypadkach przewlekłego zapalenia: unikanie pracy fizycznej nateżającej, gwałtownego spółkowania, uregulowanie stolca (środki solne, cascara sagrada, Hudyady Janos, Saratica).

U niedokrewnych podawanie żelaza. Jeżeli równocześnie miesiączkowanie zbyt obfite:

Rp. Extr. hydrastis canad. fabricationis Parke et Davis 40'00; D. in l. guttatoria. S. 3 razy dnia po 20 kropli.

Leczenie miejscowe: Przestrzykiwanie wodą przegotowaną, stopniowo co kilka dni ciepłotę wody podwyższając od 28°—30° R., ale nie silnym prądem, kąpiele nasiadowe ciepłe. Pomazywanie części pochwowej we wzierniku co 2—3 dni cum tra jodi, ichthyolem, naftalanem. Tampony w przypadkach świeżych.

Rp. Ammon sulf. ichth. 5'00; Glycerini 200'00. DS. Do tamponów lub

Rp. Kali jodati 5'00; Glycerini 100'00; D. in v. nigro. S. Do tamponów.

Nakłówanie co kilka dni części pochwowej we wzierniku, mięsenie.

W przypadkach zastarzałych amputatio portionis vaginalis. gdy powiększenie macicy znaczne, leczenie kąpielowo zdrojowe; Iwonicz, Rabka, Ciechocinek, Rymanów, Truskawiec. W późniejszych okresach: Krynica, kąpiele morskie. Kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

Menorrhagia. Miesiączka krwotokowa. Nie jest właściwie chorobą, lecz tylko objawem choroby ogólnej w ustroju (haemofilia, blednica), jako przyczyny można uważać masturbację, wzruszenia umysłowe, występuje w przebiegu lub po chorobach zakaźnych, jak płonica, ospa, dur, ostry gościec stawowy. Jako przyczyny miejscowe wymienić należy: Niedowład macicy po częstych porodach lub poronieniach, zatrzymanie części łożyska lub błon, zmiany zapalne na błonie śluzowej macicy i jej mięszu, zmiany zapalne w częściach dodatkowych, zmiany położenia macicy, nowotwory macicy (włóknaki); wreszcie występuje obfita miesiączka w okresie przejściowym (climax), prawdopodobnie wskutek zmian w naczyniach. Leczyć zbczenia w ogólnym organizmie, polecić odpowiednie zachowanie się hygieniczne i dyetetyczne, Thyraden (Knoll). W czasie miesiączki spokój, a jeżeli mimo to krwawienie jest silne, leczyć tak, jak krwotok maciczny. (Patrz następny ustęp). Gottschalk poleca 4—5 dni przed wystąpieniem krwawienia 4 razy dnia po 0·025 stipticinum (Cotarninum muriaticum) albo styptoli (tańszy) w proszku, a w razie wystąpienia krwotoku podwoić dawkę.

Metrorrhagia. Krwotok maciczny. Dokładne wykazanie przyczyny krwotoku.

W przypadkach krwotoku porodowego z macicy, jeżeli przyczyną złe kurczenie się teje: nacieranie dna macicy przez powłoki brzuszne ręką; okłady zimne na brzuch, secale cornutum przez usta, w lewatywie lub podskórnje. Wstrzykiwania gorące (40°), to zimne (2—3°) do pochwy. Uciskanie macicy dwuręczne, wprowadzenie macicy w silną antefleksyę, ściągnięcie macicy silne ku dołowi kulociągami, sposobem Pinkusa 115° C. vaporisatio, przez 20—30 sekund, ostre środki odwodzące na podbrzusze, tra jodi, synapizm, vesicatoria. Wyjątkowo tamponuje się macicę gazą jodoformową.

Rp. Extr. secalis cornut. 3·00. DS. Na koniec noża w rosole zażyć.

Rp. Extr. secalis corn. 2·00; Aqu. destill. 100·00; Syr. cort. aurant. 15·00. DS. Co godz. łyżkę.

Rp. Hydrastinini muriat. 0·02; Sacch. albi 1·00; Mf. trochisci D. t. dos. XII. S. 4 pastylki dziennie.

Rp. Extr. fluid. gossyp. herb. 20·00. S. 3 razy dnia po 20 kropli.

Rp. Extr. fluid. hamamelidis virgin. 30·00. S. 3 razy dnia po ½ łyżeczki; Ergotyna podskórnje.

Gdy macica dobrze skurczona i nic nie zawiera, a krwotok trwa, domyślać się należy przyczyny krwotoku w pęknięciu ujścia zewnętrznego macicy, lub w innym miejscu. Założyć wziernik i tamować krwotok miejscowo przez zeszytanie pęknięcia, podwiązanie, ucisk, tamponadę.

Jeżeli przyczyną są pozostałe części łożyska, błon, skrzepy: usunąć je dokładnie, jeżeli można ręcznie, a gdy to niemożliwe, wyskrobać jamę macicy.

Gdy to nie pomaga, wytamponować pochwę zapomocą penghawar-djambi w gazie jodoformowej; jeżeli przyczyną — nowotwory macicy, usunięcie tychże sposobem operacyjnym. Na razie, podczas krwotoku tamponada pochwy, po przestrzyknięciu tejże rozczynek środka przeciwgnilnego j. n. p. 2% rozczynek kw. karb.; 1:2000—3000 rozczynek sublimatu i t. d. Do tamponowania najlepiej użyć kulek waty oczyszczonej, zamoczonej w glicerynie, pierwsze kulki owinać gazą jodoformową.

W przypadkach gwałtownych wstrzyknięcie do jamy macicy rozczynek Liquor ferri sesquichlor, strzykawką Madurowicza lub Brauna, przyczem warunek konieczny, aby kanał macicy był dostatecznie drożny, aby rozczynek mógł przez szyję macicy do pochwy spływać. (Postępowanie obosieczne, ze względu na możliwość dostania się rozczynek do jamy brzucha). Wreszcie okłócić od pochwy tętnic macicznych. W ostatnich czasach polecają i zachwalają tak środki miejscowo zastosowane, jak i wewnętrzne.

Do pierwszych należy ferripyryna jako proszek na tamponach lub 20% rozczynek wodny, dalej zastosowanie do wnętrza macicy za pomocą odpowiedniego cewnika strumienia pary wodnej 100° C. 2—3 minut (Snigurieff).

Wprowadzenie do macicy patyczków szklanych watą owiniętych, napojonych płynem, który otrzymujemy przez zmieszanie antypyryny i salolu w równych częściach i ogrzewanie tego proszku w probówce nad lampą spirytusową po 2—3 minutach tworzy się płyn brunatny, po oziębieniu krzepnie, lecz dalej ogrzewany, utrzymuje się dłużej w stanie płynnym (Labadie — Lagrave).

Do nowszych środków wewnątrz podawanych należy stipticin (Cotarnin. muriaticum) podawane w proszkach 0.05 5—6 razy dnia lub w kapsułkach; w razie gwałtownych krwotoków wstrzyknąć co dnia 0.20 w mięsień pośladkowy. — Jednakże w działaniu a tańszy jest styptol. (w pastylkach po 0.05).

Równocześnie zwalczanie powstającej ostrej niedokrewności: ułożenie spokojne, poziome, ciepłe okłady na głowę, chłodne napoje, wino, kawa czarna, cognac, rum, tinct. cinnam. tra ferri acet. aeth. Wstrzykiwania podskórne eteru, ol. camphoratum, wstrzykiwania pod-

skórne większych ilości rozczyну soli kuchennej 0'6:100; lewatywy z tegoż rozczyłu.

Rp. Trae cinnam. 50'00. S. Co $\frac{1}{2}$ godz. $\frac{1}{2}$ łyżeczki we wodzie.

Tint. ferri acet. aeth. 15'00. S. 15 kropli do pół szklanki wody do popijania.

Bandaże na kończyny, ucisk na tętnicę główną przez powłoki brzuszne.

Migraena zob. **Haemicrania**.

Morbili, Odra. Niemowlęta i chorowite dzieci oddzielić. Jeżeli przebieg prawidłowy, nie trzeba uciekać się do lekarstw. Pokój ostrożnie przewietrzać, ciepłota od 15—16° R., okrycie średnio ciepłe, lekkie przysłonięcie okien, jeżeli jest światłowstręt.

Dyeta w czasie gorączki ścisła, po jej przebyciu pożywna, za napój lekkie kwaski, lub wody (szczawowy alkaliczne). Dopóki trwa łuszczenie, nie wypuszczać dzieci z łóżka, a mniej więcej 8—14 dni nie wypuszczać z pokoju, zwłaszcza, gdy są objawy nieżyty.

Przeciw nieżytowi spojówek wystarczają przemywania 20% kw. borowego. Silny świąd uspokaja się nacieraniem tłuszcami.

Rp. Lanolin anhydr. 50'00; Vaselin 20'00; Aquae dest. 25'00; M. terendo f. ung. S. Co 3 godziny nacierać.

Silny kaszel wymaga podania naparu ipecac. ze środkami narkotycznymi, wzięwania pary wodnej, napoje ciepłe, odwar ślazu i t. p. W razie biegunki dyeta i opium.

Wysokie gorączki i majaczenia, uśmierzać zimnymi okładami na głowę. Chinina, antypiryna, natr. salicylicum.

Wśród udadku sił, stygnięcia kończyn: wino, cognac, camphora, acid. benzoicum.

Przeciw drgawkom: Chloral w lewatywach (0'50:50) kali bromatum (2:100) co godzinę łyżeczkę.

Jeżeli gorączka przewleka się ponad 4 dni, zwrócić uwagę na przełyk, uszy i nerki.

Powikłania: błonica, dławiec, nieżyt oskrzeli, zapalenie płuc, leczyć według wskazówek odpowiednio podanych.

Rp. Codeini phosphor. 0'02; Linctus gummosi 50'00; Syrup altheae 30'00. MDS. Co 2 godziny łyżeczkę w razie silnego kaszlu.

Rp. Extr. hyoscyami 0'15; Aq. dest. 70'00; Syr. simpl. 10'00. MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Rp. Infus. ipecac. e 0'20 ad 100'00; Tinct. laudani gtts. duas.; Liquor ammon. anisat. 1'00; Syrup altheae 20'00. MDS. Co godzinę łyżeczkę.

Morbus Basedowii. Regularne, higieniczne życie, unikanie zmęczenia fizycznego i umysłowego, wstrzy-

manie się od nadużywania a nawet od picia wysokoku, herbaty, kawy, nadmiernego palenia. Pobyt na świeżem powietrzu, zwłaszcza w górach Davos, St. Moritz, Zakopane, Szmejs, Truskawiec lub nad morzem.

Jako leczenie radykalne polecono wycięcie gruczołu tarczowego z dobrym w niektórych przypadkach skutkiem.

Na okolicę serca okład zimny lub lód, zwłaszcza podczas silniejszej akcji serca, oraz digitalis lub strophantus w miernych dawkach.

U chorych osłabionych anemicznych: żelazo, chinina, arsen, zabiegi wodolecznicze, obok systematycznego stosowania prądu galwanicznego na sympaticus (ganglion supremum i processus mastoidei).

Przetwory bromowe i nervina, woda Gubera, Levico, Roncegno, Żegiestów, Krynica, obok należytego odżywiania i psychicznego spokoju.

Rp. Natri brom.; Aq. amygd. am. $\bar{a}\bar{a}$. 15'00; Trae convall. maj. 12'00; Aq. dest. 60'00. DS. 2—3 łyżeczek na dzień.

Rp. Ferri lactici 1'00; Coff. natr. sal. 1'5; Elaeosacch. foen. 5'00; Mfp. div. in dos. N. XX. S. 2—3 proszki dziennie.

Morbus Brighti. Zapalenie nerek. W razie Morb. Brighti, w okresie ostrym, powinien chory bezwarunkowo leżeć w łóżku. Dieta złożona z mleka, kleików, rosółów, lekkich zup, trochę kaszki, lub ryżu w mleku. Do picia wodę szczawnicką, bilińską, giesshübelską, ubogim zaś zwykłą wodę z dodaniem cytryny lub kwasu.

Na okolicę nerek stawiać bańki suche, nawet cięte, jeżeli mocza bardzo krwawa i zawiera wiele białka.

Jeżeli opuchliny są znaczne, to polecić kąpiele gorące zaczynając od 28° R. do 30° i 32° R. po 15—45 minut, ze zlewaniem na głowę, następnie zawija się chorego w koce na 1—2 godzin, żeby się dobrze pocić. Jeżeli chory czuje się w kąpielu bardzo osłabionym, dać można kieliszek wina. Albo też urządza się choremu w łóżku sztuczną parówkę zapomocą przyrządu opalanego spirytusem. Obok tego można dawać mierne dawki środków nasercowych, jak digitalis, strophantus lub coffein dla połączenia działania napotnego z moczopędnem. Wstrzykuje się też pilokarpinę po 0'01—0'02 na dawkę, uważając jednak czy nie nastąpi zapad. Obok napotnych i moczopędnych polecają silne środki przeczyszczające, jak colocynth, jalapa, gumi gutti, rheum, pigułki Morisona.

W razie przypadków mocznicowych (uraemia), kąpiel gorąca ze zlewaniem zimnemi, silny laxans, podskórnie eter lub kamfora, albo też do lewatywy hydras

chlorali 2—3 gramów lub acid. benzoicum po 0·2 co 2—3 godz. u silnych wenesekcya, pijawki.

Nephritis p. scarlatinam zobacz Scarlatina.

W okresie przewlekłym, chory niekoniecznie ma leżeć w łóżku, zwłaszcza, jeżeli opuchliny nieznaczne.

Dyeta przeważnie mleczna, 2—4 litry mleka, jaja, mięsa mniej, jarzyny, żadnych alkoholików i korzeni.

Do picia wody: Bilińska, Giesshübel lub woda z kwaskami, Truskawiec. Unikać zmęczenia fizycznego, odziewać się ciepło, nie narażać się na nie pogodę i zmiany temperatury.

Choremu należy polecić mierne dawki tanniny lub plumb. acet., ferr. sesquichloratum obok ciepłych kąpieeli, mniej energicznie stosowanych, jak w okresie ostrym i zawijania w koce. Nadto podawać diuretica: koffeina 1·0—1·50 p. die, theobrominum salicyl. w tych samych dawkach, digitalis, adon. vernalis z dodatkiem liq. kali acet. 15—20 na 200.

Fol. jaborandi w naparze; Rad. ononidis; Rad. petroselinii; Bacc. juniperi jako ziółka.

W razie zaparcia stolca środki przeczyszczające.

Rp. Diuretini (Knoll) 5·00; Aq. dest. 100·00; Syr. aurant. 15·00. MDS. Co 2 godziny łyżkę.

Rp. Agurin 0·5 t. dos. XII. S. 3—6 pr. dziennie.

Rp. Diuretini (Knoll) 1·00; Fol. digital. pulv. 0·10; Sacch. albi 0·30; Mff. d. t. d. Nr. X. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Theocini 0·5; D. ad. caps. amylac. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Flor. benzoës.; Sacch. albi *aa.* 2·0; Mfp. div. in dos. N. X. Co 3 godziny proszek.

Rp. Blatt. orient. 2·00; Elaeosacch. foen. 5·00; Mfp. div. in dos. N. XII. S. 2—3 proszki na dzień.

Silnie moczopędnie działa napar z liści brzozy zwykłej (Betula alba), zbieranych na wiosnę i suszonych.

Rp. Urotropin 0·5. S. 3 razy dziennie proszek.

Działa szybko i wydatnie moczopędnie.

Morpiones zob. **Pediculi pub.**

Myelitis. Zapalenie rdzenia (kręgowego).

W ostrej:

Ułożenie chorego równo w łóżku, najlepiej na poduszkach powietrznych. Bańki cięte lub pijawki w samym początku choroby, potem tra. jodi, wcierki z ung. cinereum 3—4 grm. p. die i jednocześnie kali jodatum, jeżeli była lues, a nawet jako środek przeciwzapalny.

Uważać przytem na ślinotok, lodowe okłady na stos pacierzowy. Równocześnie silne środki przeczyszczające: kalomel, jalapa, senna. Uważać na odleżyny, na zatrzymanie moczu.

W przewlekłej formie:

Kąpiele ciepłe, wyjazd do Cieplic, Gasteinu, Tren-

czyzna, Wildbadu, Swoszowie, Piszczan, Lubienia, Truskawca i t. p. wód. Elektryzowania prądem stałym i faradycznym. Na wewnątrz kali jodatum z 10 : 200, 2 łyżki dziennie, arg. nitricum 0'01—0'02 w pigułkach, arsen po 0'01 lub ergotynę po 0'10—0'50. 2—3 razy dziennie (skutek jednak wątpliwy).

Nephritis zob. **Morbus Brighti.**

Neuralgia intercostalis. Rwa międzyżebrowa. Najczęściej przyczyną zimnica, wtedy chinina i arsen.

Elektryzowanie, wcieranie kojących maści. Wstrzykiwania morfiny lub antypiryny.

Rp. Chloroformii 10'00; Ol. hyosc. cocti; Ol. olivar. āā. 20'00. MDS. Do nacierań.

Rp. Extr. opii aquos. 2'00; Spir. aromat. 100'00. DS. Do wcierań.

Rp. Veratrini 0'50; Chloroformii 10'00; Spiritus 50'00. MDS. Do nacierań.

Rp. Antypirini; Aq. dest. āā. 5'00. MDS. 1 lub 2 strzyk. wstrzyknąć w okolice bólu.

Neuralgia trigemini, Prosopalgia. Tic douloureux. Rwa twarzowa — nerwu trójdzielnego. Uwzględnić i leczyć przyczyny: anemia, histeria, zimnica, choroby ucha, zębów itp.

Wycięcie blizny ugniatającej nerw. Leczenie przymiot, zatrucia ołowiem (Truskawiec).

Rp. Chinin muriat. 0'50; Dtur. tal. dos. N. X. S. Jeden proszek przed napadem.

Rp. Exalgin 2'50; solve in tinct. cort. aurant. 5'00; Aq. destill. 120'00; Syr. aurant. 25'00. S. Rano i wieczór łyżkę.

Rp. Solut. arsen Fowleri 10'00. DS. 3 razy dziennie od 3—5 kropli po jedzeniu.

W razie bólu powstałego z przeziębienia:

Rp. Butyl chloral 2'00—3'00; Spir. vini rectif. 10'00; Glycerin 20'00; Aq. dest. 120'00. MDS. 3—4 łyżek na raz. (Dawki według stopnia bólu i indywidualności chorego).

Rp. Natri salicyl. 5'00; Aq. dest. 180'00; Syr. aurant. 20'00. MDS. Co godz. łyżkę.

Rp. Pyramidon salicyl. 0'5—0'75; T. d. VI. S. 2—3 pr. dziennie.

Rp. Antypirini 0'50; Dtur. tal. dos. N. 10. DS. Rano i wieczór proszek.

Rp. Analgeni 0'50. 3—4 razy na dzień.

Rp. Methyl. coerul. 0'02—0'03; Dent. tal. dos. Nr. VI. S. 2—3 razy dziennie.

Rp. Veratrin. 0'15; Morphii acet. 0'10; Ung. cerei 10'00. Mf. ung. S. Wcierać w miejsca bolące.

Rp. Chinini hydrobromic. 0'1; Aconitini cryst. Duquesnel 0'0001; Pulv. et rad. gent. q. s. ut f. pill. D. t. d. XX. S. 1—3 pigułki dziennie.

Rp. Aconitini nitric. 0'003! Aq. dest. 300'00. S. 3 łyżki dziennie.

Rp. Aconitini nitric. 0'001! Aq. dest. 10'0. S. 1—3 strzyk. Pravatzka dziennie.

Wstrzykiwanie 10% wodnego roztworu Ac. hyperosmici (świeży roztwór, bo się łatwo psuje). Elektryczność, naciąganie lub wycięcie kawałka nerwu.

Neurosis gastrica. Nerwica żołądka. Leczyć hypersecretio (patrz catarrh. ventr.). Zaś wymioty nerwowe:

Rp. Menthol. 0'05; Natr. hydrocarb. 1'00; D. tal. dos. ad caps. am. N. XII. S. 3 razy dziennie po jedzeniu.

Czopki:

Rp. Extr. bellad. 0'2; Codein. phosphor. 0'3; Butyr. cacao q. s. U. f. supp. Nr. X.

Suggestya wsparta lekiem:

Rp. Menthol. 0'3; Trae amar. 3'00. M. S. Przed jedzeniem 15 kropli. Przetwory bromowe z wodami aromat.

Obstipatio alvi habitualis. Nawykowe zaparcie. Usunąć przyczyny cierpienia, środki lekko czyszczące, dyeta mieszana, kompoty, jarzyny, owoce, figi, miód, pierniki, zimna woda na czczo.

U dzieci: zmiana pokarmu, w 8 m. podać można gotowane owoce; obok tego zabiegi hydropatyczne, mięsienie, starszym dzieciom i dorosłym wody mineralne: Karlsbad, Marienbad, Hunyady Janos, Saratica, Kissingen (Rakoczy), Krynica, Friedrichshall, proszki Seidlckie, okłady wysychające, elektryzowanie prądem przerywanym.

Rp. Decoct. pulp. tamarind. e 15'00 ad 150'00; Cremor. tartari 15'00. DS. Co 2 godz. łyżkę lub na noc 3—4 łyżek — lub też powidełka tamaryndowe. Ziółka francuskie St. Germain.

Rp. Trae rhei vinos.; Extr. fluid. cascar. sagr. *aa.* 25'00. DS. 2 razy dnia po $\frac{1}{2}$ do 1-ej łyżeczki.

Rp. Extr. aloë aquos; Extr. taraxaci *aa.* 5'00; f. pil. N. 50. S. Rano i wieczór po 1—2 pigułek.

Rp. Trochisci compressi e rheo à 0'50; N. 50. DS. Co dzień na noc 1—3 pastylek.

Rp. Trochisci compressi e cascar. sagrad. à 0'50; N. 50. S. Co dzień na noc 1—3 pastylek.

Rp. Sal. therm. carolin. 100'00. DS. Co dzień na czczo łyżeczkę w $\frac{1}{2}$ szklanki ciepłej wody.

Rp. Natri bicarb.; Magnes carbon. *aa.* 50'00; Pulv. rad. rhei 7'00; DS. 2 razy dnia na koniec noża.

Rp. Podophyllini 0'30; Extr. aloë; Extr. rhei *aa.* 3'00; Extr. taraxaci q. s. f. pil. N. 40. S. Na noc 1—3 pigułek.

Rp. Extr. aloë aquos; Extr. jalapae; Sapon.

medicin. $\bar{a}\bar{a}$ 5'00; Pulv. et extr. rhei q. s. ut. f. pill. Nr. 50. S. 4 pigułki rano zażyć.

Rp. Pulv. rad. rhei; Extr. aloës aquos $\bar{a}\bar{a}$. 5'00; Extr. tarax. q. s. ut f. pill. Nr. 50. S. 3 pigułki rano zażyć.

Rp. Pulv. r. rhei chin. 5'00; Extr. trifol. fibrin. q. s. ut pill. Nr. 50. S. 5 pigulek rano zażyć.

Rp. Podophyllini 0'20; Sapon. medicin.; Melis dep. $\bar{a}\bar{a}$. q. s. ut f. pill. Nr. 20. S. 1—3 pigulek dziennie.

Rp. Extr. coloquinth. 0'50; Pulv. rad. rhei; Pulv. aloës; Resinae jalapae; Gummi gutti $\bar{a}\bar{a}$. 1'00. Myrrhae 2'00; F. pill. Nr. 50. S. 1—4 pig. dziennie.

Rp. Calomelanos; Tub. jalapae; Sacch. lactis $\bar{a}\bar{a}$ 0'30; Mfp; dent. tal. dos. Nr. X. S. 2 proszki dziennie.

Rp. Aloës 2'00; Ferri sulfurici; Chinini sulfur. $\bar{a}\bar{a}$. 1'00; Extr. hyoscyami 0'50; Extr. et pulv. liquir. $\bar{a}\bar{a}$. q. s. ut f. pill. Nr. 30; Consperge c. lycopod. S. Pigułkę dziennie zażyć.

Przy uporczywem zaparciu wlać przez wysoko do rectum wprowadzoną sondę: 70 gr. aether sulf. z 300 gr. Aq. foeniculi.

Oedema pulmonum. Obrzęk płuc. Leczenie głównej choroby w odpowiedni sposób.

Przy pierwszych objawach obrzęku płuc ostrego, podać środki podniecające akcyę serca jak: czarna kawa, cognac, grog, wino, kamfora, piżmo. Podskórnie wstrzyknąć eter, ol. camphoratum lub coffeinę.

Zewnętrznie położyć na piersi i łydki synapizmy, rozcierać nogi i ręce, dać choremu kąpiel i zlewać głowę i piersi zimną wodą.

Jeżeli chory jest krwisty, można puścić krew, zwłaszcza w obrzęku płuc wśród spraw zapalnych. Nadto można dać lewatywę ze środków ostrych jak: decoct. coloquinth. octu, rozczyntu soli itp.

Jeżeli niebezpieczeństwo na razie minęło, dawać cardiac: digitalis, coffeinę, teobrominę, sparteinę, tra stroph. — Po tem leczyć główną chorobę i zwracać uwagę na pierwsze objawy zastoinowe.

Rp. Infus. flor. arnicae e 15'00 ad 120'00; Camphor. trit. 1'25; Mucil. g. mimos. 20'00. Mf. emulsio. S. Co $\frac{1}{2}$ godziny łyżkę.

Rp. Acidi benzoici 3'00; Camphor. pulv.; Stibii sulf. aurant. $\bar{a}\bar{a}$. 0'50; Sacch. alb. 5'00; Mfp. div. in dos. X. S. Co 2 godz. proszek.

Rp. Inf. rad. valerian. e 10'00 ad 150'00; Aeth. acet. 2'00; Syr. seneg. 15'00. DS. Co godz. łyżkę.

Rp. Aetheris sulfur.; Spir. vin. concen. $\bar{a}\bar{a}$. 5'00; Aq. destill. 150'00; Syr. rub. idaei 15'00. MDS. Co godz. łyżkę.

Rp. Apomorphin. mur. 0.10; Aq. dest. 10'00. DS.
1—2 strzykawki podsk.

Rp. Moschii oriental 0'50; Sacch. alb. 2'00; Mfp.
div. in dos. quinque. S. Co godz. proszek.

Orchitis zob. **Epididymitis**.

Otitis. zob. **Choroby ucha**.

Oxaluria. Moczenie szczawianem wapniowym. Wzbronąć potraw mącznych, cukrów, owoców, jarzyn zawierających dużą ilość węglowodanów i cukru, octu, piwa, wina. Dozwolone *na śniadanie*: kawa, herbata, mało mleka, najwyżej jedna bułka z małą ilością masła, jaja mięso, *drugie śniadanie wzbronione*. *Obiad*: rosół, *mięso wszelkiego gatunku*, tłuszcz miernej ilości, ser, zielone jarzyny, sałata, wody mineralne. *Podwieczorek*: herbata lub kawa bez cukru. *Kolacja*: wszelkie mięso, jaja, ser, najwyżej jedna bułka, wody mineralne. Ze środków leczniczych: picie wód: Vichy, Karlsbad, Elster, Salzbrunn, Wildungen, szczawnicka ze źródła Józefiny.

Na wewnątrz: lith. carb., lith. salicylicum, natr. carbon. po 0'50—1'0 dziennie.

Rp. Natri bicarb. 10'00; Lith. carb. efervescentis 50'00; Mf. pulv. div. in dos. N. XX. S. rano i wieczór proszek w szklance wody.

Rp. Natri bicarb. 2'00; Lith. carbon.; Kali carbon. *aa.* 0'50; Aq. flor. naph.; Syr. simpl. *aa.* 20'00; Aq. dest. 300'00. DS. Piżez dzień wypić (rozczyń Ewicha).

Rp. Natr. phosphor. 10'00; Div. in dos. Nr. X. S. R. d. proszek.

Oxyuris vermicularis. Glistnica robaczkowa. Lewatywy z wody, czosnku roztartego w wodzie (garść na 1 litr) lub też lewatywy z czystego tranu.

Rp. Buthyri cacao 3'00; Calomelanos 0'05; Mf. supposit. Dtur. tal. dos. Nr. V. S. Na noc jeden czopek.

Rp. Naphalin 1'00; Ol. olivar. 40'00. MDS. do lewatywy. Dorosłym 5—6'00 : 80'00 oliwy.

Rp. Santonini 0'10; Ol. papaver. 50'00. S. Do lew.

Ozaena. O z e n a. Leczyć chorobę, na której tle występuje: (zołzy, gruźlica). Zwracać uwagę na czystość powietrza, utrzymywać jednostajną ciepłotę. Ostrożne przestrzykiwania $\frac{1}{2}\%$ roztworem soli kuchen., $\frac{1}{10}\%$ kw. borowy, maść borowa. W razie trudności przy ssaniu, karmienie osesków łyżeczką. Wdmuchiwanie kalomelu.

Rp. Zinci sozojodici 2'00; Vaselini; Lanolini *aa.* 20'00; Paraf. liquidus q. s. f. ung. S. Posmarować gazę i wkładać do nosa.

Rp. Calomelanos 1'00; Hydrgr. praec. rubri 0'50; Sacchari 20'00. Mfp. Do wdmuchiwań.

Rp. Ichtyoli 10'0; Ol. ricini 20'0; Spir. vini 100'0. S. Do inhalacyi.

Rp. Saloli 1'0; Acid. salicyl. 0'20; Tannini 0'10; Acid. borici sublt. pulv. 4 0. Mfp. S. Tabaka. Co godzinę zażywać przez $\frac{1}{2}$ dnia.

Rp. Jodoli cryst. 20'0. S. Do wdmuchiwań do nosa.

Rp. Jodoformi 0'30; Vaselini 30'0. S. Maść.

Parametritis p. Perimetritis.

Paraphimosis. Zadzierzgnięcie żołądź, załupiek. Starać się jak najwcześniej odprowadzić za pomocą palców, wywierając ucisk na żołądź; i zlewając ją podczas zabiegu zimną wodą. Jeżeli się nie udaje, nacięcie pierścienia ściśniającego w kierunku podłużnym prącia i następne odprowadzenie napletka, okłady zimne i częste przemywania.

Pediculi a) capitis. Wesz głowia. U dzieci zmyć dobrze głowę spirytusem mydłanym i posypać siarką, poczem zmywać przez kilka dni spiryt. kamforowym. U starszych nasmarować dokładnie głowę (u mężczyzn ostrzyż włosy) naftą lub:

Rp. Ol. Petrae 100'0; Bals. peruvian.; Ol. olvarum. $\bar{a}\bar{a}$ 25'0. S. Zewnętrznie; i owiązać głowę chustką grubą, a po 24 godz. zmyć głowę spirytusem mydłanym, lub zamiast tego położyć głowę 3—4 razy po odstępach 2 godzinnych.

Rp. Decoct. sem. Sabadillae e 10'0 ad 200'0. S. Zewnętrznie, a następnie zmyć mydłem szarem. Dla zgubienia jajek, czepiających się włosów, zmywać głowę wysyconym roztworem sody lub octem.

b) **vestimentorum.** Wiesz. Kąpiele, leczenie wyprysku, a rzeczy do desyntenficy lub oczyścić 1—2% roztworem sublimatu.

c) **pubis.** Mędo weszka. Nasmarować 1—2 razy maścią szarą lub 10% roztworem sublimatu, które jednak wywołać mogą wyprysk, dlatego lepiej użyć maści:

Rp. Praecipit. alb. 1'0; Ung. simpl. 20'0. S. Maść. Maść tę należy wetrzeć 3 razy w odstępach dwugodzinnych, a po następnych 2 godzinach zmyć dokładnie mydłem szarem.

Pemphigus. Pęcherzyca. a) ostra. Profilaktycznie odosobnić chorego. Dieta posilna, lekko strawna. Kąpiele ciepłe z dodatkiem wywaru z kory dębowej (500 grm. kory na kąpiel). Oprócz tego pudrować.

Rp. Acid. salicylii 2'0; Zinc. oxydat. 10'0; Amyl. tritic; Talc. venet. pl. $\bar{a}\bar{a}$. 40'0. S. Do zasypywania. Uważać na wypróżnienia.

b) przewlekła. Uwzględnić stan ogólny chorego, dieta wzmacniająca. Wewnętrznie arszenik w zwykłych dawkach. Zewnętrznie kąpiele ciepłe z wywarem kory dębowej, sublimatem (5 grm. na kąpiel dla dorosłych) maść cynkowa, dziegielowa, pendzlowanie.

Rp. Tinct. rusc.; Ol. olivar. $\bar{a}\bar{a}$. 50'0. S. Zewnętrznie, poczem w $\frac{1}{2}$ godziny po zapendzlowaniu

kąpiel ciepła $\frac{1}{2}$ do 1 godziny trwająca (p. pruriginosus).

Pericarditis. Zapalenie osierdzia. Przede wszystkim spokój, chory powinien leżeć w łóżku. W okresie ostrym na okolicę serca worek lodowy. W razie silnych bólów parę pijawek, suche bańki, pendzlowanie c. tra. jodi. Na wewnątrz inf. digitalis e 1'00 ad 200'000. co godzinę łyżkę, lub inne cardiacum. W razie silnej gorączki podawać antipyrinę, fenacetynę lub antifebrynę w połączeniu z coffeiną dla uniknięcia zapadu. Jeżeli bóle trwają, dać morfinę, chloralhydrat, lub sulfonal na noc. Dyeta przytem płynna niepodniecająca, uważać na regularne stolce. — Jeżeli okres zapalny minął, stosować resorbentia: okłady ciepłe, pendzlowanie jodyną, diuretica, jak: coffeina, diuretyna, digitalis. tra strophanti itp. a dyeta wówczas posilna, lekko podniecająca.

W uporczywych przypadkach można zrobić punkcję i aspirację przyrządami Potaine'a lub Dieulafoy.

Rp. Infus. fol. digit. e 1'00 ad 180'00; Syrup. simpl. 20'00. MDS. Co 2 godziny 2 łyżki.

Rp. Tinct. strophanti 10'00. DS. 3 razy dziennie po 10 kropli.

Po ustaniu gorączki, gdy exsudat zostaje:

Rp. Infus. juniperi e 15'00 ad 200'00; Liqu. kali acet.; Oxymel. scillae $\bar{a}\bar{a}$. 15'00. DS. Co 2 g. łyżkę.

Rp. Infus. hb. digitalis e 1'00 ad 150'00; Kali ac. 5'00; Syrup. simpl. 20'00. S. Co 2 godz. łyżkę.

Rp. Decoct. equiset. e 20'0 ad 200'0; Liquor. terr. fol. tart.; Oxymell. scillae $\bar{a}\bar{a}$. 15'0. DS. Co 2 godz. łyżkę.

Rp. Pulv. fol. digit. 0'5; Coff. natrobenz. 1'00; Sacch. lactis; Elaesacch. calami $\bar{a}\bar{a}$. 1'5; Mfp. div. in dos. Nr. X. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Sparteini 0'02; Sacch. albi 0'20; Mfp. Dtal. dos. N. X. S. 3 proszki na dzień.

Perimetritis. Zapalenie okołomaciczne. Tu możemy też mówić o zapaleniu około trąbek i jajników (perisalpingitis et perioophoritis), jak również o zapaleniu tkanki okołomaciczej (parametritis), gdyż objawy i leczenie są bardzo do siebie podobne.

W okresie ostrym: Spokojne leżenie w łóżku, okłady lodowe na okolicę bolesną, w razie znacznej boleści i gwałtownych objawów, u osób silnych 5—6 pijawek nad okolicę pachwinową, dyeta ścisła, płynna, nadto wewnętrznie: tra. opii simpl. po 10 kropli kilka razy dziennie, albo:

Rp. Extr. opii aquos. 0'10; But. cacao q. s. ut f. 1. artis suppositoria ad anum N. V. DS. Co 3 godz. czopek użyć, a gdy nasilenie objawów się zmniejsza rzadziej.

Gdy ciepłota opadnie, środki łagodnie wypróżniające: lewatywy z wody, z dodatkiem 2 łyżek ol. ricini albo z dodatkiem łyżki gliceryny. Czopki glicerynowe, oleum ricini wewnątrz.

Gdy objawy ostrego zapalenia ustąpiły, okłady wysychające, po ustąpieniu bolesności: kąpiele nasiadowe ciepłe, z dodatkiem $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ kilo soli na kąpiel. Kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa) Truskawiec.

Przestrzykiwanie pochwy słabym prądem wody na 30—38° R. z dodatkiem soli kuchennej (2 łyżki na 1 litr) lub z dodatkiem płynu o składzie:

Rp. Kali jodati 3'0—5'0; Trae jodi 15'0—20'0; Aq. destill. 250'0. S. 1—2 łyżek na litr wody.

Rp. Trae jodi; Trae gallarum $\bar{a}\bar{a}$. 20'00. DS. Do pendzlowania.

Rp. Ammon. sulfo-ichtyol. 5'00—10'00; Naftalini 50'00. Mf. ung. DS. Zewnętrznie.

Rp. Ammon. sulfo-ichtyol. 5'00—10'00; Glycerini 200'00. MDS. Do tamponów.

W przypadkach przewlekłych mięsienie.

Rp. Kali jodati 10'00; Gelatini q. s. f. l. art. globuli vaginales Nr. X. DS. Raz dnia gałkę użyć.

Rp. Jodoфор. desodorati 3'00; But. cacao q. s. ut f. l. art. globuli vaginales N. X. DS. Raz dnia gałkę użyć.

Rp. Ammon. sulfo-icht. 1'00; Butyr. cacao q. s. f. l. art. suppos. ad anum N. X. S. 1 czopek dziennie użyć.

W chronicznej postaci, obciążenie od zewnątrz ($\frac{1}{2}$ —2 klg.), columnisatio, obciążenie śrutem, rtęcią w balonie Brauna. Mimo użycia wyżej wymienionych sposobów leczenia, badanie i objawy wykazują znaczne zmiany około jajników, lub w nich samych, albo, że w trąbce rozszerzonej znajduje się treść (śluz, ropa, krew), to często dopiero leczenie operacyjne usunąć zdoła cierpienie, wskutek którego życie dla kobiety staje się ciężarem. W tych wypadkach należy wyciąć trąbkę schorzałą (salping-ectomy).

Peritonitis. Zapalenie otrzewnej. Bezwzględny spokój; dyeta ściśle płynna. Wewnątrz podawać przetwory maku w dużych dawkach, a w razie silnych wymiotów kawałki lodu do połykania i kokainę lub morfinę. Zewnętrznie środki przeciwzapalne, okład lodowy. Gdy okres ostry minie, okłady wysychające lub ciepłe. Kąpiele ciepłe całe lub nasiadowe.

W przypadkach surowiczego zapalenia z przebiegiem chronicznym, może być czasem wskazane wypuszczenie płynu z jamy brzusznej, a nawet t. z. toaleta jamy brzusznej.

P. Tuberculosa.

Leczyć ogólnie: posilna dyeta, słone kąpiele (Rabka,

Iwonicz, Rymanów), kąpiele borowinowe (Mattoni), Truskawiec, miejscowo ostrożnie wcierać masę jodoformową 25:0 na 100 wazeliny, a następnie brzuch pokryć ceratką Billrotha i opasać cały brzuch flanelą.

Rp. Antipyrini 10:00; Aq. dest. 150:0. DS. 2 łyżki do lewatywy co 2 godziny, póki gorączka nie spadnie do 38.

Rp. Laudani pur. 0:02; Sacch. albi 0:30; Dtur. tal. dos. XII. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Emuls. communis 200:0; Aq. lauroceras. 10:0; Morphii muriat. 0:10. S. Co godzinę łyżkę.

Rp. Resorcini resublimat 2:0; Aq. destill. 180:0; Tinct. laud. simpl. gtt. XV; Syr. simplic. 20:0; D. in vitr. nigro. S. Co 2 godziny łyżkę.

Rp. Cocaini mur. 0:15; Aq. dest. 10:00. DS. W razie wymiotów 10—15 kropli zażyć.

Rp. Emuls. commun. 200:00; Aqua lauroc. 5:00; Morphii mur. 0:05; Syrup. simpl. 10:00. MDS. Co godzinę łyżkę.

W razie parcia na stolec:

Rp. Morphii mur. 0:01; Extr. bellad. 0:02; Butyri cacao 1:00, f. suppos. dtur. tal. dos. X. S. W razie parcia użyć jeden czopek.

Rp. Jodoform. 5:00; Lanolin; Vaseline āā. 25:00. Mfung. S. Rano i wieczór wcierać.

Perityphlitis zob. **Typhlitis**.

Periurethritis. Zapalenie okołocewkowe. W okresie ostrym spokój, zaprzestać leczenia rzeżączki, miejscowo okłady zimne (z aq. plumbi, liqu. alumin. acet.). Gdy chęlibotanie, nacięcie wczesne; gdzie nie ma dążności do ropienia (okres przewlekły), smarować:

Rp. Extr. belladon. 1:0; Ung. ciner. 10:0. S. 3 razy dnia wielkości grochu dokładnie wetrzeć.

Rp. Jodi pur. 0:2; Kal. jodat. 2:0; Ung. simpl. 20:0. S. Jak wyżej.

Rp. Emp. hydrarg.; Empl. saponat. āā 15:0. S. Rozsmarowaną na płótnie codziennie przykładać.

Perniones zob. **Congelatio**.

Pertussis. Krztusiec. Koklusz. Oddzielić dzieci zdrowe zwłaszcza małe. Dyeta pożywna, karmić zaraz po wymiotach. Pobyt na świeżem powietrzu, oddychanie zgośszczonem powietrzem, zmiana miejsca pobytu. Rozpylanie 5% kw. karb. w mieszkaniu.

W razie wystąpienia zapalenia płuc (napady czasem ustają) dawać leki wykrztuśne:

Rp. Trae bellad. gtt. 2—5; Mixtur. gummos. 100:00; Syrup. simpl. 15:00. MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

Rp. Chloral hydratis 0:50; Ammon. v. natri brom. 2:00; Aq. dest. 100:00; Mixtur. gumm.; Syrup. rub. id. āā. 15:00. MDS. Co 3 godziny łyżeczkę.

Rp. Cocain mur. 1'00; Aq. dest. 10'00. MDS. Do
pendzlowań, przelyku i krtani.

Rp. Morphii mur. 0'01—0'02; Aq. dest. 60'00;
Syrup. altheae 15'00. MDS. 3 razy dzien. łyżeczkę.

Rp. Chinini muriat.; Natr. bicard.; Sacchari *aa*
1'50; Mfp. div. in. dos. 10. S. Co 3 godz. proszek.

Rp. Trae alcohol. rad aconit.; Trae bellad *aa*.
gtts. 10'0; Aq. amygdal. amar. 10'0; Aq. destill.
100'00; Syrup. aurant. 20'00. MDS. 3—4 razy dzien.
łyżeczkę.

Rp. Coccionell. pulv. 1'00; Kali carbon. 3'00; Sac-
chari 10'00; Aq. dest. 100'00. MDS. Co 2 godziny
łyżeczkę.

Rp. Antipyrini 1'00; Terpinhydratis 1'00; Aq.
tiliae; Syrup aurant. *aa*. 50'00. MDS. 4—5 razy dz.
łyżeczkę.

Rp. Extr. hyosc. 0'20; Linct. gummosi 100'00;
Syrup rub. id. 20'00. MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Rp. Codeini mur. 0'05; Linct. gumm. 60'00; Syr.
attheae 30'00. MDS. 3—5 łyżek dziennie.

Rp. Antipyrini 0'50—1'00; Aq. de Vichy 80'00;
Syrup rub. id. 20'00. DS. Używać zaraz po napa-
dzie łyżeczkę. — Wyżyć w ciągu 24 godzin.

Rp. Dct. hbae thymi 10'00 ad 200'00; Ammon.
bromat. 2'00; Syrup altheae 20'00. MDS. Co 2 godz.
łyżeczkę.

Rp. Bromoformii 5'00.

DS. Dzieciom do roku życia 2—3 kropli,

od 2—4 lat 3—4 „

do 8 lat 4—5 „

3 razy dziennie podać w łyżeczce wody.

Rp. Tussol (antipyr. amygdalic.) 2'0; Aq. destil.
80'00; Syr. senegae 20'0. MDS. Dziennie 1—3 łyże-
czek.

Rp. Acidi benzoici; Bismut. salicyl. *aa*. 5'0; Chi-
nin sulf. 1'0. Mfp. DS. 2 razy dziennie wdmuchi-
wać do nosa.

Rp. Acidi borici; Coffeae tost. *aa*. 5'0. Mfp. DS.
2 raz y dzienniewdmuchiwać do nosa.

Rp. Thymoli 1'0; Spir. vini rectific. 250'0; Aqu.
dest. 750'0. DS. Do inhalicyi.

Rp. Aspirini 0'2—0'5; Heroini 0'1000—0'001; Mfp.
Dent. tal. dos. Nr. X. S. 3'proszki dziennie.

Rp. Kreospti 0'25; Sulfonal 0'20; Syrup tolutani
150'0. MDS. Co 2 godziny łyżeczkę (przed użyciem
wstrząsnąć).

Rp. Antispasmini 1'0; Aq. amygd. amar. 10'0.
S. 1—2 razy dziennie po 10 kropli.

Pharyngitis. Z a p a l e n i e g a r d ł a. Leczenie winno
poprzedzać zbadanie jamy noso-gardłowej, względnie
nawet nosa; przy zajęciu tychże równoczesne leczenie.

W przypadkach postaci zanikowej, suchej, leczenie prawie bezsilne; nieraz sprawia się ulgę chorym pendzłowaniem.

Rp. Jodi puri 0'25; Kali jodati 1'0; Glycerini 20'00.
DS. Zewnętrznie.

Pharyngitis hypertr. granulosa lub lateralis.

Kauteryzowanie miejscowe lapisem w substancji lub pendzłowanie całego gardła rozcżynami lapisu 10 i 20%, lub taniny np.:

Rp. Acidi tannici 2'0; Spir. vini rectific. 20'0. DS.
Zewnętrznie.

Rp. Sozjodoli 2'50; Aq. dest. 50'0. S. Do pendzłowania.

Niemniej można chorym zapisywać zimne rozpylania z rozcżynów 1—2% natri bicarb., kali carbon., natri chlor., ammonii chlor., dalej płókania z tych środków lub z taniny np.:

Rp. Acidi tannici 5'0; Spir. vini rectific. 50'0; Aq. dest. 500'0; (Morphii mur. 0'10—0'20). DS. Do płókania gardła.

Phosphaturia. Nadmierne wydzielanie fosforanów z moczem. Dyeta prawie całkiem odmienna niż przy skazie moczowej. W z b r o n i o n e: jaja, owoce, jarzyny. Tylko w małej ilości mięsa. D o z w o l o n e: mleko, potrawy mączne, cukry, miód, masło, piwo, wino, woda sodowa. Nie dawać wód alkalicznych.

Zwracać uwagę na objawy neurasteniczne.

Rp. Urotropin 0'5. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Ac. mur. dil. 30'0. S. 3 razy dziennie po 20 kropli w 1/2 szklanki wody.

Rp. Ac. benzoic. 2'0; Sacch. alb. 1'0; M. f. pulv. Div. in dos. aeq. Nr. VI. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Ac. lactic. 3'0; Aq. dest. 200'0; Aq. menth. pip. 50'0. S. 3 razy dziennie po łyżce w 1/2 szklanki wody sodowej.

Pityriasis versicolor. Łupież pstry. Rozmydlić na skórze mydło szare, siarkowe lub naftolowe (przetłuszczone Eichhoff'a) i pozostawić, robiąc to codziennie aż do podrażnienia skóry; wtedy kąpiel i puder; albo nacierać codziennie i pudrować, aż nie nastąpi złuszczenie przyskórka:

Rp. Ac. carbolic (s. salicyl.); Spir. lavandul. āā 2'0; Spir. vini rect. 15'0. S. Zewnętrznie.

Rp. Naphtholi 0'50; Spir. vini rect. 50'0. S. Zewnętrznie.

Rp. Anthrarobin 5'0; Lalonin. anhydr. 40'0; Ol. olivar. 10'0; M. f. ung. S. Maść.

Rp. Ol. terebinth. 20'0; Lanolini 30'0. M. f. ung. S. Maść.

Rp. Naphtol. vazogen 100/0 30'0. S. Do pendzłowania.

Pleuritis. Zapalenie opłucnej. Łóżko, pożywienie płynne, zwłaszcza jeżeli jest gorączka. Suche bańki na okolicę zajętą zapaleniem opłucnej, jeżeli bardzo silny ból, to nawet 4—6 pijawek lub wstrzyknięcie morfiny. Potem okład lodowy, lub wysychający. W razie męczącego kaszlu morfina. Jeżeli się wypocina nie wytwarza, to pozostać przy tem leczeniu, co najwyżej pendzlowanie przez kilka dni cum tra jodi i nie pozwalać choremu wychodzić, dopóki tarcie istnieje i stan podgorączkowy się utrzymuje. Zresztą trzeba leczyć chorobę zasadniczą, najczęściej nacieki szczytowe. Jeżeli zaś nagromadza się wypocina, to obok okładów wysychających można zalecić smarowanie raz na dzień jodyną lub przyszczydło. Wewnętrznie natrium salicylicum 3—4 gr. dziennie. W okresie, kiedy już wypociny nie przybywa, pendzlowanie jodyną, kataplasmy ciepłe, wewnętrznie kalium jodatum, diuretica, jak: inf. digitalis, theobrom. natro. salicyl. po 4—5 grm. dziennie, coffeinum natro-salic. 1—1.5 dziennie, calomel., adonis vernalis 6'o na 200'o, tra stroph., kali nitricum i t. p. Nadto można próbować środków przeczyszczających, jeżeli nie ma przeciwwskazania.

Tam, gdzie wypocina ropna, należy zrobić resekcję żebra i ropę wypuścić, jeżeli zaś chory się nie zgadza, to przynajmniej punkcję i aspirację płynu przyrządem Potaina lub Dieulafoi. Punkcja nadto jest wskazana, jeżeli znaczna bardzo duszność grozi życiu chorego.

Po przebyciu zapalenia opłucnej, wyjazd na świeże powietrze, w góry do Zakopanego, Szczawnicy, Davos, Gleiichenbergu, odżywianie forsowne, gimnastyka odpowiednia i leczenie w gabinetach pneumatycznych.

Zresztą leczyć należy chorobę główną, która dała powód do zapalenia opłucnej, a tą jest najczęściej gruźlica płuc.

Rp. Dect. cort. chinæ e 10'o ad 150'o; Natri salicyl. 3'o; Syrup. aurant. 20'o. MDS. Co 2 godz. łyżkę.

Przy pozostałym exsudacie:

Rp. Dococt. adonidis e 15'o ad 200'o; Oxymel scillae 20'o. DS. Co 2 godz. łyżkę.

Rp. Natr. chlorat. 3'o; Lithii chlorat. 1'o; Aq. petroselin. 130'o; Syrup. menth. 20'o. S. Co 2 godz. łyżkę.

Rp. Duotali Bayeri 0.25—0.50; Dent. tal. dos. Nr. XII. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Kali hydrojod. 2'o; Jodi puri 0.50; Ung. digitalis 20'o. Mfung. S. Maść.

Rp. Aspirini Bayeri 0.25—0.50; Dent. tal. dos. Nr. XII. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Sapo. vir. 50'o. S. Maść.

Albo okłady napojone: Spirit. saponato-kalin.

Pneumonia. Zapalenie płuc. Leków swoistych przeciw pneumonii nie posiadamy. Leczenie więc prze-
ważnie objawowe. Zasadą jest, że w prawidłowo
przebiegającym zapaleniu płuc czem
mniej lekarz stosuje leków, tem lepszy wy-
nik. Dyeta płynna: bulion, rosół, mleko, winna pole-
wka, wino, rosół z żółtkiem (kilka razy dziennie).

W pierwszym okresie zapalenia płuc można posta-
wić suche bańki, zwłaszcza, jeżeli jest kłócie w pier-
siach, przy bardzo silnem kłóciu nawet 2—3 pijawek
lub cięte bańki i okład lodowy lub wstrzyknięcie mor-
finy. Przy silniejszym kaszlu, męczącym chorego, nie-
znaczne dawki narkotyków. Jeżeli gorączka bardzo wy-
soka lub trwa długo, należy przeciwdziałać przez zmy-
wanie ciała letnią wodą lub pół na pół wodą z octem,
podawać środki przeciwgorączkowe jak: antipyrinę 1.00
—2.00 fenacetylę 0.3—0.5, z dodatkiem kofeiny 0.15—0.20
na dawkę, lub też obok tych przetworów dać jeszcze
koniak lub mocne wino. Przy słabem tętnie, takież
akcyi serca, podać alkohol, digitalis, strophantus lub
spar teinę.

W objawach zapadu, podać kamforę 0.1 w kieliszku
wina lub podskórnie strzykawkę ol. camphorat.; wreszcie
podskórnie eter, w razie oedema pulmonum można za-
stósować upust krwi.

Rp. Infus. valerianae e 5.00 ad 200.00; Aether.
sulf. 2.00; Syr. aurant. 20.00. S. Co godz. łyżkę.

Chorem, przyzwyczajonem do nadużywania wy-
skoku, należy z obawy przed delirium nie szczędzić
wina, koniaku.

Rp. Cognaci optimi; Aq. milissae āā 60.00; Syr.
cort. aur. 40.00; Vitel. ovi N. duo. MDS. Co 2 godz.
łyżkę.

W razie delirium: opium, morfina lub chloralhydrat
(2—3 grm.).

Rp. Chloral. hydr. 4.0; Aq. dest. 25.0; Syr. cort.
aurant. 20.0. S. Na raz użyć.

Rp. Tinct. capsici annui 5.0; Aq. dest. 180.0;
Syr. simpl. 20.0. S. Co 2—3 godz. łyżkę.

W okresie rozdzielania się nacieku: środki wykrztu-
śne, rozdzielające, jak: woda giesshübelska, józefinka,
szczawnicka, kali jodatum.

Rp. Infus. senegae e 10.00 ad 200.00; Natri ben-
zoici 2—3.00; Liquor ammon. anis. 2.00; Syrup
simpl. 20.00. S. Co 2 godziny łyżkę.

Rp. Infus. ipecac. e 0.30 ad 180.00; Aq. lauroc.
2.00; Syr. altheae 20.00. DS. Co 2 godz. łyżkę.

Pulv. Doveri 0.25, 2 lub 3 dawki, stib. sulfur. aurant.
0.01—0.02 na dawkę, 2—3 razy na dzień itp. W razie
trudnego rozdzielania się nacieku: okłady wysychające,
okłady ciepłe, kataplazmy, dyeta pożywna, wino, koniak.

Podagra zob. **Arthritis**.

Pollutiones. Z m a z a. Leczenie przyczynowe: phimisis, kamienie pęcherza, choroby кишки stolcowej, a przede wszystkim neurastenia; unikać podrażnień płciowych, wysiłków umysłowych lub fizycznych; zalecać pobyt na wsi lub w górskiej okolicy, kąpiele rzeczne, morskie lub solankowe. Dyeta lekko strawna; unikać napojów wyskokowych, kawy i herbaty, późnej wieczery, miękkiej pościeli i ciężkiego przykrycia. Leczenie ogólne, wzmacniające (żelazo, arszenik, chinina); wewn.:

Rp. Natr. bromat. 2'0; Dent. tal. dos. Nr. X. S. Rano i wieczór proszek.

Rp. Camphor. monobrom. 0'30; D. ad. caps. amyl. d. t. Nr. XV. S. 3—4 kapsułek dziennie.

Rp. Kal. bromat. 2'0; Lupulini pur.; Camphor. ras. āā 0'20; Dent. tal. dos. ad caps. amyl. Nr. XX. S. Rano i wieczór proszek.

Rp. Ergotin. Bonjeau 0'1; Sacch. albi 0'3; Dent. tal. dos. Nr. XV. S. 3—4 proszków dziennie.

Przytem użyć można leczenia miejscowego sondami metalowymi ciężkimi, psychrophorem Winternitz'a, elektroterapii, wreszcie przepłókiwań pęcherza lub wkraplania sposobem Ultzmanna jak przy rzeżączce.

Processus puerperalis. Febris puerperalis. G o r ą c z k a p o ł o g o w a. Zapobiegać przeniesieniu zakażenia z osób chorych na zdrowe. Ścisłe aseptyczne postępowanie podczas porodu, t. j. utrzymanie w stanie aseptycznym rąk, narzędzi, bielizny, czyli wszystkiego, co wchodzi w zetknięcie z rodzącą, unikanie niepotrzebnego częstego badania rodzącej.

Gdy występuje po porodzie gorączka lekka do 38° C. a tętno spokojne, odchody rozłożone: przestrzykiwanie pochwy 1—2 razy dnia rozczykami: kwasu karbolowego, kwasu borowego, kreoliny, tymolu. Posypywanie owrzodzeń w przedsionku i na międzykroczu jodoformem, opatrzenie gazą jodoformową. Antipyretica zaciemniają obraz chorobowy i nie przynoszą korzyści.

Gdy ciepłota i tętno się podnosi po użytem postępowaniu: przestrzykiwanie jamy macicy środkami przeciwniepalnymi (Acid. boricum 30%. Acid. carbol. 2—50% itd. za pomocą cewników Bozemanna, Fritscha, Olshausena, 2—3 razy dziennie). Gdy po 2 dniach ciepłota nie opada, postępowania tego zaniechać.

Gdy są objawy podrażnienia otrzewnej: lód na brzuch, opium per anum. Środki rozwalniające (ol. ricini, calomel) podawać można, tylko gdy nie ma zdrażenia otrzewnej.

Przy rozwinięciu się gorączki połogowej, postępowanie Rungego: mocne wina 1—2 butelek dziennie. Koniak. Gdy skłonność do wymiotów, wino szampańskie z lodu.

Rp. Cocaini muriat. 0'10; Aq. dest. 100'0. DS. Co 1/2 godz. łyżeczkę.

Gdy wstręt do wina, to koniak, rum.

Rp. Spir. vini cognac. optimi; Aq. dest. $\bar{a}\bar{a}$. 60°0; Vitellum ovi unius; Syr. simpl. 20°0. DS. Co pół godz. 1—2 łyżek.

Mleko, herbata, czarna kawa, silne rosoły, beeftea, do napoju: woda z dodatkiem białka kurzego, jednego jaja na szklanke (przecedzić). Gdy tętno szybkie: coffeina wewn. Jeżeli nie ma podrażnienia otrzewny, kąpiele letnie (22—24° R.) 5—10 minut 1—2 razy dziennie. Polecają też wstrzyknąć w udo lub łydkę 1°0—1°2 terpentyny oczyszczonej celem wywołania miejscowego ropienia (abscessu). W nowszych czasach stosowano wstrzykiwanie roztworu sublimatu do żył (0°001 pro dosi i wyżej z roztworu 10/0).

W ostatnich czasach próbowano leczyć gorączkę połogową za pomocą wstrzykiwań surowicy przeciwpaciorkowej (Marmorka) w dawkach od 20—40 cm. sześć, jakoteż wcieraniami maści Grèdègo (ung. coloidale po 4 gr. na dawke) lub wstrzykiwaniami aseptycznymi collargolu do żył.

Podskórne wstrzykiwanie normalnego roztworu soli kuchennej (6:1000) 2 litry dziennie.

Postępowanie przeciwgorączkowe: Gdy ciepłota dochodzi do 39°5' C., zmywanie całego ciała kilka razy dziennie, gdy dochodzi do 40° C. zawijanie w mokre, w letniej wodzie maczane prześcieradła; zawijanie takie można powtórzyć 2—3—4 razy, aż do opadnięcia ciepłoty, 1—2 razy dziennie. Zimny okład na głowę. Uważać na tętno i w razie zapadu środki podniecające.

Prostatitis. a) *acuta*. Zaprzestać leczenia miejscowego; polecić pacjentowi łóżko, dyetę płynną, antiflogosa, na międzykrocze pijawki, dbać o wolne wypróżnienia; przeciw bólowi i trudnemu oddawaniu moczu (spasmus sphincteris externi) narkotyki w czopkach:

Rp. Morphii mur. 0°10; Extr. bellad. 0°30; Butyri cacao q. s. f. supp. ad anum. N. X.

Dobre usługi oddaje przyrząd podany przez Fingera (Kühlapparat), przez który (podobnie jak w psychroforze) przepuszcza wodę o ciepłocie 12—15° przez 20—30 minut 2—3 razy dziennie. Jeżeli mimo wszelkich zabiegów leczniczych gruczoł nie zmniejsza się, a nawet wybadać się da chęłbotanie — przecięcie z кишки odchodowej, dalsze leczenie jak każdego ropnia.

b) *chronica*.

Leczyć przedewszystkiem sprawę rzeżączkową czy nieżytną części tylnej cewki, psychrofor, mięsienie per rectum, kąpiele nasiadowe, wprowadzanie czopków:

Rp. Kali jodati 0°50; Jodi puri 0°05; Extr. belladon. 0°07; Butyri cacao q. s., f. supp. N. V. S. Rano i wieczór czopek.

Rp. Ammon. sulfoicht. 0°15; Extr. bellad. 0°01;

But. cacao 1'50. M. f. supposit. S. Rano i wieczór
czopek.

Prosopalgia patrz **Neuralgia trigemini**.

Prurigo. Świerzb i ą c z k a. Kąpiele siarczane (dla
dzieci 30—100 gr. wątroby siarczanej na kąpiel, dla do-
rosłych 5 razy tyle) codziennie wieczorem przez $\frac{1}{2}$ —1
godziny, po kąpieli wtarcie 20% maści naftolowej. Po
4 tygodniach takiego leczenia można stopniowo ordyno-
wać kąpiele coraz rzadziej. Kąpiele dziegciowe.

Rp. Ol. rusc. (anthrasol); Aether. dep.; Spirit.
vin. rectific. $\bar{a}\bar{a}$ 30'0. S. Zewnętrznie.

Całą skórę pendzluje się tym rozczyntem, a w 15 mi-
nut po zapendzlowaniu kąpiel ciepła przez 1 godzinę.
Po kąpieli natarcie 2—5% maścią naftolową lub nawet
obojętnym tłuszczem.

Pruritus ani. Świąd odbytu.

Rp. Calomelanos 5'00; Vaselini 35'00. S. Maść.

Rp. Ung. bromocoll 20'0 25'0. S. Maść.

Rp. Mercurii sublimati 0'03; Ammon. chlorati
0'10; Acidi carbolici 4'00; Glycerini 60'00; Aquae
rosarum 120'00. S. Zewnętrznie; nacierać tym płyn-
nem 2—3 razy dziennie.

Skuteczne bywają pendzlowania c. oleo rusci, 5%
rozczyntem alkoholowym kwasu karbolowego.

Pruritus universalis. Świąd o g ó ł n y. Uwzględnić
w leczeniu przyczynę, jaką bywają: przewlekłe nieżyty
żołądka i kiszek, cukrzyca, u kobiet zboczenia w narzą-
dzie rodnym. Późny wiek stanowi sam przez się przy-
czynę tego przykrego cierpienia (p. senil.). Polecić kąpiele:
z sublimatu, wątroby siarcz., ałunu, zimne tusze, zawiązania
w mokre koce. Przeciw napadowi swędzenia zmyć ciała:

Rp. Acidi carbolici 5'00; Spir. vin. gall. 100,
lub 30% rozczynt alkoholowy mentolu, następnie puder.
Jako maści:

Rp. Anthrasol 50'0. S. Zewnętrznie.

Rp. Chloral. hydrat.; Ac. carbol. $\bar{a}\bar{a}$ 0'5; Ol.
olivar.; Lanolin. anh. $\bar{a}\bar{a}$ 25'0. S. Nacierać miejsca
swędzące.

Rp. Hydrarg. oxydat. rubr. 0'10; Vaselin. flav.
25'0. S. Nacierać po zmyciu mydłem.

Wewnętrznie:

Rp. Ammon. valerian. 10'0; Syr. menth. pip.
20'0; Aq. tiliae 125'0. S. 2—4 łyżek dziennie.

Pruritus vulvae. Świąd p o c h w y. Uwzględnić
przyczyny: Zapalenie sromu i pochwy, u dziewcząt pa-
sorzyty, wyprysk, masturbację, żylaki, blizny po wrzo-
dach, zaparcie stolca, diabetes. Przyczyną świerzbiączki
może być nieprawidłowe uwłosienie sromu (Mars) mia-
nowicie zwrócenie włosów na wewnątrz przedsionka
(entropium labiorum). — Unikać drapania, kąpiele na-
siadowe na 14—26° R., okłady z kwasu karbolowego 20%,

okłady sublimatowe $\frac{1}{2}\frac{0}{100}$. Wyciąć lub wygolić nieprawidłowo rosnące włosy, — można też użyć maści.

Rp. Menthol. 3'0; Ol. olivar. 1'0; Lanolini 6'0; Mfung. S. Do smarowania. Lub zwilżyć rozczy-nem:

Rp. Hydrarg. bichlorat 2'0; Alcohol 10'0; Aq. rosar 40'00; Aq. destill. 450'0. S. Zewnętrznie.

Rp. Natri subsulfur. 30'00; Acid. carbol. 5'00; Glycerini 2'00; Aq. dest. 500'00. MDS. Do obm. (płyn letni).

Rp. Ac. carb. crist. 5'00—10'00; Ol. olivar. 100'00. DS. Do smarowania.

Rp. Chlorofom 5'00; Ol. olivar. 50'00. MDS. Do pendzlowania.

Rp. Cocaini muriat. 1'00; Lanolini 5'00; Vaselini 15'00. Mfung. S. Do smarowania.

Rp. Methylenblau 0'06; Extr. et pulv. gentian. āā q. u. fiat. pill. dt. t. dos. XXX. S. 2—3 pigułek dziennie.

Psoriasis. Łuszczyca.

Rp. Solut. Fowleri; Trae malatis ferri āā 10'000, rozpoczynając od 12 kropli na dzień; co 2—4 dni bierze chory o 2 krople więcej. W ten sposób zwiększając stopniowo dawkę, dojść można do 40 kropli na dzień, którąto ilość używa pacjent przez dłuższy czas, aż zmiany chorobowe zaczynają ustępować. Zmniejszając w podobny sposób dawki o 2 krople co 3—4 dni dochodzi się znów do pierwotnej ilości.

Rp. Natr. arsenicos. 0'05; Aq. destill. 25'0. S. $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki Pravatz'a co drugi dzień.

Rp. Ac. arsenicos. 0'05; Piper. nigr. 5'0; Gummi tragacant. 1'0. Aq. destill. q. s. ut. f. pill. Nr. 100. S. 3 pig. dziennie — co 4 dni o jedną pigułkę więcej aż do 10 i nazad.

Polecają jodek potasu w wielkich dawkach, zaczynając od 3'00—5'00 pro die; co 2—3 dni zwiększając dawkę, dochodząc stopniowo do 15'00—20'00 pro die. W 4—6 tygodniu przy tem leczeniu zaczynają zmiany na skórze ustępować. Lekkie objawy zatrucia nie są przeciwwskazaniem do dalszego podawania leku.

Leczenie zewnętrzne ma za zadanie:

- 1) usunięcie łusek,
- 2) „ nacieku,
- 3) „ przekrwienia.

Celem usunięcia łusek, polecamy ciepłe kąpiele i zmywanie się w nich mydłem szarem lub salicylowem. Na pojedyncze części ciała jak łokcie, kolana można stosować okłady Prissnitz'a. Kąpiele można zastąpić przez tłuszcze jak: waselina, szmalec, tran zawierając pojedyncze części opaskami flanelowemi po poprzedniem nasmarowaniu jednym z wymienionych tłuszczów.

Celem usunięcia nacieku wcierania (robione codziennie) za pomocą pendzla szczecinowego.

Rp. Acidi pyrogal 10'00; Naftalani 90'00. S. Maść.

Rp. Chrysarobini 5'00—10'00; Naftalani 100'00. S. Maść.

Rp. Anthrarobin. 10'0; Vaselin. flav. 40'0; M. fung. S. Maść.

Jeżeli zmiany chorobowe na skórze są nieliczne, rozsiane, nadaje się dobrze smarowanie ognisk chorobowych przez 10—14 dni rozczynem:

Rp. Chrysarobini 5'00; Traumaticini 50'00. S. Zewnętrznie.

Rp. Lenirobin 5'0; Naftalani 95'0. S. Zewn.

Rp. Eurobin 1'0; Naftalani 99'0. S. Zewnętrznie.

Rp. Eugallol; Aceton *aa* 10'0. S. Zewnętrznie.

Rp. Chrysarobin. 10'0; Gelatin. alb. 50'0; Aq. dest. 100'0. S. Rozpuścić w kąpieli wodnej i rozsmarować pendzlem na skórze.

Przy zastarzałej psoriasis zmodyfikowana sol. Vlemmingx:

Rp. Calcii oxydat. 50'0; Sulf. sublim. 100'0; Aq. dest. 1000'0; Coque ad remanent 600'0. DS. Pociierać poszczególne miejsca, po czym kąpiel ciepła.

Także maść Wilkonsona stosowana według Hebry.

Rp. Sulf. citrin.; Ol. fagi *aa*. 50'0; Sapon virid.; Axung. porci *aa*. 100'0; Pulv. cretae alb. 10'0. DS. Przez 6 dni pendzlem 2 razy dnia nacierać, 10 dnia kąpiel. (Zamiast ol. fagi można zastosować anthrasol przyjemniejszy bo bezbarwny).

Kaposi poleca zwłaszcza na zmiany na głowę 5—10⁰/0 maść naphtolową.

W razie powstającej dermatitis, po użyciu któregokolwiek z powyższych środków, zaniechać dalszego używania, ograniczyć się do pudrowania skóry.

Przeciwno zmianom na czaszce:

Rp. H. praecip. albi 2'00; Unguenti emoll. 20'00. S. Maść, którą maść wciera pacjent codziennie, po poprzednim usunięciu łusek zapomocą zmywania głowy mydłem szarem.

W okresie wybuchu ostrego łuszczycy, nie używać środków drażniących silnie skórę (chrysarobin, oleum rusci i t. d.), bo łatwo powstają wypryski i zapalenia powierzchowne skóry; ograniczyć się do polecenia kąpieli ciepłych i leczenia wewn.

Pyelitis. Zapalenie miedniczek nerkowych.

Jeżeli jest okres ostry zapalny: chory ma leżeć w łóżku, suche bańki w okolicę nerek, dyeta tylko płynna, przeważnie mleczna, najlepiej mleko pół na pół z wodą wapienną, picie wody: Bilińska, Giesshübler, Szczawni-

ca, Truskawiec, Wysowa, wystrzegać się kawy, herbaty, korzennych zapraw i napitków wysokokowych.

Przy cierpieniu przewlekłym dyeta mniej ścisła, z unikaniem jednak wszelkich napojów wysokokowych i korzeni, kąpiele letnie i leczenie miejscowe, jak cystitis.

Wewnętrznie: środki balsamiczne i odwar ziół (zob. blennorrhoea), wreszcie środki ściągające:

Rp. Kali chlorici 4'0—6'0 na 200'0, z tego co godzinę łyżkę.

Rp. Arbutini 3'00; Aq. dest. 150'00; Syr. simpl. 15'00. DS. Co 2 godz. łyżkę.

Rp. Tannini 0'10; Opii 0'02; Sacch. albi 0'30; Mfp. d. tal. dos. N. X. 3—5 proszki dziennie.

Rp. Natr. salicyl. po 0'50. S. 3—4 razy na dzień.

Rp. Plumbi acetic. 0'3—0'5; Sacch. alb. 5'0; Div. in dos. Nr. X. S. Co 2—3 godzin proszek.

Rp. Chinin. tannic. 0'2; Sacch. alb. 0'3; Dent. tal. dos. N. X. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Ol. terēbinth. rect. gtt. 3. D. tal. dos. in caps. gelat. Nr. 50. S. 3 kapsułki dziennie.

Rp. Ser. lactis. clarefic. 500'0; Alumin. crud. 3'0. S. W dniu wyżyć.

Rp. Urotropin.; Saloli āā 0'2—0'50; Dent. tal. dos. Nr. XV. S. 4—5 proszków dziennie.

Rp. Helmitol 1'0; T. d. XII. S. 3—4 proszki dziennie.

Rp. Natr. benzoic. 0'3; Elect. aromat. 0'1; Prlv. et. extr. acoris. qu. s. ad. pill.; Dent. tal. dos. Nr. 50. S. 4—5 pig. dziennie.

Rp. Ol. terebinth. rect.; Camphor. pulv. āā 6'0; Extr. thebaic. 0'35; Extr. rad. aconit. 0'20; M. f. pill. Nr. XX. S. Co 8 godzin pigułka; lub narkotyka, pijawki na okolicę nerek, wreszcie wstrzykiwania morfiny.

Rachitis. Krzywica. Najwięcej skuteczne pielęgnowanie i żywienie. Dzieci z krzywicą powinny być jak najwięcej na powietrzu w ubraniu lekkim, zamiast pierza materace z włósia; przy craniotabes: poduszeczka z włósia z wyciętym otworem na główkę. Przy skrzywieniach kręgosłupa i załamaniu kończyn, nie pozwalać dzieciom bez podpory siedzieć, a próby ze staniem i chodzeniem bardzo ostrożnie zaczynać. W razie obfitych potów zmywać ciało kilka razy gąbką zmoczoną w zimnej wodzie i dobrze wycisnąć, a zwłaszcza tyłogłowie.

Młodszy dzieciom nie podawać pokarmów mącznych. Drugim ważnym czynnikiem są kąpiele, jeżeli nieżyt oskrzeli nie przeszkadza.

Daje się je w połączeniu ze słodem ($\frac{1}{2}$ litra) i solą ($\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ do 1 funta na 20 litrów) z dodatkiem ziół aromatycznych, w razie niedokrewności sole żelaziste, kąpiele

(26⁰ R.) z soli borowinowej (Mattoniego), na tydzień 2—3 razy, nigdy na noc.

Nieżyt oskrzeli leczyć naparem ipecac, senegae, liquor amm. anis.

Kurczowi głośni energicznie zapobiegać, (zob. Laryngospasmus). Skrzywienia kończyn często wśród ogólnego leczenia ustępuje, w razie przeciwnym wymagają leczenia gimnastycznego, ortopedycznego, szyn, gorsetów i t.p.

Rp. Phosphori 0'01; Ol. amygdal. dulc. 30'00; Gum. arab.; Sacchari $\bar{a}\bar{a}$. 15'00; Aq. dest. 40'00; M. f. emulsio. D. in vitro coeruleo. DS. Jedną łyżeczkę na dzień.

Rp. Phosphori 0'01; Lipanin 30'00; Pulv. gumm. ar.; Sacchar. $\bar{a}\bar{a}$. 15'00; Aq. dest. 40'00. DS. 1—2 łyżeczki dziennie.

Rp. Phosphori 0'01; Ol. jecor aseli 100'00. DS. 1—2 łyżeczki dziennie.

Rp. Phosphori 0'06; Alcohol. 20'00; Spir. menth. 0'50; Glycerin. 60'00. DS. 3 razy dziennie po 6 kropli — (Co tydzień o kroplę więcej aż do 10).

Także thyraden (Knoll) w pastylkach.

Rp. Aq. pyrophosphatis ferri et sodae. S. 3 razy dziennie łyżeczkę. Dalej:

Rp. Pastilli jodo-ferrati comp. Jahr. scatul. orig. S. 1—2 kołacz dziennie.

Rp. Syr. mangan. ferr. pept. fabr. Matula.

Rp. Ferri pyrophosphor. 0'05—0'10; Sacchari lactis 0'20; Mfp. dtur. tal. dos. Nr. XV. S. 2 proszki dziennie.

Rp. Calcii phosphor. 30'00. DS. Parę razy dziennie na koniec noża do pokarmów.

Rp. Calpar. phosphor. 30'00. Ferri lactici 2'00; Sacch. lactis. 30'00. Mfp. S. 3 razy dziennie na koniec noża.

Rp. Bismut. subnitrici; Carbonat calcar. $\bar{a}\bar{a}$. 1'50; Mfp. div. in dos. N. X. S. Co 4 godzin proszek (w razie uporczywego nieżytu przewodu pokarmowego).

Rp. Ol. jecor. aselli 20'0—40'0; Mucilag. gumm. arab.; Aq. dest. q. s. f. l. a.; Mixtr. oleosa col. 80'00; Syrup. simpl. 10'00. DS. 3 razy dzien. łyżkę.

Rp. Ol. jecor. aselli 150'00; Limaturae ferri 20'00, stent. in mecerat. per 24 horas deinde decant. DS. Rano łyżeczkę.

Dzieciom z nieżytem kiszek stanowczo fosforu nie podawać.

Rheumatismus articulorum. Gościec stawowy.

1. *Acutus.*

Chory bezwarunkowo ma tak długo pozostać w łóżku, dopóki gorączka nie minie, obrzęki się nie zmniejszą i bóle nie ustąpią.

Ze środków najprędzej działających polecają: anti-pyrinę, z natr. salicylicum po 0'50, dziennie takich proszków 4—6. Jeżeli obawiamy się zapadu po silnych dawkach antipyriny, to lepiej dodać do każdego proszku 0'15 coffeini natrosalicylici.

Dalej stosować można samo natr. salicyl. 5'0—6'0 pro die, acid. salicyl. 4'0—5'0 pro die, phenacetin po 0'50, po 4—5 proszk. dziennie, — antifebuin od 0'25—0'50, 3—4 proszki na dzień, antinervin 0'50, 3 razy na dzień, aspirin 0'50—1 gr. 3 razy dziennie.

Rp. Salipyrin 0'50. DS. Kilka razy dziennie proszek.

Rp. Aspirini 0'50; Dent. tal. dos. Nr. XV. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Salopheni 1'00; Dt. tal. dos. X. S. 3—4 proszki dziennie.

Rp. Phenocollum hydrochl. 1'00; Dent. tal. dos. Nr. XII. S. 3 proszki dziennie.

Nadto okłady lodowe na bolesne stawy, lub ciepłe okłady. Pendzlowanie jodyną i zawijanie w watę. Smarowanie stawów mieszkanką chloroformową, Ichtyolem i naftalanem.

Dobre wyniki daje zwłaszcza, gdy podawanie natr. salicyl. jest z jakichkolwiek powodów przeciwwskazane, zewnętrznie na chory staw methylum salicylicum (sztuczny ol. gaultheriae). Płyn ten czysty kroplami (50—120 kropli i więcej) nakapać na chory staw i natychmiast przykryć kawałkiem papieru gutaperkowego, watą i opaską flanelową. Raz lub dwa razy na dobę. Wsysa się do skóry niezmiernie szybko.

Podobnie działa mesotan p. rheum. musc.

Także podać można wewnętrznie zamiast natr. salicyl.:

Rp. Methyli. salicyl. artificial. 1'0; Syrup. citri; Rum aa 50'0; Inf. fol. theae chinens 1:100'0. S. Łyżkami w przeciągu 2 dob wyżyć.

Jeżeli równocześnie występują bóle w nerwach jako powikłanie gośceń ostrego w postaci: polyneuritis dawać równocześnie salicyl i jodek potasowy.

Rp. Natr. salicyl. 5'0; Kal. jodat. 1'0—2'0; Aq. dest. 200'0. MS. Wyżyć przez dzień.

Jeżeli szum w uszach po tym leku występuje dodać doń:

Rp. Extr. secal. corn. 0'5—1'0.

Nadto leczenie wszelkich powikłań w odpowiedni sposób, zwłaszcza zapaleń osierdzia, opłucnej i t. p.

2. *Chronicus.*

Obok środków wyż wymienionych i kali jodatum —3'0 pro die, polecić ciepłe kąpiele, kąpiele ze soli borowinowej (Mattoniego), pendzlowanie jodyną, masaż stawów maścią jodową, ruchy bierne, wysłanie chorego

do czeskich Cieplic, Trenczyna, Piszczan, Swoszowic, Krzeszowic, Truskawca.

Rp. Jodoformii 3'00; Extr. opii aq. 2'00; Ung. simpl. 30'00. *Mf. ungu. DS. Maść.*

Rp. Ichtyoli 10'00; Ungu. parafin. 90'00. *Mf. ung. DS. Maść.*

Rp. Naftalani 3'0; Vaselini flavi 50'0. *Mfung. S. Wcieranie.*

Rp. Sapomenthol fabr. Matula.

Rp. Ammon. sulfoichthyol; Spir. aether. *āā.* 10'00; Collodii 20'00. *DS. Do pendzlowania stawów.*

Rp. Trae colchici 1'00; Trae aconit. 3'00; Trae opii 2'00. *DS. 3—4 razy po 15—20 kropli.*

Rp. Exalgin 2'50; Alcohol menth. 15'00; Aqu. dest. 100'00; Syrup. simpl. 30'00. *S. Co godzinę łyżkę.*

Rp. Natri jodat. 6'00; Sol. Fowleri 5'00; Natri bicarb. 15'00; Kali bicarb. 30'00; Dct. sarsaparill. comp. 600'00. *S. Po obiedzie łyżkę zażyć.*

Rheumatismus musculorum. Gościec mięśniowy. Wewnętrznie można podać mierne dawki natr. salicylicum, antypiryny, phenacetyny a obok tego działać miejscowo przez wcieranie maści kojących, mieszanki chloroformowej. Kąpiele ciepłe i borowinowe (sól borowinowa Mattoniego), zawijania w koce, łaźnia parowa, masaż, prąd elektryczny, kąpiele siarczane. Cieplice w Czechach, na Węgrzech, Truskawiec i t. p. miejscow.

Rp. Aspirini 0'50—1'0; Dent. tal. dos. Nr. XII. *S. 3 proszki dziennie.*

Rp. Chloroform.; Ol. olivar. *āā.* 10'00; Tinct. opii simpl. 5'00. *DS. Do wcierań.*

Rp. Trae bellad. 1'50; Bals. vitae Hoffman. 80'00; Chloroformii 20'00. *DS. Do wcierań.*

Rp. Veratrin. 0'30; Chloroform 15'00; Mixt. oleos. balsam. 80'00. *DS. Do wcierań.*

Rp. Sapomenthol fabr. Matuja D. in lagena org.

Rp. Mesotan.; Ol. olivar. *āā* 15'0. *S. 3 razy dz. wcierać.*

Rhinitis. Nieżyt nosa. *Acuta:*

Srodki napotne, miejscowe pendzlowanie 10% kokainą lub wprowadzenie długich tamponików z waty, zanurzonych w roztworze kokainy, przyczem nie należy zapomnieć o tem, iż kokaina może się dostać do trąbek Eustachiusze, sprowadzając przemijające przytępienie słuchu.

Rh. chron. atrophica, połączona z cuchnieniem z nosa i zaleganiem mas zeschniętej wydzieliny. Po wykluczeniu scleroma, lues, cierpienie zatok bocznych nosa, należy stosować przestrzykiwania nosa, najlepiej z irygatora, 2—3 razy dziennie, biorąc na każdy raz litr wody ciepłej, dodając do niej łyżeczkę od kawy z proszku:

Rp. Natri bicarbonici 100·00; Natri chlorati 50·00.
S. Łyzeczkę na litr wody do przestrzykiwania.

Rp. Magn. carbon.; Natr. bicarbon. 0·20; Mentholi 0·05; Nosopheni; Sacc. lactis *aa.* 2·50. Mfp. Tabaka do nosa.

Można też dodać kwasu salicylowego lub borowego w ilości 5·00. Gdyby zeschnęła wydzielina nie dała się usunąć przestrzykiwaniami, należy ją usuwać szczypcami.

Przy rozpoznaniu lues leczenie tejże ogólne obok miejscowego, gdzie na pierwszym miejscu należy postawić nitras argenti w roztynach 2—5%, względnie sublimat 1%. Przy scleroma również przepłukiwania nosa, przy ropieniu z zatok bocznych nosa leczenie tegoż.

Chron. hypertrophica.

Zbadanie nosa od tyłu, by się o stanie przerostu przekonać. Leczenie miejscowe tuszowaniem z lapisu 5—10%, wprowadzenie bougies z waty zanurzonych w roztynie 3%. Na. chlorat. z każdej strony po dwa, odpowiednio dolnemu i średniemu przewodowi nosowemu, usuwanie wybujałości przerostowych w końcu leczenie galwanokauterem.

Scabies. Swierzb. U dorosłych polecić wcierać przez 3—4 dni (zawsze wieczorem) jedną z niżej podanych maści, zwróciwszy uwagę na to, by maść została dokładnie wcierana, zwłaszcza między palcami, w dłonie, staw nadgarstkowy, łokcie, pachy, pośladki, prącie, okolice stawu kolanowego i stopowego.

Rp. Naphthol 10·00; Naftalani 90·0. S. Maść.

Rp. Florum sulfuris; Olei fagi *aa.* 40·00; Saponis viridis; Axungiae porci *aa.* 80·00; Cretae albae 5·00. S. Maść.

Zamiast ol. fagi — anthrasol (bezbarwny).

Rp. Axung. porcin. 100·0; Sapon. virid. 50·0; Naphthol. 15·0; Cretae alb. pulv. 10·0; M. f. ung. S. Maść (Kaposi).

W praktyce ubogich solutio Vlemingx (300), którymto płynem chory powinien się natrzeć 2—3 razy.

Rp. Styracis liquidi; Sulfur. praecip.; Cretae *aa.* 20·0; Vaselini 50·00. S. Maść.

Rp. Balsam. peruvian.; Styrac. liquid. *aa.* 50·0. S. Zewnętrznie.

Rp. Epicarini 7·0; Cretae albae 2·0; Vaselini flavi 30·0; Lanolini 15·0; Axung. porc. 45·0. S. Zewnętrznie.

Rp. Naphthol. 5·00; Vaselini 75·00. S. Maść. Peruol; Mydło peruolowe 40%; Peruscabinum.

U dzieci zwrócić uwagę na to, by obok miejsc powyżej wskazanych równie dokładnie wetrzeć maść w stopki, po czem leczyć często pozostające wypryski.

Scarlatina. Płonica. Ścisłe odłączenie chorych, aż do zupełnego zżuszczenia, t. j. 5—6 tygodni, poczem

należy mieszkanie odwietrzyć, okna, podłogi wymyć 5% kw. karbolowym lub formaliną.

Pokój troskliwie przewietrzać, ciepota 13—14° R. wystarcza, bieliznę można często zmieniać.

Za pożywienie: mleko, kleiki, po ustąpieniu gorączki dyeta pożywniejsza, lecz nie zaraz mięsna. Za napój podawać można czystą wodę, kwaski.

Płókanie gardła częste 2% kw. borowym, 2% kali chloricum. W razie silnej gorączki, zimne okłady na głowę, chinina, antipirina (ostrożnie), natr. salicyl.

Na obrzęki gruczołów okłady z liquor aluminis acet., wcieranie szarej maści. Skoro tylko wystąpi chęłbotanie, przecinać. W razie znacznego swędzenia:

Rp. Lanolin anhydrys. 50'00; Vaselin. americ. 20'00; Aqu. dest. 25'00; M. terendo f. ung. S. Do nacierań.

Drgawki, majaczenia uspakajać okładami z lodu; lewatywami z chloralu (0'50:50'0). W razie zapadu, osłabienia serca: koniak, mocne wina, czarna kawa, kamfora.

Zmiany na błonie śluzowej gardła leczyć płókaniami, pendzlowaniami. Zastrzykiwania surowicy przeciwbłonicznej w przypadkach tych nie odnoszą żadnego wyniku.

Powikłania, z wysiękiem opłucnej, błony brzusznej, zapaleniem stawów, chorobami ucha, rakiem wodnym, zapaleniem nerek — zob. odpowiednie rozdziały:

Rp. Natr. Salicyl. 3'00; Aqu. dest. 100'00; Syrup. rub. id. 20'00. MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Rp. Liquor. ammon. anis.; Aether. sulfur. āā. 5'00. MDS. Co 2 godz. po 10 kropli w czarnej kawie.

Rp. Campoorae 0'50; Spir. vini; Aqu. dest. āā. 5'00. MDS. Do podskórnych wstrzykiwań.

Rp. Acidi benzoici 0'20; Sacchari 2'00; Mfp. div. in dos. Nr. X. S. Co 2 godz. proszek.

Od początku płonicy należy mocz codziennie badać. Od pierwszej chwili zapalenia nerek podawać dużo mleka.

Po stwierdzeniu białkomoczu postawić 5—10 suchych baniek. Dopóki w osadzie z moczu znajduje się wiele ciałek krwi i wałeczków, nie podawać leków moczopędnych, lecz ściągające.

Rp. Acidi tannici 0'50; Chinin. sulfur. 1'00; Sacchari 2'00; Mfp. div. in dos. Nr. 6. S. 3 pr. dz.

Rp. Chinini tannici 4'00; Div. in dos. Nr. X. S. 3 razy dziennie proszek.

Rp. Solut. acid. tannici 2'00 ad 100'00; Solut. natri bicarb. q. s. ad react. alcal.; Syrup rub. id. 20'00. MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

W razie silnego krwawienia:

Rp. Liquor. ferri sesquichl. gtts. X; Aq. cinnamon.; Syrup. simpl. āā. 50'00. S. Co godz. łyżeczkę.

Rp. Ferropyrini 1'00; Aqu. dest. 100'00. S. Co 3 godz. łyżeczkę.

Jeżeli się pojawia znaczna puchlina, lub ucisk na płuca, podawać wcześniej leki moczopędne, a przy towarzyszącej anaemii żelazo np. Tra ferri pomati, 3 razy dziennie po 15 kropli.

Rp. Infus. fol. digital. e 0'20 ad 100'00; Liquor. kali acet. gtts. XX; Syrup. simpl. 15'00. MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Rp. Diuretini 2'00; Aq. destill. fervid. 100'00. S. Co godz. łyżeczkę.

Rp. Dcti equiset. e 3'00 ad 100'00; Liquor. kali acet. gtts. XX; Syrup. simpl. 15'00. MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Można też używać w razie dłużej trwającej puchliny, kąpeli na 29° R., 5—10 minut i zawijania w koce na 2—3 godziny; przeciwwskazanie stanowi tylko stan zapalny płuc lub osłabienie serca, w kąpeli dawać zimne okłady na głowę.

Uraemia patrz Morbus Brighti.

Scorbutus. Gnilec. Dobre powietrze i dobre pożywienie, podawać dużo zielonej jarzyny (sałata, szpinak itp.) owoce, lemoniada z cytryn. Mleko w dużych ilościach. Wino, piwo. Letnie kąpiele. Płókanie ust roztworami lekko ściągającymi (kali chloricum, acidum boricum). Pendzlowanie: tra ratanh. Nacieki krwawe smarować oliwą z chloroformem. W ciężkich przypadkach leki pobudzające, kamfora, eter, wino często podawać.

Rp. Dct. cort. chinae e 10'00 ad 150'00; Acidi sulfur. dil. 2'00; Syrup. rub. id. 20'00. MDS. Co godz. łyżkę.

Rp. Kali citrici 4'00; Aq. destill. 180'00; Syr. rub. idaei 20'00. S. Co godz. łyżkę.

Rp. Ergotini pur. 2'00; Aqu. dest. 150'00; Aqu. laurocer. 5'00; Syr. moror. 20'00. DS. Co 2 godz. łyżkę.

Rp. Liquor. ferri sesquichl. 2'00; Aqu. cinamon. 200'00; Syrup. sacchari 20'00. MDS. Co 2 g. łyżkę.

Leczenie następowe wymaga dłuższego podawania: żelaza, przetworów chinow., dobrego żywienia i kąpeli.

Rp. Trae chin. comp. 40'00; Trae aurant. 10'00. S. 4 razy dnia łyżkę.

Scrophulosis. Zółty. Przestrzegać odpowiedniego żywienia u dzieci mniejszych, starsze dzieci żywić mięsem, mlekiem, kawą żołądźkową, dać nieco wina czerwonego, owoce, jarzyny łżejsze. Suche mieszkane przewietrzane. Kąpiele, zmywania wodą są koniecznymi.

Dzieci blade, chude, mogą używać więcej tłuszczów, podać tran. Lepiej odżywionym tran z dodatkiem trae jodi. Zaprzestać jednak tranu przy braku apetytu, biegunce, gorączce. Tran dawać w godzinę po jedzeniu ½—1 łyżki, małym dzieciom w emulsyi, po 3 tygodniach przestawać na kilka dni.

Jeżeli dzieci nie znoszą tranu lub są przeciwwskazania

podawać przetwory jodu z żelazem, herbatę z liści orzecha, ekstrakt słodowy (1—2 łyżeczek 2 razy dziennie).

W lecie pobyt na świeżem powietrzu, wody mineralne, jodobromowe lub słone — (Rabka, Iwonicz, Rymanów) tak do kąpieli, jak i do picia.

Kąpiele ze soli z dodatkiem soli iwonickiej, rabczańskiej, rymanowskiej, soli borowinuwej Mattoniego (po $\frac{1}{2}$ —1—2 funtów), kąpiel na 27° R. przez 15—20 minut.

W obrzmiale gruczoły wetrzec na wieczór łyżeczkę mydła szarego (Sapo kalin) i zmyć rano i tak przez szereg dni dopóki nie będzie większej bolesności.

Choroby towarzyszące jak: Conjunctivitis, Keratitis, Otitis, i t. p. obok ogólnego leczenia leczyć miejscowo (zob. pod odpowiednimi rozdziałami).

Rp. Ol. jecor. aselli 10'00; Mucil. gum. ar. q. s. u. f. c. Aqu. dest. 60'00 emulsio; Syr. melissae 10'00. MDS. 3 razy dziennie łyżeczkę.

Rp. Syrup ferri jodati 20'00; Syrup. sacchari 40'00. MDS. 3 razy dziennie łyżeczkę.

Rp. Kali arsenicos solut.; Aqu. cinamon. āā. 10'00. MDS. 3 r. dziennie po 3—6 kropli.

Rp. Ferri jodati sacchar. 0'50; Sacchari 5'00; Mfp. div. in dos. Nr. XX. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Trae jodi gtts. X; Kali jodati 1'00; Aq. menth. pip.; Glycerin. āā. 50'00. MDS. 3 r. dzien. łyżeczkę.

Rp. Ol. jecor. aselli; Aq. calcar. āā. 100'00; Mf. linim. adde; Trae chinae comp. 20'00; Trae rhei vin. 15'00; Trae calami 5'00. MDS. 2—3 razy dzien. łyżeczkę do jednej łyżki.

Rp. Pastilli jodo ferrati comp. Jahr. scalut. orig. S. 2 kołaczyki dziennie.

Rp. Kreosoti 1'00; Ol. jecor. aselli 150'00. DS. łyżeczkę na godzinę przed jedzeniem.

Rp. Kreosoti 1'00; Tinct. gentian. 2'00; Spiritus 25'00; Vini xerens. q. s. ad 100'00. DS. 2—3 łyżeczek dziennie do $\frac{1}{2}$ szklanki wody.

Rp. Kreosoti carbonici 25'0. S. Dwa razy dnia 5—10—20 kr.

Rp. Capsulae tenent.; Kreosot. carbonic. 0'10—0'20 fabric. Hygea (Zahradnik). S. 2 r. dnia 1—3 kapsulek.

Rp. Capsul. tenent.; Kreosoti carbon. 0'10; Ol. jecor. aselli 2'00 fabric. »Hygea«. S. Jak wyżej.

Rp. Thicoli Roche 0'25—0'50; Dent. tal. dos. Nr. XII. S. 3 proszki dziennie.

Sclerosis initialis zob. **Syphilis**.

Septicaemia. Posocznica. Wstrzykiwania do żyły wyjałowionego roztworu fizyologicznego soli (0'60%) codzień 1 liter. Po wstrzyknięciu następuje odczyn w postaci dreszczów i gorączki, ale skutek ogólny ma być dobry. Jestto przepłókiwanie krwi zakażonej, zalecane obecnie przez lekarzy francuskich.

Rp. Chinin. mur. 5'0; Hydrarg. bichlorat. corros. 0'20; Extr. et pulv. rad. gent. $\bar{a}\bar{a}$. q. s. ut. f. l. a. pill.
Nr. XX. S. 2 pigułki dziennie.

Soor. Czyste utrzymanie ust, przemywać po pokarmach, dobre pokojowe powietrze.

Po usunięciu mechanicznem grzybków (miękkim płótnem zwilżonem w zimnej wodzie) pendzlować:

Rp. Kali hypermang. 0'12; Aqu. destill. 15'00.
MDS. Do pendzlowania.

Rp. Resorcin. 0'50; Aqu. dest. 90'00; Syrup. 10'00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę. (Dla dziecka od 1—2 lat).

Do przemywania ust: borax (1'50:100'0 Aq. destil.)
Hydrog. hyperoxyd. (33%) 1:1000 aquae dest. do płókań,
kali chloricum, bicarb. sodae (0'50:150'0).

Spasmus glotidis zob. **Laryngospasmus.**

Stenocardia. Dusznica bolesna. Leczenie samego napadu polega na wygodnem ułożeniu chorego, usunięciu uciskającego ubrania, podaniu choremu trochę czarnej kawy, łyżkę wina lub koniaku. Podskórnie wstrzyknąć morfinę, lub dać do wziewania trochę chloroformu.

Na okolicę serca synapizmy, okład gorący, rozcierać kończyny, dać lewatywę z soli. Można też dać do wziewania kilka kropel amylnitritu, pyridyny.

Polecają też wewnątrznie wśród napadu: Nitroglicerynę w roztworze 0'01 na 10'0 z tego 5—20 kropli na raz, lub pastylki nitroglicerynowe po 0'001. $\frac{1}{4}$ —1 pastylki.

Następnie leczyć chorobę przyczynową, najczęściej więc: wady sercowe, choroby nerwowe i zatrucia przewlekłe tytoniem, kawą i herbatą.

Rp. Tinct. lob. infl.; — valer. aeth. $\bar{a}\bar{a}$. 10'00.
DS. 10—20 kropli podczas napadu.

Rp. Natri brom. 5'00; Aqu. dest. 150'00. DS. Co 2 godz. łyżkę.

Rp. Natr. nitrosi 0'5; Sacch. albi 3'00; Mfp. div. in dos. X. in capsul. amylaceis. S. 1—2 pr. dzien.

Rp. Amyl. nitros. 5'0; Ol. foeniculi 10'0. S. 3—6 kropli przed napadem wachać.

Rp. Oxydi zinci 0'50; Sacch. albi 2'0; Mfp. div. in dos. Nr. 5. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Flores zinci 1'0; Sacch. albi 3'0; Mfp. div. in dos. Nr. X. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Tinct. valerianae 5'0; Tinct. castorei 1'0. S. Co kwadrans 10 kropli.

Rp. Exalgin 2'50; Alcohol menth. 15'00; Aqu. dest. 190'00; Syrup. 30'00. DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Stomatitis aphthosa zob. **Aphthae.**

Stomatitis catarrhalis. Nieżytowe zapal. jamy ustnej. Czyste utrzymanie jamy ustnej, wymywanie ust chłodną wodą. Pendzlowanie: 2% kwasem borowym, 10% roztworem kali chloric. Dzieciom starszym zimne

pokarmy, mleko z lodu. Wyrwać psujące się zęby, które są częstym powodem stomatitis.

Rp. Boracis 5'00; Mel. rosat. 20'00; Aq. rosar. 10'00. MDS. Do pendzlow.

Stomatitis ulcerosa. Stomacace. Wrzodnienie ust, dzięgni. Pendzlowanie pojedynczych owrzodzeń rozczynek kali hypermang. (0'12:20'0) 5—6 razy dziennie lub lepiej nawet przestrzykiwanie jamy ust za pomocą irygatora.

Rp. Trae myrrhae; ratanh. āā. 10'00. S. Do pendzlowania.

Rp. Acid. salicyl. 5'0; Aquae dest. 500'0. S. Woda do płókania ust.

Rp. Acidi borici 1'00; Kali chlorici 0'75; Succ. citri 15'00; Glycerini 10'00. DS. Do pendzlowań.

Wewnętrznie: kali chloricum (1'0—3'0 na 120'0 aquae pro die, u dzieci 1'0! pro die.

Rp. Decoct. cort. chinae e 5'00 ad 100'00; Kali chlorici 2'00; Syrup. simpl. 20'00. MDS. Co godz. łyżeczkę.

Sycosis barbae. Fig ó w k a. Włosy krótko ostrzydz, skórę przez parę dni rozmiękczać za pomocą maści Hebrý, plastra salicylowego 5—10% (zob. eczema), później codziennie częściowo włosy z miejsc zajętych wyrwać, ropnie nacinać, a czasem nawet wyskrobać i stosować równocześnie środki przeciwpasorzytnicze:

Rp. Hydrarg. sublimat. corr. 0'10; Spir. vini rect.; Glycerin. p. āā. 75'0. S. Rano i wieczór dobrze wetrzeć.

Rp. Euresol 10'0; Aceton 50'0. S. Zewnętrznie.

Rp. Cupr. acetic. 0'30; Ung. simplic. 10'0; M. f. ung. S. Maść, wcierać rano, na noc przykładac.

Rp. Ac. tannic. 2'0; Sulf. praecipit. 4'0; Zinc. oxydat.; Amyl. tritic. āā. 7'0; Vaselin. flav. 20'0. M. f. pasta. S. Maść.

Rp. Ol. rusci 3'0; Ac. salicylic. (s. Resorcin.) 1'50; Axung. porcin. 30'0; M. f. ung. S. Maść.

Rp. Resorcin. resubl. 1'0; Hydr. sublim. corr. 0'10; Zinc. oxydat.; Amyl. tricit. āā. 7'50; Vaselin flavi 15'0. M. f. pasta. S. Maść.

Leczenie trwać musi tygodnie nawet miesiące, potem jeszcze brodę golić należy przez kilka miesięcy.

Syphilis acquisita. Prz y m i o t, k i ł a. *Sclerosis initialis.* Podejrzanę przeczsoy w pierwszych dniach można wypalić lub wyciąć. Wrzód rozwinięty przemywać: sublimatem 10/00, lub hydrargylolem 1/4% i przykładac plaster rtęciowy.

Jeżeli wrzód rozpadający się zasypywać go po dokładnem wymyciu jodoformem, przyczem starać się o podniesienie ogólnych sił. Dla usunięcia nacieku stosować plaster rtęciowy. Wyjątkowo tylko przy dużych

wrzodach podawać rtęć wewnętrznie. Zwrócić uwagę na jamę ustną chorego, polecić mu zęby zepsute wyrwać, względnie zaplombować.

Rp. Syphilis secundaria. W okresie wybuchowym przy bólach nerwowych lub gośćcowych:

Rp. Kal. jodat. 1'00; Aq. dest. 150'0. S. Rano i wieczór łyżkę.

Przygotować chorego do leczenia ogólnego przez wzmacnianie stanu ogólnego, leczenie chorób istniejących, przyczem zbadać mocz na białko przed podaniem rtęci, którą stosować należy dopiero po wystąpieniu zmian drugorzędnych.

Wcierania: zalecać przy pierwszym wybuchu, jeżeli osobnik nie zbyt osłabiony, a skóra nie zajęta inną sprawą chorobową.

Rp. Ung. hydrarg. ciner. 1'5—3'0; D. ad. ch. cer. t. d. Nr. XXX. S. Wcierania.

Rp. Hydr. oleinic. lub Ung. hydr. c. resorbin 1'5—3'0; D. ad ch. cer. t. d. Nr. XXX. S. Wcierania.

Przy wcieraniach uważać na ogólne przepisy higieniczne, zabronić napojów wyskokowych, ograniczyć do minimum palenie tytoniu i zalecać nader czyste utrzymywanie jamy ustnej, (czyszczenie zębów rano i wieczór, płókanie ust kilkanaście razy na dzień rozc. kali chlor., kwasu borowego lub kali hypermang.). (Patrz stomatitis i gingivitis). Ilość wcierań zależy od uporczywości zmian, zazwyczaj oblicza się ją tak: jeżeli u chorego zmiany drugorzędne ustąpiły doszczętnie przy 20 wcieraniach, należy mu jeszcze polecić dalszych 10 wcierań (t. j. połowę poprzedniej ilości). Przed rozpoczęciem wcierań chory powinien wziąć kąpiel oczyszczającą; wcierania powinien robić codziennie, rano, najlepiej w następującym porządku: 1-go dnia łydki, 2-go uda, 3-go brzuch i boki klatki piersiowej (aż do wysokości brodawki sutkowej), 4-go kończyny górne, 5-go dnia pauza, a wieczorem tegoż dnia kąpiel oczyszczająca, poczem następuje drugi turnus w tym samym porządku i t. d.

Zamiast wcierań użyć można u chorych osłabionych pomazywać Welandera. (Podwójną ilość maści jak przy wcieraniach rozciera się na skórę i owija opaską). Jeżeli chory dla zbyt drażliwej skóry nie może znieść wcierań, lub z powodu np. zbyt silnego porostu włosów na skórze robić ich nie może, zastosować:

Wstrzykiwania podskórne: W grzbiet między łopatkami, codziennie 1 gr. płynu:

Rp. Hydr. sublim. corr. 0'10; Natr. chlorat. 0'5; Aqu. dest. 10'0; (Morph. muriat. 0'05). S. Sublimat do wstrzykiwań podskórnych.

Podobnie użyć można:

Rp. Hydrarg. formamidat. 0'10; (Hydr. bicianat. 0'05); Glycerini 1'0; Aqu. dest. 9'0. S. j. w.

Do wstrzykiwań miąższowych w pośladki zaleca się:

Rp. Hydr. sublim. corr.; Natr. chlor. $\bar{a}\bar{a}$. 0'5;
Aqu. dest. 10. S. raz na tydzień 1 gr. płynu.

Rp. Calomelan 1'0; Glycerini 50'0. S. j. w.

Rp. Hydr. oxydat. flav. 0'5; Ol. amygd. dulc. 15'0.
S. Co 5 dni strzykawka (1'0).

Rp. Hydr. salicyl. 1'0; Gumm. arab. 2'0; Aqu.
dest. 18'0. S. Co 6 dni strzykawka (2'0).

Na wewnątrz:

Używać w postaciach łagodnych szczególnie na-
wrotach.

Rp. Calomel. laevig. 0'5; Opii pur. 0'1; Sacch.
alb. 5'0; Mfp. div. in dos. Nr. XII. S. 3 pr. dziennie.

Rp. Hydr. sublim. corr. 0'10; Extr. opii. 0'07;
Pulv. et extr. acor. q. s. ut. f. pill. Nr. XX. S.
2—4 pigułki dziennie.

Rp. Protojodur hydrarg. 0'4; Extr. opii 0'3; Pulv.
et extr. acor. q. s. ut. f. pill. Nr. XX. S. Rano
i wieczór pigułka.

Rp. Hydrarg. tannic. oxydul. (s. hydr. salicyl.)
2'0; Pulv. et extr. quass. $\bar{a}\bar{a}$. q. s. ut. f. pill. Nr.
XXXX. S. 2—3 pigułki na dzień.

Kąpiele: Wskazane u chorych z owrzodzeniami
na skórze lub u dzieci, stosowane przez $\frac{1}{2}$ —1 godz. co-
dziennie, o ciepłocie 28—30° C.

Rp. Hydrarg. subl. corr. 10'0—20'0; Spir. vin. rectiv.
100'0. S. Wlać do jednej kąpieli (dla dorosłych).

Leczenie jodem: Używane przeważnie w kile
wtórordernej złośliwej i przy zmianach w jamie ustnej.

Rp. Kali jodat. 10'0; Aqu. dest. 150'0. S. Rano
i wieczór łyżkę w mleku.

Rp. Natr. jodat. 10'0; Lithii jod. 1'50; Extr. et
pulv. gent.; $\bar{a}\bar{a}$. q. s. ut. f. pill. Nr. L. S. 3 razy
dnia po 2 pigułki.

Rp. Ferr. jodat. sacch. 2'0; Pulv. et extr. acor.;
q. s. ut. f. pill. Nr. XXX. S. 3 razy dnia po 2 pig.

Rp. Kal. jodat. 10'0; Deutojod. hydrarg. 0'05;
Aqu. dest. 150'0. S. Rano i wieczór łyżka.

Zamiast podawania jodu, wysłać można chorego do
kąpiel: Iwonicz, Rabka, Rymanów, Hall.

Napary: W postaciach kiły trzeciorzędnej lub
kiły złośliwej, gdy rtec przeciwwskazana.

Rp. Decoct. Zittmanni fortior. 1000'00. S. Napar
mocniejszy.

Rp. Decoct. Zittmanni mitior. 1000'00. S. Napar
słabszy.

Z pierwszego powinien chory wypić codziennie rano
naczczo (najlepiej w łóżku) $\frac{1}{4}$ litra na ciepło w ciągu
najwyżej kwadzansa, poczem leżeć dobrze i ciepło przy-
kryty przez 2 godziny. Z drugiego ma chory wypić

codziennie po południu tę samą ilość także na ciepło. Przytem dyeta pożywna a lekko strawna.

Leczenie miejscowe: Na kłykcicy sączące na skórze (moszna, okolica stolcowa) zalecić przemywanie sublimatem 10/00 i maść:

Rp. Calomelan 5'0; Ung. zinc. oxyd. 45'0. M. f. uug. S. Maść.

Na utrzymujące się nacieki: plaster rtęciowy.

Na kłykcicy w jamie ust i w gardle stosować częste płókanie ust i pendzlować 20/0 rozez. kw. chromow. lub:

Rp. Mercur. sublim. corr. 1'0; Spir. vin. rect. 20'0. S. Zewnętrznie.

Przy kłykcicach w nosie:

Rp. Jodi pur. 0'4; Kal. jodat. 1'0; Aqu. fontis. 1000'0. S. Do płókań nosa.

Rp. Merc. praecipit. rubr. 0'20; Ung. emollient. 20'0. M. f. ung. S. Na wacie wkładać do nosa.

Przy zmianach w krtani wzięwania:

Rp. Resorcin resubl. 1'0; Aqu. dest. 100'0. S. Do wzięwań.

Rp. Merc. sublim. corr. 0'02; Aqu. laurocer. 10'0; Aqu. dest. 100'0. S. j. w.

Syphilis tertiaria.

W lekkich postaciach jod, w ciężkich leczenie rtęciowe obok jodu. Przy owrzodzeniach kilakowych na skórze lub błonach śluzowych opatrunek jodoformowy lub pendzlowanie.

Rp. Jodi pur.; Kal. jod. *aa.* 2'0; Glycer. pur. 20'0. S. Do pendzlowań co dzień.

Przy kilakach nie otwartych nie robić naciecia, a przykładac plaster rtęciowy. Przy kile okostnej lub kości pendzlowanie nalewką jodową, przykładanie plastra rtęciowego.

Syphilis hereditaria. Kiła dziedziczna. Dziecko karmić powinna, ile możności, własna matka. U osesków podawać rtęć w postaci kąpieli lub wcierek 0'5—1 gr.

Rp. Sublimat. corros. 2'0; Natr. chlorat. 10'0; Aqu. dest. 100'0. S. Na jedną kąpiel (20 litrów wody o ciepł. 28—30⁰).

Kąpiele robić codziennie; każda kąpiel powinna trwać 1/2 godz. Uważać na przewód pokarmowy dziecka.

U dzieci starszych lepiej użyć wcierań szaruchy od 1—2 gr. dziennie stosować do wieku, lub też podać można rtęć wewnętrznie:

Rp. Calomelanos 0'01; Sacchar. alb. 0'20; Dent. tal. dos. X. S. Dwa proszki dziennie.

Po ustąpieniu zmian chorobowych starać się o dobre odżywienie, podawać tran, żelazo, jod.

Rp. Syrup. ferr. jodat. 1'00; Aqu. dest.; Syrup. simpl. *aa.* 25'0. S. Rano i wieczór łyżeczkę.

Oprócz tego leczenie kąpielowe, Iwonicz, Rabka.

Tabes dorsualis. Wiądrzenia. Jeżeli tabes na tle kiły, to wcierania unguenti cin. i kali jodat.

W innych przypadkach kąpiele letnie lub ciepłe, procedury hydropatyczne, elektryzowanie stosu pacierzowego prądem galwanicznym, mniej polecane prądem faradycznym. Pendzlowanie stosu pacierzow. c. tra jodi.

Na wewnątrz arg. nitricum 0'01—0'02 w pigułkach.

Rp. Argenti nitrici 1'00; Argill. 10'00; F. c. aq. dest. qu. s. pil. Nr. 100; Consp. c. pulv. cinnam. S. Przez 8 dni po 1 pigułce, następnie po 2—3.

Rp. Sol. arsenic. Fowleri 5'0; Aq. cinnamomi 25'0. S. Rano i wieczór po 15 kropli zażyć.

Kali jodatum 10:200, arsen po 0'001, ergotyna po 0'1—0'5, 2—3 razy dziennie, Fosfor po $\frac{1}{10}$ miligr. do $\frac{5}{10}$ miligr., w roztyn. oleistych, mały dają rezultat dodatni.

Wieszanie chorego sposobem Moczutkowskiego i Charcota małe korzyści przynosi, jednak czasem ulgę sprawia.

W ostatnich czasach polecają czynną gimnastykę na osobnych przyrządach. Chodzenie po schodkach osobno na ten cel zrobionych, poręczki, wahadła, krzesła ruchome i t. p. Jest to tak zwane »wyrównawcze leczenie za pomocą ćwiczeń«, wprowadzone przez lekarza szwajcarskiego Frenkla.

Zresztą leczenie symptomatyczne, zwłaszcza kojenie bólu środkami narkotycznymi, phenacetyna po 0'50, 2—3 razy dzien., exalgina po 0'25 2—3 proszków na dzień, antipiryna 1'0, 3—4 na dzień, wstrzykiwania morfiny.

Chorych zamożniejszych wysłać do Neuheim, Teplitz, Wildbad, Ragaz, Pyrmont, Elster, Gastein, Piszczany, Trenczyn, Truskawiec.

Taenia. Tasiemiec. Wieczorem dnia poprzedniego przed rozpoczęciem leczenia lekki purgans i filiżanka herbaty lub rosółu, także śledź. Rano dnia następnego trochę czarnej kawy lub herbaty i lekarstwo, które stosować zamierzamy. W 2 godz. po zażyciu leku ol. ricini lub calomel aż do skutku. U starszych dzieci postępowanie podobne jak u dorosłych; u mniejszych, jeśli źle odżywione i osłabione nie spędzać tasiemca. Jeśli dziecko zwymiotuje podany lek, należy dawkę powtórzyć.

Rp. Cortic. punie. granati 5'0; Natri bicarb. 5'0; Macera per horas 24 in aqu. destill. 400'0. dein coque ad remanent. 200'0; Syr. mannati 20'0. DS. Co $\frac{1}{2}$ godzinę 3-cią część zażyć.

Rp. Extr. cort. rad. pun. granat. 18'0; Extr. filic. mar. aether. 10'0; M. exhibe in caps. gelat. Nr. XXX. DS. Rano na czczo zażyć 8—10 kapsułek, potem herbata, później co $\frac{1}{2}$ godz. 2 aż do ostatniej kapsułki.

Rp. Pulv. kamalae 20'0; Extr. filic. mar. 5'0; Msp. div. in dos. Nr. XXX; Da in capsul. gelatin. DS. Co $\frac{1}{4}$ godz. 4 kapsułki.

Rp. Pulv. flor. kuso 25·0; Melis depur. q. s. ut. f. electuarium. DS. W ciągu godz. zażyć na 2 lub 3 r.

Rp. Extr. filic. mar. aether.; Pulv. filic. mar. *aa.* 2·0; Conservae rosarum q. s. ut. f. pill. Nr. 15. DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. po 3 pigułki.

Rp. Extr. filic. mar. aether. 5·0—10·0; Aq. menth. pip. 150·0; Ol. ricini 30·0; Sacch. albi 2·00; M. f. emulsio. DS. W ciągu kilku godzin częściami zażywać.

Rp. Cortic. acaciae anthelm. pulv. 40·0; Infund. ad col. 200·0. DS. Wypić 3—4 godziny przed śniadaniem.

Rp. Extr. filic. mar. aether. rec. par. 2·0—4·0; Mel. depurati 20·00. S. Na czczo podać.

Rp. Extr. fil. mar. aether. ab. aether. lib. 0·50; Exhibe. in caps. gelat.; Dent. t. Nr. X. S. C. 10 minut zażyć.

Rp. Pelletierini tann. 0·20; f. p. dent. t. Nr. V. S. Co $\frac{1}{2}$ godz. proszek.

Rp. Cort. rad. punic. granat. 30·00—50·00; Aqu. fontis. 300·00—400·00; Macera p. hor. 24 dein coque. ad reman. 180·00. S. Co $\frac{1}{2}$ godz. zażyć w przeciągu 3 godzin.

Rp. Chloroformi 4·00; Syr. simplic. 30·0. S. W 2 godziny wyżyć — potem dodać ol. ricini.

Tetanus traumaticus. Tężec przyranny. Usunięcie powodów: oczyszczenie ran i wrzodów, wydobyć ciał obcych, odszczepów kostnych.

Wstrzykiwać morfinę w małych dawkach, chloroformowanie. Chloral w lewatywach lub wewnętrznie z koniakiem.

Rp. Sulfonali 1·00; Dtur. tal. dos. Nr. V. S. 3 do 4 proszki dziennie (rozpuściwszy w 200 gramach herbaty lub rosołu).

Rp. Urethani 1·00; Tal. dos. Nr. V. 2 do 3 razy dziennie proszek we wodzie.

W razie osłabienia serca, podskórne wstrzykiwanie eteru, kamfory.

Rp. Antipyrini 0·50; Dt. d. Nr. X. S. Co 3 godz. proszek.

Rp. Curare 0·05; Glycerini 5·0. S. $\frac{1}{2}$ strzykawki (2 strzykawki dziennie).

Polecają obecnie zastrzykiwania surowicy przeciw-tężcowej (Tizzoni-Catani, Bujwida), i zawiesiny mózgow.

Tic douloureux zob. **Neuralgia trigemini.**

Tonsilitis zob. **Angina.**

Trismus et Tetanus neonatorum. Tężec noworodków. Główną uwagę zwrócić na pepek, opatrunek przeciwnilny.

Chloral po 0·05 pro dosi, kilka razy dziennie, w mleku, wlać przez nos lub w lewatywie (w podwójnej dawce).

Ciepłe kąpiele 28° R. kilka razy dziennie. Karmić mlekiem, również przez nos kateterem. Lewatywy odżywcze z mleka po 50 cm. sześć co 2 godziny.

Rp. Kali bromati; Natri bromati $\bar{a}\bar{a}$. 0'50; Aqu. dest. 100'00; Syr. chamomillae 10'00. MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Rp. Extr. fab. calabar. 0'10; Aqu. dest. 10'00. S. $\frac{1}{2}$ strzykawki.

Tuberculosis pulmonum. Gruźlica płuc.

W przypadkach gruźlicy dziedzicznej, należy zwrócić całą uwagę na higieniczne wychowanie, przebywanie jak najwięcej na świeżem powietrzu, gimnastykę, wysypianie się, dobre odżywianie, nie obciążanie pracą umysłową lub fizyczną, unikanie zaziębień, hartowanie skóry przez zimne nacierania słoną wodą, zwłaszcza: szyi i klatki piersiowej.

W pierwszych początkach suchot przede wszystkim uważać na podniesienie odżywienia chorego, forsowne żywienie. Polecić picie mleka w lecie, tranu w zimie, tłuszców jak najwięcej, o ile tylko żołądek znosi. Pobyt kilkomiesięczny w górskim powietrzu podczas lata, na zimę zaś polecić wyjazd do jednej ze stacyj klimatycznych najbardziej zalecanych: Davos (zakład Dra Turbana), Zakopane (zakład Dra Chramca, Dra Chwistka, Dra Dłuskiego i Dra Majewicza), Szczawnica (zakład Dra Kołaczковского), Meran (Dr. Binder), Arco, Gries przy Bozen (Dra Nazarkiewicza), Lussin Piccolo (Dr. Wobr).

Ze środków leczniczych stosować kreożot, guajakol, sirolinę, thiocol, duotal Bayera, sulfosotsyrop, arsen, zresztą leczenie symptomatyczne jak przy bronchitis.

W późniejszych okresach obok powyższych poleceń pilnie uważać na pojawiające się krwiopłucia i stosownie je wstrzymywać. Zmniejszać wydzielanie płwocin przez środki balsamiczne, usuwać gorączkę przez podawanie miernych dawek leków przeciwgorączkow., jak antipyr. po 0'50, 2—3 pr. na dzień w razie potrzeby. Toż samo phenacetyny, antifebriny po 0'25, pyramidon po 0'30.

Rp. Salipyrin 1'00; Dtur. tal. dos. 15. S. Co 2 godziny proszek (do 7 dziennie).

Rp. Lactophenin. 0'50; D. t. dos. XV. S. 3—4 proszki dziennie.

Uśmianie nocnych potów przez zmywanie ciała winnym octem, koniakiem, wodą kolońską, lub na wewnątrz koniak z mlekiem, lub atropina po 0'001 na noc, agaricin bardzo słabo działa, z nowszych środków polecają: Kalium telluricum po 0'01 na noc, dochodząc do 0'05.

Rp. Acidi agarcin. 0'01—0'05; Sacchari 0'30; Mfp. dtur. tal. dos. X. S. 2 proszki dziennie.

Rp. Agaricin, 0'10; Pulv. Dover. 2'0; Rad. altheae; Mucilag. gum. arab. $\bar{a}\bar{a}$. 1'0; Mf. pill. Nr. XX. S. Więcór pigułek zażyć.

Rp. Hyosc. hydrojod. 0·05; Argill. q. s. ut. f. pill. Nr. XX. S. Na noc pigułkę.

Rp. Pyramidon bicamphoric. 0·5; T. d. VI. S. 2 pr. dziennie. Veronal \bar{a} 0·30.

Przeciwpołtnie działa bardzo dobrze tra salviat 30—50 kropli na 2 godziny przed spodziewanymi potami.

W razie krwotoków bezwzględny spokój; okład lodowy na piersi, połykanie lodu, pokarmy tylko chłodne, wstrzyknięcie ergotini Bombelon 0·50 do 1·0 na raz, podanie większych dawek morfiny dla zapobieżenia kaszlowi.

Przy tętnie przyspieszonym dać: fol. digitalis 0·05 z morfiną 0·01 co 2—3 godz. proszek.

W ciężkich przypadkach krwotoku, wstrzyknąć atropinę 0·01:10·0 z tego pół strzykawki na raz, lub acid. sclerotinici 0·10:10·0 wody, z tego co godzinę strzykawkę.

Rp. Extr. fluid. hydr. canad 10·00. S. Na wieczór 30 kropli.

Przeciw biegunce leki osłaniające z dodatkiem opiatów.

Rp. Plumb. acet.; Laudani \bar{a} . 0·03; M. p. dtur. tal. dos. 10. S. 2—3 razy dziennie.

Rp. Laudani pur. 0·20; Tannini pur. 1·0; Pulv. rad. colombo 2·0; Mfp. div. in dos. Nr. X. S. Co 4 godz. proszek.

Rp. Decoct. rad. colombo \bar{e} 10·0 ad 200·0; Mucilag. salep. 10·0; Extr. op. aq. 0·10; Syr. cortic. aur. 20·0. S. Co 2 godziny łyżkę.

Creosotal Heyden, w kapsułkach »Hygea« wyrobu M. Zahradnika.

Rp. Kreozoti \bar{e} bit. fagi 3·00; Trae gent. 30·00. DS. Po jedzeniu 20—30 kropli w kieliszku wody lub wina.

Rp. Kreozoti \bar{e} bit. fagi 1·00; Trae gent. 2·50; Spir. vini rectific. 25·00; Vini xerens 100·00. DS. 3 razy dziennie po łyżeczkę w szklance wody.

Rp. Kreozoti 2·0; Natri arsenic. 0·04; Vini malahensis 500. S. 2 kieliszki dziennie.

Rp. Kreozot. carbon. 40·0. S. 3 r. na dzień po $\frac{1}{2}$ —1 łyżeczk.

Rp. Duotali Bayeri. 0·25—0·50; Pulv. ipéc. opiatu 0·02—0·10; F. p. dent. tal. dos. Nr. XV. S. 3 prószki dziennie.

Rp. Guajacoli 2·0; Spir. vini 20·0; Tinct. gentian. 10·0; Extr. coff. conc. 20·0; Aq. dest. 200·0. MDS. 2—4 łyżek dziennie.

Kapsułki guajakolowe po 0·05 wyrobu Zahradnika, w tych samych dawkach co kreozot.

Rp. Guajacetin. 0·5. S. 3 prószki dziennie.

Rp. Thiocol 1a Roche 0·5 t. d. XII. S. 3 proszki
dziennie.

W tej samej dawce, a tańsze: Kalium sulpho guajacolic. Sirolin 3 łyżeczki dziennie, syrop sulfoguajakolowy z kołą lub bez (wyróbu Mikolascha).

Rp. Styraçol (Cynamonian guajakolowy) 0·5. S. 3 r. dziennie (dawkę stopniować).

Przeciww męczącemu kaszlowi suchotników:

Rp. Djonini muriat. Codeini muriat. $\bar{a}\bar{a}$. 0·10; Cocaini muriat. 0·025; Ammon. valerianici; Aq. amygdal. amar. $\bar{a}\bar{a}$. 7·50. S. Co 4 godz. po 15 kropli.

Rp. Peronini po 0·02—0·05 w wodzie, herbacie; dawki zwiększać stopniowo.

Rp. Peronin 0·5; Aq. dest. 100·0. S. Łyżeczkę na noc w wodzie ocukrzanej.

Rp. Codeini 0·3; Rad. et succ. liquir. q. s. u. f. pill. N. XXX. S. Na noc 2—3 pigułek.

Rp. Apomorph. hydrochlor. 0·02; Syr. ipec. 7·5; Syr. tolut. 30·0; Aq. dest. 90·0. MDS. 5 razy dziennie łyżeczkę (uspakaja i działa wykrztuśnie).

Rp. Ammon. mur.; Trae opii.; Spir. chlorof. Syr. ipec. $\bar{a}\bar{a}$. 7·5; Syr. prun. virg. ad 90·0. S. Co 4 godz. łyżeczkę.

Rp. Extr. fluid. hydrastis. S. 4 razy dziennie po 20—30 kropli w wodzie ocukrzanej.

Rp. Codeini phosphor. 0·02—0·05; Sacch. albi 0·20; M. f. p. dent. tal. dos. Nr. XII. S. 3 proszki dziennie.

Tuberculosis laryngis. Gruźlica krtani.

W przypadkach owrzodzeń więcej ograniczonych, kwas mlekowy 40 i 80%, przy zmianach rozleglejszych zadmuchiwanie czystym jodolem; przy bólach przy przełykaniu zadmuchiwanie morfiny.

Rp. Morphii mur. 0·50; Sacch. lact. 5·00.

Rp. Nosophen 5·0; Pulv. Gummi. 1·0. DS. Wdmuchiwanie do krtani.

Również można połączyć jodol z morfiną. W przypadkach zasychania wydzieliny w krtani, bólów i uporczywego kaszlu, można też polecić wdychiwania ciepłe ze słabych roztworów soli kuchennej z dodatkiem morfiny w stosunku 0·10—0·20% lub tylko z morfiny.

Tussis convulsiva zob. **Pertussis.**

Typhlitis et **Perityphlitis.** Zapalenie kątnicy i okątnicze. Leczenie zewnętrzne polega na stosowaniu środków przeciwzapalnych i odwodzących; okład lodowy, pijawki, smarowanie jodyną. W przypadkach, gdy chory nie znosi okładów lodowych, okład wysychający. Nie zwlekać z zabiegiem operacyjnym.

Wewnętrzne przetwory makowca w dużych dawkach. Jeżeli je chory wymiotuje, w postaci czopków do kiszki odchodowej, a w razie gwałtownych bólów, podskórne

wstrzyknięcie morfiny. Dyeta wyłącznie płynna, bezwzględny spokój.

Gdy okres zapalenia minie, środki przyspieszające wessanie wypociny są wskazane, więc: okłady ciepłe, wcieranie maści jodowych. Jeżeli stolce w tym okresie dobrowolnie nie następują, należy je ułatwić za pomocą lewatyw. Zresztą leczenie czysto przypadkowe, w razie silnych wymiotów, kawałki lodu do połykania, kokaina. W razie zapadu, napoje wysokokowe, eter podskórnie.

Rp. Trae opii simpl. 5'00. DS. 3 razy dziennie po 5—10 kropli.

Rp. Tinci. laud. simpl. gtt. X.; Emuls. amygdal. 50'0. S. Co 3 godziny łyżkę.

Rp. Extr. opii 0'02; Sacchari albi 0'30; Dent. t. dos. XII. DS. 3 proszki dziennie.

W razie silnych wymiotów:

Rp. Cocain muriat. 0'2; Aq. dest. 10'00. MDS.

W razie wymiotów 10 kropli zażyć.

Rp. Morphii mur. 1'00; Spir. vini 5'00; Glycerin 10'00; Aq. dest. ad 30'00. DS. Do podskórnych wstrzykiwań.

Jako przyspieszające wessanie:

Rp. Ung. kali jodati 25'00. DS. Do wcierania.

Rp. Kali jodati 2'00; Extr. bellad. 0'50; Ung. simpl. 30'00. MDS. Do wcierania.

W razie parcia na stolec lub moc:

Rp. Morph. mur. 0'10; Butyri cacao 10'00; Mf. 1. a. supposit. N. X. S. 2—3 na dobę użyć.

Rp. Extr. opii aquos. 0'03; Butyri cacao 1'0; F. suppos. dent. t. dos. X. S. 2—5 czopki dz. użyć.

Typhus abdominalis Dur brzuszny. Leczenie przypadkowe, polegające na zwalczaniu zagrażających objawów. Przy pierwszym podejrzeniu na T. abd. purgans, najlepiej kalomel po 0'50 z dodatkiem pulv. jalap. 0'30 2—3 dawki aż do skutku.

Gorączkę należy obniżać zapomocą chłodnych zmywań całego ciała wodą czystą lub z dodatkiem octu, letniemi kąpielami i środkami przeciwgorączkowymi, jeżeli zbyt wysoka, ale ostrożnie, aby nie wywołać zapadu.

Skrzepiać akcyę serca napojami wysokokowymi, a gdy te nie są dostateczne, środkami nasercowymi.

W razie silnej biegunki, przetwory makowca i środki ściągające; w razie zaparcia stolca w pierwszym okresie choroby, środki czyszczące, w późniejszych okresach lepiej lewatywy stosować.

Przytem należy pamiętać o należytem przewietrzaniu mieszkania, desinfekcyi stolców i bielizny. Dyeta powinna być wyłącznie płynna, zwłaszcza mleko, rosół, wino czerwone.

W razie nieżytu oskrzeli bańki suche.

Rp. Chinin. mur. 0'40; Dtur. tal. dos. XII. S. 3—5 proszków dziennie.

Rp. Natr. salicyl. 5'0; Aq. dest. 200'0; Syr. simpl. 15'0. DS. Co 2 godziny łyżkę.

Gdy chodzi o znaczne obniżenie ciepłoty ciała:

Rp. Antipyrin. 0'50; Coff. natrosalicyl. 0'05; Dt. tal. dos. X. DS. Co godzinę proszek aż do obniżenia ciepłoty.

Rp. Phenacetin 0'50; Coff. natrosalicyl. 0'05; Dent. tal. dos. X. DS. Co godzinę proszek aż do obniżenia ciepłoty.

Rp. Lactophenin 5'0; Div. in dos. Nr. X. Da in caps. amyl. S. Co 2 godziny proszek.

Rp. Magn. salicyl. p. 10'0; Div. in dos. Nr. X. S. Co 3 godziny proszek.

W razie silnej biegunki:

Rp. Decoct. salep. 0'50 ad 200'0; Trae opii simpl. gtts. 10; Syr. rub. idel 15'0. DS. Co godzinę łyżkę zażyć.

Rp. Chinin. mur. 2'0; Pulv. Doveri 3'0; Mfp. div. in dos. XII. DS. 3 proszki dziennie.

Rp. Mixt. gum. 200'0; Extr. laudani aquos 0'10. MDS. Co godz. łyżkę.

Rp. Naphtalini 0'20; Mag. bism. 0'15; Chinin. sulph. 0'25; Mfp. tal. dos. 15. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Naphtol-B; Bismuth. salicyl. *aa.* 0'20. Mfp. S. 10 proszków na 24 godzin w razie biegunki.

Rp. Naphtol-B.; Magnes. salicyl. *aa.* 0'20; D. t. N. X. S. 4 proszki dziennie.

W razie krwotoków jelitowych okład lodowy na brzuch i środki przeciwkrwotoczne:

Rp. Ferri sesq. sol. 1'0; Aq. cinnam. 150'0; Syr. cinnam. 20'0. S. Co godzinę łyżkę.

Rp. Alumin. crud. 0'50; Laudan. pur. 0'10; Camphor. 0'30; Sacch. lactis. 2'0; Mfp. div. in dos. Nr. V. S. Co 2 godz. proszek.

Rp. Plumbi acetici; Laudani p. *aa.* 0'30; Amyli puri 5'0; Mfp. div. in dos. Nr. X. S. Co 2 godz. pr. Nareszcie w razie silnego podrażnienia mózgu:

Rp. Natri bromati 0'50; Sacchari 10'0. Rozpuściwszy we wodzie, wypić w ciągu dnia.

Rp. Camphor. 0'50; Chloralhydrat. 0'1; Aq. dest. 60'0; Vitell. ovi unius. S. Co 2 godziny łyżkę.

W razie zapadu wstrzyknąć ol. camphor.

Typhus exanthematicus. Dur osutkowy. Według tych samych prawideł.

Ulcus contagiosum s. molle. Wrzód — szankier miękkii. Jeżeli nie ma żadnego powikłania (zwłaszcza żaden z gruczołów pachwinowych nie powiększony) można starać się oczyścić dno wrzodu przez środki żrące:

Rp. Cupri sulfurici 5'00; Aq. dest. 15'00. S. Ze-
wnętrznie.

Pacjent przykładą przez jeden dzień co 2 godziny na owrzodzenie tamponik waty umoczony w tym płynie, i na noc go zostawia, poczem w miejscu wrzodu tworzy się strup. Wtedy polecić obmywanie jakim płynem antyseptycznym, a gdy wśród tego odpadnie strup i odsłoni ranę czystą przykładanie maści z argent. nitr. 10/0 lub 30/0 borowej lub zasypywać:

Jodoform, nosephen, antinosin, eudoxin, airol, anti-septin, amyloform, dermatol, jodoformin, tanoform, xeroform, obok przemywania 30/0 kw. borowym, 50/0 cupr. sulfur., 10/0 sublim.

Gdy wrzód fagadeniczny zalecać zaraz z początku częste i obfite przemywanie 10/0 rozz. kali hepermang. i jodoform, albo:

Rp. Chloral. hydrat. 5'0; Aq. font.; Spir. vin. rect. āā. 10'0. S. Pędzlowanie.

Rp. Bitumin. fagi 10'0; Calcar. sulf. 50'0. S. Posypywać grubo i założyć opatrunek zmieniany 3 razy na dzień.

W pierwszych chwilach, kiedy który z gruczołów jest lekko powiększony, bolesny, starać się przez okłady lodowe, wcieranie szaruchy, zapobiedz ropieniu. Najczęściej wynik bywa ujemny, a wtedy nie czekając, aż gruczoły powiększą się znacznie, nawet da się wyczuć chębotanie, wyciąć gruczoły zajęte, a nawet podejrżane. Kiedy daje się wykazać wyraźne chębotanie, można ograniczyć się do przycięcia, następne leczenie jak każdego ropnia.

Ulcera intestini tuberculosa. Gruźlica jelit. Leczenie czysto przypadowe, polega na podawaniu środków odurzających wewnętrznie lub w postaci wstrzykiwań podskórnych. W razie silniejszych bólów na podawaniu przetworów makowca wraz ze środkami ściągającymi i przeciwnieślennymi z powodu zwykle towarzyszącej biegunki. Przytem należy starać się podnieść odżywienie chorego zapomocą odpowiedniej diety (do mleka dodawać aq. calcis).

Rp. Tinc. opii simpl. 10'00. DS. 2—3 r. dnia po 5—10 kropli.

Rp. Laudani puri 0'02; Tannini 0'10; Naphtalini 0'25; Sacch. alb. 0'30; Mfp. dent. tal. dos. XII. DS. 2—5 proszki dziennie.

Rp. Benzonaphtoli; Bismut. salicyl.; Resorcin. āā. 0'20; Mfp. dtur tal. dos. N. XV. 3—5 proszków dziennie.

Rp. Tinct. colombo; — Cascarillae āā. 15'00. DS. Co godzinę 10=30 kropli w kleiku.

Rp. Extr. opii 0'02; Resorcini 0'20; Sacch. alb. 0'30; Mfp. dent. tal. dos. XII. DS. 2—3 proszki dziennie.

Rp. Decoct. rad. colomb. e 10'00 ad 150'00; Tinct. opii gtt. XX. Syr. simpl. 15'00. DS. Co 2 godziny łyżkę.

Rp. Bismuth. subnitrici 5'00; Opii puri 0'02; Sacch. alb. 4'00; Mfp. div. in dos. N. X. S. 3 pr. na dzień. Tannalbin 0'50. S. 3—4 pr. dziennie.

Rp. Dermatoli 0'25—0'50. S. 3—10 prosz. dzien.

Rp. Bismuth. salicyl. 10'0; Div. in dos. aeq. Nr. XII. S. 3—6 proszków dziennie.

Rp. Thiocoli Roche 0'10—0'20; Dent. tal. dos. Nr. X. S. 3 proszki dziennie.

Ulcus ventriculi. Wrzód żołądka okrągły, trawienny. Przy świeżym wrzodzie zalecić ścisłą dyetę co godzinę łyżkę kwaśnego mleka, woda białkowa z cukrem, okłady lodowe na żołądek, spokój bezwzględny, opium. Dalsze leczenie polega na podawaniu środków alkalicznych, czy to w postaci wód mineralnych, czy też soli alkalicznych, w szczególności Karlsbad.

Korzystne wyniki leczenia dają przepłókiwania wodą karlsbadzką lub rozczynami soli karlsbadzkiej prawdziwej lub sztucznej, które mają i tę zaletę, że je stosować można i w razach, gdy picie wody karlsbadzkiej z innych powodów jest przeciwwskazaniem.

W razie silnych bólów lub wymiotów są wskazane środki odurzające, ale bardzo ostrożnie, woda chloroformowa 2—3 łyżek, uspokaja bóle, foż samo mentol, kokaina 10% 5 kropli na szlanke wody; w razie krwotoków żołądkowych postępowanie lecznicze jak przy Haematemesis. Obok tego postępowania leczniczego dyeta powinna być pożywna a lekko strawna z wykluczeniem wszelkich napojów wysokowych lub CO₂ zawierających, kwasów, tłuszczów i pokarmów korzennych. Gdy chorego z powodu silnych bólów, gwałtownych wymiotów lub żołądkowych krwotoków nie można stosownie żywić, wskazane są lewatywy odżywcze.

Często towarzyszące zaparcie stółca usuwać należy lewatywami.

Rp. Argent. nitrici 0'20; Aq. dest. 200. S. 4 razy dnia po łyżce.

Rp. Chloroformii 1'00; Aq. dest. 120'00; Bismuth subnitr. 3'00. D. Co godz. łyżkę.

Rp. Sal. therm. carolin. 100'0. DS. Co dzień na czczo łyżeczkę w 1/2 szklanki letniej wody zażyć.

Rp. Natr. bicarb.; Magn. ustae aa. 15'00. MDS. 3 razy dziennie na koniec noża zażyć.

Rp. Menthol. 1'0; Spirit. 25; Aq. dest. 200. S. W razie bólów łyżeczkę na pół szklanki wody.

Rp. Natr. bicarb. 5'00; Morph. mur. 0'10; Mfp. div. in dos. XII. DS. 3 proszki dziennie.

Rp. Magister. bismuth. 5'00; Codeini m. 0'20; Mfp. div. in dos. X. S. 3 proszki dziennie.

Rp. Codeini ph. 0'02; Natr. bicarb. 0'50; F. p. dent. t. dos. XII. S. 2—3 proszki dziennie zażyć.

W razie krwotoku:

Rp. Sol. Adrenalini hydrochl. (1:1000) z Aquae menthae pip. āā. S. Co godzinę 5—10 kropli zażyć.

Uraemia zob. **Morbus Brighti.**

Urticaria. Pokrzywka. Starać się o wyszukanie i usunięcie przyczyny cierpienia. Takimi są: pasożyty skórne (pluskwy, pchły), nieżyty przewodu pokarmowego, u kobiet zboczenia w narządzie rodnym. Jako leczenie symptomatyczne skierowane przeciw swędzeniu i pieczeniu skóry polecić używanie:

Rp. Aceti vini; Aq. dest. āā. 100'00; Acidi salicyli 1'00. S. Zewnętrznie.

Zwilżyć wodą, a potem rozetrzeć sól kuchenną.

Rp. Menthol. 5'0; Chloroform.; Aether. sulf.; Spir. camphor. āā. 15'00. S. Zwilżać lekko skórę.

Rp. Chloroform.; Glycerin. p. āā. 50'0. Po zwilżeniu skórę pudrować.

Przy powtarzającej się pokrzywce, kąpiele i wewnętrznie:

Rp. Chinin. muriat.; Ergotin. āā. 0'15; Extr. belladon. 0'003; Glycerin. q. s. ut. f. pill. Nr. XXX. S. 6—11, pigułek dzien.

Rp. Atropin. sulf. 0'01; Aq. dest.; Glycerin. p. āā. 2'0; Pulv. tragacanth. q. s. ad pill. Nr. X. S. 2 pigułki dziennie.

Vaginismus. Pochwica. Usunięcie zmian chorobowych miejscowych i owrzodzeń, zapalenia i t. p. jeżeli się znachodzą. Poprawa stanu ogólnego i podawanie środków uspokajających ustrój nerwowy. Gdy objawy niezbyt jeszcze gwałtowne a przyczyną choroby jest niedokładny stosunek płciowy, wpływ moralny, środki znieczulająco miejscowo, aby umożliwić coitum.

Rp. Cocaini muriat. 1'0; Aq. dest. 30'0; Spir. vini rect. 2'0. DS. Do pendlowania.
albo:

Rp. Extr. bellad. 1'0; Vaselini 15'0. Mf. ungu. DS. Na wacie między wargi na noc zakładać.

Można też polecić okłady z wody Goularda, pendzlowanie rozczy-nem azotanu srebrowego 1:50 lub rozczy-nem kwasu karbolowego 1:30. Rozszerzanie powolne wnijscia pochwowego rozszerzaczami.

Jeżeli przypadki gwałtowne: wycięcie błony dziewiczej i nagłe rozciągnięcie wnijscia pochwowego sposobem tępym po poprzednim zachloroformowaniu chorej.

Vaginitis zob. **Fluor albus.**

Varicella. Ospa wietrzna, ospówka. Lżejsze przypadki nie wymagają leczenia, prócz lekkiej diety, oraz pozostania w pokoju zwłaszcza, w chłodniejszej

porze roku. Swędzenie usuwa się obfitemi zasypkami, owrzodzenia wymagają opatrunków. Należy zwracać uwagę na zdarzające się powikłanie z zapaleniem nerek, wskutek czego po 3 tygodniach badać mocę.

Rp. Acidi phosphor. dil. 1'00; Aq. deslil. 80'00; Syr. rub. idaei 20'00. DS. Co 3 godz. łyżeczkę.

Rp. Acidi salicyl. 0'50; Alumin plumosi 50'00. Mfp. S. Zasypka.

Variola vera. O s p a. W okresie zwiastunów, przeczyszczenie. Przewietrzać pomieszkanie, ciepłota pokoju 14—15° R., lekkie przykrycie chorego, dyeta pożywna płynna, mleko, mocny rosół z żółtkiem. Dużo wody, orszada, woda z winem. Przeciw bólom głowy lodowe okłady. Napięcie skóry łagodzić smarowaniem tłuszczów (oliwa, waseline, 50% masę borowa). Kąpiele ciepłe, a gdy to niemożliwe, zmywania ciepłą wodą, zwłaszcza twarzy i powiek. Płókanie: 20% Kali chloricum, 30% kwas borowy.

Rp. Kali chloric. 5'0; salve in Infus. flor. tiliae 300'00; Trae laudan. 1'00; Mell. rosati 10'00. DS. Płókanie.

Rp. Tannin. puri 1'00; Alumin. 0'50; Kali bromat. 5'00; Mucilag. gum. ar. 25'00; Aq. dest. 200'00. DS. Płókanie.

Przeciw wymiotom pigułki lodowe lub wstrzyknięcie morfiny w okolicę dołka podsercowego.

W razie bezsenności:

Rp. Chloralhydrat 3'00; Aq. dest. 60'00; Syrup. rubid.; Mucilag. gum. ar. aa. 20'00. DS. Połowę na raz użyć.

Rp. Sulfonali 0'50; Dtur. tal. dos. N. V. S. Na noc proszek w herbacie lub rosole.

Zaraz po wybuchu wysypki dać na głowę, twarz i szyję maskę z płótna, pozostawiwszy otwory na nos, oczy i usta, posmarowaną pastą:

Rp. Acid. carbol 3'00; Amyli; Ol. amygdal. dulc. aa. 50'00. F. Pasta. S. Zewnętrznie.

Resztę ciała smarować często:

Rp. Acid. salicyl. 3'00; Amyli 30'00; Glycerin. neutr. 70'00. Mf. Pasta.

W osłabieniu serca: kamfora, wino, cognac na pół z wodą z żółtkiem i cukrem, co godzinę łyżkę. Ropnie wcześniej otwierać.

Vitia cordis. W a d y s e r c a. W okresie wyrównania stosowne żywienie, mleko, mięso bez korzeni, osobom chudym więcej tłuszczów, otyłym tychże zabronić.

Wzbronione również napoje wyskokowe, prócz lekkich win. Ruch, a mianowicie po równi, lub po miernych wzniesieniach gór, z wyjątkiem, gdy chorzy dostają duszności, zawrotów głowy, lub nierégularności tętna, gimnastyka lecznicza, kąpiele solne letnie. Unikać

wzruszeń. Uregulować stolec. Kąpiele w Neuheim lub sztuczne z kwasem węglowym.

Wobec braku wyrównania leżenie w łóżku:

Rp. Infus. digitalis e 1'0—1'5 ad 150'00; Syrup. simpl. 20'00. MDS. Co 2 godz. łyżkę.

Rp. Trae digital. 2'50; Aq. lauroc. 8'00. MDS. 3 razy dziennie po 15 kropel.

Rp. Pulv. fol. digitalis 0'10; Diuretin (Knoll) 1'0; Sacchari 0'30; Mfp. dent. t. dos. N. X. S. Co 2 godziny proszek.

Jeżeli po użyciu digital. tętno mocniejsze, regularniejsze, ilość moczu większa, to przestać na parę dni podawać.

Rp. Trae strophanti; Aq. lauroc. $\bar{a}\bar{a}$. 10'00. S. 3 razy dziennie po 10 kropli. (Dzieciom od 5—10 lat do 5 kropli dziennie).

Rp. Trae cacti grandifl. 5'0; Trae convalar. maj. 10'0. DS. 3 razy dnia po 15 kropli.

Rp. Trae nerri oleand. 5'0; Trae adonis vernalis. 10'0. S. 3 razy dziennie po 15 kropli.

Rp. Coffeini natrobenz. 2'00; Sacchari 5'00; Mfp. div. in dos. 20. S. 5—8 proszków dziennie.

Rp. Theobrom. natr.-benz. 0'10; Sacchari albi 0'20; Mfp. d. tal. dos. 20. S. Co 2 godziny proszek.

Rp. Sparteini 0'02; Sacch. albi 0'30; Mfp. dtal. dos. N. X. S. 2—3 proszki dziennie.

Rp. Inf. conval. maj. e 6'00 ad 180'00; Coff. natrobenzoic. 2'00; Syr. simpl. 20'00. D. Co 2 godziny łyżkę.

Rp. Digaleni fabr. Hoffman et La Roche scat. orig. S. $\frac{1}{2}$ —1 cm. 3 razy dziennie zażywać.

Rp. Trochisci nitroglycerin à 0'001; Tal. dos. X. S. W razie napadu duszności, osłabienie akcji serca $\frac{1}{4}$ —1 pastylki.

Rp. Sol. nitroglycerin alkoh. (0'30%) 1'0; Alcohol 5'0. S. 3 razy dnia 5—6 kropli.

Rp. Inf. fol. digital. 1'5; 150'0; Natr. jodat. 3'5—5'0. MDS. Co godz. łyżkę w mleku.

Rp. Kali jodati 10'00; Aq. dest. 200'00. DS. Rano i wieczór $\frac{1}{2}$ —1 łyżki.

Rp. Infus. adonis. vern. e 5'00 ad 180'00; Syrup. rubid. 20'00. S. Co 2 godz. łyżkę.

Rp. Spartein. sulfur. 0'10; Aq. dest. 180'00; Syrup. sacchar. 20'00. MDS. Co 2 godz. łyżkę.

Rp. Tinct. fruct. immat. nerii oleandri 10'00. DS. 2—3 r. dziennie po 20 kropli.

Przy objawach obrzęku płuc:

Rp. Inf. flor. arnicae e 8'00 ad 180'00; Liqueur ammoniae anis. 2'0; Syrup. cort. aurant. 20'0. MDS. Co godzinę łyżkę.

Przeciw puchlinie nacięcia obrzękłej skóry, jużto

lancetem lub małym trójkątnym po czym opatrunek aseptyczny. W razie duszności gorczycznik na okolicę serca, moczenie nóg w gorącej wodzie, wstrzykiwanie morfiny, w razie silnego bicia serca, blaszanka z zimną wodą na okolicę serca.

Rp. Diuretin (Knoll) 10·0; Aq. dest. ad 200·0. S. Co 3 godziny łyżkę.

Rp. Theocini 0·5. S. 4 razy dziennie proszek.

Volvulus zob. **Ileus**.

Vulvitis. Zapalenie sromu. Pierwszym warunkiem leczenia jest utrzymanie sromu w czystości i sucho, unikać drażnienia, polecić spokój, kąpiele ciepłe nasienne, następnie srom wysuszyć unikając tarcia, okłady z wody Goularda, z 20% octanu ołowiowego zasadowego, z 1—20% kwasu karbolowego, z 2—40% kwasu borowego. Jeżeli są nadżerki, to maść cynkowa, salicylowa, pudrować pudrem salicylowym, lub zasypać proszkiem składającym się z równych częściach z jodoformu i dermatolu lub proszkiem składu:

Rp. Jodoformi 4·0; Tannini 1·0; Magist. bismuth. 6·0; Mf. pulv. D. in scatula. S. Do zasypywania.

Ropnie otworzyć. Jeżeli zapalenie sromu jest następstwem chorób wyższych dróg rodnych n. p. rzeżączki pochwy, raka macicy, przetok moczowych, należy usunąć przyczynę, toż samo, jeżeli przyczyną jest niedokrewność, żoły, kiła, należy oprócz leczenia miejscowego, zastosować leczenie ogólne.





CHOROBY OCZU.

—co—

Conjunctivitis catarrhalis.

Nieżytowe zapalenie spojówki.

W przypadkach ostrych i chronicznych silniejszego stopnia, ze znaczniejszem rozpułchnieniem spojówki i wydzieliną obfitą, łapisowanie 10% roztworem nitr. arg. lub 5% protargolem. Obecność następowego wrzodu rogówki (ulcus corn. catarrh.) nie zmienia tego leczenia, a nakazuje prócz tego zapuszczać atropinę dla zapobieżenia następowej iritis. Opaska jak wogóle w zapaleniach spojówki przeciwwskazana.

Rp. Arg. nitr. cryst. 0·5; Aqu. dest. 50·0; Dtr. ad vitr. nigr. S. Do rąk lekarza.

Rp. Protargoli 2·5; Aqu. dest. 50·0; Dtr. ad vitr. nigr. S. Do rąk lekarza.

W przypadkach chronicznych, lżejszych o wydzielinie skąpej zapuszczenie 2—3 razy dziennie jednej z następujących wód ocznych:

Rp. Acidi borici 1·50; Aqu. dest. ferv. 50·00; Zinci sulfur. 0·25. MDS. Woda do ocz.

Rp. Collyr. acstr. lut. 30·00; Aqu. dest. 20·00; Detr. ad vitr. nigr. DS. Woda do ocz *).

Rp. Plumbi acet. perf. neutr. 0·50—1·00; Aqu. dest. 100·00; Solv. filtra. DS. Woda do ocz.

Octan ołowiu jest przeciwwskazany wobec wrzodów lub złuszczeń przybłonka rogówki, powstałyby bowiem nieuleczalne białe zaćmienia z inkrustacyi ołowiem. Używając jakichkolwiek wód ocznych, należy unikać zapuszczenia późnym wieczorem.

*) Jakkolwiek Collyr. adstr. lut. wedle ostatniej farmakopei austr. o połowę jest słabsze niż dawniej, przecież dzięki różnorodnym swym częściom składowym (Zinc. sulf., ammon. chlor., camphora, spir. vin., crosus) bez rozcieńczenia za nadto silne sprawia pieczenie.

Wskazanie przyczynowe nakazuje wystrzegać się wszelkich zewnętrznych szkodliwości, jak: kurz, dym itp., nadto w przypadkach chronicznych zwrócić uwagę, czy katar spojówki nie ma lokalnej przyczyny w innych cierpieniach, jak blepharadenitis, blennorrhoe sacculacr., ectropium, distichiasis, u starszych wreszcie złogi wapniste w gruczołach Meiboma. Wówczas obok zwykłego, wskazane leczenie przyczynowe.

Conjunctivitis crouposa.

Włóknikowe zapalenie spojówki.

Jestto tylko silniejszy katar oczny z wypociną krzepnącą w postaci szarej błonki włóknikowej na powierzchni spojówki. Wydarza się wyłącznie niemal u dzieci.

W okresie tworzenia się błonek unikać kauteryzowania, a polecić tylko zapuszczanie co 2—3 godz. roztworu sublimatu 1:5000 lub 30% kwasu borowego obok okładów lodowych (3—4 razy dziennie po 1 godz.). Gdy po kilku dniach błonki się oddzielają, leczyć jak zwykły katar ostry.

Rp. Acidi borici 3'00; Aqu. dest. 100'00. DS.
Woda do ocz.

Rp. Sublim. corros. 0'02; Aqu. dest. 100'00. DS.
Woda do ocz.

Conj. blennorrhoeica adultorum.

Zapalenie wiewiórowe spojówki u dorosłych.

Śluzoropotok ostry jest zawsze następstwem zakażenia spojówki jadem trypra (2—4 dni po infekcyi). W obrazie choroby góruje 1) silny obrzęk powiek zwłaszcza górnej, 2) poduszkowate obrzmienie spojówki gałki (chemosis), 3) znaczne rozpulchnienie i jednostajne ciemno czerwone przekrwienie spojówki, przez co zacieśniają się kontury gruczołów Meiboma, 4) obfita wydzielina, która w pierwszych 2—3 dniach bywa trudno krwawą, łatwo krzepnącą, do opłuczyn mięsnych podobną, później zmienia się w ropną. Wydzielina ropna w odróżnieniu od kataralnej nie układa się w nitki, ale miesza się jednostajnie ze łzami. W wątpliwych przypadkach rozstrzyga obecność rzeżączki części rodnych lub wykazanie gonokoków w wydzielinie spojówkowej.

Rokowanie zawsze wątpliwe, grozi bowiem zropienie rogówki przebiegające pod formą wrzodu lub abscesu. Rzadszą i mniej niebezpieczną komplikacją jest łuszcza wydarzająca się jednak w późniejszych dopiero okresach

Leczenie: Przedewszystkiem uchronić drugie oko od infekcyi szczelnym opatrunkiem (na oko zwitek waty, który pokrywa się owalnym płatkim borlintu, od biedy zwykłego płótna lub ceratki, brzegi przytwierdzić do skóry kolodjonem, na to założyć zwykły monoculus). Opatrunek ten zmieniać należy codziennie tak długo, dopóki przez leczenie nie usuniemy wydzieliny ropnej z oka chorego.

W okresie I (wydzielina surowicza) wskazane przepłukiwanie co $\frac{1}{2}$ godz. worka spoj. sublim. 1:5000 tudzież okłady lodowe stosowane przez dzień i noc, a zmieniane co parę minut. Wobec gwałtownych bólów 6—7 pijawek na skroń.

Z chwilą, gdy wydzielina przybiera charakter ropny (II lub III dzień choroby) przystąpić do energicznego kauteryzowania 2%—3% roztworem nitr. argenti. Lapisować wystarcza i raz dziennie — w cięższych przypadkach, gdy strup po lapisie się oddzielił nawet 2 razy dnia. Rozczyn arg. nitr. zastąpić można 10% roztworem protargolu, który jako mniej drażniący można już od razu stosować w przypadkach, gdzie wydzielina nie okazuje skłonności do krzepnięcia w błonki. Gdy nastąpił wrzód lub absces rog. zrazu (obok lapisowania) atropinę, gdyby jednak wrzód głęboki groził przebicciem $\frac{1}{2}$ % eserynę lub 2% pilokarpinę.

Przy odwijaniu powiek zachować jaknajwiększą ostrożność, unikać ugniecenia oka lub dotykania rogówki. Gdyby delikatne odwiniecie powiek wobec wrzodu rogówki było niemożliwe, ułatwi to i na przebieg wrzodu korzystnie wpłynie, rozcięcie zewnętrznego kącika powiek (kantoplastyka prowizoryczna).

W przypadkach lekkich, lapisowanie usuwa doszczetnie chorobę, w cięższych, pozostaje przerost spojówki znany pod nazwą: conjunctivitis blennorrhöica chronica, przypominający trachoma papillare. Wówczas przejść należy do tuszowania siarkanem miedzi in subst.

Rp. Arg. nitr. cryst. 1.0—1.5; Aqu. dest. 50.0;
Dtr. ad vitr. nigr. S. Do rąk lekarza.

Rp. Protargoli 5.0; Aqu. dest. 50.0; Dtr. ad vitr. nigr. S. Do rąk lekarza.

Blennorrhöa neonatorum.

Zapalenie wiewiórowe spojówki u noworodków.

Śluzoropotok noworodków różni się od takiejże choroby dorosłych tylko łżejszym stopniem objawów zapalnych i łagodniejszym przebiegiem. Czas występowania 2—5 dni po urodzeniu się. Charakterystycznym jest tylko brak okresu wydzieliny surowiczej. Wydzielina jawi

się tu odrazu w formie ropnej, do góstej śmietany podobna. Leczenie jak u dorosłych.

Dla zapobieżenia chorobie w każdym przypadku fluor albus u rodzących antyseptyczne przestrzykiwania pochwy, u noworodków zaś wnet po przyjściu na świat zapuszczenie do oczu kropli 1—2% lapisu, albo 10% protargolu.

Conjunctivitis follicularis.

Zapalenie spojówki grudkowe.

Cierpienie to przypominające I okres jaglicy da się jednak odróżnić na podstawie:

1) umiejscowienia na dolnej tylko spojówce, 2) dla regularnego ułożenia mieszków limf. w szeregach, 3) powierzchownego ułożenia i barwy różowawej.

Leczenie: pendzlowanie 2% acet. plumb., po czym obficie wodą spłukiwać. W cięższych przypadkach zapuszczenie 2—3 razy dnia 1/2% plumb. acet.

Rp. Plumb. acet. neutr. 2'o; Aqu. dest. 100'00. Solv. Filtra. DS. Do pendzlowania.

Trachoma. Jaglica.

Leczenie: w formie ostrej, względnie rzadkiej (obrzęk powiek, chemosis, w rozpulchnionej spojówce powiek drobne, głęboko ukryte ziarna jaglicowe) okłady lodowe, częste przepłukiwania roztworem sublimatu (1:5000), głównie jednak lapisowanie 1—2% roztworem argent. nitr. Po ustąpieniu objawów ostrych leczyć jak formę chroniczną.

Leczenie jaglicy chronicznej zależy od każdorazowego okresu choroby. W każdym przypadku, gdy spojówka jest rozpulchniona, a wydzielina obfita, należy rozpocząć od lapisowania. Z ustąpieniem zbytnej wydzieliny rozchodzi się o usunięcie zmian przerostowych (ziarna i przeroste brodaweczki). Środki do tego służące są następujące:

1. Systematyczne tuszowanie cum cupr. sulf. in subst. tak długo, aż spojówka nie stanie się gładką i bladą. Środek ten jednak może być przeciwwskazany chwilowo, jeżeli wystąpi świeży infiltrat, wrzód lub ostra łuszcza wśród żywego nastrzyknięcia rzęskowego. Wówczas wrócić do lapisu, aż do ustąpienia nastrzykania rzęskowego.

2. Systematyczne pocieranie wacikiem, zwilżonym w roztworem (1:2000) sublimatu, odwiniętych spojówek.

3. Gdzie przeważają ziarna jaglicowe, a są powierzchowne, najkorzystniej zastosować wygniatanie bądź to

przez uciskanie załamka chwyconego pomiędzy paznogiowe powierzchnie obu palców dużych, bądź też osobną »ad hoc« pensetą Knappa. Po wygnieceniu, które czasem wypadnie powtórzyć, okłady lodowe, przestrzykiwanie sublimatem, a po kilku dniach powrót do leczenia zwykłego (lapis względnie cuprum).

4. Nielicznie rozsiane, a do wygniecenia zagłębokie lub zbyt młode ziarna jaglicowe, można pojedynczo wypalać galwanocauterem Settler-Niedena.

5. W przypadkach ciężkich opierających się leczeniu powyższymi środkami przy znacznym przeroście załamka, skraca znacznie przebieg wycięcie częściowe załamka wedle Heisratha. Metoda ta, jakkolwiek ma swoich przeciwników, wolną jest przy umiejętnem wykonaniu od wszelkich szkodliwych następstw.

W przypadkach lekkich lub na ukończeniu leczenia, można pendzlować cum plumb. acet. (cave przy wrzodach) lub zasypywać proszek tanninowy z kw. borowym w stosunku 1:3. Gdzie niemożliwem jest leczenie przez lekarza, wskazanem jest przynajmniej zapuszczanie roztworu cupr. sulf. lub tanniny.

Rp. Cupr. sulf. 1'00; Glycerini puri 15—20'00.

DS. Krople do ocz (1—2 kropli raz dziennie).

Lub też gdzie wskazana ostrożność:

Rp. Tannini puri 1'00; Glycerini puri 8—15'00.

DS. Krople do ocz (1—2 kropli raz dziennie).

Dobrze jest zmieniać te środki, aby wykluczyć wpływ przyzwyczajenia. Komplikacje, jak łuszcza i wrzody nie wymagają zazwyczaj osobnego leczenia. Przyczyną przewlekania się komplikacji mogą być następstwa jaglicy, jak distichiasis, trichiasis, blepharophimosis, entropium. Stany te wymagają operacji. Aż do chwili oper. należy bacznie zwracać uwagę na rzęsy i często epilować wadliwie rosnące lub wkręcone.

Kerato-conjunctivitis phlyctaenulosa.

Pryszczykowe zapalenie spojówki i rogówki.

Wspólną cechą wszystkich postaci tego cierpienia, występującego pod formą pryszczków na spojówce, lub rogówce, łuszczy, czy też miotełki naczyniowej, jest ich tło skrofuliczne.

Leczenie musi więc być nietylko lokalne ale i ogólne: posilna dyeta (pokarmy mięsne, jaja, mleko, zdrowe suche mieszkanie, w zimie zażywanie tranu, w lecie kąpiele słone (Rabka, Iwonicz, Rymanów). Lokalnie: zasypywanie kalomelu przez czas dłuższy, nawet w parę tygodni po ustąpieniu cierpienia.

Rp. Calomel. vap. p. alcoholis. subt. pulv. 5'00.

DS. Proszek do ocz. Pendzelek.

Wobec znaczniejszej wydzieliny spojówkowej, lepiej zacząć leczenie od lapisu, a później dopiero przejść do calomelu. Unikać calomelu przy równoczesnym podawaniu jodku potasu, wywiązujące się bowiem przy tem połączenia jodu z rtęcią, działają silnie gryząco. W formie złośliwej (infiltrat głębszy, barwy szaro-żółtej) dążęć wpięrow do oczyszczenia się nacieku za pomocą środków podanych w leczeniu wrzodów rogówkowych.

Energiczniej jeszcze niż calomel działa zmodyfikowana maść Pagenstechera.

Rp. Mercur praecip. flav. 0'15—0'2; Vaselini flavi 5'00. Mfung. DS. Maść do oka.

Środek ten wprowadza się bądź grubszą sondą okul., bądź pręcikiem szklanym pod powiekę, po czem zlekka masuje się palcem przez powiekę. Maść ta nadaje się szczególnie w formach naczyńiowych kerat. phlyct. Gdzieby postępowanie to nie wstrzymało progresji miotёлki naczyńiowej, najlepiej przypalić galwanokaute-rem brzeg wrzodu znajdującego się na szczycie miotёлki.

Conjunctivitis diphteritica.

Błonica spojówki.

Jest to najniebezpieczniejsza z chorób ocznych, u nas na szczęście rzadka, częstsza w północnych Niemczech.

Leczenie: pierwszym zadaniem odosobnienie chorego dziecka i wstrzykiwanie surowicy swoistej. Lokalnie w okresie infiltracji (deskowato twardy obrzęk powiek, naciek brudno szary w spojówce, zdjąć się nie dający) leczenie przeciwzapalne i antyseptyczne, jak w conjunctivitis blennorrhöica: przestrzykiwanie pilne sublimatem i okłady lodowe, jednak miernie i bez przesady stosowane, przytem ogólne leczenie, t. j. wstrzykiwanie surowicy antydyft. Francuscy okuliści radzą nadto pomazywanie spojówki sokiem cytrynowym. W okresie ropienia i exfoliacji błon dyft., lapisowanie 20% roztworem lub co lepiej cum lapide mitigato w miejscach już od błon wolnych. W okresie zbliźnowacenia zmniejszają dolegliwości środki osłonne, jak mleko i maść borowa.

Combustio conjunctivae cum calce.

Oparzenie spojówki wapnem.

Sparzenie wapnem przedstawia obraz podobny do dyfteryi spojówki. Charakterystycznym jest mlecznobiałe zazwyczaj nie wyjaśniające się zaćmienie rogówki, o ile ta sparzoną została. Pierwszym zadaniem lek. jest wydobyć starannie łyżeczką Daviela szczątki wapna,

kryjące się w fałdach spojówki, przyczem unikać wszelkiego spłókiwania, prócz chyba roztworem cukru trzcinowego, który zobojętnia wapno. Dla usunięcia bólów i objawów zapalnych okłady lodowe obok zapuszczania w pierwszych dniach 3—5% kokainy, w razie potrzeby z dodatkiem atropiny, na strupy zaś oparzelinowe zasypywanie jodoformu.

Rp. Cocaini mur. 0·3—0·5; Aqu. dest. 10·00. **DS.**
Krople do ocz.

Rp. Jodoformi subtil. pulv. 5·00. Proszek do ocz.

W okresie zablizniania rozrywać końcem tępej sondy świeżo powstające zrosty, aby zapobiedz symblepharon. W razie, gdyby takowe mimo to wystąpiło, operacya.

Keratitis parenchym. diffusa.

Mięzszowe rozlane zapalenie rogówki.

Obraz choroby na szczycie rozwoju może nasunąć niewprawnym myśl łuszczki. Dla odróżnienia pamiętać należy, że naczynia nowo wytworzone w cierpieniu tem leżą w głębszych warstwach rog., stąd też przez zaćmienie rogówki wydają się brudno-czerwone, podczas gdy w łuszczce leżą powierzchownie, rozgałęz. się widocznie, a barwy są żywo czerwonej.

Leczenie musi uwzględnić tło, a więc w lues congen. natrium lub kal. jodat. wewnątrznie, w kile nabytej wcierania szaruchy. W okresie zapalnym (nastrzykanie rzęsek. i łzawienie) lokalnie poprzestać należy na zapuszczaniu atropiny dla zapobieżenia iritis. Zresztą po silne pożywienie, pobyt na świeżem powietrzu, a tylko wobec ciężkiej komplikacji z iridokykklitis lub iridochoioiditis, ciemny pokój (ciemne okulary). Po ustąpieniu objawów zapalnych, przejść należy do środków wyjaśniających, jak kalomel, maść Pagenstechera, tra, opii crocata lub ol. terebintinae cum glycerin. *aa.* do zapuszczania 1 raz dziennie. W szeregu środków tych kalomel jest najłagodniejszym, ol. terebint. najsilniej drażniącym środkiem. Od kalomelu więc zacząć należy i zwolna do coraz silniejszych przechodzić.

Rp. Natr. jod. 5—8·00; Aqu. dest. 200·00. **DS.** Po dwie łyżki dziennie.

Rp. Ung. ciner. 1·50—2·00. D. t. d. Nr. 30. **DS.** Po 2 pak. do wcierania.

Rp. Ol. terebint. rectific. Glycerini *aa.* **DS.** Jedną kroplę raz dziennie zapuszczać do oka.

Ulcera corneae. Wrzody rogówki.

Zawdzięczają one swe powstanie infekcyi lokalnej na tle exkoryacyi rogówki. Dla tego to obok drobnych

urazów rogówki, ciał obcych, trichiasis, entropium, lagophthalmus, exophthalmus) najczęstszą przyczyną wrzodów rog. są zapalenia spojówki, gdzie wydzielina śluzowo-ropna stanowi materiał zakaźny. Odróżniamy więc:

- 1) Wrzody kataralne charakteryzujące się swem położeniem obwodowem i kształtem półksiężycowym,
- 2) Wrzody na tle jaglicy.
- 3) Wrzody na tle śluzoropotoku.
- 4) Wrzody na tle dyfteryi.
- 5) Wrzody urazowe.

Zboczeniom stanu ogólnego zawdzięczają swoje powstanie wrzody po Keratitis phlyctenulosa, tudzież po herpes corneae febrili.

Leczenie zależy od etiologii. Wrzody następowe goją się pod wpływem leczenia choroby spojówki (Trachoma, conjunctivitis blennorrhoea, conjunctivitis catarrhalis). Obok tego dla zapobieżenia iritis, należy utrzymać źrenicę w rozszerzeniu za pomocą atropiny. W leczeniu wrzodów pierwotnych rogówki zależy postępowanie od stadium wrzodu. W okresie progresyi, tj. wobec silniejszego nastrzykania rzęskowego, żółtawego zabarwienia dna i brzegów wrzodu, należy dążyć w pierw do oczyszczenia nacieku. W przypadkach lżejszych osiągamy to przez zapuszczanie atropiny, zapruszanie jodoformem i opaskę. W przypadkach cięższych wskazane jest obok atropiny zapuszczanie sublimatu 1 na 5000 co 1—1½ godz., ciepłe okłady z siemienia lnianego przez kilka godzin dziennie, na noc jodoform i opaska. Wobec wrzodów głębszych, gdzie grozi przebicie, lub zachodzi obawa zniszczenia przeważnej części rogówki, lepiej jest zastąpić zwłaszcza przy wrzodach obwodowych atropinę pilocarpiną lub eseryną, środki te bowiem obniżając ucisk śródoczny, poprawiają odporność rogówki. Dopokąd wrzód wybitnie ropny (np. ulcus serpens corneae) jest niezbyt rozległy, najlepszym środkiem wstrzymującym progresję jest przypalenie galwanokauterem. Przy większych jednak rozmiarach wrzodu lub abscesu rogówki wskazaną będzie keratotomia wedle Saemisch.

Doprowadziwszy leczeniem tem wrzód do oczyszczenia się (oko blade, dno wrzodu już zaledwie szare lub zupełnie czyste) przystąpić należy do przyspieszenia regeneracyi przez środki lekko drażniące, a zarazem wyjaśniające, jak calomel i maść Pagenstechera.

Maculae corneae. Plamy na rogówce.

Łatwo je odróżnić od nacieków zapalnych uwzględniając: 1) brak nastrzykania rzęsk. 2) ostre odgraniczenie, 3) barwę białą lub niebieskawą, 4) gładką zwierciadłą powierzchnię.

Tylko świeże plamki można do pewnego stopnia wyjaśnić przez dłuższe stosowanie środków podanych przy keratitis parenchym. diff. Plamy grubsze, zasłaniające źrenicę, dają wskazanie do iridectomii optycznej. W celu kosmetycznym można szpecące plamy uczynić mniej widocznymi przez tatuowanie, co w przypadkach odpowiednich może również korzystny wpływ wywrzeć na bystrość wzroku.

Staphyloma corneae. Garbiak rogówki.

Garbiaki częściowe bez względu na stopień upośledzenia wzroku, jaki wywołują, dają wskazane do iridectomii, aby ocalić wzrok podpadający skutkiem podwyższenia ucisku śródocznego. W razie wrośnięcia źrenicy całkowitego w bliznę, można przy utrzymanym poczuciu światła (światło stoczka na 6 m. lokalizacja dobra) przez iridectomię nawet wzrok przywrócić.

Garbiaki całkowite, o ile wywołują dolegliwości przez swe rozmiary, a utrzymane jest poczucie światła, mogą być usunięte drogą operacyjną (Wecker, Knapp). Wobec braku jednak poczucia światła, zwłaszcza przy równoczesnym wyđęciu twardówki, wskazaną jest enukleacja gałki ocznej.

Iritis, iridokylitis.

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego.

Prosta iritis zdradza się:

- 1) Nastrzykaniem rzęskowym,
- 2) Często zmętnieniem cieczy wodnej, czasem obecnością ropy w przedniej komórce (iritis supur.).
- 3) Zmianą barwy tęczówki (porównaj z okiem II-em).
- 4) Zatarciem promienistego rysunku właściwego tęczówce.
- 5) Obecnością tylnych przyczepień łatwo uwidaczniających się po zapuszczeniu atropiny. Jestto najczęstszy objaw iritis.
- 6) W pewnych przypadkach szarymi osadami na tylnej części rogówki (Iritis serosa).

Nie rzadko przechodzi zapalenie na ciało rzęskowe, co przynajmniej w ostrych przypadkach zdradza się silnym bólem przy dotykaniu okolicy ciała rzęskowego (Irydokylitis).

Leczenie. Ponieważ iritis, pomijając wrzody i zapalenia rogówki, jest zawsze niemal następstwem chorób ogólnych (syphilis w około 70% przypadków, rheumatismus, diabetes melitus, tuberculosis, gonorrhoe) więc przede wszystkim leczenie ogólne zależnie od etiologii

a więc: wcierania ung. ciner., kalium jod. interne, natr. salicyl. i t. d. W przypadkach ostrych ciemny pokój, w lepszych okulary dymne.

Lokalnie: zapuszczanie atropiny lub innych środków tak często, aby źrenicę do maximum rozszerzyć, w pierwszych dniach zatem co 2 do 3 godz., później rzadziej. Przy większej ilości tylnych przyczepień zapuszczanie atropiny z cocainą. Jeżeli źrenica opiera się rozszerzeniu, 6—7 pijawek na skroń. Z powodu bólów tudzież dla pobudzenia szybszej resorbcyi, ciepłe okłady (zimne przeciwskazane z wyjątkiem świeżej iritis traumatica). Wobec idiosynkrazyi do atropiny zapuszczanie duboizyny, jak powyżej.

Rp. Atropini sulf. 0·05; Aqu. dest. 5·00. DS. Krople do oka.

Rp. Atropini sulf. 0·05; Cocaini mur. 0·15; Aqu. dest. 5·00. DS. Krople do ocz.

Rp. Duboisini sulfur. 0·025; Aqu. dest. 5·00. DS. Krople do ocz.

Rp. Scopolamin hydrobrom 0·01; Aqu. dest. 5·0. DS. Krople do ocz.

Ophthalmia sympathica.

Zapalenie współczulne oczu.

Przyczyną choroby jest iridokykklitis traumatica oka 2-go po urazie przebijającym gałkę. Choroba w najlżejszym swym stopniu objawia się łzawieniem i łatwym nużeniem się oka (Iritatio symp.). Właściwe zapalenie symp. przebiega najczęściej pod formą ciężkiej iridokykklitis plast., rzadziej neuritis opt.

Leczenie: E nukleacya oka pierwszego, zresztą postępowanie, jak wogóle przy iridokykklitis: Kali jodat, wewnątrznie, w cięższych przypadkach wcierania szaruchy.

Następstwa w postaci seclusio i oclusio pupillae, dają wskazanie do iridectomii, ale dopiero po zupełnem uspokojeniu się oka.

Iridochorioiditis suppur. Panophthalmitis.

Ropne zapal. tęczówki i naczyńówki. Rop. zapal. całej jagodówki.

Oba te cierpienia dla oka bezwzględnie zgubne, kończą się z reguły zanikiem gałki ocznej. Pierwsze charakteryzuje się obrzmieniem powiek wysokiego stopnia, obecnością chemosis, hypopion, tudzież reflexem żółtawym z głębi oka. Gdy choroba wzmogła się do panophthalmitis, do powyższych objawów przyłącza się wysadzenie gałki ku przodowi, nie rzadko także go-

rażka. Przyczyną bywa infekcyja ropna, bądź to po urazie przebijającym gałkę, bądź też metastaza na tle pyemi, endocarditis ulcerosa, meningitis cerebrospin.

Leczenie: Ze względu na złe rokowanie, rozchodzi się tylko o złagodzenie bólów i skrócenia choroby. Poleci więc należy ciepłe okłady, na noc iniekcję morfiny; wobec rozwiniętej panophthalmitis, gdy zbliża się czas przebicia ropy, incizya w twardówce w okolicy równika cięciem równoległym do brzegu rogówki lub evisceracya treści gałki ostrą łyżką. Enukleacya przeciwwskazana z powodu niebezpieczeństwa meningitis.

Ciała obce i zranienia oka.

Drobne a lekkie ciała obce, znajdziemy zazwyczaj pod powieką górną lub dolną tuż ponad, względnie pod wolnym brzegiem powieki. Ukryte w załamku górnym, co bywa rzadziej, łatwo wykazać i wydobyć łyżeczką Daviela. Odpryski metaliczne, (zendra, opiłki żelazne) jeśli drobne, wbijają się powierzchownie tylko w rogówkę, skąd je, po poprzednim znieczuleniu rogówki kokainą (5%) dokładnie wydobyć należy igiełką dyscysyjną lub t. z. dłutkiem rogówkowym. Ciała obce, tkwiące w komórce przedniej, wymagają już delikatniejszego zabiegu operacyjnego. Ciała obce, które przebiwszy twardówkę lub rogówkę, dostały się w głąb oka, sprowadzają z reguły utratę oka, bądźto za pośrednictwem chronicznej irydokykłitis plastica, bądź też panophthalmitis. Ważniejszem jest niebezpieczeństwo sympatycznego zapalenia oka 2-go, dlatego w przypadkach podobnych wskazana jest enukleacya. Tylko tam, gdzie ciałem obcym jest stal lub żelazo, można w świeżych przypadkach uniknąć enukleacyi, przez wydobywanie elektromagnesem.

Wobec każdego cięższego zranienia oka, pierwszym zadaniem jest skrupulatna czystość i założenie antyseptycznego opatrunku. Specjalista oceni, jaki zabieg, a względnie leczenie, będzie w dalszym ciągu wskazane.

Katarakta. Zaćma.

W rozwoju zaćmy odróżnić należy 4 okresy: 1. Cataracta incip. dająca się wykazać oświetleniem ogniskowem lub wziernikiem, gdzie jakiś wzrok jeszcze utrzymany. 2. Cat. intumescens, gdzie utrzymane już tylko poczucie światła, kom. przedn. płytka, soczewka niebieskawo-szara zaćmiona, okazuje połysk perłowej macy i rysunek klinów. 3. Cat. matura, gdzie soczewka już dokładnie zaćmiona, barwa szara lub żółtawo-szara, komórka zaś wróciła do dawnej głębokości. 4. Cat. hypermatura: kom. przed. głębsza, z poza zeszczipiałej

kory przegląda żółtawe jądro, nie rzadko dołącza się zaćmienie torebki.

U dzieci nie należy wyczekiwać dojrzałości, ale operować (*Discissio*) już w pierwszych latach życia, aby uniknąć ordetwienia siatkówki (*amblyopia ex anopsia*) u dorosłych wskazaną operacya (*extrakcya*) dopiero w okresie dojrzałości. Warunkiem odzyskania wzroku po operacyi jest zdolność rozpoznawania światła na 6 m. i lokalizacya dobra.

Glaucoma. Jaskra.

Niebezpieczna ta choroba nakłada na lekarza obowiązek wczesnego rozpoznania, aby nie zaniedbać odpowiedniej chwili do operacyi. W samym początku (okres zwiastunów) występują przelotne zamglenia wzroku, widzenia kół barwnych do koła światła, wreszcie mniej lub więcej wyraźne bóle w czole i głowie. Przedmiotowo w chwili napadu można już stwierdzić pewne objawy jaskry, które jednak po pewnym czasie ustępują. Gdy jaskra przechodzi w okres 2-gi (*Glauc. evolutum*) niema już przerw pomiędzy pojedynczymi napadami — oko stale okazuje wybitne zmiany:

1. Przekrwienie przednich żył rzęskowych.
2. Zamglenie rogówki, rozlane głównie w środku o powierzchni jakby pokutej.
3. Komórka przednia płytka.
4. Tęczówka łupkowo szara.
5. Żrenica szeroka, często owalna, na bodźce nie oddziaływa.
6. Jako przyczyna wszystkich tych objawów, a zarazem jako najgłówniejszy objaw przedmiotowy — podniesienie ucisku śródocznego.

Zwolna wśród chwilowych remisji i zaostrzeń, wzrok co raz niżej podupada, wreszcie poczucie światła ginie (*Glauc. absolutum*). Przebieg bywa ostry lub chroniczny. W pierwszym przypadku do opisanych objawów przylączy się silniejsze nastrożenie rzęskowe czasem chemosis, podmiotowo zaś gwałtowne bóle w okolicy oka i w głowie.

Jaskra prosta przebiega tylko z lekkim stwardnieniem oka bez objawów zapalnych, bez bólów, wzniernik zaś wykazuje exkawyę tarczy dobrzeżną.

Leczenie: Środkiem radykalnym jest wczesne wykonanie iridectomii obwodowej i szerokiej. Mniej pewną jest sclerotomia. Aż do chwili operacyi wskazane są środki obniżające ucisk śródoczny jak zapuszczanie $\frac{1}{2}\%$ eseryny lub 2% pilocarpiny, które w miarę ciężkości przypadku zapuszczać należy co 3 do 2 godzin dziennie. Działanie ich jest bardzo korzystne, jednak tylko prze-

mijające. Nadto nie działają one tam, gdzie żrenica np. z powodu atrofii tęczówki nie zweża się.

W jaskrze ukończoney (Glauc. absolut.) wskazane wypatroszenie gałki ocznej lub enukleacya.

Rp. Eserini salicyl. 0·025; Aq. dest. 5·00. DS.
Kropie do ocz.

Rp. Pilocarpini mur. 0·1; Aq. dest. 5·00. DS.
Woda do ocz.

Hordeolum. Jęczmyk.

W razie, gdy już widnieje czop ropny — nacięcie. U osób bojaźliwych ciepłe okłady. Przy habitualnej skłonności do jęczmieni, dłuższe używanie maści z precipitatu białego lub żółtego.

Rp. Hydrarg. praec. albi 0·15—0·2; Vaselini flavi 5·00. DS. Maść na powieki.

Lub też:

Rp. Mercuri praecip. flav. 0·15—0·2; Vaselini flav. 5·00. MDS. Maść na powieki (do smarowania przed ułożeniem się do snu, w wielkości ziarna grochu między rzęsy).

Blepharadenitis.

Zapalenie gruczołków powiekowych.

W formie łuskowej i strupkowej maść z precipitatu białego lub żółtego, najwyżej 1—2% (silniejsze zbyt drażnią), pilne usuwanie strupów, zmywanie brzegów powiek wacikiem zmoczonym w wodzie kolońskiej. W formie wrzodziejącej, przypalenie cum lapide mitigato. Uwzględnić nadto przyczynę (scrophulosis, ble-norrhoe sacci lacr.)

Chalazion. Gradówka.

Od jęczmienia różni się brakiem objawów zapalnych, tudzież punktem wyjścia z chrząstki powiekowej (Gruczoły Meiboma). Usunięcie za pomocą nacięcia od strony spojówki powiekowej cięciem równoległym do przebiegu gruczołów Meiboma, po czem galaretową treść wygnieść, a torebkę wyskrobać należy.

Blennorrhoea sacci lacrym.

Śluzoropotok woreczka łzowego.

Objawy: łzawienie, tudzież śluz ropiasty za uciskiem okolicy woreczka łzowego, wydobywający się z punktów łzowych. Od czasu do czasu przyłączają się ostre ropne

zapalenie woreczka łzowego (dacryocystitis) z ogólnymi objawami abscesu, charakteryzującego się tem, że odpowiada położeniem woreczkowi łzowemu, a nie przekracza ku górze lig. canthi int. Dacryocystitis nieleczona przebiega na zewnątrz, a rezultatem jest przetoka woreczka łzowego.

Leczenie: W blennorrhoe sacci lacr., tudzież wobec przetoki niezbędnem jest systematyczne sondowanie przewodu noso-łzowego sposobem Bowmana. Rozpocząć należy od Nru 2-go, a kończyć na Nrze 4-tym. Po każdorazowym wyjęciu sondy (sonda leży $\frac{1}{2}$ godziny) przestrzykać należy przewód noso-łzowy przez kanalik łzowy, za pomocą szpryki. Anela lub dobranego zakrapiacza sublimatem 1 na 5000. Gdy przy leczeniu tem już żadnej wydzieliny z wor. łzow. wycisnąć nie można, sondować jeszcze w rzadszych odstępach czasu dla zapobieżenia recydywie. Wiedzieć jednak należy, że tylko prawdziwe sondowanie prowadzi do celu, podczas gdy wywoływanie «par force» dróg fałszywych, zdradzających się krwotokiem z nosa lub przewodki łzowej, mści się zazwyczaj każdorazowem pogorszeniem stanu.

Przetoki granulujące, goją się pod wpływem tego leczenia same, przetoki zaś o ścianach zabliźnionych wymagają nadto operacyi. Przypadki zbyt zadawnione z zarosnięciem przewodu noso-łzowego lub ze znacznem wydęciem wor. łzow. dają wskazanie do extyrpacyi woreczka łzowego.

Dacryocystilis. Zapalenie woreczka łzowego.

Gdy nie trwa nad 24 godzin można często wyleczyć poronnie, przez wywarcie ucisku za pomocą waleczka waty na woreczek łzowy i założenie staranne opaski uciskowej. Gdy jednak jest fluktuacya, należy przeciąć cięciem prostopadłem do skóry tuż popod lig. canthi int. Następnie zaś traktować, jak zwykły absces, a więc dla zapobieżenia sklejenia się brzegów rany wprowadzanie paska gazy jodoform., do worecka tak długo, dopokąd wydzielina nie straci charakteru ropnego i obrzmienie zapalne nie ustąpi, poczem przejść należy do sondowania.

BADANIE BYSTROŚCI WZROKU I REFRAKCYI.

Bystrość wzroku wyraża się stosunkiem odległości, w jakiej dany przedmiot może być jeszcze rozeznany, do odległości, w jakiej przez oko normalne rozeznany być powinien. W skali druków poniżej podanej nagłówki

oznaczają odległości normalne w metrach. Kto więc $D=30$ czyta tylko na 5 metrów, posiada bystrość wzroku $=\frac{5}{30}$ i t. d. Przy równoczesnem oznaczeniu refrakcyi należy badać w stałej odległości, nie mniejszej od 6 lub 5 metrów.

Jeżeli badany największych nawet nrów nie rozpoznaje w odległości 6 m., należy badać, na jaką odległość widzi i liczy palce. Liczenie palców odpowiada mniej więcej Nrowi 60 Snellena. Kto więc palce liczy tylko na 3 m., tego bystrość wzroku $=\frac{3}{60} = \frac{1}{20}$.

Bystrość wzroku mniejsza od 1 wskazuje na zboczenia bądź to w przezroczystości środków łamiących (zaciemnienia rogówki, soczewki, ciała szklanego) bądź na choroby siatkówki, nerwu wzrokowego lub naczyńiówki, bądź też wreszcie na wady refrakcyi. Wadę refrakcyi stanowić może wzrok krótki (Mp.), nadmiarowy (Hp.) lub astygmatyzm. Jeżeli bystrość wzroku badana w dali (5—6 m.) okazuje się mniejsza od 1, podczas gdy w pobliżu czyta badany nawet najdrobniejsze druki do pewnej stałej odległości, wskazuje to na obecność krótkiego wzroku, wówczas należy oznaczyć największą odległość w której badany drobne druki jeszcze czytać potrafi. Będzie to t. zw. punkt dali wzrokowej. Stopień krótkiego wzroku w dyoptryach znajdziemy, dzieląc 100 (cm.) przez ową odległość: n. p. ktoś czyta Nr. 08 na odległość 50 cm. Mp. będzie $=\frac{100}{50} = 2$ Dpt.

Dokładnie oznaczmy stopień Mp. empirycznie, oznaczając, jakie najsłabsze szkło wklęsłe najlepiej bystrość wzroku w dal poprawi. Na odwrót, w hypermetropii miarą stopnia wady będzie najsilniejsze szkło wypukłe, dające najlepszą bystrość wzroku. Hypermetropia istnieć może jednak i tam, gdzie bystrość wzroku w dal okazuje się prawidłową (t. z. Hp. facultativa), w takim razie miarą Hp. jest najsilniejsze szkło wypukłe, które bystrości wzroku nie pogarsza.

Jeżeli przy prawidłowej bystrości wzroku stwierdzamy zupełną niemożność czytania drobnych druków, wskazuje to na wadę akomodacyi. U osób młodych przed 43 rokiem życia bywa to wynikiem porażenia akomodacyi («mydriatica», przebyta dyfterya, zatrucie toksynami nieświeżych ryb, raków, kiełbas i tp.). U osób starszych jest to wada fizyologiczna: presbyopia. Postęp presbyopii unaocznia poniższa tabliczka (dla emetropów).

W r. 43 — 1 D.

> 50 — 2

> 55 — 3

> 60 — 4

> 65 — 4,5

Wartości te zmniejszają się u krótkowidzów o stopień myopii, u hypermetropów zwiększają się o stopień hypermetropii.



D = 0.5.

Przyroda czaruje nas urokiem barw i zachwycą powabem postaci, a widok jej zjawisk podnosi serce i kości cierpienia duszy. Czysta i zimna woda jest najlepszym napojem, bo nas pokrzepia a zdrowiu nie szkodzi. Sknera jest jako na skale jagody: ludziom nie po nich, jeno wronom gody. Kto daje a wymawia, szpetny ma zwyczaj, lepiej niech nie daje a wypominaniem daru nie zatruwa. Bieda a niedostatek to dwie bardzo odmienne rzeczy. Biedny nie posiada tego, co mu do utrzymania potrzeba: kto niedostatek cierpi, ten wprawdzie z biedy nie umiera, lecz nie posiada wielu rzeczy potrzebnych ale koniecznych.

D = 0.8.

Jednego naprawisz datkiem, drugiego zepsujesz, bacz zatem komu dajesz. Kto godnemu daje, sam zyskuje, ale nikomu nie dawaj bez miary i rozważ, bo szybko ustanieś. Nauka bez cnoty jako miecz, a szalonego i sobie i drugiemu szkodzi. Trudna zgoda z ogniem woda. Lenistwo idzie powoli, niedostatek za nim kroczy, a bieda dogania je szybko. Nawet przyjacielowi nie zwierzaj wszystkiego, lecz gdy to czynisz, wybierz znanego ci nie z mowy ale z czynu.

D = 1.25.

Najgorsza i jedyna prawdziwa niedola, okrom zbrodni, to strata ukochanej osoby. Nadzieja pokrzepia opuszczonego, pociesza go w biedzie i niedoli i chroni od rozpacz. Kto sam kochany i innych kochaniem darzy, ten pewno bogaty jest w wielkie cnoty; wzajemne kochanie bowiem zwykle wielkich zalet jest wynikiem.

$D = 5.$




$D = 10.$



$D = 15.$



$D = 30.$





CHOROBY USZNE.

I. Małżowina uszna.

Othaematoma, (Krwiak ucha) powstaje skutkiem urazu, czasem samoistnie. Z początku zimne okłady, lód, później w lżejszych przypadkach: pendzlowanie jodyną, nacieranie jodwazogenem, mięsienie i opatrunek uciskający. Przy znacznych rozmiarach, silnem napięciu skóry, wielkich bólach, zropieniu: wypróżnienie treści zapomocą trójgrańca albo nacięcia, usunięcie części obumarłych, opatrunek przeciwnilny. Przeciw pozostałemu zniekształceniu i zgrubieniu: codzienne mięsienie.

Erysipelas (róża), **Phlegmone** (ropowica), **Perichondritis** (zapalenie chrząstnej). Z początku leczenie przeciwzapalne, zimne okłady, lód, przyrząd chłodzący Leitera, okłady *Liqu. Burowi*. Przy nagromadzeniu się ropy nacięcie, w razie potrzeby wyskrobanie schorzonej chrząstki, opatrunek przeciwnilny. W gruzliczem zapaleniu chrząstnej *Perichondritis tuberculosa*, stosuje się zawieszinę jodoformu w glicerynie, jak w gruzlicy miejscowej innych części ciała.

Eczema (wyprysk). W wyprysku ostrym, przy silnem napięciu, przekrwieniu i znacznej bolesności skóry: unikanie mycia, albo moczenia chorej części wodą, okłady z *aq. Goulardi*, potem różne posypki lub maści jak:

Rp. Zinc. oxyd.; Amyl. tritic. *āā*. 25'0; Acid. salicyl. 1'0; Vaselin albi 50'0. *Mf.* ung. S. Maść.

Rp. Ung. diachyl. Hebrae; Acid. boric. *āā*. 10'0; Vaselin 20'0. *Mf.* ung. S. Maść.

Rp. Acid. tannic.; Glycerin *āā* 4'00; Ungt. rosat. 30'0; Acid. carbol. 0'30. *Mf.* ung. S. Maść.

Rp. Creolin 2'0; Waselin 100'0. *Mf.* ung. S. Maść.

Rp. Ichtyol 1'0; Lanolin 10'0. *Mf.* ung. S. Maść.

Przyschnięte strupy należy pierwiej zmiękczyć i usunąć zapomocą letniej oliwy albo okładów z 20% rozczy-
nu kw. borowego, lub też *Liquor alumin. acet.*

Miejsca czerwone, starte i pozbawione przyskórka nasmarować grubo maścią i pokrywać grubą warstwą waty. Opatrunek ten należy zmieniać w początku codzień, później co 2—3 dni. Miejsca owrzdodziłe i rozpadliny przyżęga się 3—5% azotanem srebowym, lub też stosuje się:

Rp. Chrysarobini 5'o; Lanolini 20'o. Mf. ung. S. Maść.

W wyprysku suchym, swędzącym i łuszczącym się używa się obok maści jeszcze przetworów dziegciowych lub siarczaných jak:

Rp. Zinc. oxyd.; Amyl. tritic. $\bar{a}\bar{a}$. 12'o; Acid. salicyl. 0'50; Vaseline alb. 25'o; Sulfur. prp.; Ol. rusci $\bar{a}\bar{a}$. 5'o. Mf. ung. S. Maść.

Rp. Pic. liquid. 4'o; Spirit. vin. 6'o., albo:

Rp. Ol. cadin 2'o; Glycerin 30'o., albo:

Rp. Ol. fagi 10'o; Glycerin 5'o; Ung. emoll. 40'o. Mf. ung. S. Maść.

Rp. Tct. rusci 10'o. S. Do nacierania.

Obok środków miejscowych często wskazane jest leczenie ogólne skrzepiające: żelazo, tran, Sol. Fowleri, leczenie dyetyczne i t. d.

Herpes auriculae (opryszczki). Posypywanie proszkiem albo smarowanie maścią borową.

Combustio (oparzenie). Przeciw zacerwienieniu, obrzmieniu i bolesności zasypywać pudrem.

Rp. Aq. calcis; Ol. oliv. $\bar{a}\bar{a}$. pp. aequal. DS. Do okładów. Opatrunek 3% maścią borową, jodoformową, aristolową 20% rozczy-nem octanu glinowego.

Większe pęcherze otworzyć nożyczkami, potem opatrunek wyżej podany. Ziarniny przyżęgać azotanem srebowym.

Congelatio (odmrożenie). Z początku nacierania śniegiem, potem zimne okłady, okłady lodowe, przyrząd Leitera. Okłady z wody Goularda i nastoju makowca. (10'o : 200'o). W późniejszym okresie obmywanie i nacieranie dwa razy dziennie gorącą wodą, smarowanie kleiną jodoformową, traumatycyną, pendzlowanie maścią:

Rp. Camphor ras. 0'20; Cerae alb. 10'o; Ol. lini 15'o. MDS. Kilka razy dziennie napendzlować, (działa korzystnie szczególnie na przykry świąd skóry). albo:

Rp. Ungt. plumb.; Vaseline flavi $\bar{a}\bar{a}$ 40'o; Ol. olivar. 20'o; M. c. acid. phenylic. 2'o; adde ol. lavandul. gtts. XXX. f. ung. S. Maść, smarować grubo na szmacie i przez noc zakładać.

Owrzdodzenie leczyć należy według ogólnych zasad

chirurgicznych. odmroziny (perniones) najlepiej popędzować nastojem jodu.

II. Przewód słuchowy zewnętrzny.

Otitis externa circumscripta et diffusa. Zapalenie przewodu słuch. zewn. ograniczone i rozlane. Obrzmienie, zwężenie przewodu i znaczna bolesność na ograniczonym miejscu lub na większym obszarze. Bóle szczególne przy leżeniu na uchu chorem, dotknięciu, ucisku lub pociągnięciu małżowiny lub skrawka, przy ruchach żuchwy podczas jedzenia. Słuch w różnym stopniu upośledzony, zależnie od obrzmienia i zwężenia przewodu. W okresie ostrym także gorączka, ból głowy i zębów, bezsenność. Częstą przyczyną cierpienia jest uszkodzenie wskutek dłubania w uchu palcem lub różnymi przedmiotami, różne drażniące środki partackie, (t. zw. krople uszne (nafta), drażniące ciała obce, zakażenie przez wydzielinę z ucha środkowego, nieczyste narzędzia i t. p. Następnie przyczyną częstych czyraków przewodu może być moczówka cukrowa i skłonność indywidualna. Leczenie: z początku środki przeciwzapalne i kojące, pijawki przed skrawkiem, zimne wysychające, lub ciepłe okłady naokoło ucha, nacieranie naokoło:

Rp. Chloroformi; Ol. hyoscyami c. *āā*. pp. aequal.

S. Do nacierania na około ucha.

Wkraplanie do ucha ciepłych środków kojących, jak:

Rp. Dct. semin papav. 1'0—10'0; Tct. laudani simpl. 0'5—1'0. MDS. Ogrzać i parę razy dziennie wkraplać do ucha, pozostawiając tam parę minut.

Rp. Morphii muriat 0'20; Aq. lauroceras 20'0. MDS. Wkraplać do ucha 10 kropel letnich parę razy dziennie.

Rp. Cocain mur. 1'5—2'5; Aq. destil.; Glicerini *āā*. 10'0. MDS. Jak wyżej.

Rp. Amygdal. amar. quarum quaelibet, contineat; Muriat. morph. (albo Cocain mur.); Extr. opii aq. *āā*. 0'01. D. t. d. Nr. X. S. Czopki do ucha.

albo:

Rp. Menthol 4'0; Ol. olivar. 20'0. MDS. Tamponiki z waty maczać w tym płynie ogrzanym i tak do ucha wkładać, żeby wywierać lekki ucisk na ściany przewodu albo podłużny zwitek waty, umoczonej w 10% roztworze azotanu srebra lub w ciepłym płynie Burowa wkładać do ucha, częste okłady z tegoż płynu na uchu. Mięsenie miejsca dotkniętego zapaleniem jego sąsiedztwa zapomocą zgłębnika, owiniętego na jednym końcu watą natłuszczoną, lub zapomocą palca, wsuwanie kawałeczka natłuszczonego drenu, (co dobę coraz grub-

szego) do przewodu tak, aby wywierał na ściany lekki ucisk 24 godzin, może chorobę w początku przerwać.

Rp. Spirit. vin. rectificat. 10'0; Morph. mur. 0'1 albo cocain. muriat. 0'2—0'4.

Rp. Acid. carbol. 0'5—1'0; Glycerini 10'0 z dodatkiem morph. 0'1 albo cocain. 0'20—0'4.

Rp. Anaesthesini; Acid. carbol. $\bar{a}\bar{a}$. 0'5; Menthol 0'05; Spirit. vin.; Glycerin $\bar{a}\bar{a}$. 5'00. MDS. Watę umoczoną w tym płynie ogrzanym co 4 godzin wkładać do ucha.

Rp. Sublimati 0'02; Alcohol abs. ad 20'0. MDS. Trzy razy dnia wkraplać do ucha 10 kropel na 10 minut.

Przy dłuższem trwaniu, znacznem obrzmieniu, wielkich bólach, albo wytwarzaniu się ropy: głębokie nacięcie miejsca naciekłego albo zropiałego, z wyciśnięciem ropy albo czopka nekrotycznego, potem wkładanie zwitka waty umoczonej w glicerynie karbolowej 5—10⁰/₀, albo paska gazy jodoformowej, umoczonej w rozcieńczonym octanie glinowym, albo 1⁰/₀ roztworze azotanu srebra, unikać wystrzykiwań ucha. Dla zapobieżenia nawrotom zaleca się pendzlowanie ścian przewodu 1—2 razy dziennie roztworem 0'5—1⁰/₀ azotanu srebra, lub:

Rp. Merc. subl. corros 0'01—0'02; Aq. dest. 10'0. MD. Zewnętrznie.

Rp. Acid. borici. 4'0; Alcohol abs. ad. 20'0. S. Zewnętrznie.

Później przez 4 tygodnie, co drugi dzień po 10 kropel do ucha wkraplać.

W przewlekłym rozlanem zapaleniu przewodu z wydzieliną: przepłókiwanie ucha letnim roztworem przeciwnilnym jak: 3⁰/₀ roztworem kw. borowego, albo 0'1⁰/₀ roztworu sublimatu i wdmuchiwanie dobrze sproszkowanego kw. borowego, wkraplanie lub pendzlowanie ścian przewodu 5⁰/₀ roztworem azotanu srebrowego albo wkraplanie:

Rp. Acid. borici 0'50; Spirit. vin. 10'0. MD. Kropie do ucha, albo kąpiele uszne z 1⁰/₀ roztworu azotanu srebra.

Ziarniny należy przyżęgać azotanem srebrowym, albo kw. chromowym.

Na swędzenie pozostające nieraz po tej chorobie, używać maści z *Hydr. pp. alb.* Przy uporczywych nawrotach stosować kąpiele uszne:

Rp. Kali sulfurati 0'50; Aq. dest. 50'0. ND. Na kąpiele uszne, przez cztery tygodnie używać.

Przy zapaleniu błoniczem albo włóknikowym przewodu (*otitis ext. diphtheritica aut. crouposa*):

Rp. Aq. calcis 50'0.

S. Co godzina napełniać przewód uszny (kąpiele uszne) tym płynem, wdmuchiwanie jodoformu, albo dobrze sproszkowanego kw. borowego z kw. salicylowym (w równych częściach), albo kalium vel zinc. sozodolite, z talc. venet. 1:10. pendzlowanie schorzonego miejsca 10% roztworem azotanu srebrowego, wkraplanie roztworu:

Rp. Acid. salicyl. 10; Spirit. vin. rectificati 100.
MDS. Krople do ucha, albo gliceryny karbolowej 5—10%, a w danym razie wstrzyknięcie podskórne surowicy przeciwbłoniczej.

Otomycosis. otit. ext. parasitica. (Grzybica uszna). Obok objawów przewlekłego zapalenia przewodu zewnętrznego wydzielają się z ucha od czasu do czasu błonki białawe, albo brunatne w kształcie palca od rękawiczki. Silny świąd w uchu. Usunięcie błonek za pomocą zgłębnika, szczypcyków, albo strzykawki, przepłókanie ucha roztworami przeciwnilnymi (sublimat 1:5000), kąpiele uszne z 0.6% nadmanganianu potasowego, zresztą leczenie, jak przy *otit. ext. chronica*. Dla zapobieżenia nawrotom wkraplanie roztworów wyskokowych, przez kilka tygodni..

Pityriasis versicolor. (Łupież pstry). **Psoriasis.** (Łuszczyca przewodu słuch. zewn.)

Rp. Ol. cadini; Spirit. vin. āā. pp. aequal. **MDS.** Do pendzlowania ścian przewodu ucha zewnętrzn.

Eczema. (wyprysk) przewodu słuch. zewn. Leczenie, jak przy wyprysku małżowiny usznej.

Cerumen. (Woskowiny). Silne przestrzyknięcie najstosowniej 1/2% roztworem lysolu. Jeżeli to zostaje bez skutku:

Rp. Natr. bicarb. 0.50; Aq. dest.; Glycerin āā 50.

MDS. Trzy razy dnia po 10 kropel letnich wpuszczać do ucha na 10 minut, potem przestrzykiwanie powtórzyć, w razie potrzeby i oddzielenie czopka woskowiny od ścian przewodu zgłębnikiem lub łyżeczką uszną i potem przestrzykiwanie, letnim roztworem mydła albo lysolu. Dla zapobieżenia nawrotom wkraplać przez 4 tygodnie borglicerinę.

Rp. Acid. boric. 15; Aq. destil.; Glycerin. āā. 200. **MDS.** Trzy razy dnia 10 kropel letnich do ucha wkraplać.

Corpus alienum. (Obce ciało) w uchu zewnętrznem. Przedewszystkiem, co jest bardzo ważne, przekonać się osobiście, że obce ciało rzeczywiście znajduje się w uchu, zbadać jego własności, zbitość, wielkość, położenie, unikać wszelkich narządzi, zastosować zaś silne przestrzykiwanie. Takowe jest bezskuteczne i bezcelowe, jeżeli woda wstrzyknięta upływa, wobec przedziurawienia błony bęb. przez trąbkę do gardła. Gdzie przewód już ścieśniony wskutek na-

stępowego zapalenia, wtedy naprzód je wyleczyć, a potem dopiero przystąpić do wydobywania ciała obcego. Tylko wtedy, jeżeli grozi niebezpieczeństwo, jeżeli wystąpią silne bóle ucha i głowy, nudności, zrywania na wymioty, gorączka, tarcza zastoinowa albo zatrzymanie wydzieliny w uchu środkowem, można próbować przy dobrym oświetleniu i pod kontrolą wzroku wydobyć ciało obce ostrożnie, za pomocą narzędzi, zgłębników, łyżeczek usznych, lub haczyków tępych. Gdzie to się nie udaje, a wydobywanie ciała obcego wobec groźnych objawów konieczne jest wskazanem, należy przystąpić w uśpieniu, do zabiegu operacyjnego, polegającego na oddzieleniu małżowiny i chrzęstnej części tylnej ściany przewodu, lub na oddłutowaniu kostnej części tylnej ściany dla ułatwienia przystępu do ciała obcego. Gdzie zaś groźnych objawów niema, a przestrzykiwanie nie pomogło, tam lepiej zostawić obce ciało w uchu, zachować się wyczekująco i po jakimś czasie znowu próbować wydalania za pomocą przestrzykiwania, bo obce ciało może bardzo długo pozostać w uchu, bez najmniejszej szkody dla zdrowia, podczas gdy nieostrożne próby wydobywania za pomocą narzędzi mogą spowodować bardzo znaczne szkody dla zdrowia, a nawet niebezpieczeństwo dla życia. Szczególnie u dzieci nie wolno używać żadnych narzędzi, chyba w uśpieniu. Żyjące owady nie dające się z ucha usunąć wystrzykiwaniami, należy naprzód zabić przez wlewanie do ucha letniej oliwy, olejku terpentynowego albo spirytusu.

Obce ciało w uchu środkowem można próbować poruszyć z miejsca zapomocą zabiegu Politzera albo przestrzykując jamę bębenkową przez trąbkę Eustachiusza. Jeżeli próby są bezskuteczne, należy przystąpić do wydobywania operacyjnego.

Pruritus meati externi. (Świąd). Smarowanie ścian przewodu maścią..

Rp. Menthol 1:0; Vaselini 20:0. S. Maść.

Albo borolanolina, lub też wypendzlowanie 4—10% rozczyntem azotanu srebrowego albo:

Rp. Sol. aquosa acid. picrin. cont. 10:0. DS. Nacierać w uchu zewnętrznem.

Rp. Epicarini 0:5; Aether 1:0; Alcohol abs. 40:0. DS. Do nacierania.

Strictura i Stenosis. (Ścieśnienie) przewodu usznego może być wrodzone albo nabyte przez ściągnięcie się błizny po zapaleniu, przez wyrośnię kostne, przez zwiócenie ścian błoniastych u starych lub przez ucisk z sąsiedztwa. Rozszerzyć albo na tępo za pomocą stożków z blaszkowiny, rurek kauczukowych (drenów), ołowianych, albo przez przecięcie, lub wycięcie ściągających

się blizn i następowe rozszerzenie, lub oddłutowanie kostnych.

Atresia. (Zarośnięcie) przewodu może również być wrodzone lub nabyte. Tylko tam gdzie światło przewodu zamyka błona w postaci przepony, można próbować przez jej przecięcie i następowe rozszerzenie, przywrócić drożność przewodu.

III. Błona bębenkowa.

Myringitis acuta. (Ostrze zapalenie błony bębnekowej). Silne kłójące bóle w uchu, powiększające się przy dotknięciu, jedzeniu, ziewaniu, szum w uszach, ból głowy, słuch dość dobry. Błona bębenkowa czerwona, silnie nastrzykana, obrzękła, czasem pokryta białymi punkcikami łuszczącego się naskórka, nieraz na niej wynaczynienia albo pęcherzyki, młotek niewidzialny. Leczenie przeciwzapalne: pijawki, zimne okłady, pen-dzlowanie jodyną w okolicy ucha. Środki przeczyszczające. Zatkanie przewodu usznego watą. Przy silnych bólach, krople kojące, jak przy *otitis ext.* Ropnie na błonie bębenkowej należy naciąć i wypróżnić.

Myringitis chronica. leczenie jak w *otit. ext. chronica.*

Ruptura. (Pęknięcie) błony bębnekowej skutkiem urazu zrasta się zwykle w krótkim czasie samoistnie i nie wymaga żadnego szczególnego leczenia prócz noszenia w uchu przez jakiś czas tamponika z waty, lub gazy jodoformowej, lub wyjałowionej, dla uchronienia ucha od szkodliwych wpływów zewnętrznych. Jeżeli zaś rana ulega zakażeniu, wtedy rozwija się ropne zapalenie ucha środkowego.

IV. Jama bębenkowa, ucho środkowe.

Otitis media acuta. (Ostre zapalenie ucha środkowego). Bóle i uczucie pełności w uchu, bóle głowy, czasem, szczególnie u dzieci gorączka, upośledzenie słuchu różnego stopnia. Błona bębenkowa w różnym stopniu wypukła i nastrzykana czasem prześwieca wypocina w jamie bębnekowej. Z początku leczenie przeciwzapalne: pijawki i zimne okłady na wyrostek sutkowy, środki odwodzące, krople kojące bóle.

Rp. Phenolsalyl 1:0; Glycerin 10:0; Cocain. mur.

0'2—0'50. MDS. Watę umoczoną w tym płynie co 3—4 godziny wkładać do ucha.

Jeżeli chory zimnych i lodowych okładów nie znosi wtedy okłady rozgrzewające albo gorące z liqu. Burowi z ceratą. Środki przeczyszczające, spokój, unikanie na-

pojów gorących i wysokowych. Równocześnie leczenie chorób przyczynowych nosa i gardła. Wobec silnych bólów, bezsenności:

Rp. Phenacetini 0·50; Antifebrini 0·25. Mfp. D. tal. dos. quinque. S. Dwa proszki dziennie, albo Aspirini 0·5, parę razy dziennie.

Przez wlewanie 10—20% karbolgliceryny można czasem zapalenie w samym początku przerwać. Po ustąpieniu okresu ostrego i bolesności, przedmuchiwanie sposobem Politzera, albo za pomocą cewnika trąbkowego. Jeżeli zaś gorączka i bóle nie ustają, w jamie bębnekowej zbiera się coraz więcej wypociny, wypuklając błonę bębnekową i przeświecając przez nią, wykonać przecięcie błony bębnekowej, w dolnym tylnym jej odcinku albo w miejscu największego wypuklenia. Zaraz potem unikać przestrzykiwania i przedmuchiwania, lecz wprowadzać głęboko aż po błonę wązki pasek gazy jodoformowej (jako sączonek) a na niej zwitek waty wyjałowionej, które zmienia się w miarę wypływu i potrzeby po każdym przemoknięciu. Po kilku dniach po ustąpieniu bolesności i ostrych objawów zapalnych przestrzykiwanie w miarę potrzeby letnimi rozcżynami przeciwnie, lub ściągającymi i przedmuchiwanie sposobem Politzera dla lepszego wypróżnienia i oczyszczenia jamy bębnekowej, lub też ostrożne wdmuchiwanie dobrze sproszkowanego kwasu borowego. Po pęknięciu albo przecięciu błony bębnekowej, utrzymujące się dalej bóle ucha i głowy mogą być skutkiem zbyt małego otworu i wymagać kilkakrotnego nieraz powtórzenia przecięcia błony bębnekowej, lub rozszerzenia istniejącego już otworu. Po ustaniu ropienia należy jeszcze przez jakiś czas wykonywać przedmuchiwanie 2—3 razy na tydzień.

Otitis media suppurativa chronica. (Przewlekłe ropienie ucha środkowego). Dość często ostre zapalenie ucha środkowego przechodzi w stan przewlekły. Leczenie: częste przestrzykiwania 3% rozczynek kwasu borowego, albo 0·5% formaliną. W uporczywym ropieniu przepłókiwać ucho środkowe przez trąbkę za pomocą cewnika letnim fizyologicznym rozczynek soli kuchennej albo 0·5% rozczynek kwasu borowego, wdmuchiwanie proszku kwasu borowego, xeroformu, protargolu, aristolu, 1—3 razy dnia zależnie od obfitości wypływu.

Rp. Zinc. sulfur. 0·30; Aq. dest. 30·0. MDS. Trzy razy dnia 10 kropel letnich do ucha wpuszczać na 10 minut.

Rp. Plumb. acet. 0·30; Aq. destil. 30·0. MDS. Jak wyżej.

Przy wydzielinie cuchnącej używa się przestrzykiwania 3—4% kwasem karbolowym, słabym rozczynek kreoliny, lysolu, kreosolu, nadmanganianu potasowego

albo sublimatem 1:1000. Dla lepszego wypróżnienia jamy bębenkowej częste przedmuchiwanie sposobem Politzera, albo cewnikiem trąbkowym, lub też aspiracya powietrza w przewodzie ucha zewnętrznego lejkiem Siegla, częste przestrzykiwania przez trąbkę Eust. itp. Przy rozpulchnieniu błony śluzowej jamy bębenkowej wpuszcza się przy dokładnem poprzedniem oczyszczaniu, parę kropel 10% roztworu azotanu srebrowego na 1—2 minuty do ucha, potem przestrzykuje się roztworem soli kuchennej. Dla lepszego oczyszczenia i rozpuszczenia wydzieliny wkraplać:

Rp. Perhydrol Mercka (3%) 10.0., albo z dodatkiem Thigenolu 1.0. DS. 10 kropel letnich 2—3 razy dziennie wpuszczać do ucha na 10 minut.

Wobec ziarnin w jamie bębenkowej:

Rp. Spirit. vini rectificati 10.0; Acid. boric. 1.0. albo:

Rp. Perhydrol Mercka (60%); Spirit. vini rectificati aa. 10.0. MS. Jak wyżej.

Lub przyżeganie z *ferr. sesquichlorat*, *acid. chrom.*, *acid. trichloracet.*, lub w końcu wyskrobanie za pomocą łyżeczki ostrej. Przy ropnem zapaleniu gruźliczem wdmuchuje się jodoform lub wkrapla się 10% zawiesinę jodoformu w glicerynie. Wobec ropienia albo tworzenia się żółciołojaka (*cholesteatoma*) w górnym uchyłku nadbębenkowym jamy bębenkowej, (*recessus epitympanicus*) należy uchyłek ten przestrzykiwać za pomocą krzywych cewników, tak zwanych kaniuli bębenkowych wodą utlenioną, albo parafiną płynną (*parafin liquid.*) lub też mentholvasogonem. Wytamponowanie jamy bębenkowej względnie górnego jej uchyłku gazą namoczoną 10% formaliną. Gdy wydzielina zaczyna się zmniejszać, należy zaniechać dalszego przestrzykiwania, a tylko obsuszać jamę bębenkową suchym tamponikiem z waty.

Ukłeje uszne należy usunąć za pomocą pętli zimnej, szczypczyków uklejowych, nożyka pierścieniowatego Politzera, potem wkraplać krople spirytusowe, albo przyżegnać kwasami żrącymi.

Wobec *próchnicy* kostek słuchowych i ścian jamy bębenkowej, w uporczywym ropieniu w uchyłku nadbębenkowym, w jamie sutkowej i w przypadkach *żółciołojaków* wszystkie te zabiegi mogą pozostać bez skutku. Wtedy wskazane są różne zabiegi operacyjne, jak wyskrobanie jamy bębenkowej, wycięcie kostek słuchowych, odsłonięcie pobocznych jam ucha środkowego, jak uchyłku nadbębenkowego, wejście do jamy sutkowej, lub też wydłutowanie wyrostka sutkowego i kostnej tylnej ściany przewodu usznego.

Otit. media catarrhalis serosa et sicca, Sclerosis cavi tympani. (Zapalenie nieżytowe, przewlekłe ucha środkowego). Upośledzenie słuchu różnego stopnia, szum

w uchu, często zawrót głowy, objawy Ménière'a. Błona bębenkowa albo mało zmieniona (*sclerosis*) albo zgrubiała, zaciągnięta, zmętniała, stożek świetlny nieprawidłowy, nieprawidłowe blaski, tu i ówdzie na błonie bębenkowej miejsca zanikłe, albo złogi wapienne, czasem błona bębenkowa mleczno-biała, krótki wyrostek młotka i tylny fałd mocno wysterczający. Obok leczenia przewlekłego nieżyty nosa i gardła wdmuchiwanie powietrza do ucha środkowego parę razy na tydzień, czasem stózkowanie i mięsienie trąbki za pomocą zgłębników z celuloidyny albo wpuszczanie do trąbki parę kropel adrenaliny z kokainą (20/0). Gdzie jest w jamie bębenkowej wydzielina, która po tem leczeniu nie ustępuje należy ją wydalić przez przecięcie błony bębenkowej. W sprawach nieżytowych suchych należy także próbować wdmuchiwania do ucha środkowego przez trąbkę pary terpentynowej, lub salmiakowej albo::

Rp. Aether. sulfur.; Ligu. hollandici $\bar{a}\bar{a}$. 5'0. DS.
Parę wpuszczając do ucha środkowego albo wstrzyknięcie do jamy bębenkowej kilku kropel jednego z następujących rozczyńów.

Rp. Natr. caust. 0'03—0'1; Aqu. destil. 20'0. MDS.
Kilka kropel wpuszczając do ucha środkowego za pomocą cewnika, albo:

Rp. Natr. bicarbon.; Glycerin. $\bar{a}\bar{a}$. 2'0; Aqu. destill. 10'0. MS. Jak wyżej.

Rp. Kali jodat. 0'50; Aqu. destil. 15'0. MS. Jak wyżej.

Po każdym wstrzyknięciu należy parę razy wpędzić powietrze do ucha, żeby płyn wstrzyknięty w jamie bębenkowej lepiej rozdzielić. W tak zwanej sklerozie ucha środkowego działa stosunkowo najlepiej mięsienie błony bębenkowej i kostek słuchowych za pomocą zgłębnika uciskowego Lucae'go, masseura Delstauche'go i t. p. narzędzi, albo przez rozrzedzanie powietrza w przewodzie ucha zewnętrznym.

Residua otitidis mediae. (Pozostałości po ropnem albo nieżytowem zapaleniu ucha środkowego). Choroby te zostawiają często po sobie różne zmiany jak: zrosty tworów jamy bębenkowej między sobą, błony bębenkowej, kostek słuchowych, ścian jamy bębenkowej, wskutek tego unieruchomienie kostek i błony bębenkowej, powiększenie napięcia śródbłędniowego i w następstwie zawroty głowy, osłabienie słuchu i nieznośny szum w uszach. Wymagają one czasem różnych zabiegów operacyjnych jak przecięcia tylnego fałdu błony bębenkowej, stawów między kostkami, między nimi a ścianą błędnikową, ścięgnię naprężacza błony bębenkowej, wycięcia błony bębenkowej, albo kostek usznych i t. d.

Jeżeli pozostało przedziurawienie błony bębenkowej bez wydzieliny (>suche przedziurawienie<) można osią-

gnąć poprawę słuchu i usunąć szum w uchu, przez używanie tak zwanych bębenków (Tyonbee), albo wkładanie zwitka waty, umoczonej w glicerynie. Zarośnięcie przedziurawienia można sprowadzić przez częste nacieranie brzegów otworu 30–80% roztworem kwasu trójchlorooctowego. Niekiedy jednak już samoistne zabliznienie się otworu w błonie bębenkowej sprowadza pogorszenie słuchu i silny szum w uchu, tak że wówczas trzeba wytworzyć i utrzymywać sztuczny otwór w tej błonie najlepiej za pomocą galwanokaustyki.

We wszystkich chorobach ucha środkowego należy zwracać uwagę na stan ogólny ustroju, na choroby tak zwane konstytucjonalne, jak zółty, gruźlica, niedokrwistość, gościec, kiła i t. p., i na stany chorobowe nosa, gardła i trąbki Eustachiusza i leczyć je odpowiednio, a przede wszystkim usunąć powiększone migdałki i wyrośnięte gruczołowe w jamie nosogardłowej.

V. Trąbka uszna Eustachiusza.

Salpingitis acuta. (Ostre zapalenie trąbki). Uczucie pełności w uchu, przykre odczuwanie własnego głosu, (*Autophonia*) trzeszczenie, szum i bóle w uchu szczególnie przy żuciu, ziewaniu, połykaniu, zmienne przytępienie słuchu, błona bębenkowa prawidłowa, albo mało tylko zmieniona, zaciągnięta. Z początku w leczeniu należy przede wszystkim uwzględnić istniejące równocześnie prawie zawsze schorzenia błony śluzowej nosa i gardła. Po przejściu okresu ostrego, wpędzanie powietrza do trąbki cewnikiem lub sposobem Politzera, lub też wstrzykiwanie do trąbki kilku kropel 10% roztworu *natri bicarbonici*. Próbować wpuszczania do trąbki kilku kropel adrenaliny.

Salpingitis chronica. (Przewlekły nieżyt trąbki) prawie zawsze połączony jest z przewlekłym nieżytem ucha środkowego. Upośledzenie słuchu znacznieszego stopnia, równocześnie zmiany na błonie bębenkowej, przy osłuchiowaniu chropowate trzeszczenie w trąbce. Częste wpędzanie powietrza, wstrzykiwania do trąbki kilku kropel roztworu alkalicznego lub ściągającego jak:

Rp. Natr. biborab.; Natr. chlorat. *aa.* 0.25–0.50;
Aqu. destil. 100.0. MDS. Kilka kropel do trąbki wstrzykiwać.

Rp. Argent. nitr. 0.15; Aq. destil. 100.0. MDS.
Jak wyżej.

Później można przejść do coraz silniejszych roztworów, wpuszczanie cewnikiem do trąbki par terpentynowych, mentyłowych, kilku kropel adrenaliny, miśsienia palcem bocznej części szyi albo ujścia gardłowego

trąbki, lub też mięsienia warg trąbki, za pomocą zgłębnika, owiniętego na końcu watą umoczoną w 10% roztworze jodu w glicerynie. Równocześnie leczenie nosa i gardła. W przypadkach ścieśnienia trąbki, rozszerzenia jej i mięsienie błony śluzowej za pomocą zgłębników z fiszbinu, gutaperki, struny jelitowej, celuloidyny.

Niedowład lub niesprawność mięśni trąbkowych. Powietrze wpada szerokim prądem przez cewnik do trąbki, najgrubszy zgłębnik łatwo przechodzi przez jej światło, a jednak nie udaje się wtłoczyć powietrza sposobem Politzera, lub Valsalvy. Leczenia polega na elektryzowaniu. Jedną elektrodę wprowadza się wprost do trąbki, drugą przykładą się do bocznej ściany szyi.

VI. Wyrostek sutkowy.

Zapalenie wyrostka sutkowego, występuje prawie wyłącznie dołączając się do ropnego zapalenia ucha środkowego. Zaczernwienie, obrzmienie, nacieczenie skóry na mniejszej lub większej przestrzeni, bolesność przy ucisku, częste obrzmienie sąsiednich gruczołów chłonnych odstawanie małżowiny, rzadziej gorączka, towarzyszą dość często ostremu ropieniu usznemu. Nie raz przychodzi do ropnia podokostnowego (chełbotanie) albo do ropienia opadowego na bocznej części szyi. (*Caput obstipum*). Leczenie przeciwzapalne: pijawki, zimne okłady, przyrząd Leitera, smarowanie jodwasogem, nastojem jodowym, maścią rtęciową, Ungt. Credé, w danym razie otwarcie ropnia podokostnowego. Jeżeli objawy nie ustępują, a dołącza się zwięźlenie światła przewodu usznego, opadnięcie czyli wypuklenie górnej tylnej jego ściany, zajęcie i ból głowy połowiczy, albo jeżeli wyrostek uległ przedziurawieniu na zewnętrznej czy na przedniej swej ścianie ku przewodowi usznemu, wtedy należy za pomocą dłuta otworzyć jamę sutkową (*anthrotomia*). Gdzie równocześnie istnieje przewlekłe ropienie lub próchnica ucha środkowego, poleca się zarazem usunąć tylną górną ścianę przewodu słuchowego zewnętrznego i zewnętrzną ścianę jamy bębenkowej oraz kostki słuchowe, to jest wykonać operację tak zwaną doszczętną. (*Anthroatticotomy*). Tosamo należy wykonać, jeżeli w przebiegu ropienia usznego przewlekłego, czy ostrego występują groźne objawy zatrzymania ropy, zakażenia krwi, lub powikłania śródczaszkowego, jak wysoka gorączka, gorączka ropnicza, nieregularne tętno, ból głowy, ospałość, nudności, wymioty, zawrót głowy, zajęcie umysłu, zaburzenia czuciowe, ruchowe, mowy, tarcza zastoinowa, porażenie n. twarzowego i t. d.

VII. Błędnik, czyli ucho wewnętrzne.

Przyczynami chorób ucha wewnętrznego są: choroby zakaźne (płonica, grypa, dur, kiła, zapalenie opon mózgowych i gruczołów przyusznych), uwiad rdzenia, uraz, wstrząśnienie, zadziałanie wysokich tonów (detonacya), błednica, zaburzeuia krążenia, (niedokrewność, przekrwienie, wybroczyny), zatrucie chininą, salicylem, wyskokiem, nikotyną i t. d., przeniesienie się choroby z ucha środkowego na ucho wewnętrzne: **Objawy:** zawrót głowy, szum w uszach, przytępienie słuchu wysokiego stopnia. Zegarka i strójnika nie słyszy chory z kości czaszki, albo słyszy gorzej po chorej stronie niż po zdrowej, wysokie tony słyszy gorzej, niż nizkie, słyszenie fałszywe (*Paracusis*), słyszenie podwójne (*Dip-lacusis*), wypadnięcie kilku tonów z pola słuchowego. W ostrym zapaleniu błędnika obok wymienionych objawów: gorączka, ból głowy, nudności, wymioty, nieraz także sztywność karku. (*Meningitis cerebrospinalis abortiva* — *Voltolini*). Rokowanie niepomyślne: **Leczenie** w okresie ostrym podobne, jak w zapaleniu opon mózgowych. Bezwzględny spokój, okłady lodowe na głowę, miejscowy upust krwi, nacieranie maścią szarą, albo nalewką jodową, środki odwodzące, pryszczydła na kark, kończyny i łydki. **Wewnątrznie:** środki przeczyszczające i jodek potasu. Ważnem jest unikanie wszelkich wrażeń zmysłowych, jak jaskrawego światła i szczególnie silnych wrażeń słuchowych, wstrząśnień umysłowych itd. W okresie przewlekłym leczenie jest: 1) **przyczynowe:** celem usunięcia niedokrewności, błednicy, kiły, chorób ucha środkowego i t. p. 2) **objawowe** na: a) niedosłyszenie, b) szum, c) zawrót głowy.

a) **niedosłyszenie**, rozrzedzanie powietrza w przewodzie usznym zewnętrznym, zgęszczanie powietrza w uchu środkowym, przetwory jodowe, bromowe, wstrzykiwania podskórne:

Rp. Strychnini 0·07; Aqu. dest. 10·0. Do wstrzykiwań.

Rp. Pilocarpini. mur. 0·20; Aqu. dest. 10·0. Jak wyżej.

Kilka krople na wewnątrz, do wstrzyknięcia do ucha środkowego, albo podskórnego, elektryzowanie, nareszcie ćwiczenia słuchowe sposobem Urbantschitscha, a gdy nie można osiągnąć poprawy słuchu tymi sposobami, to rurki słuchowe i różne słuchawki.

b) **Na szum w uszach:** wdmuchiwanie do jamy bębenkowej par chloroformu z eterem, eteru z *liqu. hollandic.*, wstrzykiwanie podskórne strychniny, wstrzykiwanie do jamy bębenkowej pilocarpiny (20/0), waseliny, kokainy, wodanu chloralu, pryszczydła za uszami, mię-

sienie i nacierania wyrostka sutkowego wyskokiem, jodyną, jodwasogenem, wkładanie do przewodu usznego waty umoczonej w:

Rp. Ol. hyoscyami; Chloroform; Tct. opii āā. pp. aequal. MS. Zwitek waty umoczyć i włożyć do ucha.

Rp. Camphor. rasae 0·20; Ol. olivar. 20·0. MS. Jak wyżej.

Rp. Aether sulfur 2·0—4·0; Glycerini 10·0. MS. Jak wyżej.

Rp. Aether. acet. 2·0—4·0; Tct. valerian. 10·0. MS. Jak wyżej, i t. p. Dalej elektryzowanie.

Wewnętrznie podaje się przetwory jodowe, bromowe:

Rp. Natr. bromat. 10·0; Antipirin. 2·0. Div. in pp. aequal. Nr. X. DS. 2 proszki dziennie.

Rp. Acid. hydrobromic. 20·0. D. 2 razy dziennie po 20 kropel w wodzie ocukrzanej zażywać.

Następnie nastój wilczej jagody, *liqu. arsenic. Fowleri* i azotyn amylowy (*amylnitrit*) do wachania. Wobec szumu tętniącego 6—10 kropel nastoju naparstnicy lub *strophantus* parę razy na dzień, mięsienie kostek słuchowych za pomocą zgłębnika uciskowego Lucae'go, lub innych wspomnianych już sposobów.

c) zawrót głowy: mniej więcej te same środki i zabiegi używane bywają na zawrót głowy pochodzenia błędnikowego i w chorobie Ménière'a, przewlekłe przebiegającej. Oprócz tego polecenia godne są w pewnych rodzajach zawrotu głowy, ćwiczenia gimnastyczne całego ciała metodą Spiry, albo tylko samej głowy metodą Urbantschitscha.

VIII. Morbus Menieri.

Objawy: Nagłe napady 1) wysokiego stopnia niedosłyszenia, 2) zawrotu głowy z nudnościami i wymiotami, czasem z bezprzytomnością, 3) silnego szumu usznego. Przyczyny: Różne choroby uszne, niedokrewność, przekrwienie, wypocina i wybroczyna w błędniku, błędnic, kiła, uraz, telefonowanie podczas burzy, zaziębienie, nadmierne napięcie i wzruszenie umysłowe. Leczenie: jak w chorobach błędnika.

IX. Otalgia (Rwa uszna).

Bóle w uchu przy braku wszelkich odpowiednich zmian przedmiotowych w narządzie słuchowym. Wyszukiwanie i usunięcie przyczyny: zębów próchnicznych, chorób nosa, gardła, krtani, macicy, niedokrewności, błędnic, kiły, ogólnej nerwowości, histeryi. Leczenie: różne *antinervina*, antypiryna, fenacetyna, lactofenina, chinina, jod, lub:

Rp. Pigułki Meglin'a: Zinc. oxydat.; Rad. valerian. $\bar{a}\bar{a}$. 10'0; Extr. hyoscyam. nigr. 1'0; Pulv. et extr. liquir. q. s. f. pill. Nr. centum. D. Co dzień o jedną pigułkę więcej aż do 30, potem znów coraz mniej.

Rp. Ol. terebinth. DS. 15—20 kropel na dawkę w kapsułkach żelatyn., R. i w. po 6 kap. zażywać.

Zewnętrznie: nacieranie wyrostka sutkowego maściami narkotycznymi, nastojem jodowym, elektryzowanie, leczenie zimną wodą i nareszcie mięsienie kostek usznych za pomocą zgłębnika uciskowego Lucaego.

X. Krwawienie z ucha.

Przyczyny: I. krwotoki idiopatyczne, zastępcze u histeryczek i osób nerwowych. II. krwotoki następowe: a) zaburzenia w krążeniu: (choroby serca, krwi, miażdżyca, morbus Brighti, podczas kichania i t. p.), b) choroby uszne, ukleje, ziarniny, nadżarcie naczyń skutkiem próchnicy lub spraw nekrotycznych w uchu, c) uraz, przez ostre ciała obce, narzędzia ostre, pęknięcie błony bębenkowej, podstawy czaszki, zabiegi operacyjne jak: niezręczne usiłowanie wydobywania obcego ciała z ucha, mimowolne uszkodzenie opuszki żyły szyjnej, albo tętnicy szyjnej, przy paracentezie błony bębenkowej, przy silnem rozrzedzeniu powietrza w uchu zewnętrznym i t. p. Leczenie: Nagłe, obfite i groźne krwotoki wymagają ścisłego tamponowania przewodu usznego gazą jodoformową umoczoną w roztworze sześciochloru żelaza, ferropiryny lub wody utlenionej. Jeżeli to nie wystarcza albo krew spływa do gardła przez trąbkę należy przystąpić do podwiązania tętnicy szyjnej. Tampon zostawić kilka dni, potem ostrożnie usunąć.

W łżejszem krwawieniu: ucho oczyścić i szukać przyczyny i pochodzenia krwawienia. Przy małych zranieniach zazwyczaj wystarcza samo przestrzyknięcie i lekki tampon z waty. Przy uszkodzeniu większego naczynia ściślejsze kilkodniowe tamponowanie. Ciało obce, ukleje, ziarniny, martwiny, nowotwory i t. d. usunąć względnie przyżęgać azotanem srebrnym, kwasem chromowym, galwanokauterem. Przy często powtarzających się krwawieniach z powodu zaburzeń w krążeniu, zmian ustrojowych, usposobienia neuropatycznego itp. chory powinien poddać się leczeniu, zawsze nosić tampon z waty w uchu i unikać nawału krwi do głowy, (gorących i wyskokowych napojów, parcia, kichania i t. p.).

Wewnętrznie można w lekkich przypadkach polecać extr. fl. hydrast. canad. samo lub w połączeniu z ergotyną. W krwawieniach zastępczych histerycznych

należy uciec się do wielkich dawek bromu, wstrzykiwań podskórnych pilokarpiny. Miejscowo korzystnie działają wkraplanie zgęszczonego roztworu kwasu borowego i wysokoku, tamponiki zamoczone w wodzie utlenionej (hydrogenium hyperoxydat) albo w 10% roztworze żelatyny. W przypadkach uporczywych próbować wstrzykiwań podskórnych 2% wyjałowionego roztworu żelatyny.

Dr. R. Spira.

X Krwawienie z ucha.



Przyczyny: 1. Krwawienie z ucha może być spowodowane różnymi przyczynami. Najczęściej jest to skutek urazu, który może być spowodowany przez przedmiot ostry, który może być wprowadzony do ucha. W innych przypadkach może być to skutek choroby, takiej jak zapalenie błony śluzowej nosa, które może być spowodowane przez bakterie. W niektórych przypadkach może być to skutek choroby, takiej jak zapalenie błony śluzowej nosa, które może być spowodowane przez bakterie. W niektórych przypadkach może być to skutek choroby, takiej jak zapalenie błony śluzowej nosa, które może być spowodowane przez bakterie.

W leczeniu krwawienia z ucha należy przede wszystkim usunąć przyczynę. Jeśli jest to skutek urazu, należy usunąć przedmiot, który spowodował uraz. Jeśli jest to skutek choroby, należy leczyć chorobę. W niektórych przypadkach może być konieczne zastosowanie leków, które mogą pomóc w zatrzymaniu krwi. W innych przypadkach może być konieczne zastosowanie leków, które mogą pomóc w zatrzymaniu krwi. W niektórych przypadkach może być konieczne zastosowanie leków, które mogą pomóc w zatrzymaniu krwi.



OTRUCIA.

UWAGI OGÓLNE.

W rozpoznaniu podejrzanego otrucia należy zwracać szczególną uwagę na następujące objawy:

Zachowanie się błony śluzowej ust, czy nie jest nadżartą i czy nie okazuje jakiegoś nienormalnego zabarwienia.

Zachowanie się skóry, czy wilgotna czy sucha, żółtaczkowa, czerwona lub pokryta wysypką.

Zachowanie się źrenic, zwięźone czy rozszerzone i jak oddziałują na światło.

Zapach wydechanego powietrza, zapach i wejrzenie wymiocin; tak samo zachowanie się moczu, który ewentualnie należy wypuścić kateterem.

Tętno, przytomność, drgawki, spiączka i t. d.

Należy zwrócić uwagę na otoczenie chorego, jakoś powietrza w pokoju (zaczadzenie), flaszki, słoiki z resztkami trucizn, które dadzą się czasem z łatwością stwierdzić.

UWAGI TERAPEUTYCZNE.

Ponieważ największa wartość ratowania otrutych leży w szybkości działania, należy przeto pamiętać o środkach domowych, które każdej chwili można mieć pod ręką, a mianowicie:

Środki wymiotne: Sól kuchenna, spora łyżka w niewielkiej ilości wody; mąka gorczyczna, łyżeczka do łyżki w wodzie; łechtanie łuków podniebiennych, środki przeczyszczające jakie tylko mogą się znaleźć pod ręką, klyzma.

Analeptica: Czarna kawa, rum, koniak, wino, zimne oblewania, flaszki z gorącą wodą, nacieranie szczotkami, synapizmy, lewatywa z octu, rytmiczne uderzenia dłonią w okolicę serca.

W zatruciu kwasami: mleko, woda białkowa, woda z mydłem, woda wapienna, kreda, lód.

W zatruciu alkaliarni: ocet, mleko, oliwa, lód.

W zatruciu alkaloidami: silny wywar herbaty (zawiera w stosunku do zwykłego naparu znacznie więcej tanniny).

Aconitinum. Tojad. Zawiera akonitynę (najwięcej w korzeniu), najjadowitszą z wszystkich alkaloidów. *Objawy:* pieczenie w ustach, mocno szczypiący smak rzodkwi z następownm znieczuleniem języka, ból piekący wzdłuż przełyku i żołądka. Ślinotok, pragnienie, wymioty. Mrowienie i drętwienie członków, porażenie dolnych kończyn. Uczucie zimna, zimne poty, kolka, rzadko biegunka. Lęk, zawroty i ból głowy, amblyopia i głuchota, źrenice zwykle rozszerzone. Tętno drobne i zwolnione do 40, arytmia. Oddech ciężki powierzchowny. Drgawki. Świadomość często utrzymana. Przebieg czasem bardzo szybki, pół do kilka godzin. Śmierć z porażenia ośrodków oddechowych lub zupełne wyzdrowienie. *Leczenie:* (Środki wymiotne?). Przepłókanie żołądka, sztuczne oddechanie. Nadto acid. tannici 2⁰/₀ co 5 minut łyżkę. Pigułki lodowe. **Dos. letal.** = 0.003.

Acid. carbolic. **Dos. tox.** = 1—10 gr. — **Dos. letal.** 10 gr. Zatrucia wskutek okładów i opatrunków karbolowych dłuższy czas stosowanych objawiają się odurzeniem, nudnością, wymiotami, często mumifikacja członków np. palców pod opatrunkiem karbolowym. Skóra chłodna, lepki pot. Mocz okazuje zabarwienie zielonawe, które na powietrzu brunatnieje. Reakcja chlorkiem baru okazuje zmniejszenie wolnych siarkanów. *Leczenie:* usunąć przyczynę. — Zatrucie ostre po wypiciu silnego rozczyntu lub zgęszczonego karbolu. *Objawy:* piekący ból w ustach, gardle, przełyku i żołądka; zbieżenie błony śluz, wymiociny białe, śluzowe, zdradzają zapach karbolu. Zawroty głowy, szum w uszach, bladeść twarzy, zżewienie źrenic, utrata przytomności, oddech nieregularny, osłabienie tętna, zapad, śpiączka. *Leczenie:* Emetica. Przepłókanie żołądka wodą wapienną. Wewnętrznie: Calcaria saccharata w rozczyntie zgęszczonym. Sól glauberska (do iniekcji podskórnych), mleko, kleiki, excitantia, sztuczne oddechanie. *To samo tyczy się kreozotu, kreoliny, lysolu itp.*

Acid. hydrochloric. — **Dos. letal.** = 10—20 gr. *Objawy* zależne od ilości i zgęszczenia. Skóry nie nadżera, tylko dermatitis. Na błonie śluz. czasem błony podobne do dyfterytycznych. Silne palenie gardła i przełyku, gastroenteritis. Wymiociny żółte, brunatne zwykle z krwią, silnie kwaśne. Zawroty głowy, drgawki, zapad. Śmierć w ciągu doby lub nephritis. *Leczenie:* Zimne mleko, dużo płynów, woda białkowa lub mydlana. Magnesja usta in aqua, a z konieczności kreda lub soda ostrożnie

w małych ilościach. Pompa żół. tam, gdzie nie ma obawy perforacyi. Później przeciw bólowi narkotyk. Środki osłaniające jak kleiki, guma. Lód. W razie zapadu excitantia.

Acid. hydrocyanicum (kwas pruski, Cyanek potasu, Aq. laurocerasi gorzkie migdały. Czasem w likierach. Dos. letal. = 0,06 gr. = 1 kropla. Cyankali = 0,25 jeżeli nierozłożony, 50—60 migdałów g. Połączenia podwójne z żelazem nietrujące. *Objawy:* Dawka zabójcza po 2—5 minutach powala o ziemię, krzyk, ból głowy, utrata świadomości. Kurcz oddechowy, wydech ciężki, przedłużony. Gałki oczne wytrzeszczone, lśniące. Żrenice szerokie. Śmierć w kilku minutach z porażeniem oddechania. Plamy pośmiertne i krew jasno czerwone. Gdy dawka nie wystarczająca, objawy szybko ustępują. Sinek potasu działa nadto żrąco na bł. śluz. żołądka. *Leczenie:* Pobudzić do wymiotów, w początkach sonda żołądkowa. Sztuczne oddechanie. Excitantia podskórnice. Zlewania zimne w cieplej kąpieli. Venesectio z transfuzją krwi.

Acid. nitricum. — Dos. let. = 8—15 gr. — Działanie i leczenie jak acid. hydrochloric.

Acid. oxalicum. Kw. szczawiowy. — Dos. letal. = 4·0—40·0. *Objawy:* Smak bardzo kwaśny z następstwem paleniem. W gardle uczucie dławienia. Piekący ból w żołądku, wymioty. Ogromne osłabienie, omdlenie, śpiączka. Bładość lub sinica powłok. Ciepłota ciała obniża się, oddechy płytkie. Mrowienie kończyn, bóle ciągnące w łędźwiach, drgawki, biegunka krwawa. Mocz skąpo, w nim kryształki szczawianu wapn. cukier i białko. Czasem anuria. Śmierć w kilka godzin lub dni z porażenia serca, uraemii. *Leczenie:* Aqua calcis co 10 minut szklanek kilka razy, kreda, Calcaria saccharata, Magnesja usta. Symptomatycznie lodowe pigułki, narkotyk, gorczyczniki. Przeciw anuryi diuretica i diaphoretica. — Excitantia.

Acid. picronitricum. Dawki powyżej 2 gr. mogą spowodować śmierć. Smak gorzki. Rozkłada ciałka krwi. Gastroenteritis. Wymiociny żółte. Zabarwienie żółte skóry i spojówek. Mocz żółty lub czerwony. Zajęcie sensorium. Kurcze. Nephritis. — *Leczenie:* Przeplókanie żołądka, ol. ricini, sól glauberska. Mocna kawa.

Acid. sulfuricum. H_2SO_4 . — Dos. letal. = na próżny żołądek 4 gr. zgęszczonego kwasu. — *Leczenie* jak przy Acid. hydrochloricum. — Nie używać pompy żołądkowej!

Aether sulfur. Wypity w większej ilości może spowodować uduszenie z wzdęcia, pęknięcie żołądka lub przepony. Używany długi czas jako napój sprowadza zatrucie chroniczne podobne jak w alkoholizmie. Wdechowany działa na ośrodki kory mózgowej i rdzenia

przedłużonego powolniej i łagodniej niż chloroform podniecenie dłuższe, narkoza słabsza. Ślinotok. — Początkowo zaczerwienienie twarzy, tętno silniejsze i szybsze, oziębienie ciała większe niż po chloroformie. Odruch rogówkowy zwykle się utrzymuje. Groźącym objawem jest ustawianie oddechu. Śmierć następuje z porażenia oddechania a następnie serca. Nagłe porażenie serca (syncope) rzadsze niż po chloroformie, częstsze natomiast następowe pneumonie. — *Leczenie*: Sztuczne oddechanie na wolnem powietrzu ułożywszy chorego skośnie z obniżoną głową, zbryzanie piersi zimną wodą, faradyzowanie nerwów przeponowych a skoro nastaną oddechy, amoniak do wachania. Injekcja strychniny (0.002), Tracheotomia, wdmuchiwanie kateterem tlenu.

Alkalia. Ług potasowy, sodowy i węglany tychże. Mydło potasowe i amoniak. — **Dos. letal.** zgęszcz. roztworu Na OH i KOH powyżej 5 gr. — a potażu K_2CO_3 = mniej więcej 15 gr. — Działanie żrące szybkie i głębokie. Smak obrzydliwy, ługowaty, okropnie palący skłania odruchowo do wyplucia. Błona śluzowa ust zniszczona. Jeżeli połknięty palenie w przełyku i żołądku, dławienie. Wymioty gwałtowne maźnistą szarą treścią lub brunatną, alkaliczną. Wielkie pragnienie, trudność połykania. Przytomność często utrzymuje się. Wzdęcie brzucha, kolka, czasem biegunka i drgawki niestale. Zapad. Mocz alkaliczny. Śmierć w pierwszych trzech dniach lub po tygodniach wskutek następstw (strictura cardiae et pylori). — *Leczenie*: Nie sondować lecz neutralizować kwaskami! Ocet, kwas cytrynowy rozcieńczony. Dużo płynów, mleko, kleiki. Pigułki lodowe. Opium lub injectio morphii. Przeciw zapadowi excitantia, lewatywa z wina. Odżywcze lewatywy. — Gdy obrzęk głośni tracheotomia. — Później leczenie chirurgiczne.

— **Alkohol.** — **Dos. letal.** trudna do oznaczenia mniej więcej 150—300 gr. czystego alkoholu. U dzieci = 60—100 gr. Objawy ostrego zatrucia: palenie w ustach i żołądku, krótki okres podniecenia, zaczerwienienie twarzy, błyszczące oczy, nastrzykanie spojówek, źrenice zwężone, tętno przyspieszone, woń wysokoku z ust. — Depresja, utrata przytomności, bezwładność, oddech powolny, ciężki, charczący. Tętno zwolnione, małe. Znaczna bledź, skóra zimnym lepkiem potem pokryta, źrenice rozszerzone, zniesienie odruchów, oddawanie bezwiedne kału, drgawki toniczne i kloniczne, trismus. Śmierć po 1 lub kilku godzinach albo po długim śnie wyzdrowienie. — *Leczenie*: Przepłókanie żołądka. U krwistych i tęgich zapobiedz udarowi przez upust krwi, wzniesienie głowy i zimne okłady na głowę a gorące na kończyny, gorczycznik na łydki i kark, lewatywy z octu (1:4). W razie zapadu injectio ol. camphor. a jeżeli połykać może

ro kropel liq. ammonii caustic. lub anisati na $\frac{1}{4}$ szklanki herbaty, czarna kawa. W razie potrzeby sztuczne oddechanie, wyciągnięcie języka, faradyzacya n. phrenici.

Ammonia pura liquida. — Podobnie jak inne Alkalia (zobacz), nadto dyspnoe, oedema glottidis, salivatio. Bronchitis acuta lub pseudoerouposa, oedema pulmonum. — Zapad i śmierć szybko, czasem po kilku minutach lub godzinach; w następnym dniu rokowanie dość dobre. — **Dos. letal.** = 4·0—40·0. *Leczenie* zobacz Alkalia.

Amylium nitrosum. — p. nitroglycerinum.

Anilinum (amidobenzol) — **Dos. letal.** dotychczas niestwierdzona mniej więcej powyżej 10 gr. — W większej ilości połknięta lub w postaci pary wdychnięta (w fabrykach) powoduje ból głowy i zawroty, osłabienie, chód zataczający, nudności, omdlenie. Zmiany we krwi (Methemgl.) Znaczna sinica skóry, dyspnoe. Wydech o zapachu aniliny. Tętno przyspieszone, drobne, potem zwolnione, zapad. Drgawki rzadko. Mocz brunatno czerwony. W cięższych zatruciach śmierć. Farby anilinowe dla ustroju przeważnie obojętne o ile nie zanieczyszczone arsenikiem. *Leczenie:* zobacz nitrobenzol.

Antymonu połączenia. Tartarus Stibiatus. **Dos. let.** trudno oznaczyć z powodu wymiotów i indywidualizmu. U dzieci już czasem o·10 działa zabójczo. Działanie podobne jak arsenu lecz słabsze. *Leczenie:* Po przeplókanii żołądka tannina i znów przeplókanie lub purgans. Zresztą symptomatycznie: pigułki lodowe, morfina, excitantia.

Argent. nitr. — **Dos. letal.** duża, trudno oznaczyć. Śmierć prawie nigdy, gdyż zapobiegają temu wymioty. *Objawy:* Nadżarcia błony śluzowej powierzchowne, strup biały. Ból piekący. Gastroenteritis. Wymiociny białe ciemnieją na świetle. Zawroty głowy, zapad. *Leczenie:* Środki wymiotne zwykle zbyt uczynne więc mleko, przeplókanie obfite żołądka wodą słoną lub białkową. Zresztą symptomatycznie.

Arsen. Najzwyklejsze połączenia: Surowy arsen metaliczny (Cobaltum v. ziemia angielska) używany jako rutka na muchy. Bezwodnik kwasu arsenawego (arszenik biały). Sol. arsen. Fovleri, roztwór arseninu potasowego, zawiera 1% $As_2 O_3$. Sol. arsen. Pearsoni, arsenian sodowy 1:600 aq. Zieleń Scheelego i schweinfurtska, arsenin, względnie octo arsenin miedziowy. Wiele barwików anilinowych zawiera arsen jako zanieczyszczenie fabryczne, stąd As w tapetach i materyach na ubrania nie tylko zielonych. **Dos. letal.** $As_2 O_3$ = około 0·10 gr. **Dos. toxica** = mniej więcej 0·01 gr. — Otrucie ostre objawia się po $\frac{1}{2}$ —1 godziny w rozmaitej postaci: I. postać (na czczy żołądek) Arsenicismus gastrointestinalis podobny do cholery azyatyckiej lub zatrucia grzybami. Nudności,

wymioty (*corpus delicti*), bólesci w żołądku i brzuchu, biegunka gwałtowna, stolce krwawe obrzydliwie cuchnące, później wodniste albo odrazu ryżowe. Rysy zaostrome. Pragnienie. Tętno szybkie, drobne, czasem sinica zapad. już po 12 godzinach śmierć albo pozorna poprawa, potem dreszcz, osutka płonicza, stranguria (w moczu arsen) zapad i śmierć 4—8 dnia. II. postać (na pełny żołądek) *Ars. cerebrospinalis*: zawroty i ból głowy, ból w kończynach, niedowład., parestezye, nagły zapad bez objawów jelitowych, sinica, coma, czasem drgawki i szybko śmierć (6—8 godzin). Rokowanie gorsze niż w I-szym. III. Postać mieszana, częsta. IV. Na skórę i bł. śluz. pochwy stosowany (pasta) tworzy w miejscu bolesne owrzodzenia a stąd zresorbowany daje objawy powyższe. — *Leczenie*: Jeżeli wymioty słabe $\frac{1}{2}$ —1 *Pravaza* *Apomorphini* 1% lub pulv. *Ipacac.* 1,00 naraz a nigdy *Tart. stib.*! Przepiółkać żołądek dokładnie! (Nie podawać kwasów). Potem dopiero *antidotum arsenici albi*: *Rp.* *Magn. hydroxyd.* *recenter parati in aqua.* *Dtur.* 200 gr. *DS.* zażyć $\frac{1}{3}$ część naraz a resztę co 10 minut łyżkę. — Później ol. *ricini* i *diuretica*. Leczenie symptomatyczne.

Atropinum. Belladonna. *Hyoscyamus, Datura Str.* *Dos. toxica* = 0,01 gr. — *Dos. letal.* = 0,10 gr. Dla dziecka kilka jagód belladony lub kilkanaście nasion datury. Odwar z kilku gramów liści. Śmiertelność względnie mała = 10%. — *Objawy* występują szybko. Po kilku minutach suchość w ustach i drapanie w gardle, niemożność połykania. (Po jagodach nudności i wymioty). Zaczerwienienie i obrzmienie twarzy, tętno przyspieszone do 130, (porażenie *N. vagi*), silne tętnienie karodyt. Skóra sucha, szkarłatna, uczucie gorąca. — Rozszerzenie źrenic, zaburzenia wzrokowe. Zawroty i ból głowy, złudzenia i omamy. Szał. Trismus. Później sopor lub coma. Śmierć w ciągu 12 godzin lub rokowanie *quoad vitam* dobre. — *Objawy* ustępują zwolna po kilku dniach. *Leczenie*: środki wymiotne. Przepiółkanie żołądka odwarem garbnikowym. *Laxans.* *Acid.* tanie. 20% co 5 minut łyżkę. Zimne okłady na głowę. Gdy szal *injectio morphii*. *Rp.* *Pilocarpini* 0,05, *Aq. dest.* 5,00 co kwadrans *injectio Pravaza*, aż się język zwilży.

Brom. W postaci pary wywołuje *conjunctivitis*, *rinitis*, *salivatio*, strasznie męczący kaszel, *spasmus glottidis*, *bronchitis* a nawet *pneumonia*. — Zawroty i ból głowy, odurzenie. Zażyty wewn. silne zapalenie dróg pokarmowych, zapad i rychła śmierć. Sole bromowe obniżają czynność systemu nerwowego, stupor, osutka krostkowa. *Leczenie*: czyste powietrze, sztuczne oddychanie, alkohol na chustec do wdechania. Wewnętrznie klej krochmalny, woda białkowa. Ciepłe kąpiele.

Camphora. *Dos. tox.* = 1,00—2,00 gr. Rozdrażnienie,

popęd do ruchów, gonitwa myśli, drżenie, zaczerwienienie twarzy, utrata świadomości, wymioty, drgawki, czasem szal. *Leczenie*: środki wymiotne, zlewanie zimną wodą.

Cantharides. (*Lytta vesicatoria*, *Mylabris Cichorei*).
Dos. letal. pulveris cant. około 2 gr. — *tincturae c. 30 gr.*; *Emplastri Canth. 15 gr.* — *Objawy*: Palenie języka, przełyku, żołądka, ślinotok, wymioty, pęcherze na bł. śluz. Biegunka niestale, parcie. W okolicy nerek ból, parcie na mocz, ilość moczu mała, mętny, zawiera białko, wałeczki przybłonkowe, palenie w cewce, bolesne erekcje. U ciężarnych abortus. Ból głowy, zwolnienie tętna, obrzęk twarzy, rozszerzenie źrenic. Coma. *Leczenie*: nie podawać tłuszczów ani napojów wysokokowych!! Przeplókanie żołądka lub środek wymiotny, kleiki, mixt. gummosa, lód, bańki w okolicy lędźwiowej, kąpiele ciepłe, opium.

Chininum. — **Dos. letal. około 8 gr.** — **Dos. tox. 1—1'50 gr.** *Objawy*: Wymioty, ból brzucha, szum w uszach, odurzenie, głuchota i ślepotą, halucynacje, ogromne osłabienie, morzysko, śpiączka, tętno zwolnione, ciało chłodne, sinica, czasem abortus. Śmierć z porażenia serca. *Leczenie*: środek wymiotny, przeplókanie żołądka tannina excitantia.

Chlor. działanie i leczenie p. brom.

Chloralum hydratum. — **Dos. letal. = 5,00—10,00 gr.** Silniejsze rozczyyny drażnią i nadżerają błonę śluzową. Smak drapiący, palenie wzdłuż przełyku i żołądka, czasem wymioty. Upośledzenie czucia, sen, który przechodzi w coma. Oddech ciężki. Oziębienie ciała, osłabienie serca, sinica, czasem nagle śmierć z porażenia serca. *Leczenie*: emetica, przeplókanie żołądka, sztuczne oddechanie, środki drażniące skórę, excitantia, injectio atropini 0'0005 gr.

Chloroformium. CHCl_3 — Wypity w większej ilości powoduje gwałtowne, piekące bóle w przełyku i żołądku, krótkie podniecenie, długi sen, wydech zdradza zapach właściwy. Często śmierć. **Dos. letal. = 40 gramów.** Wdechowany sprowadza często kurcze oddechowe, nudności, potem podniecenie, niekiedy szalone z chwilowem zaczerwienieniem i zasinieniem twarzy, szum w uszach, mrowienie, wreszcie znieczulenie, zniesienie odruchów i napięcia mięśniowego. Głęboki sen, źrenice zwężone. Zaczerwienienie twarzy ustąpiło, oddechy regularne, tętno zwolnione, parcie krwi niższe, ciepłota ciała obniża się. Czasem asphyxia wskutek opadnięcia języka. — **Dos. letal.** rozmaite, nawet 100 gr. wdechowano bez szkody, wyjątkowo już po 2 gramach syncope i nagła śmierć z porażenia serca. — *Objawy groźne*: zasinienie ust i twarzy (asphyxia), albo woskowa bladość, tętno małe, przepuszczające lub niewyczuwalne, oddechy zbyt powierzchowne.

chowne, żrenice silnie zwężone następnie ad maximum rozszerzone, akcyja serca ustaje. *Leczenie*: Ważniejszem jest zapobieganie, należy więc przed rozpoczęciem narkozy zbadać serce i płuca, dbać o czystość i dobroć chloroformu i przestrzegać przepisów techniki narkotyzowania. — W razie asphyxii wyciągnąć język, obniżyć głowę i pierś, sztuczne oddechanie połączone z masażem serca i t. d., zob. Aether. W razie zaksztuszenia się wymiocinami wyssać cewnikiem elastycznym.

Cocainum. — Dos. letal. 1 gr. wyjątkowo znacznie mniejsza (indywidualizm). *Objawy*: tętno szybsze, kołatanie serca, mrowienie w palcach, bladeść, zimny pot. suchość w ustach, miganie przed oczyma, omdlenie, rozdrażnienie umysłu, rozszerzenie źrenic, potem depresja, tętno zwolnione, zapad. *Leczenie*: wdychanie amylnitritu, morphium, gorczyznik na serce, sztuczne oddechanie.

Coffeinum. Dos. tox. = 0,30 gr. — 0,50 gr. Dos. letal. = ? *Objawy*: niepokój i rozdrażnienie, szum w uszach, zawrót głowy, odurzenie, drżaczka, stężenie mięśni. Tętno szybkie, nieregularne, kołatanie serca, niekiedy drgawki, czasem nawet śmierć z porażenia serca. *Leczenie*: środki wymiotne lub przeplókanie żołądka, wdychanie amylum nitrosum. Środki drażniące skórę, sztuczne oddychanie, morfium.

Colchicinum. Dos. letal. = 0,04—0,06 gr. Wszystkie części rośliny (*Colchicum autumnale*) są trujące szczególnie nasiona ziemniowita jako odwar. *Objawy* zwykle dopiero po 2—3 godzinach. Palenie w całym przewodzie pokarmowym, pragnienie, wymioty, biegunka. Trwoga, zawroty, majaczenie, duszność. Świadomość czasem zupełna. Znieczulenia z niedowładem wstępującym, czasem szybki zapad. Drgawki. Przebieg zwykle długi, polepszenia naprzemian z pogorszeniem. Śmierć z porażenia oddechania. *Leczenie*: Emetica zwykle zbyt ciężkie, raczej lodowe pigułki, odwary garbnikowe. Rp. Acidi tannici 5,00 + Extr. Opil aquosi 0,20 + Aq. dest. 200,00 DS. Co 5 minut łyżkę. — W zapadzie excitantia. Sztuczne oddechanie.

Coniinum. Dos. tox. = 0,05 gr. — Dos. letal. = 0,15 gr. *Objawy*: Wkrótce po zażyciu palenie w ustach, drapanie w gardle, salivatio, wymioty, rozszerzenie źrenic, senność, zawroty głowy, w łydkach niedowład i porażenie tętno przyspieszone (poraż. N. wagi), porażenie kończyn dolnych, potem górnych, wreszcie mięśni oddechowych i śmierć z uduszenia (podobnie jak curare). *Leczenie*: Emetica. Acid. tannici 2% co 5 minut łyżkę. Excitantia. Świeże powietrze i sztuczne oddechanie.

Cuprum. C. aceticum (grynszpan). C. sulf. — Dos. letal. = ± 10,00 gr. Dla dzieł = ± 1,50 gr. *Objawy*: W słabym rozczyźnie smak ściągający, metaliczny, nudności, wymioty zieloną treścią, biegunka krwawa, potem czarna,

Morzysko. Przypadłości nerwowe, zawrót i ból głowy, znieczulenia, drgawki i zapad, sprowadzający czasem szybko śmierć. *Leczenie*: Przepiókanie żołądka słabym roztworem kali ferrocyanati lub przynajmniej wodą. Mleko, woda białkowa, cukier. — Magn. usta.

Digitalis purpurea. — Dos. letal. Traś. d. 25 gr. — Infus. e. folior, 2,50 gr. — Extr. D. 1,20 gr. — Digitalin 0,01. — *Objawy*: Ból głowy, nudności, wymioty uporczywe, biegunka. Tętno pełne, zwolnione 40—30 na minutę (podrażn. N. vagi), amblyopia, szum w uszach, rozdrażnienie, nawet delirium. Później tętno przyspiesza się (poraż. N. vagi.) małe, nieregularne. Omdlenie, oziębienie ciała, lepki pot. Coma. *Leczenie*: tannina, czarna kawa z rumem lub koniakiem, injectio ol. camph. Przeciwiw wymiotom lód, morfina. Przeciwiw oziębieniu ciepłe okłady.

Ergotinum, cornutinum zob. Secale, sporysz.

Gazy kłoaeczne p. siarkowodór.

Gaz świetlny p. tlenek węgla.

Grzyby trujące. *Amanita phalloides* (i pokrewne) podobna do bełdki pieczarki, sprowadza teżsame objawy co i *hellvella* podobna do jadalnego smardza (*Morchella*), który w stanie surowym ma być też czasem trującym. — *Objawy*: Po kilku (do 24) godzinach nudności, wymioty, biegunka śluzowa lub krwawa, gwałtowne bólesci brzucha, tętno małe, skóra zimna, miganie przed oczyma, mydriasis, mdłości, uczucie lęku, sopor, zapad, czasem delirium, drgawki i śmierć. Często żółtaczką. haemoglobinuria. — Śmiertelność 75%. — W zatruciu **muchomorem** (*Am. muscaria*) przeważają często objawy nerwowo-mózgowe, odurzenie, rozdrażnienie, szal, drgawki epileptyczne. Żrenice rzadko zwiężone, zwykle rozszerzone, sekrecya wzmożona. Przebieg szybszy. *Leczenie*: Przepiókanie żołądka, purgans, acid. tannic. 2% co 5 minut łyżkę. Excitantia, diuretica. Jeżeli przyczyną muchomor nadto atropinę 0,0005. —

Helleborus virid. foetid. niger. Ciemiernik. Folia et radix. Dos. letal. Extracti 2,00, Decocti 30 gr. p. digitalis.

Hydrarg. bichlor corros. — Sublimat. — Dos. let. = 0,50 gr. Przy polykaniu smak ściągający, metaliczny palący w ustach, gardle a szczególnie w żołądku; wymioty treścią białawo-śluzową, często z domieszką krwi, potem okropny ból brzucha, biegunka wodnista, często krwawa z parciem, utrzymujące się długo. W stolcach strzępy nekrotyczne błony śluzowej i krew jak w czerwonce. Zapad anuria lub oligurya, w moczu białko. Śmierć w ciągu 3 dni lub później a wtedy dołączają się nowe objawy: ptyalismus merc. foetor ex ore obrzęk ślinianek, stomatitis et gingivitis ulcerosa. — *Leczenie*: woda białkowa i mleko! Jeżeli wymioty niedostateczne

wstrzyknąć apomorfinę lub pobudzać mechanicznie do wymiotów, a nie sądować ani też nie podawać soli. — Lód, narkotyki. Lewatywy z wody, czopki z opium. Płókanie ust kali chloric. etc.

Jad żmij i innych gadów. — *Objawy miejscowe:* po ukąszeniu niektórych gadów w miejscu ukąszenia tylko 2 kłóte rany, po innych nadto zaczerwienienie, obrzęk otoczenia a czasem i całej kończyny, która później sinieje i ziębnie, czucie miejscowo upośledzone. *Objawy ogólne:* trwoga, drżenie, nudności i mdłości, ból i zawrót głowy, znaczne osłabienie mięśniowe, oddechanie utrudnione, zapad. Rzadko biegunka. Skłonność do krwotoków. — Śmierć wśród drgawek lub też wyzdrowienie powolne. — *Leczenie:* podwiązać kończynę powyżej ran, a te wyciąć z najbliższem otoczeniem lub wypalić żelazem. Wstrzykiwania miąższowe do rany 1⁰/₁₀ kali hypermang. lub sublimatu. Przepiókiwanie żołądka. Wewnętrznie alkoholica w dużej ilości, kamfora. — Diaphoretica. Sztuczne oddechanie. Obecnie także leczenie surowicą.

Jod. Zatrucie ostre po solach jodowych rzadkie, częste po jodynie wypitej przypadkowo lub wstrzykniętej do jam ciała. *Objawy:* gastroenteritis czasem bardzo gwałtowna, wymiociny brunatne zawierają niebiesko zabarwione resztki potraw mącznych. Szybko zapad, anuria, coma i śmierć. W przypadkach łagodniejszych nadto obrzmienie ślinianek, salivatio, coryza, zaczerwienienie twarzy, ból głowy, osutki na skórze. Również **Jodoform** wessany z powierzchni ran może wywołać podobne objawy, w przypadkach cięższych często psychozy. *Leczenie:* przepiókanie żołądka kleikami lub wodą białkową, magnezją, zresztą leczenie syptomatyczne, lód, środki podniecające i nasenne. Później roborantia, chinina.

Kalium chloricum. — Wytwarza we krwi methemogl. **Dos. letal.** = 10—30, gr. — U dzieci = 4, gr, pro dosi. Po dużej dawce (30 gr.) zatrucie bardzo ostre, śmierć po kilku godzinach wskutek rozkładu krwi i wewnętrznego uduszenia. *Objawy:* gwałtowne wymioty, biegunka, zapad, coma, usta i paznokcie bardzo sine, śmierć. Po dawkach mniejszych (10 gr.) zatrucie podostre. *Objawy:* przypadłości żołądkowo-jelitowe, ból głowy, zabarwienie skóry żółtaczkowe z sinawo-ciemnymi plamami, bolesność w podżebrzach, powiększenie śledziony i wątroby, ból w okolicy nerek, duszność. Mocz skąpo, mętny, brunatny, lub czarny, zawiera białko, rozpadłe ciała krwi, wałeczki, methemogl. i haematyną. — Anuria z zaczopowania kanalików, śmierć wśród objawów uraemii. — Krew czekoladowa, płynna. — *Leczenie:* wcześniej przepiókać żołądek, nie podawać kwasów natomiast płyny słabo alkaliczne, środki napotne

i moczopędne, Venesectio z transfuzją krwi odwłóknionej lub infuzya 0.6% Na Cl. — Excitantia.

Morphium. Dos. letal. = \pm 0.10—0.40 gr. — U oseków może kilka miligr. wystarczyć. — *Objawy* występują po iniekcji morf. w 5—10 minut, po zażyciu w pół godziny, po makowcu później. Smak gorzki, uczucie ciepła w skórze, zaczerwienienie i świąd, czasem pot obfity. Tętno trochę szybsze. Znużenie, ciężkość głowy, senność, sen lekki z utrzymaniem odruchów przechodzi w sopor i coma. Zrenice silnie zwężone nie oddziałują. Oddechy bardzo zwojnione, tętno miękkie coraz wolniejsze, ledwie wyczuwalne, obrzęk płuc i śmierć z porażenia oddechania w 6—8 godzin. W agonii czasem rozszerzają się zrenice (CO_2). *Leczenie*: Morfina wydziela się do żołądka więc częste przepłókiwanie tegoż wodą lub odwarem garbnikowym. Tannina. Sztuczne oddechanie. Excitantia. Ogrzewanie ciała. Iniekcye atropiny 0.2 miligr. co pół godziny.

Nicotinum. zobacz Tytoń.

Nitrobenzol ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$), olejek mirbanowy. Dos letal. = 20 kropel — 1.5 gr. — W niektórych perfumach i likierach. Zmienia skład krwi (Methemogl.). — *Objawy*: w pół godziny po zażyciu lub wdechnięciu par sinawo szare zabarwienie twarzy, pot, nudności, wymioty, bóleści brzucha, biegunka. Zapad. Wymiociny, moc i powietrze wydechane mają zapach migdałowy. Sensorium zajęte, coma. Czasem kurcze. Zrenice rozszerzone. W mocz u ciała redukujące. Śmierć (\pm 30%), po kilku lub kilkunastu godzinach lub też polepszenie po dłuższym śnie i wyzdrowienie. *Leczenie*: przepłókanie żołądka, purgantia nieoleiste! Nie podawać wysokoku ani mleka! Zimne zlewania, sztuczne oddechanie. Transfuzye krwi odwł. Infuzye 0.6% NaCl. — Coffeina podskórnice. Czarna kawa.

Nitroglycerinum (trinitroglyc.). — Glonoinum ulega wessaniu przez skórę, stąd częste objawy u osób mających do czynienia z dynamitem, takie osoby należy przestrzegać. *Objawy*: okropny ból głowy, zaczerwienienie twarzy, pot, nudności, wymioty, zawroty głowy, utrata przytomności, osłabienie mięśniowe. Oddechy z początku przyspieszone potem zwolnione, ciężkie. Coma, sinica. *Leczenie*: spokój, czarna kawa, bezwarunkowo unikać alkoholu, zresztą jak nitrobenzol.

Opium zobacz Morphem.

Phosphorus. Główni zapalek = 6—7% Phosph. Paczka = mniej więcej 0.05 Ph. Dos. letal. 0.05—0.15 a dla dziecka mniej więcej 6 główek to znaczy kilka miligramów. — W wodzie bardzo trudno się rozpuszcza tylko w tłuszczach lub alkoholu. *Objawy*: W pierwszym dniu objawy żołądkowe, wymiocin zwykle skąpo, świecą w ciemności i wydają woń czosnku; podobnie i kał. W 2 dniu wyjątkowo zapad i śmierć, najczęściej jednak

pozorna poprawa. — Później żółtaczką, ból w prawem podżebrzu, powiększenie wątroby, ciepłota podniesiona, moczu mało, ciemny, białko. W dniach następnych zwolnienie lub nasilenie objawów, znowu wymioty i to krwawe, abortus, krwotoki z nosa, wybroczynki w skórze, bezwładność mięśni, ból głowy, zajęcie sensoryum, senność, coma, zapad. Pod koniec wątroba może zmaleć. Śmierć z porażenia serca przeważnie w 4—7 dniu. Śmiertelność mniej więcej 50%. *Leczenie*: obfite przepłókiwania żołądka wodą lub b. słabym kali-hypermang. — Jako emetyk najlepiej Cuprum sulf. 1:50 Aquae DS. Co 5 minut łyżkę aż do skutku. Następnie co kwadrans w mniejszych dawkach jako antidotum. Również dobrą jest stara terpentyna (ozon.) Rp. Ol. terebintinae crudi et vetusti 10.00 DS. Co kwadrans po 10 kropel wypić z kleikiem. W następnych dniach leczyć syptomatycznie. Nie podawać mleka ani tłuszczów!!

Profilaktycznie w fabrykach zapalek: pedantyczna czystość i wentylacja, ściśle zastosowanie przepisów ustawowych co do lokalu, sposobu fabrykacyi i zachowania się robotników. Zwracać uwagę na zęby.

Plumbum. Najważniejszy octan ołowiu gdyż inne sole działają mniej energicznie. — Ostre zatrucie rzadkie. *Dos. letal.* = 20—50 gr. — *Objawy*: Nadżarcia błony śluz., palenie, wymioty, biegunka czasem krwawa, zapad. Wymiociny zwykle szare. Jeżeli ulegnie resorbcyi: morzyisko, bóle w mięśniach, niedowład., zawroty głowy, znaczne zwolnienie tętna (40), obstipatio; znieczulenie, porażenia nerwów obwodowych. — Śmierć zwykle dopiero po dłuższym czasie, częściej i wyzdrowienie ale niezupełne. *Leczenie*: środek wymiotny i laxans. Najlepiej Natr. sulf. lub Magnes. sulf. — Rp. Magnes sulf. 10%. DS. Szklanke w ciągu 10 minut. — Mleko. Diuretica.

W zatruciu chronicznem kali. jodat. Kąpiele gorące siarczane; w colica saturnina, podanie atropiny, opium. Profilaktycznie: przestrzegać osoby mające do czynienia z ołowiem (drukarze, farbiarze i t. d.) o niebezpieczeństwie grożącym, nakazać myć ręce, zwłaszcza przed jedzeniem, unikać wdechiwania ołowianego pyłu i t. d.

Ptomainy. Jad gnilny w zepsutem mięsie, kiełbasach, (Botulismus, Allantiasis), rybach i serze. — W kilka lub kilkanaście godzin po spożyciu nudności i mdłości, odbijania, wymioty czasem uporczywe, ból brzucha, biegunka naprzemian z zaparciem, morzyisko. Porażenie nerwów wydzielniczych, suchość w ustach i gardzieli, trudność w połykaniu, porażenie głosi, głos ocierpły lub aphonia, kaszel, duszność, suchość skóry. Szum w uszach, złudzenia słuchowe, zawroty i ból głowy, chód chwiejny, osłabienie mięśniowe, porażenie nerwów ocznych, ptosis, rozszerzenie źrenic, dwuwidzenie, chromatopsya. Sen niespokojny. Tętno i ciepłota początkowo

zwykle podwyższona, potem opada. Zapad. — Śmierć zwykle po 4—8 dniach, wyjątkowo nagle wśród objawów cholerycznych. Wyzdrowienie bardzo powolne. — *Leczenie*: purgantia salina, woda karlsbadszka, kalomel. Narkotyk, odwary garbnikowe, herbata z czerwonym winem. Pilocarpin. — Nie podawać tłuszczów!

Santoninum. — Dos. tox. = 0,10—0,30. — Semen recte flores Cinae zawierają $1\frac{1}{2}\%$ santonini. — *Objawy*: widzenie fiołkowych konturów, potem xantopsia, miganie płatków przed oczyma, halucynacje słuchu i wzroku, odurzenie, nudności, zgrzyt zębów, kurcz mięśni twarzy i drgawki ogólne, nieprzytomność, rozszerzenie źrenic, zapad, porażenie ośrodków oddechowych. — Mocz żółty po dodaniu alkaliów czerwienieje purpurowo. — *Leczenie*: przepłókanie żołądka, emeticum, purgans, chloral hydrat. Sztuczne oddechanie.

Secale cornutum. Sporysz. — Ostre otrucie rzadko sprowadza śmierć, częściej chroniczne. Dos. let. ponad 7,00 gr. — *Objawy*: nudności, szum w uszach, wymioty śluzowe, morzysko, biegunka, stolce brunatne. Zimny pot, sopor, delirium, zaburzenia czuciowe, tętno drobne, szybkie, coma, czasem abortus. Zwykle poprawa lub cierpienie chroniczne w postaci: Ergotismus gangraen. lub spasmodic. — *Leczenie*: przepłókanie żołądka, środek wymiotny, tannina 2% , excitans. Amylium nitros.

Siarkowódór. — *Objawy*: ból i ciśnienie w głowie, zawroty, nudności, drapanie w gardle, szczypiący ból w nosie i oczach, osłabienie, omdlenie; drgawki kloniczne i toniczne, źrenice szerokie, tętno i oddechy słabe, sinica, coma. Po wdechnięciu większej ilości H_2S przebieg szybki. Nagle się upada z krzykiem, utrata świadomości, sinica, w ustach piana, śmierć. *Leczenie*: Świeże powietrze, sztuczne oddechanie, środki drażniące skórę, infuzya 0.6% . Na Cl. Excitantia. Korzystnie zapobiegawczo działa wdychywanie rozrzedzonego chloru. Na chustkę nieco podchlorynu wapniowego i kilka kropli octu.

Strychninum et Brucinum. $2-3\%$ w nasionach strychnos nux vomica. — Dos. let. = Str. nitr. 0,03—0,10 gr. Dla dziecka jeden do kilku miligr. — *Objawy*: gorycz, zwykle brak wymiotów. Po upływie pół godziny bolesne uczucie ciągnięcia w mięśniach z pojedynczymi drgawkami, trwoga, później wybitne napady tęcza ogólnego pochodzenia rdzeniowego i odruchowego, wywołwane podnieceniami na zmysły, z początku krótsze później kilkadziesiąt sekund trwające. Wtedy opistotonus, ustanie odechania, sinica, wytrzeszczenie gałek ocznych, rozszerzenie źrenic, tętno szybkie 100 do 120. Świadomość zupełnie zachowana. — W przerwach między napadami objawy ustępują, pozostaje okropny ból i zaburzenia zmysłów. — Rokowanie zależy od częstości i nasilenia napadów. W napadzie 3 minuty trwającym może

nastąpić śmierć z uduszenia. Mało kto przetrzymuje więcej niż 5 napadów. Śmierć najczęściej po 2 godzinach. — *Leczenie*: Nie używać sondy żołądkowej, bo odruchowe napady!! W pierwszych chwilach najlepiej apomorfine podskórnie a wewnątrznie tanniny 2% co 5 minut łyżkę. Chloralhydratis dosiś plenam per rectum, a nim zadziała może się okazać w razie napadu konieczną narkoza chloroformowa. Sztuczne oddechanie.

Tlenek węgla. — Dos. letal. Co obliczają na 0,80 gr. — *Objawy*: występują zwolna: uczucie ciężkości głowy i tętnienie w skroniach, zawroty i nudności poczem silny ból głowy, wymioty jedno lub kilkorazowe, miganie przed oczyma, zaczerwienienie twarzy, szum w uszach, osłabienie, chory z trudnością wychodzi na świeże powietrze i ratuje się albo upada, traci przytomność, sopor, coma. Oddech ciężki charczący. Tętno z początku pełne, silne, później miękkie i szybkie, przepuszczające. Coma może przeciągać się kilka dni, zwykle jednak (w ciężkich przypadkach) śmierć już po kilku godzinach, przeważnie bez drgawek. Ciepłota ciała podnosi się pod koniec i po śmierci o 1—3° Cels. — Uratowani okazują sztywność mięśni i bezwładność kilkudniową, często porażenia, psychozy i inne cierpienia. *Leczenie*: Świeże powietrze z sztucznem oddechaniem. Podniesienie głowy, zimne zlewania, amoniak do wachania. Podskórnie ol. camphor. — Faradyzowanie N. phrenici. Gdy się coma przedłuża infuzye 0,6% Na Cl po upuszczeniu krwi lub lepiej transfuzye odwłóknionej krwi. — Wrazie wymiotów zapobiegać aspiracyi wymiocin do płuc.

Tyton zawiera (lepszy) 2% do (gorszy) 7% nikotyny a w dymie zasady pyridinowe działające podobnie szkodliwe lecz słabiej. Dos. letal. = nikotyny 0,06, a odwaru z 1—2 gr. liści. — *Objawy*: po małej ilości alkaloidu i po paleniu tytoniu: uczucie gorąca w skórze, salivatio, nausea, zawroty głowy, wymioty. Drżenie mięśniowe, wzmożenie peristaltyki, biegunka z silnem parciem. Oddech powierzchowne, niepokój serca, tętno przyspieszone, później zwolnienie. Omdlenie, drgawki toniczne i kloniczne. Po zbudzeniu się długo osłabienie, brak apetytu. — Po większej dawce uczucie palenia w ustach i przełyku, nagła utrata przytomności, silne drgawki, znaczne zwężenie źrenic, rychła śmierć (w kilku minutach). — Częstsze są zatrucia chroniczne z objawami w postaci bicia serca, scotoma, zawrotów głowy; wówczas zabronić palenia. — *Leczenie*: przepłókanie żołądka odwarem garbnikowym. Wewnątrznie tannina, kali jodatum, czarna kawa, excitantia, zimne zlewania głowy, sztuczne oddechanie.

Veratrinum (w nasionach Sabadillae offic.). Lokalnie drażni bardzo silnie zakończenia nerwów czuciowych, palenie, potem znieczulenie. Po spożyciu palący ból



Badanie moczu.

I. Ilość moczu.

Dorośli mężczyzna wydziela na dobę około 1500 cm.³, kobieta około 1200 cm.³. W warunkach fizyologicznych może ilość moczu na dobę spaść poniżej 500 cm.³ w miesiącach letnich, po nateżeniu się fizycznym, lub podnieść się do kilku litrów (*urina potus.*).

W warunkach patologicznych ilość moczu maleje (*oliguria* względnie *anuria*) po utracie znacznych ilości płynów (n. p. cholera) wskutek zmian patologicznych w samych nerkach (n. p. *neph. parench. acut.*) albo w narządzie krążenia (np. niewyrównane wady serca).

Ilość moczu wzrasta (*polyuria*): 1. pod wpływem nerwowym (*urina spastica* np. u histeryczek), 2. w *diabetes insipidus* i *mellitus*, 3. w *neph. interstit. chron.*

2. Ciężar gatunkowy.

Jest wyrazem ilości składników stałych. W normalnych warunkach waha się w granicach 1'015—1'030 choć te granice może w jedną i drugą stronę przekroczyć. W regule jest odwrotnie proporcjonalny do ilości moczu na dobę z wyjątkiem *diabetes mellitus*, gdzie obok *polyuryi* jest i ciężar gatunkowy wysoki. Ostatnie dwie cyfry cięż. gat. pomnożone przez stały współczynnik 2'33 dają w przybliżeniu ilość składników stałych w gramach w litrze moczu np. cięż. gat. = 1'017; ilość składników stałych $17 \times 2'33 = 39'61$ gr. w litrze.

3. Barwa.

Barwa moczu winowo żółta; mniej lub więcej nasycona proporcjonalnie do ciężaru gatunkowego — z wyjątkiem *diabetes mellitus*, gdzie ciężar gatunkowy wysoki w moczu bladym. Patologicznie zabarwiony mocz: czerwono brunatno (*urobilina*) w chorobach ostrych gorączkowych, w początkach lub ku końcowi żółtaczk, zielo-

nawo żółto lub brunatno w żółtaczce (p. *bilirubina*) krwisto (p. *hemoglobinurya*).

Zabarwienie przypadkowe: złoto żółty, a gdy się stanie alkalicznym, krwisto czerwony po santoninie lub kwasie chrysofanowym z *rad. rhei.* lub *fol. sennae*, oliwkowy lub brunatny po zatruciu fenolem, kreozotem.

4. Reakcyja.

Reakcyja moczu ludzkiego normalnie kwaśna, po kilku dniach — w zimie dłużej — staje się alkaliczną wskutek rozkładu mocznika na węglan amonowy pod wpływem bakteryi. Mocz świeżo wydzielony może być obojętnym, obojnaczym lub alkalicznym a) z powodu obecności węglanu amonowego, b) węglanu sodowego. Celem odróżnienia, gotować mocz na małej parownicze porcelanowej nad lampą, gdy się staje kwaśnym jest węglan amon., gdy coraz silniej alkalicznym, węglan sodowy.

Węglan amonowy wskazuje na istniejący niezbyt pęcherza, stąd równocześnie w osadzie śluz, ropa, bakterye. Często mocz alkaliczny po nieumiejętnym kategoryzowaniu.

Mocz alkaliczny z powodu obecności węglanu sodowego po wprowadzeniu znaczniejszych ilości alkaliów do organizmu w postaci leków lub wód miner., czasem po objedzeniu się owocami, wreszcie u niektórych osób pod wpływem nerwowym.

5. Przeźroczystość.

Mocz świeżo wydzielony jest przeźroczysty po ochłodnięciu zjawiają się delikatne obłoczki (*nubecula*) złożone z małych ilości śluzu, pojedynczych komórek przybłotka płaskiego, ciałek wypocinowych. Gdy mocz mętny, a po lekkim ogrzaniu się wyjaśnia, przyczyna zamięcia mocznicy, gdy wyjaśnienie następuje po dodaniu kwasu, przyczyną zamięcia fosforany (mocz bywa wtedy alkaliczny, obojętny lub co najwyżej bardzo słabo kwaśny). Całkowitą pewność co do natury zamięcia czy osadu, daje tylko mikroskop. Mocz zagotowany powinien pozostać przeźroczystym, jeżeli następuje zamięcie niewyjaśniające się po dodaniu kropli kwasu octowego, przyczyną zamięcia białko, jeżeli zamięcie się wyjaśnia, fosforan wapniowy (*fosfaturya*).

6. Białko.

Normalny mocz białka nie zawiera, przynajmniej w ilościach, któreby można było wprost wykazać.

Z pomiędzy licznych prób na białko, najważniejsze są:

1. Próba Hellera z kwasem azotowym. Kieliszek napelnia się do połowy moczem, a po nachyleniu go, dodaje się ostrożnie kwasu azotowego (apteczny *acid. nitr. concentr.*). Na granicy płynów tworzy się mniej lub więcej zbita obrączka. Granica czułości 0.003% wtedy tworzy się obrączka dopiero po pewnym czasie. Podobną obrączkę tworzy kwas moczowy gdy jest w ilości zwiększonej, ta jednak leży znacznie wyżej, mniej więcej w środku pomiędzy granicą zetknięcia się płynów a powierzchnią. Na granicy zetknięcia się płynów tworzą obrączkę także mydła i kwasy żywiczne np. po zażyciu terpentyny, balsamów, rozróżnić jej można dolewając ostrożnie alkoholu za pomocą pipetki, wtedy pierścień nieknie.

2. Mocz zagotowuje się w próbówce — występuje zmaczenie lub kłaczkii nierozpuszczalne po dodaniu kropli kwasu octowego. Próba nieco mniej czuła, lecz wygodna o tyle, że można ją zrobić wszędzie używając choćby łyżki, świecy i kropli octu.

Ilościowo można oznaczyć białko:

1. Sposobem Esbacha. Do tego potrzebna rurka kalibrowana (albuminimetr Esbacha). Po znak U nalewa się moczu, a po R odczynnika (*Rp. Acid. picrin. 10'00, Acid. citric. 20'0, Aq. dest. 1000'0*) i zostawia do odstania się na dobę. Z wysokości utworzonego osadu, odczytuje się ilość białka pro mille.

2. Sposób Stolnikowa. Rozcieńcza się mocz tak długo, aż kwas azotowy tworzyć będzie obrączkę dopiero po pewnym czasie. Wtedy będzie 0.003% białka. Ile razy mocz był rozcieńczonym przez taką liczbę pomnożyć 0.003, a otrzyma się ilość białka w procentach.

7. Barwii krwi i żółci.

Hemoglobina (*oxyhemoglobina, methemoglobina*). Mocz zawiera w tym razie zawsze białko. Do moczu dodaje się nieco potażu żrącego i zagotowuje. Opadające fosforany porywają ze sobą hematynę i stają się dichroistyczne, t. j. w świetle przechodzącem czerwone, w odbitem zielonawe. Osad można zebrać na sączku i zrobić z nim próbę Teichmanna.

Zabarwienie czerwone fosforanów, choć bez dichroizmu, mogą wywołać barwii w pewnych lekach zawarte, (*rheum., senna, santolina* i in.). Gdy fosforany po dodaniu KHO, z moczu nie opadają, dodać kroplę chlorku wapniowego lub równą objętość moczu fizyologicznego. Najpewniejsze stwierdzenie barwików krwi jest spektroskopowe.

Barwii żółci: Barwa moczu brunatno żółta do zielonej, zależnie od tego czy przeważa *bilirubina* czy *biliverdyna*. Piana moczu żółtaczkowego zawsze jest żółta.

Próba Gmelina, kwasem azotowym jak na białko. Tworzy się szereg pierścieni barwnych, licząc od dołu: żółto czerwony, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony. By uniknąć pomyłki wskutek obecności indykanu mięsza się mocz z kilkakrotną objętością kwasu solnego, następnie dolewa kwasu azotowego, jak wyżej.

8. Chlorki.

Mocz zakwasza się kwasem azotowym, i wpuszcza kroplę roztworu azotanu srebrowego 1 : 8. Najwygodniej jest użyć mieszaniny pozostałej po badaniu na białko kwasem azotowym. W moczu normalnym opada osad zbity serowaty. Gdy chlorki zmniejszone, osad jest mniej zbity, kaszkowaty, obłoczkowaty lub niema go zupełnie. Chlorki zmniejszone w chorobach gorączkowych, szczególnie w zapaleniu płuc, podczas tworzenia się wypociny i po znacznej utracie kwasu solnego przez wymioty w chorobach żołądka,

W normalnych warunkach w *urina potus* chlorki nieco zmniejszone (proporcjonalnie do zmniejszenia się procentowego składników stałych).

9. Cukier.

Próba Mohra: Do moczu dodaje się równą objętość steżonego ługu potasowego i gotuje. W razie obecności cukru zabarwienie brunatne. Granica czułości około 0.2⁰/₀. Mocz normalny także choć tylko bardzo słabo ciemnieje.

Próba Fehlinga: Potrzebne dwa roztwory: I. *Cupr. sulphuric.* 34.639 gr. *Aq. dest.* 500.00. II. *Natr. caustic.* 60.00 *Salis Seignetti cryst.* 175.00 *Aq. dest.* 500.00. Do próbówki dodaje się po 5 cm.³ jednego i drugiego płynu, następnie badanego moczu i gotuje. W razie obecności cukru, osad tlenku miedziawego. Ilości podane wyżej odpowiadają dokładnie 0.05. gr. cukru gronowego.

Próba Nylandera: 2 gr. zasadowego azotanu bizmutu, 4 gr. soli Seignetta i 10.5 gr. wodorotlenku sodowego rozpuszcza się w 100 gr. wody dest. Rozczyn daje się przechować długi czas bez zmiany. 10 obj. moczu gotuje się przez kilka minut z jedną obj. odczynnika; w razie obecności cukru powstaje czarny osad zredukowanego bizmutu. Próba bardzo pewna.

Reakcyja dwuazotowa Ehrlicha.

Odczynniki: I. Nasycony rozczyzn kwasu sulfoanilowego w 100 cm.³ wody z dodatkiem 5 cm.³ kwasu solnego. II. 1/2⁰/₀ wodny rozczyzn azotynu sodowego.

Wykonanie próby: Do 10 cm.³ rozczyynu 1. dodaje

się 4 krople roztworu 2., 10 cm.³ badanego moczu i amoniaku do reakcyi alkalicznej. Normalny mocz daje zabarwienie co najwyżej pomarańczowe, gdy tymczasem mocz gorączkujących i t. d. zabarwienie szkarłatne z pianą różową:

Badanie treści żółądkowej.

Kwasota ogólna: Miareczkowanie 1/10 N. ługiem sodowym z dodatkiem fenoloftaleiny.

Wolny kwas solny: a) Próba Günzburga: alkoholowy roztwór 10% floroglucyny i 5% waniliny; kilka kropli odczynnika z kilku kroplami badanej treści ogrzewać ostrożnie w parownicze porcelanowej, zabarwienie czerwone.

b) Papierki napojone barwikiem Congo zabarwiają się niebiesko.

c) Tropeolina oo. zabarwienie rubinowe.

d) Fiolet metylowy b. rozcieńczony zabarwia się niebiesko.

Kwas mlekowy: 4% woda karbolowa daje z kroplą chlorku żelazowego zabarwienie ametystowe, które po dodaniu śladu kwasu mlekowego zmienia się w żółte.

Badania bakteriologiczne.

Na prątki gruźlicze: odpowiednio cienko zrobiony preparat utrwała się przez trzykrotne przeciągnięcie przez płomień i barwi przez 10 minut na gorąco roztworem Ziel-Neelsena: *Fuchsin* 1:10; *Spir. vin.* 1:10; *Acid. carbol.*; 5:10 *Aq. dest.* 100:10 po opłórkaniu wodą podbarwia przez minutę roztworem: *Methylen. caeruleum* 2:10; *Acid. sulfur.* 25:10; *Aq. dest.* 100:10; Obserw. w balsamie kanad. Prątki gr. czerwone, inne prątki i jądra niebieskie.

Na gonokoki: Preparat jak powyżej zabarwić wprost wodnym roztworem fuksyny lub błękitu metylenowego, opłókać wodą, balsam.

Metoda Grama: Barwi się roztworem fioletu gencyanowego w 5% wodzie karbolowej, następnie 2—3 minut roztwór: jodu 1:10; jodku potasowego 2:10; wody destylowanej 200:10; w końcu alkohol absolutny aż do odbarwienia. Gonokoki nie barwią się. Preparat można podbarwić n. p. wodnym roztworem fuksyny.



KRÓTKIE WSKAZÓWKI

o sztucznych kąpielach mineralnych

podał

Dr. Jan Regiec.

I. Wskazówki ogólne.

Kąpiel pełna po szyję sięgająca wymaga:

dla dorosłych . . . 200—400 litrów

dla dzieci . . . 50—150 litrów

Kąpiel sięgająca po dołek podsercowy:

dla dorosłych . . . 100—150 litrów

dla dzieci . . . 30—100 litrów

Kąpiel nasiadowa . . . 20—30 litrów.

Co do ciepłoty rozróżniamy:

Kąpiel zimną od 10 do 20⁰ C. czyli od 8 do 15⁰ R.

» chłodną » 20 » 28 » » » 15 » 22 »

» letnią » 28 » 34 » » » 22 » 26 »

» ciepłą » 34 » 40 » » » 26 » 32 »

» gorącą powyżej 40⁰ C. czyli powyżej 32⁰ R.

Jako kąpiele mineralne w ścisłym znaczeniu mają zastosowanie tylko kąpiele ciepłe i letnie o wyższych stopniach ciepłoty, zaś gorące jako miejscowe np. kąpiele nożne. Pełne kąpiele powyżej 40⁰ C. znoszą tylko wyjątkowo ludzie z bardzo zdrowym sercem.

Zimne i chłodne kąpiele stosuje się z pożytkiem tylko jako zabiegi wodolecznicze, t. j. działające przez swoją ciepłotę. Zabiegi takie powinny trwać krótki czas, najwyżej 5 minut, który zatem nie wystarcza na przeniknięcie naskórka drobinami soli w kąpeli zawartych; a przez to zadrażnienie zakończeń nerwowych w skórze, tem mniej na ewentualną resorbcyą do krwi i limfy.

Czas trwania kąpeli mineralnej powinien wynosić od 10 do 30 minut. Pod tym względem i co do ciepłoty kąpeli należy się kierować nie tylko wskazaniem chorobowem, wiekiem, stopniem odżywienia, ogólnym stanem

zdrowia (sercel!), ale także indywidualnością leczącego się, która tu odgrywa bardzo ważną rolę. Zawsze należy zaczynać od kąpiei krótkotrwałych, później postępować w miarę jak chory kąpiele znosi. Od powyższych okoliczności zależy także, jak często chory ma się kąpać i ile kąpiei wziąć.

Rzadko kiedy osobniki nawet zdrowe i silne znoszą dobrze kąpiele codzienne przez dłuższy czas. Należy tedy urządzać przerwy a mianowicie słabszych, niedokrewnych i licho odżywionych kąpać co drugi dzień; silniejszym zalecać jednodniową przerwę co dwie do trzech kąpiei. Doświadczeni balneologowie twierdzą, że przeciętnie leczący się kąpielami potrzebują 2 dni wolnych od kąpiei w tygodniu, a nadto, że w porze letniej na świeżem powietrzu znoszą częstsze kąpiele niż w porze zimowej w mieście.

Korzystnem jest obmywanie lub oblewanie chłodniejszą wodą po kąpiei cieplej, zabieg ten nie jest jednak wskazanym u reumatyków, chorych na ischias i t. p. — w innych zaś wypadkach należy do niego użyć wody o tej samej zawartości składników mineralnych jaką posiada kąpiel.

Ilość kąpiei zawisła od wskazania chorobowego, np. w niektórych chorobach kobiecych wystarczy 30 kąpiei, w innych np. u dzieci skrufulicznych ilość ta stanowić ma zaledwie jeden okres leczenia. Choremu nigdy nie obiecywać zbyt rychło dobrych wyników, jego to może łatwo zrazić, gdyż wynik następuje często dopiero w długi czas po zaprzestaniu kąpiei.

Jakiej wanny należy używać?

Co do materiału najpraktyczniejszą do użytku w domu, gdzie nie zachodzi obawa zakażenia się od innych chorych w tej samej wannie kąpać się mogących, jest bezsprzecznie wanna drewniana pokostowana i olejną farbą pociągnięta. Do kąpiei siarczanych, borowinowych, zawierających związki jodu nadaje się niemal wyłącznie tylko wanna drewniana. Wanny metalowe powinny być również lakierem powleczone. Wanny marmurowe, porcelanowe nadają się tylko wtedy do kąpiei mineralnych, jeżeli są z jednego kawałka zrobione, nie sklepane.

II. Wskazówki szczegółowe.

a) Kąpiele solankowe.

Głównym składnikiem solanek mineralnych jest chlorek sodowy a po nim idzie węglan sodowy i chlorek potasowy, z gazów zaś bezwodnik węglowy.

Najwięcej zbliżonym materiałem do przyrządzania sztucznych kąpiei solankowych są sole otrzymane przez odparowanie odnośnych solanek. Te sole z różnych wód

otrzymywane są do siebie bardzo zbliżone co do swojego składu, zatem jest rzeczą prawie obojętną, której do kąpieli użyjemy. Ilość nie powinna przekraczać 3⁰/₀ dodatku i to w przypadkach ciężkich, a rozpoczynać należy od 1,5⁰/₀. U dzieci małych o skórze delikatnej wystarczy 0,5⁰/₀ do 1⁰/₀. Z tego wypadnie na pełną kąpiel dla dorosłego 3—12 kg., zaś dla dziecka $\frac{1}{4}$ —2 kg. soli.

Zważywszy na dosyć wysoką cenę soli wyrabianych z wód mineralnych tego rodzaju kąpiele można zalecać tylko zamożnym. W przeważnej liczbie przypadków można tych soli używać tylko jako przymieszki do zwykłej soli kuchennej, a gdzie i na ten wydatek nie można sobie pozwolić, należy użyć samej soli kuchennej.

Ale i ten dodatek w bardzo wielu przypadkach przy znacznej liczbie kąpieli okaże się za drogim. Znakomicie zastępuje sól kuchenną kainit znajdujący się w naszym kraju w wielkich pokładach w Kałuszu, którego głównymi składnikami są chlorek sodowy, chlorek potasowy i siarkan magnowy. Zważywszy, że własności lecznicze kąpieli solankowych przypisują się głównie chlorkom alkalicznym, z których chlorek potasowy ma działać jeszcze energiczniej na przemianę materii w ustroju niż chlorek sodowy, kainit jest znakomitym materiałem do kąpieli a przy tem bardzo tanim, bo cetnar metryczny kosztuje w Kałuszu niespełna 2 korony.

Kainit denaturowany dodatkiem barwika »Mineral-schwarz« a sprzedawany w takim stanie w Kałuszu do celów rolniczych nie nadaje się do kąpieli.

Sól morska stosunkowo u nas droga ma mniejszą wartość jako materiał do kąpieli od kainitu.

Tak do kąpieli ze soli kuchennej jak i z kainitu należy dodać mniej więcej $\frac{1}{4}$ ⁰/₀ sody, która zmydlając tłuszcz pokrywający skórę i rozmiękczaając przyskórek ułatwia działanie lecznicze.

Do częściowych kąpieli np. nożnych, względnie do okładów mających znaczenie niejako ciągłej kąpieli w gruźlicy kości i stawów można użyć z bardzo dobrym skutkiem ługu pokrystalicznego, otrzymywanego przy wyrobie soli z wód mineralnych zwłaszcza jod zawierających. W ługu tym znajduje się przeważna część związków jodu w wodzie zawartych. Takiego ługu trzeba dodawać do kąpieli 10⁰/₀, zaś do okładów 15⁰/₀.

b) Kąpiele żelaziste.

Naturalne wody żelaziste zawierają zazwyczaj małe ilości żelaza w postaci dwuwęglanu żelazawego. Przyrzadzanie tego rodzaju kąpieli sztucznych napotyka na znaczne trudności, najwygodniej użyć do tego celu surowego winianu potasowo żelazowego, sprzedawanego w postaci t. zw. kul żelaznych (globuli martiales) lub siarkanu żelazawego. Jedna taka kula waży 25 gr. zaś na kąpiel pełną dla dorosłego używa się ich 3—5.

Siarkanu żelazawego używa się zaś zazwyczaj w mieszaninie: 30—60 gr. *Ferrum sulphuricum venale* i około 100 gr. potażu, lub co korzystniej 500 gr. soli kuchennej i 100 gr. węglanu sodowego. Dla dzieci $\frac{1}{3}$ do $\frac{1}{2}$ tej ilości.

Do kąpeli żelazistych należy zaliczyć kąpiele z borowiny żelazistej, jak krynicka, francensbadzka i t. p., bo najważniejszym leczniczym składnikiem tej borowiny jest siarkan żelazawy. Na tej podstawie powszechnie są dziś stosowane sztuczne kąpiele ze soli borowinowej i ługu borowinowego Mattoniego. Przeważnie w użyciu są półkąpiele dosyć ciepłe (35—37,5° C.) przez 30 minut przeciętnie. Na taką półkąpiel daje się 250—500 gr. soli borowinowej rozpuszczonej poprzednio w gorącej wodzie, lub 1000 gr. ługu. Dla dzieci ilość stosunkowo mniejszą.

c) Kąpiele siarczane.

Do przyrządzania kąpeli siarczanych, t. j. nasyconych siarkowodorem używa się dodatku 100—200 gr. t. zw. wątroby siarczanej. Ilość dodatku zależy nietylko od ilości wody kąpielowej, ale także od jakości wątroby siarczanej. Dobry preparat powinien głównie zawierać pięciosiarczek potasowy K_2S_5 , który łatwo ulega w wodzie rozkładowi i wydziela dużo gazu. Takiego dodatku wystarczy 100 gr., często jednak należy dodawać daleko więcej, aby kąpiel należycie czuć było gazem. Wanna powinna być drewniana, nakryta mokrem prześcieradłem w miarę możliwości szczelnie około szyi kąpiącego się owiniętem, aby trującego gazu nie wdychiwać. Przedmioty metalowe należy z łazienki usunąć, bo czernieją — zapas wątroby siarczanej należy trzymać w słoju szklanym lub porcelanowym szczelnie zatkanym, bo ciało to bardzo chciwie przyciąga wilgoć, rozpływa się i rozkłada. Kąpiele siarczane powinno się kombinować ze słoniami.

Wskazania chorobowe do kąpeli siarczanych wymagają przeważnie wyższych ciepłot (35—40° C. dla miejscowych kąpeli do 50° C.). Tu ciepłota sama ma wielkie znaczenie lecznicze.

d) Kąpiele z bezwodnikiem węglowym.

Przeważna część naturalnych solanek i wód żelazistych zawiera znaczne ilości bezwodnika węglowego, niektóre bardzo dużo jak Nauheim, Kissingen, Krynica, Łęgiestów i t. d. Gaz ten bardzo silnie zadrażnia skórę, wzmacnia czynność serca, to też uchodzi słusznie za bardzo cenny składnik kąpielowy. Stąd i kąpiele sztuczne z bezwodnikiem węglowym są dziś bardzo rozpowszechnione. Sposoby ich przyrządzenia są rozmaite. Najprostszy jest taki: do kąpeli zwykłej względnie solankowej lub żelazistej dodaje się 500—1000 gr. dwuwęglanu sodowego, a potem z chwilą, gdy kąpiący się wchodzi do wanny, wlewa się powoli taką samą ilość surowego kwasu solnego o ciężarze gatunkowym 1,20.

Najwygodniej wprowadzać kwas solny ze szklanego irygatora rurką kauczukową, unikając naturalnie zamknięcia metalowego, Zamiast kwasu solnego można użyć kwasu w postaci stałej, np. kwasu winowego. Wszystkie tak bardzo dziś reklamowane »cegiełki« do wyrobu kąpieeli gazowych, tak zagraniczne jak i krajowe z fabryki »Tien« są właśnie z kwasu winowego. Użycie takich cegiełek jest może nieco wygodniejsze ze względu na transport i przechowanie, ale jednostajne wprowadzenie kwasu w kąpiel, a zatem i jednostajne nasycenie jej wywłazującym się gazem jest nieco utrudnione.

Wobec wysoko dziś rozwiniętego fabrycznego wyrobu bezwodnika węglowego, używają go w zakładach kąpielowych także i do kąpieeli gazowych (sposób Kellera i inne). Jest to rzecz kosztowna, dająca się urządzić tylko w większych zakładach kąpielowych, a nadto nie pozbawiona stron ujemnych co do samego nasycania kąpieeli gazem. A wreszcie może i ten bezwodnik węglowy wywiązujący się dopiero w kąpieeli (in statu nascendi) nie jest bez znaczenia leczniczego. Znaczna ilość tego gazu w kąpieelach naturalnych pochodzi z rozkładu dwuwęglanów już w wannie się odbywającego.

Wanna w czasie kąpieeli powinna być nakryta mokrem prześcieradłem, aby gazu nie wdychiwać. Ciepłota kąpieeli może być niższą o 2° C. przeciętnie, niżby była wskazaną bez bezwodnika węglowego, bo bańki gazu na skórze osiadające sprawiają uczucie ciepła. Kontrola lekarska chorych używających tego rodzaju kąpieeli, zwłaszcza »sercowych« powinna być bardzo ścisłą, stopniowanie systematyczne.

Poza tymi kąpieelami, naśladowującymi naturalne kąpiele mineralne, są w praktyce w użyciu kąpiele z innymi dodatkami nieorganicznymi i organicznymi. z których najważniejsze są:

e) **Kąpiele sublimatowe.**

Na jedną kąpiel: Sublimatu . . 2—10 gr.

Alkoholu . . 5—25 «

Wody dest. . 200 «

f) **Kąpiele aromatyczne.**

Przyrządza się przez dodatek odwaru ziół aromatycznych (Species aromat.), jak mięta, macierzanka, szalwia, rumianek, tatarak i t. p. 250—1000 gr, suchych ziół zaparza się 2—4 litrami wrzącej wody i napar wlewa do kąpieeli dla dorosłych, dla dzieci stosunkowo mniej. Zamiast odwaru można użyć odpowiednich nalewek wyskokowych (Spirit. aromat.) 50—125 gr. na kąpiel.

g) **Kąpiele słodowe.**

1—3 kg. słodu jęczmiennego gotuje się przez 1/2 godziny w 4—5 litrach wody i wlewa rozczyń do kąpieeli. Podobne kąpiele otrzymuje się z odwaru z takiej samej ilości pszenicznych otrąb.

Kąpiele aromatyczne i słodowe kombinują się ze solankowymi z bardzo dobrym skutkiem zwłaszcza u dzieci krzywiczych.

h) Kąpiele igliwiowe.

Robi się przez odpowiedni dodatek albo odwaru świeżych liści sosny, jodły i innych drzew szpilkowych, albo gotowych wyrobów aptecznych, jak łyżeczkę ol. pini, lub 250—500 gr. extr. pini silvestr. na dużą kąpiel.

i) Kąpiel gorczyczna.

100—200 gr. mąki z nasienia gorczycy zarabia się z zimną wodą i otrzymane ciasto rozdziela w kąpiel. Zamiast tego można użyć: Ol. sinapis 2,00; Spirit. vini 25°0.

j) Kąpiele garbnikowe.

500—1000 gr. kory dębowej, wiązowej, kasztanowej lub tyleż suchych liści orzecha włoskiego gotuje się z trzema litrami wody i odwar wlewa do kąpeli. Niektórzy lekarze przypisują odrębne znaczenie kąpielom z liści orzecha włoskiego w krzywicy i niedokrewności. Zamiast odwaru można użyć: Acid. tannic. 20—50 gr.; Spir. vini 50 gr.; Aqu. dest. 200.





SKOROWIDZ

zdrojowisk, kąpielisk i uzdrowisk.

Skrócenia: C. = Celsius, c. = ciepłota, km. = kilometry, Zkł. = zakład, m. metry (wzniesienia nad poziom morza), p. = pobyt, p. kąp. = pora kąpielowa, p. zdroj. = pora zdrojowa, st. k. = stacya kolejowa.

Abacya nad morzem Adryatyckiem w Istrii, własność kolei połud. — otwarta cały rok. kąpielisko morskie i st. klim. zimowa od 15. IX — 15. V, łagodny, średniowilgotny klimat, kąpiele morskie od V—IX, urządzenie wytworne, leczenie terenowe, zakład wodoleczniczy otwarty przez cały rok. Dr. H. Ebers, Dr. X. Górski, Dr. B. Kostecki.

Adelheidsquelle, patrz Heilbrunn.

Aix-les-Bains. (Aix en Savoie) Sabaudya, 250 m., cieplice siarczane, 47° C. znakomite urządzenia kąpielowe przez cały rok do użycia.

Ajaccio, Korsyka, (Francya), st. klim. zimowa. p. 15. X—30. IV.

Akwizgran = Aachen = Aix-la-Chapelle = Aquisgranum, dwa zdrojowiska: Aachen i Aachen Burtscheid złączone pod jednym zarządem kąpielowym, Prusy nadreńskie, 176 m., silne cieplice alkaliczno-solno-siarczane, 45—56° C., urządzenia kąpielowe i na porę zimową.

Algier, półn.-Afryka, fr. Alger stolica Algeryi, st. klim. zimowa, p. X—V. podróż na Marsylię, skąd parowcem w 26 godzin.

Amélie-les-bains, Francya, depart. wsch.-pirenejski, 276 m., słynne z balneotechnicznych swych urządzeń i z łagodnego klimatu cieplice siarczane, od 31° do 63° C. Właściwa pora kąp. 1. V—31. X., jed i przez cały rok do użycia.

Apollinarisbrunnen, silnie reklamowana szczawa alkaliczna słaba, wydobywana w Heppingen (Prusy nadreńskie) rozsyłana w milionach flaszek rocznie.

Arco, Tyrol południowy, 90 m., st. klim. zimowa, p. 1. IX — 15. V. klimat łagodny, kojący, w zimie brak śniegu; wiewialnia solankowa i sosnowa, zakł. wodolecznicy, lecz. kefirem, mlekiem, winogronami.

Arosa, Szwajcarya, wysoko-górskie uzdrowisko letnie i zimowe, 1860 m. o 200 m. wyżej niż Davos, od st. k. w Chur pocztą tam $5\frac{1}{2}$ godz., z powrotem $3\frac{1}{2}$ godz. Lecznica dla piersiowych Dra Jacobi'ego, oprócz tego pensjonaty i hotele.

Aussee, Styrya (Salzkammergut), 650 m., silna solanka, 24.5% soli kuchennej zawierająca p. V. — X.

Aix, Francya, depart. de l'Ariège, cieplice obojętne i siarczane.

Axenstein, nad jeziorem czterech kantonów, 750 m., piękne uzdrowisko letnie.

Baden pod Wiedniem, czyli Baden rakuski, 229 m., cieplice ziemno-słono-siarczane, $26-36^{\circ}$ C. p. 1. V — 15. X. Dr Kümmerling.

Baden w Szwajcaryi, czyli Baden helwecki, 383 m. cieplice ziemno-słono-siarczane, 48° C., urządzenia łaźnie i na porę zimową. P. kąp. cały rok.

Baden-Baden, czyli cieplice szwabskie w Ks. Badeńskim, 250 m., cieplice solankowe, $65-68^{\circ}$ C., najwytworniejsze i najliczniej uczęszczane niemieckie zdrojowisko, klimat bardzo łagodny, licznie odwiedzane jako st. klim. przejściowa. P. cały rok, głównie 16. IV — 15. X.

Bagnères de Luchon, Francya, depart. górn. Garonny, 628 m., cieplice siarczane w Pirenejach, $17-66^{\circ}$ C., w ślicznem położeniu, klimat łagodny, znakomite urządzenia balneotechniczne. P. kąp. cały rok ale głównie 15. VI — 15. XI.

Balaton Füred, = Błotne jezioro.

Bardyjów, = Bartfeld, półn. Węgry, na pograniczu Galicyi, 310 m., szczawy wapniowo-żelaziste, urządzenia balneo-techniczne przestarzałe, w ostatnim czasie nieco ulepszone. Pobyt tani. St. kol. w miejscu.

Berèges, Francya, (Pireneje), 1240 m. cieplice siarczane, $31-45^{\circ}$ C. Najwyżej położona st. klim. we Francyi.

Bath, w Anglii, z Londynu w 3 godz. koleją 3 źródła ciepłocy wapniowej, od 42° do 47° C., bardzo licznie odwiedzanej (rocznie około 30.000 osób). Pobyt drogi.

Berchtesgaden, Bawarya, 580 m., st. klim. letnia i solanka.

Biarritz, Francya w zatoce Biskajskiej, kąpielisko morskie. Pobyt bardzo drogi. Pora kąp. od 1. V — 15. X., zimą st. klim., ale nie dla chorych piersiowych. Dr Bohdanowicz (od maja do grudnia).

Bilin, w Czechach, 200 m., 2 mile od Cieplic cze-

skich, silne szczawy alkaliczne, na miejscu zakład wodoleczniczy Sauerbrunn. (p. ogł.).

Birsztany. Litwa (gub. wileńska), solanka od O do 3⁰/₀, urządzenie zdrojowe i kąpielowe w ostatnim czasie znakomicie ulepszone przez Dra Radeckiego L. zakład, Ceny wszystkie bardzo umiarkowane. P. kąp. 15. V—30. IX. Dr Zachorski.

St. Blasien, Badeńskie, 772 m., letnia st. klim. i lecznica Dra Sander'a dla piersiowych całoroczna.

Błotne jezioro, na Węgrzech, kąpiele jeziorne w miejscowości zwanej Siófok.

Bojarka, wieś o pół godz. od Kijowa, zakład kumysowy, własność i kierownictwo Dra Jadowskiego, otwarty 1. V—1. IX.

Bordighera, półn. Włochy, nad zatokę genueńską pomiędzy Mentoną a San Remo, st. klim. zimowa. P. 15. X. — 15. V.

Bozen, połudn. Tyrol. 260 m., st. klim. przejściowa, leczenie winogronami.

Borszék, w Siedmiogrodzie, 381 m., szczawy alkaliczno-żelaziste, w kwas węglowy wolny bardzo zamożne, P. zdr. kąp. tylko 1. VII—31. VIII. Rozsyłka wód bardzo wielka.

Brighton, Anglia, sławne kąpiele morskie, źródła siarczane i żelaziste.

Budapeszt, stolica Węgier, cieplice słabo siarczane, 45—63⁰ C., wspaniałe urządzenie t. zw. Kaiserbad, Reitzenbad i Lucasbad. W pobliżu Budy są bardzo liczne źródła wód gorzkich, z nich najważniejsze: Hunyady, Attila. Deak, Rakoczy i Wiktorya.

Bourbonne les bains, Francya (Wogezy), silne słone cieplice. 58—66⁰ C., nazwane francuskim Wiesbadenem. P. zdr. 15. V.—15. X.

Bournemouth, w Anglii, uzdrowisko nadmorskie, wielkim obszarem lasów otoczone, ciepłota powietrza zimą przeciętnie + 7.2⁰ C., mnóstwo wspaniałych will, lecznica dla piersiowych.

Busko, Król. polskie, gub. kielecka, pow. stopnicki, zakład zdrojowo-kąpielowy wód solno-alkaliczno-siarczanych, LL. Dr Dymnicki, Grabowski, Majkowski, Radziszewski, Sulimirski, P. 15. V—30. IX.

Buziás, Węgry, 132 m., bardzo silne szczawy alkaliczno-żelaziste. Rozsyłka wód do Anglii i do Ameryki bardzo wielka, pobyt tani, p. zdr. 15. V—30. IX.

Bystra, obok Bielska. Śląsk Austr., st. k. Dziedzice-Żywiec. zakł. wodoleczn., właśc. i kier. Dr Jেকেles.

Cannes, Francya, tuż nad morzem Śródziemnem st. klim. zimowa znakomita. p. pob. w celu klim. 4. X—1. V. dla kąpiel mnrskich 1. V. — 30. X.

Capri, st. klim. zim. na wyspie tej nazwy. parowcem z Neapolu 3—4 godz.

Catania, Sycylia, st. klim. zim. P. 15. XI—31. III. średnia ciepłota zimowa $11^{\circ}5'$ C.

Cauterets, Francya, (depart. wysokich Pirenejów), 930 m. słynne cieplice siarczane, $15-55^{\circ}$ C., p. kap. 15 VI. — 15, IX.

Churwalden, Szwajcarya. 1270 m., st. klim. letnia wysokogórska, p. pob. I. V. — 30. IX.

Chudowa, Śląsk Pruski, 400 m. szczawy alkaliczno-żelaziste, Dr Oświęcimski.

Ciechocinek, Król. polskie, st. k. żel. warszawsko-bydgoskiej, solanka $\frac{1}{2} = 4^{\circ}/_{0}$, Dr Arnstein, Asterblum, Certowicz, Ciagliński, Górski, Lewenstein, Lubowski, Pajewski, Ruppert, Stockmann, Tannenbaum i Wolberg.

Cieplice czeskie, = Teplitz-Schönau, Czechy, 220 m., słynne cieplice obojętne, $32-48^{\circ}$ C.

Cieplice Trenczyńskie, = Trenczyn = Trencsin-Teplitz, Węgry, 250 m., cieplice siarczane, $38-40^{\circ}$ C., Dr Filipkiewicz, Dr Wobr.

Cieplice waraźdyńskie, = Töplitz Warasdin = Waraźdyn, Kroacya 274 m., cieplice ziemno-siarczane, 57° C.

Contrexéville we Francyi 345 m. 6 god., kolejną od Paryża, zimne źródła ziemne do kąpieli i do picia.

Copoty, (niem. Zoppot), pod Gdańskiem, st. kap., kąpielisko morskie, b. mało soli, mała fala, licznie uczęszczane przez Polaków. Szpital dla dzieci żółzowych na 65 łózek. 15. VI—30. IX. Dr Sterling.

Cranz, p. Koło.

Darków, niem. Darkau, Śląsk austr., st. kol., jodowo-bromowe źródła słone, p. I. V. — 15. X.

Davos, Davos-Dorf, 1574 m., Davos-Platz, 1560 m., Szwajcarya. Dwa łączące się z sobą uzdrowiska, st. klim. zimowa lecznica dla piersiowych Dra Turbana, lecznica dla uczniów i uczennic, st. k., pobyt latem a głównie zimą.

Dieppe, Francya (Normandya), wyborne morskie kąpielisko, p. I. VI. — 15. X.

Dorna-Watra, Bukowina w Karpatach, szczawa alkaliczno-żelazista, własność rządu. p. 15. V—30. IX.

Druskieniki, Litwa (gub. gródzieńska). 17 klm. od st. k. ż. warszawsko-petersburskiej, 200 m., solanka $1^{\circ}/_{0}$, L. L. Bujakowski i Szepietowski, zakład zdrojowo-kąpielowy znakomity, p. 15. V, — 30. IX.

Druźbaki, dwie wsi: Druźbaki niżnie i wyżnie, Węgry (Spiż), Cieplica wapniowa, $24^{\circ}2'$ C., już w r. 1541 opisane po łacinie przez Wernhnera, a po polsku w r. 1640 przez Petrycego, w XVII wieku przez magnatów polskich licznie odwiedzana, obecnie bardzo mało przez chorych uczęszczana, pobyt nader tani.

Elster, Saksonia, 491 m., alkaliczno-słono-żelaziste wody, podobne do Franzensbadzkich, wyborne balneotechniczne urządzenia, Dr Błociszewski.

Ems, Ks. Nassauskie, 91 m., słynne cieplice słono-alkaliczne, 28—46° C., p. 1. V, — 1. X.

Ernsdorf, zob. Jaworze.

Euganejskie źródło, Włochy, w zachodniej stronie Padwy, dawniejsze wulkaniczne wzgórza ujawniły tu liczne i silne cieplice ziemno-słone, 80—70° C. w miejscowościach: Abano, Bataglii i St. Pietro Montagnone.

Fachingen, Prusy, (okrąg rządowy Wiesbaden)-112 m., alkaliczna szczawa, zamożna w kwas węglowy, mnogo używana do dyetetycznego i leczniczego użytku, Niema tu urządzonego zakładu zdrojowego.

Feydey s. Leysin, Szwajcarya, kanton Waadt, uzdrowisko wysoko-górskie, 1450 m., lecznica dla piersiowych, też zimowa. Od st. k. Aigle powozem 3 godz.

Franzensbad, Czechy, Franciszkowe Łaźnie, 423 m., alkaliczno-solno-żelaziste szczawy, zamożne w kwas węglowy, wzorowe balneotechniczne urządzenia kąpielowe. Z tutejszej borowiny Mattoniego sól i ług borowinowy, oba przetwory licznie rozsyłane, zastosowane na kąpiele. LL. Polacy: Rosner, Steinsberg, Zeitner. (vid. ins.).

Friedrichshall, w Ks. Sasko-Meiningen, dawniejsza salina i zdroj słono-gorzki, powszechnie znana woda gorzka p. i. »Friedrichshallerbitterwasser« ze skutków rozwalniających.

Friedrichsroda, m. w Ks. Sasko-Coburg-Gotha, ulubiona w Niemczech letnia klimatyczna miejscowość w lesie turyngskim, 430 m.: corocznie przez 5.000 osób odwiedzana, p. 15. V. — 15. IX.

Fürstenhof, Styrya, prywatny folwark przy m. Kapfenbergu, 533 m., Zakł. hydropatyczny, dawniej własność Dra Czerwińskiego, przeważnie przez Polaków uczęszczany, pensjonat 60 do 80 kor. tygodniowo od osoby.

Gainfarn, przy m. Vöslau pod Wiedniem, 200 m., zakład hydropatyczny Dra Friedmanna, pensjonat 100 koron tygodniowo od osoby.

Gais, Szwajcarya (kant. Appenzell), 935 m., najdawniejszy zakład galaktoteraupetyczny, letnia st. kl., pensjonat 4—6½ fr. dziennie od osoby p. 15. V. — 15. IX.

Gastein, = Wildbad-Gastein i Hof-Gastein (niżej położony, mniej wykwintny) po pols. Gastuń, Austrya, (Ks. Salzburgskie), 960 m., cieplice obojętne, 24—48° C., klimat czysto alpejski. Najodpowiedniejszą p. pob. VII i VIII.

Giesshübl-Sauerbrunn, pod Karlsbadem, stac. kol. Czechy, 340 m., znakomita prosta szczawa-alkaliczna. Jest tu zakład hydropat. (vide ins. Mattoni).

Gleichenberg, Styrya, 300 m., szczawy alkaliczno-solne, klimat łagodny, urządzenia balneotechniczne wzorowe, L. Polak: Bulikowski. p. pob. 1. V — 30. IX.

Gmunden, Austrya górna, 322 m., nad jeziorem

Traunsee, st. k., uzdrowisko letnie, kąpiele solankowe, wzięwalnia, p. l. VI — i. X.

Goczałkowice, Śląsk pruski, $\frac{1}{4}$ godz. od st. k. żel. Pszczyny (Pless), 266 m., solanka jodobromowa, 3⁰/₀ soli kuchennej, wywóz zagęszczonej solanki i soli zdrojowej.

Goriaczewodzk, Ces. rosyjskie, Kaukaz, w górach kabardyńskich, cieplice siarczane 87^o 9⁰ C. gorące.

Görbersdorf, Śląsk pruski. 550 m. Lecznice dla pier-siowych Dra Brehmera, Dra Römplera, oraz zakład dla niezamożnych chorych Dra Weickera. Od st. k. Friedland 20' powozem.

Gräfenberg, Śląsk austriacki, 580 m., przez swego założyciela Priessnitza najdawniejszy i powszechnie znany zakł. hydropatyczny, cały rok otwarty. Dr Ebel.

Gries, połudn. Tyrol, 270 m., $\frac{1}{4}$ godz. od Bozen, uzdrowisko zimowe, leczenie winogronowe, p. 15. IX—15. V. Pension Sonnenhof pod kierunkiem lek. Dra Nazarkiewicza (vide Ins.).

Grodzisko, Król. pols., St. k. ż. warszaw. wiedeńskiej, zakł. kąpielowo leczniczy, założony przez ś. p. Dra Bojasińskiego dom zdrowia z wygodami, żywienie dyetetyczne z kuchni zakładu. L. Dr Tokarski.

Gubera źródło p. Srebrenica.

Hall rakuski, Górna Austria, 376 m., wody słone jodo-bromowe. Dr Feuerstein.

Hall tyrolski, Tyrol, 537 m., solanka 26⁰/₀, urządz. kąpiel. liche.

Hall = Schwäbisch-Hall, królestwo Wirtemberskie, 290 m., solanka 28⁰/₀.

Hallstadt, Austria, Salzkammergut (przy Ischlu), solanka 27⁰/₀.

Havre de Grâce, Francya, kąpielisko morskie.

Helgoland, wyspa na morzu północnem, kąpielisko morskie p. l. IV, — i. X.

Hélouan-les-Bains, nad Nilem w Egipcie, 35 klm. od Kairu, st. klim. zimowa i cieplice siarczane, 32^o C., urządzenie balneotechniczne i pomieszkanie należyte. P. pob. do leczeń klimatycznych, 15. IX — 15. IV: zaś dla kąpeli i. V. do i. VI.

Heringsdorf, na wyspie Usedom, Pomorze, st. k., kąpielisko morskie nad morzem bałtyckiem, od lądu wysokopiennym lasem otoczone, licznie uczęszczane. 15. V — 30. IX.

Herkulesbad, zob. Mehadia.

Homburg, Ks. Nassauskie (okrąg rządowy Wiesbaden), 189 m., zdroje żelazisto-glaubers. i żelazisto-słone, uzdrowisko letnie i zimowe, zakł. ortopedyczny, wodoleczniczy i żentyczny.

Inowrocław, Ks. Poznańskie, m. powiatowe, od r. 1876 urządzony zakł. silnych kąpiel solankowych 26⁰/₀. LL. Krzymiński i Przybyszewski.

Interlaken, Szwajcarya, Berner Oberland, wierzchożina berneńska, 568 m., st. klim. podalpejska, leczenia mleczne, żentyczne, winogronowe, poziomkowe, licznie uczęszczane kąpiele, 15. IV—1. X. Koszt dzienny w pensjonacie od osoby 16—24 kor.

Ischia, w zatoce Neapolitańskiej, kąpielisko morskie, cieplice, parówki przyrodzone.

Ischl, Austrya (Salzkammergut), 474 m., solanka 24‰, klimat łagodny, wilgotno-ciepły, p. zdr. VI—30. IX.

Iwonicz, Galicya, st. k. ż. o 12 klm. oddalona od zakładu zdrojowego, 410 m., szczawy jodo-bromowo-słone, opisywane od r. 1630, źródła Karola i Amelii, około 600 pokoi gościnnych, 3 gmachy łaźiebne z 114-ma wannami do kąpiei, nowe łaźienki borowinowe i hydropatyczne. Drowie: J. Wernicki, Gabryszewski, Stanisławski, Stauber, Weigel, Lancs, Wachtel, Damański. P. zdr. 15. V—1. X.

Jastrzębie, (niem. Königsdorf-Jastrzēb) Śląsk pruski, 250 m., wody słone, brom zawierające. L. zakładu Dr Witeczak.

Jaszczurówka, w Tatrach pod Zakopanem, 908 m., jedyna polska cieplica obojętna 21° C., kąpiele w zbiorniku, hotel wygodnie urządzone, wille osobne. Połączenie omnibusem z Zakopanem.

Jaworze, (niem. Ernsdorf), Śląsk austr., 360 m., zakład wodoleczn., st. k. w miejscu.

Johannisbad, Czechy, 651 m., cieplice obojętne 29° C., st. klim. letnia, pora zdr. 16. V—30. IX. Dr Hamáček.

Kair, Egipt, uzdrowisko zimowe, klimat suchy, gorący, p. 15. X—15. IV.

Kaltenleutgeben, Austrya, 2 godz. od Wiednia, pierwszorzędny w Austrii zakład hydropatyczny, własność prof. Dra Winternitza, mogący współcześnie pomieścić około 900 chorych, wzorowo prowadzony, pensjonat od osoby 100 kor. tygodniowo.

Kapri, Capri, wyspa w zatoce Neapolitańskiej, zimowe uzdrowisko, 138 m., obok Anapri 300 m.

Karlsbad, Karolowe wary, Czechy, słynne cieplice alkaliczno-glauberskie, 12 źródeł o c. 30—73° C., (Sprudel, Mühlbrunn, Schlossbrunn, Markbrunn). LL. polscy: Dr Hassewicz, Goldwasser, Osk. Kaufmann, Max. Kaufmann, Kołaczkowski, Kostecki, Kretowicz, Kropf, Małszewski, Moraczewski, Rosenzweig, Scharf, Süsskind. Toepfer, Wittlin.

Kamionka, Podole rosyjsk., miasteczko nad Dniestrem, jedyne polskie uzdrowisko winogronowe. LL. Boćiański Kotsowski.

Kisłowodzk, ces. rosyjskie, Kaukaz, gub. Stawropolska, 864 m., liczne i rozmaite źródła, z tych najważniejszy źródło Narsan, szczawa alkaliczno-słono-żelezi-

sta z ogromną ilością kwasu węglowego, pora zdrojowa 15. VI—I. X.

Kissingen, Bawarya, 190 m., pierwszorzędne zdrojowisko pod względem balneotechn. urządzeń, znakomite szczyawy żelazisto-słone, 10⁷—18⁴° C. Lekarz Dr Chłapowski Fr. Posiada zakłady: hydropatyczny, dyetyczny i pneumatyczny, p. zdr. 1. V—30. IX.

Koło, (niem. Cranz = Kranzkuhren) pod Królewcem, Prusy wschodnie, st. k., kąpielisko morskie. bywa wielu Polaków. p. 15. IV—30. IX.

Kołobrzeg, (niem. Colberg), Pomorze, st. k., kąpielisko morskie, solanka 5⁰/₀, bywa wielu Polaków, w kościele św. Marcina kazania polskie, p. 15. IV—30. IX. Dr Weissenberg.

Kossów, (za Kołomyją), lecznica. Dr Tarnawski. (Vide ins.).

Köstritz, Saksonia, 170 m., 22⁰/₀ solankowe kąpiele, tudzież gorące piaskowe, tak urządzone, iż chory leżąc, na świeżem powietrzu może przebywać, p. zdr. 15. V—I. X.

Korytnica, Węgry, Liptów, 847 m., zdroje ziemno-żelaziste, klimat górski.

Kraljevica, miasto portowe w Chorwacyi, włoskie Porte-re, nad morzem Adryat., godzina drogi od Rjeki (Fiume), kąpielisko morskie i uzdrowisko letnie, założone przez Polaka Dra Grodeckiego.

Krankenheil, przy Tölz (górna Bawarya), 650 m., jodo-sodowo-alkaliczne zdroje, p. zdr. 15. V—I. X.

Krapina, Cieplice Krapieńskie, Chorwacya, 160 m., cieplice obojętne 41—43° C.

Krasnobród, w król. pol., gub. lubelska, pow. zamojski, St. k. ż. nadwiślańskiej Rejowiec, odr. 1888 zakład kumysowy i uzdrowisko z pensjonatem dla chorych piersiowych, utrzymanie miesięczne z kumysowem leczeniem 75 do 100 r. L. zakładu Dr Skłodowski.

Kranz, zobacz Koło.

Kreuth, Bawarya, 812 m., pierwszorzędny zakład galaktoterapeutyczny niemiecki, pyszne lasy, p. zdr. 15. V—30. IX.

Kreuznach, Bawarya, 106 m., słaba solanka, odrobinę jodku i bromku sodu zawierająca, o ciepłocie 8—30° C., zasilana 6 źródłami słonemi, pochodzącemi z miejscowości Münster am Stein, o 25' od Kreuznach odległej, ogromny wywóz wyrabianego ługu i soli zdrojowej, p. zdr. 1. V—I. X.

Krondorf, Czechy, 1 mila od Karlsbadu, prosta szczawa alkaliczna, corocznie w ilości około 1 miliona flaszek do dyetycznego użycia rozsyłana, napełnianie wzorowe.

Krynica, Galicya, st. k. ż. Muszyna-Krynica, 589 m., z źródłem w Słotwinach, nadto zakład hydropatyczny

pod kierunkiem dra Ebersa z pensyonatem od osoby dziennie 10—16 kor., tudzież zakład dyetyczny, własność Dra Skórczewskiego, za opłatą tygodniową od osoby 42—84 kor., wreszcie pensyonat dla pań p. Burzyńskiej. 18 zdrojów szczawy alkaliczno-ziemno-żelazistej, bardzo zamożnej w kw. węglowy, wzorowe urządzenia balneotechniczne kąpieli mineralnych, borowinowych i suchych gazowych. L. zakł. Dr Kopff, nadto Drowie: Aronsohn, Askenazy, Cercha, Dębicki, Ebers, Glücksmann, Grabowicz, Kmietowicz, Lewicki, Lorentski, Piotrowski, Skórczewski, Tyszecki, Wąsowicz, Zarzycki, 1500 pokoi gościnnych, 2 gmachy łaźienne o 100 wannach, klimat podalpejski, na miejscu wyrób pastylek krynickich i wy ciągu z igliwia świerkowego na kąpiele balsam., p. zdr. 15. IV—30. IX.

Krzeszowice, st. k. ż. 24 klm. od Krakowa, zakład kąpielowy wód siarczanych.

Kudowa, zob. Chudowa.

Landec, Śląsk pruski, 452 m., cieplice obojętne 22—29° C., nieco siarkowodu i siarczku sodu zawierające. L. zakł. Dr Ostrowicz. Dr Pomoński, Chłapowski A., p. zdr. 15. V—15. IX.

Langeoog, Niemcy, wyspa wschodnio-fryzyjska na morzu niemieckiem, kąpielisko morskie (silne fale). P. 1. VI—30 IX.

Levico, Tyrol południowy, 533 m., zdroje zawierające siarkan żelaza i kwas arsenawy, mnogo rozsyłane, p. zdr. 1. V—30. IX.

Leysin, p. Feydey.

Libawa, kąpielisko morskie w Bałtyku, p. 15. V—1. IX.

Lippspringe, Prusy (Westfalia), 136 m., wody ziemno-żelaziste, tutejsze gazy źródłane: z tlenu, azotu i kwasu węglowego złożone, używane są do wziewań, p. zdr. 15 V—15. IX.

Lubień, Galicya, 3 mile od Lwowa, 275 m., bardzo obfite zimne źródło siarczane, przyrząd do leczenia chorób górnych dróg oddechowych rozpylaniem wody siarczanej.

Lubownia nowa, Węgry (Spiż), 556 m., zakład zdrojowy w pięknym i rozległym parku szczawy alkaliczne. ziemno-żelaziste. Pobyt bardzo tani.

Luchaczowice, Morawy, 508 m. szczawa słono-jodobromowa, na miejscu zwykle z żętycą lub mlekiem wewnętrznem używana, p. zdr. 18. V—30. IX. Dr Spielmann.

Lugano, Szwajcarya, kanton Tessyński, 275 m., st. klim. przejściowa.

Lussinpiccolo na Adryatyku, stacya klim. zimowa. Dr Wobr (p. ogł.).

Madeira, północna Afryka, miasto Funchal, słynna st. klim. południowa wilgotno-gorąca, pensyonat najtańszy tygodniowo 12—15 funt. szterl. od osoby.

Maryenbad, Czechy, 640 m., alkaliczno-glauberskie zimne źródła w gaz węglowy zamożne, c. 10—15° C., (Kreutzbr., Ferdinandsbr., Carolinenbr.), wzorowe urządzenia balneotechniczne. Lekarze Polacy: Dr Dobija, Harajewicz, Kaufmann, St. B. Kwiatkowski, Schermant, p. zdr. 1. V—30. IX.

Maryówka, zakład hydropatyczny 6 km. od Lwowa, Dr Zakrzewski. (Vide ins.).

Mehadia = **Herkulesbad**, Węgry (Banat), 147 m., słynne cieplice siarczane 39—40° C.

Mentona = **Mentone**, połudn. Francya, 1 godz. k. ż. od Nizy, w zatoce genueńskiej, uzdrowisko zimowe na francuskiej Riviera di Ponente, nader korzystnie położone, umiarkowanie wilgotne względnie ciepłe, pensjonat dziennie od osoby 10 fr., p. pob. 1. X—30. IV.

Meran, wraz ze sąsiednimi gminami: Ober-Untermals i Gratsch połudn. Tyrol, 319—520 m., st. klim. zimowa, p. 15. IX—15. V, wiosną leczenie galaktoterapeutyczne, jesienią winogronowe, leczenie wzniesienne. Lekarze Dr Binder (willa Stefania, p. ins.), Dr Żuliński.

Misdroy, dobre kąpiele morskie, na wyspie Wolin, koło Szczecina, Pomorze, p. 29. VI—20. IX.

Montecarlo = **Monaco**, uzdrowisko zimowe, klimat miernie suchy.

Monsummano, Włochy (prowincya Lucca), oprócz cieplic siarczanych 40—50° C., przyrodzona parówka w jaskini, p. V—X.

Montreux, Szwajcarya (nad jeziorem Genewskiem kant. Waadt), wspólna miejscowość z 20 sąsiednich gmin złożona, 380 m., st. klim. zimowa o wiele chłodniejsza niż Meran, żętyczne tudzież winogronowe leczenie, ma szczawę alkaliczną, p. 1. IX—15. V.

Morszyn, Galicya, powiat stryjski, st. kol., 316 m., oprócz słonych źródeł, znakomite słono-gorzkie źródło, wyrób soli zdrojowej do picia i na kąpiele; zakład zdrojowy jest własnością Towarzystwa lekarzy galicyjsk., stanowiąc fundusz wdów i sierót pozostałych po lekarzach. Dr Czaplicki. (vid. ins.).

Münster am Stein, Prusy (prowincya nadreńska) 100 m., niedaleko Kreuznachu, zakład kąpiele słonych bardzo dobrze urządzonych, solanka jodo-bromowa, własność rządowa.

Nałęczów, Królestwo polskie, o 10 klm. od Lublina, źródła ziemno-żelaziste, skąpe w kwas węglowy, zakłady: kąpielny, hydropatyczny i kumysowy, pensjonat dziennie 3½ do 5 rs. od osoby. Dr Chmielewski Dyrektor zakładu, tudzież Drowie Chełchowski, Puławski, Sączewicz.

Nauheim, Ks. Hessen-Darmstadt, 140 m., najsilniejsza niemiecka cieplica solankowa, nader zamożna w kw.

węglowy; 35⁰ C. urządzenia balneotechniczne wyborne. Dr Jankowski.

Nenndorf, Prusy (prow. Hessen-Nassau), 71 m., zimne wodysiarczane z niemieckich najsilniejsze, tudzież solanka 6⁰/₀, wzorowe urządzenia balneotechniczne, p. zdr. 1. V—30. IX.

Nervi, Włochy, niedaleko Genui na Riviera di Levante, uzdrowisko zimowe, klimat miernie wilgotny, p. 1. X—1. V.

Neuenahr, Prusy nadreńskie, 87 m., cieplice alkaliczne, 20—40⁰ C. podobne do Ems i Vichy, klimat łagodny, p. z. 1. V—15. IX.

Niekań, Król. pol., st. k. ż. Iwangrodzko-dąbrowskiej tegoż nazwiska, niedawno otwarty zakład hydropatyczny w willach hr. Platery, okolica leśna, kierownik Dr Misiewicz.

Nizza = Nice, Francya (depart. Alp morskich), nad morzem Śródziemnem, ulubiona st. klim. południowa, umiarkowanie wilgotno-ciepła, kąpielisko morskie, pensjonat od 10—20 franków dziennie. Lekarze: Drowie Bohdanowicz (od grudnia do maja), Heymann, p. 1. X—1. V.

Norderney, Hanower, wyspa m. północnego, najznakomitsze niemieckie kąpielisko morskie, lecznica dla żółzowych chorych, pensjonat w hotelach 50 marek tygodniowo od osoby, p. 1. V—15. IX. Dr Panieński.

Nowe Miasto nad Pilicą, Król. pol., gub. Piotrkowska, zakład wodoleczniczy Dra Bilińskiego, pensjonat od 2 rs. 20 kop. do 3 rs. 15 kop. dziennie od osoby. Lekarze: Drowie Biliński, Niedzielski i Skowroński.

Nowy Smokowiec, (węgiersk. Uj-Tatrafüred, niem. Neu-Schmecks), Węgry, w Tatrach, 1005 m. zakład wodoleczniczy i lecznica dla chorób piersiowych Dra Szontagha, uzdrowisko letnie.

Obersalzbrunn, patrz Salzbrunn.

Odessa, w ces. ros., miasto portowe na północnem wybrzeżu morza Czarnego, kąpielisko morskie. Ciepłota wody w morzu waha się latem od 15⁰ do 26⁰ C., średnia jej temperatura 15⁰ do 18⁰ C. W Odeskiej zatoce są trzy naturalne słone jeziora (limany: »Kujalnicki«, »Chadżybeski« i »Klein liebntalski«), służące na kąpiele słonemułow. Najlepsza pora do nadmienionych kąpiel jest od 20. VI. do 15. VIII. Ocenienie działania skutków (fizyologicznych i terapeutycznych) kąpielei limanów zawdzięczamy ś. p. Drowi Moczutkowskiemu. Lekarze: Kozłowski, Jachimowicz.

Oeynhausen = O.-Rehme. Prusy (Westfalia), 134 m., cieplice słone w kw. węglowy zamożne, 26—31⁰ C., od 3 do 9⁰/₀ soli kuchennej zawierające, p. 15. V—30. IX.

Ojców, zakład wodoleczniczy. Lecznica dla chorych nerwowych. Dr Niedzielski.

Ostenda = Ostende, Belgia, najczęściej uczęszczane kąpielisko morskie, wspaniałe i zbytkowne urządzenia, pobyt drogi, zakład zbyt ruchliwy i bez spokoju.

Palermo, stolica Sycylii, krajobraz pyszny, bogata roślinność, klimat wilgotno ciepły, stacya klimatyczna południowa, pensyonat w hotelu 15 lirów dziennie, p. 15. X—30. IV.

Pau, Francya (depart. niższych Pirenejów), 207 m., stacya klimatyczna zimowa, cieplejsza o 2° C. od Meranu, pensyonat 10 fr. od osoby dziennie, p. 1. X—15. IV.

Piatigorsk, ces. rosyjsk. Kaukaz, gub. Stawropolska, 993 m., 20 źródeł siarczanej ciepłicy od 29°30' do 51°25' C., tudzież źródła alkaliczno-żelaziste 11° R., urządzenia kąpielowe należyte, nawet zbytkowne, p. 1. V—1. X.

Petersthal, W. ks. Badeńskie, 421 m., jedna z t. zw. Kniebisbäder, najznakomitsze szczawy alkaliczno-ziemno-żelaziste, p. 14. V—3. IX.

Pfäfers, zobacz Ragatz-Pfäfers.

Piszczyany = Pistjan, Węgry (komitat Nitrzański), 135 m., cieplice siarczane 57—75° C., tutejszy muł zdrojowy używany na kąpiele, p. 1. V—30. IX. Dr Teichmann.

Plombières, Francya (Wogezy), 421 m., liczne źródła ciepłe obojętnych od 19—96° C., kąpiele wybornie urządzone, p. 30. V—15. X.

Póhóra, Węgry, Orawa, pod Babią Górą, wody słone jodo-bromowe.

Pontresina, Szwajcarya (kant. Graubinden), uzdrowisko letnie w górnym Engadynie, 1800 m., liczne hotele i pensyonaty od 6 do 10 fr. dziennie od osoby, p. 1. V—30. IX.

Pustomyty, Galicya, 1 mila od Lwowa, wody siarczane zimne, od roku 1879 skromny zakładzik zdrojowo-kąpielowy.

Püllna, wieś w Czechach, źródła wody gorzkiej.

Pymont, ks. Waldeck, 130 m., liczne źródła trzech rodzajów: proste szczawy, wody słone 4‰, a najważniejsze silne żelaziste zdroje, bardzo zamożne w kwas węglowy, pobyt drogi, p. zdr. 15. V—30. X.

Rabka, Galicya, stac. k. ż. transwersalnej, 500 m., najsilniejsze z europejskich zdroje słono-jodo-bromowe; w tutejszym zakładzie jest od roku 1887 »Lecznica dla dzieci skrofulicznych«, założona przez Tow. Opieki szpitalnej w Krakowie (Kurator Prof. Dr Jakubowski); na miejscu wyrób soli zdrojowej i lugu, klimat podgórski, powietrze czyste. Lekarze: Supiński, Kaden, Lang, p. 15. V—1. X.

Ragatz-Pfäfers, Szwajcarya (kant. St. Gallen), dwa zdrojowiska: Pfäfers 685 m., a Ragatz 521 m., których cieplice obojętne 38° C. służą wspólnie do użycia, pensyonat od 7—10 fr. dziennie. Ragatz zajmują osoby bogate, zaś Pfäfers mniej zamożne, szukające spokoju.

Rehme, zobacz Oeynhausien.

Reiboldsgrün, Saksonia, lecznica dla piersiowych. Dra Drivera też urządzona na zimę.

Reichenhall, Bawarya, 474 m., uzdrowisko podalpejskie, solanka, leczenie wzniesienne (terenowe), zakład aeropneumatyczny i inhalacyjny do wzięwań solankowych i balsamicznych (własność Macka) pod kierunkiem znakomitego pneumoterapeuty Dra G. Liebiga, a drugi zakład inhalacyjny (własność Lehmana) urządzony według systemu Jahra. Ogółem urządzenia balneotechniczne wzorowe, między lekarzami zdrojowymi Dr W. Sadowski, p. zdr. i. V—30. IX.

Reinerz, Śląsk pruski, 558 m., źródła ziemno-alkaliczno-żelaziste, wyborna żętyca, klimat górski, kąpiele mineralne wodne i borowinowe znakomicie urządzone, p. zdr. i. V—30. IX. Dr Stan.

Riviera, wybrzeże zatoki Genueskiej, pomiędzy Nizzą a Speją rozdzielone przez Genuę na część zach. Riv. di Ponente i wsch. Riv. di Levante. Na Riv. di Ponente: Nizza, Mentone, San-Remo, Bordighera, Hyeres, Cannes, Monaco, Cordigliano, Genua. Na Riv. di Levante: Pegli, Nervi, Rapallo, Piareggio, Spezia.

Rohicz, Styrya (Rohitsch-Sauerbrunn), 228 m., wody słono-alkaliczne, zamożne w kw. węgl.

Roncègno, połudn. Tyrol, 535 m., zdroj arsenowo-żelazisty do picia i do kąpieli na miejscu używany.

Römerbad, połudn. Styrya, 207 m., obojętne cieplice 36—38° C., klimat łagodny.

Royat, Francya (depart. Puy de Dome), 415 m., cieplice alkaliczno-solne 20—35° C., pobyt bardzo drogi, zdrojowisko przez arystokrację licznie uczęszczane, urządzenia balneotechniczne znakomite, p. zdr. 15. VI—15. IX.

Rožnów = (Roznau) Morawy, 380 m., zakład żentyczny i wodolecznicy.

Ryga, w ces. ros. (gub. inflancka), miasto portowe i forteczne, pierwszorzędne kąpielisko morskie, zakład kumysowy i fabryka sztucznych wód mineralnych, wspaniały zakład hydropatyczny z pensjonatem, p. kąp. 15. V—15. VIII.

Rymanów, Galicya (powiat sanocki), st. k. ż. o milę od zakładu oddalona, 3 źródła szczawy alkaliczno-słonojodo-bromowej, Celestyny, Klaudy i Tytusa, od r. 1881 zakład kąpielowy, wyrób soli zdrojowej, podczas lata kolonia wakacyjna dla ubogich dzieci ze Lwowa. Dr Dukiet, Jodłowski, Regiec i Weigiel, p. zdr. 20. V—20. IX.

Saidschütz, Czechy, zdroj wody gorzkiej mnogo rozsyłanej.

St. Honoré, Francya, 271 m., cieplice siarczane 20—31° C., wspaniałe balneotechniczne urządzenia.

St. Sauveur, Francya, 770 m., cieplice siarczane 20—34° C., najliczniej uczęszczane francuskie zdrojowisko.

St. Moritz, Szwajcarya (kant. Graubünden), 1856 m., st. klim. alpejska i zakład silnych źródeł żelazistych, bardzo zamożnych w kw. węglowy, p. zdr. i. VI—15. IX.

Salvatorquelle, woda litowa, czerpana w Preszwie. rozsyłana z Pesztu.

Salzbrunn = Obersalzbrunn, Śląsk pruski, 407 m., szczawy solno-alkaliczne i żelaziste, nadto środki galaktoterapeutyczne, znaczna rozsyłka tutejszych wód urządzenia znakomite, pobyt tani. Dr Grabowski.

Salzungen, ks. Sasko-Meiningen, 250 m., silne solanki 26%, korzystne klimatyczne położenie uczyniło to zdrojowisko niezmiernie ulubionem letniem schroniskiem dla osób zółzowych i podlegających nieżydom, p. zdr. 15. V—1. X.

San-Remo, Włochy, (Riviera di Ponente) w zatoce genueńskiej, uzdrowisko zimowe, które co do ochrony od wiatrów i jednostajności ciepłoty powietrzej przewyższa: Nizzę, Cannes i Hyeres, pensjonat w hotelach 10—12 fr. dziennie od osoby, p. i. X—30. IV. Lekarze pol.: Dr Ostrowicz, B. Landau.

Sasów, stacya klim., zakład wodoleczniczy. Dr Buryński.

Sassnitz, na wyspie Rugii, kąpielisko morskie, parowcem od Szczecina, p. 15. VI—15. IX.

Scheveningen, kąpielisko morza północnego w Holandyi, słynne z korzystnego położenia i wspaniałych swych urządzeń. Koszt czterotygodniowego pobytu jednej osoby 450 m., p. kąp. 15. VI—15. X.

Schinzach, Szwajcarya (kant. Aargau), 350 m., klimat łagodny, cieplice ziemno-siarczane 18—34° C., nadto zdroj jodowy z Wildegg, zakład ulubiony przez zamożnych, wyborne urządzenia balneotechniczne. Lek. zakł. Dr Tymowski, p. 15. V—15. IX.

Schlangenbad, Prusy (prow. Hessen-Nassau), 313 m., cieplice obojętne 32° C., p. 15. V—30. IX.

Schwalbach = Langenschwalbach, 313 m., silne szczawy alkaliczno-żelaziste, wyborne urządzenia balneotechniczne, mnoga rozsyłka wód tutejszych, p. i. V—15. IX.

Seewis, Szwajcarya, kanton Graubünden, st. kolei, 1000 m., wyborne uzdrowisko wysoko-górskie letnie, przejściowe dla Davos.

Selters = Niederselters, Prusy (prow. Hessen-Nassau), wieś, szczawa alkaliczna, wysyłka około 4 milionów flaszek rocznie, zakł. zdrojowego tutaj niema.

Semmering, Rakuzy dolne st. k., 1000 m., uzdrowisko wysoko-górskie letnie i zimowe.

Siofok, p. Błotne jezioro.

Simaiz, w ces. rosyjsk. na południowym brzegu półwyspu Krymskiego 5 wiorst od Alupki, wyborne kąpie-

hisko morskie i stacya klimatyczno-lecznicza ciepła, poddostatek mieszkań dla gości kąpielowych.

Sławiański, ces. rosyjskie (gubernia Charkowska), zdroje i jeziora słone 6—10⁰/₀ soli zawierające, latem szpital wojskowy, klimat niekorzystny, pobyt nie tani, a zbyt nudny, p. 15. V—15. VIII.

Sławuta, Wołyń, st. ż. d. brzesko-kijowskiej, stac. klimat. leśna i zakład kumysowy, lecznica dla chorób piersiowych Dra Dobrzyckiego, Dr Przesmycki, Dr Dzierzbicki, zakład otwarty 22. V—22. IX. Pensjonat sześćcio-tygodniowy 150 rs. od osoby.

Słotwiny, zob. Krynica.

Sooden, Prusy (prow. Hessen-Nassau), 142 m., klimat łagodny, liczne źródła wód słonych w kw. węglowy zamożnych, 15—30⁰ C., wyborne balneotechniczne urządzenia, pensjonat 36—45 mrk. tygodniowo od osoby, p. 15. V—15. IX.

Solec, Król. pol. (powiat Stopnicki), wieś, źródł zimny alkaliczno-solno-siarczany, Drowie Danielewski i Siarczyński.

Spaa = Spa, Belgia, 250 m., wytworny zakład kąpielowy silnych wód alkaliczno-żelazistych, zamożnych w kwas węglowy, dawniej przez arystokrację licznie odwiedzany, obecnie po zniesieniu banku gry mało uczęszczany, opłata zdrojowa na sezon 50—100 fr., w miarę ilości osób, p. zdr. 1. V—30. IX.

Srebrenica, m. pow. w Bośni, źródła siarkanowo-żelaziste zawierające arsen, dziennie używane po 2—4 łyżek stołowych, wprowadzone w handel przez firmę H. Mattoniego, zwane też źródłem Gubera.

Stołopińskie wody, ces. rosyjsk. (gub. Samarska), 210 km. od Samary, źródło słono-siarczane, a drugie żelaziste, tudzież słone jezioro, którego mułu używają do kąpeli. Wyrób kumysu wielki i mnogie jego zastosowanie na miejscu.

Swoszowice, Galicya, 10 km. od Krakowa, st. k. ż., dawniej słynne kopalnie siarki, zimne wapiowo-siarczane zdroje z wielką ilością bezwodnika węglowego i siarkowodoru, ze zakładem kąpielowym. Dr Cholewicz.

Sylt, na wyspie Sylt na m. półn., kąpielisko morskie składa się z dwu miejscowości: Westerland (zbytkowne) i Wennigstedt (skromniejsze, odległe o godzinę), z Hamburga parowcem.

Szaratica, (Morawy), własność Dra Vesely'ego, znakomita woda gorzka.

Szczawnica, (Galicya), w Pieninach nad Dunajcem, 500 m. n. p. m., szczawy słono-alkaliczne, 7 zdrojów: Józefiny, Stefana, Magdaleny itd., dzieli się na zakład górny i zakład dolny na »Miedziusi«; zakład inhalacyjny solankowy i igliwiowy; dwa zakłady wodolecznicze t. j. górny pod kierunkiem Dra X. Gorskiego i dolny

pod kierunkiem Dra Kołaczkowskiego; mleko, kefir, żętyca; kąpiele rzeczne w Dunajcu; stacya kolei Stary Sącz (41 km.) lub Nowy Targ (39 km.), 5 godzin powozem. L. zakł. Dr Gorski Xaw., lekarze: Dr Hammer-schlag, Kołaczkowski, Korczyński L., Kretz, Kruszyński, Singer, Żuliński.

Szkleno, Węgry, 1 godz. od Sztiawnic (Schemnitz), ziemne cieplice 30—50° C.

Sliacz = Szliacs, Węgry, 300 m., proste ciepłe wody żelaziste, 11—31° C., w kwas węglowy zamożne, p. 15. V—30. IX.

Szkoło, Galicya, 35 km. ode Lwowa, zimne wody siarczane, ma 2 zakł. kąpielowe: wojskowy i cywilny, urządzenia nędzne. Najpierwsza jego monografia Dra Erazma Syxta: »O cieplicach we Szkle« wydana w r. 1527.

Taraps-Schuls, Szwajcarya (kan. Graubünden), 1180 m., klimat alpejski, bogaty zasób źródeł mineralnych: glauberskich i szczaw żelazistych.

Töplitz-Schönau, zob. Cieplice czeskie.

Trenczyn, zob. Cieplice Trenczyńskie.

Trouville, Francya, Normandya, kąpielisko morskie.

Truskawiec, w Galicyi wsch., u stóp Karpat Stryjskich, wieś oddalona od Drohobycza 8 km., st. k., zakład leży w dolinie 420 m., 4 źródła do picia, z nich trzy słono-gorzkie (Maryi, Zofii i Bronisławy), jedno szczawy alkalicznej (Nafta), zakład inhalacyjny systemu Wassmutha. Lekarze zakł.: Dr Pelczar, Dr Krzyżanowski, Praszil, Frey, Węclewski, Mindes, Selzer, p. 15. V—30. X.

Tryest, (u Słowian Terst), kąpielisko morskie, często wiatry Sirocco, Bora.

Tyflis, ces. ros. m. gub., 440 m., liczne cieplice obojętne, zaopatrujące łaźienki całego miasta.

Vals, Francya (depart. Ardèche), 10 źródeł alkalicznych, do wód Vichy składem chemicznym bardzo zbliżonych, lubo zimniejszych, 13—16° C. mających, wywóz tych wód wielki, pobyt tańszy niż w Vichy.

Vevey, Szwajcarya, nad jeziorem genewskim, 380 m., st. klim. podalpejska, dobra na wiosnę i jesień, z wyjątkiem lipca i sierpnia, nie odpowiednia na zimę dla chorych piersiowych, leczenie winogronowe, pensjonat 7—15 fr. dziennie od osoby.

Vichy, Francya (depart. Allier), 260 m., najznakomitsze zdrojowisko francuskie, cieplice alkaliczne, zdroje: Grande Grille, Célestines, l'Hopital 12—44° C., wspaniałe balneotechniczne urządzenia, ogromny wyrób soli zdrojowej i pastylek. Właściwa pora zdrojowa 1. V—1. X., jednak zakład kąpielowy jest cały rok otwarty. Dr Bier-nawski.

Vöslau pod Wiedniem, cieplice obojętne 24° C., leczenie winogronowe.

Warnemünde, w. ks. Meklenburg-Schwerin, kąpie-

lisko morskie, dobrze urządzone, ceny nader umiarkowane, p. zdr. 15. VI—18. IX.

• **Warażdyn**, zob. Cieplice warażyńskie.

Wenecya, nad Adryatykiem, st. klim. zimowa, średnio ciepła, wilgotna, wolna od kurzu i wichrów, słoneczna. Średnia zimowa ciepłota od $1\frac{1}{2}$ —2° C. wyższa, niż w Meranie lub Montreux. Styczeń i luty są na pobyt najodpowiedniejsze. Ujemną stronę stanowi niedobra woda do picia; jesienią są tu dobre morskie kąpiele na Lido, pensjonat 7—10 franków dziennie od osoby.

Westerland, patrz Sylt.

Wiesbaden, Prusy, stolica ks. Nassauskiego, 117 m., cieplice solankowe 50—68° C., nie tylko na kąpiele, ale i do picia zastosowane, 900 gabinetów łaziennych, najliczniej uczęszczane niemieckie uzdrowisko letnie i zimowe, urządzenia kąpielowe i na zimę, pensjonat od osoby miesięcznie od 100 mrk. i wyżej, leczenie winogronowe. Dr Mierzwinski.

Wildbad, król. Wirtemberskie, 400 m., obojętne cieplice, 33—37° C., używane na kąpiele i do picia, urządzenia balneotechniczne wyborne, pensjonat 10—15 mk. dziennie od osoby, p. k. 1. V—1. X.

Wildungen, ks. Waldeck, 228 m., szczawy ziemno-alkaliczne i z dróź znakomity żelazisty, p. 1. V—1. X.

Wysowa, Galicya (powiat gorlicki) 525 m., od r. 1882 zakład zdrojowo-kąpielowy i żętyczny, szczawy słono-alkaliczno-żelaziste, 6 głównych źródeł. Dr Ozga, p. 1. VI—1. X.

Zakopane, w Tatrach polskich, 830—1000 m., uzdrowisko letnie i zimowe, st. k. w miejscu, klimat alpejski, pobyt zimowy dla piersiowych. Dr Chramiec, Chwistek, Dłuska, Dłuski, Gaik, Gawlik, Janiszewski, Majewicz, Tabor, Wojczyński, Zychon, p. zimowa X—V. Liczne pensynaty, hotele, wille.

Zoppot, patrz Copoty.

Zuckmantel, Śląsk austr., zakład wodoleczniczy.

Żegiestów, Galicya (pow. Sądecki), st. k., szczawy alkaliczno-ziemno-żelaziste, tudzież rzeczne kąpiele w Popradzie. L. Dr Tym. Piotrowski, p. 15. V—30. IX.





UWAGI SĄDOWO-LEKARSKIE.

I. Świadcstwa lekarskie i sądowo-lekarskie.

Świadcstwa lekarskie, wydawane przez lekarza na żądanie osób prywatnych a nie władz muszą być opatrzone marką stemplową na 1 kor. Świadcstwa stwierdzające przebyłą ospę lub dokonane szczepienie ochronne tejże, również i świadectwa mające na celu usprawiedliwienie ucznia z jego nieobecności w szkole i t. d. lub z jego opóźnienia się w złożeniu egzaminu w należytych czasie, są wolne od stempla (rozp. z d. 29 czerwca 1834, L. gub. 30736 i obwieszczenie gub. z d. 4 grudnia 1834 L. 75852). Opinie lekarskie co do istnienia choroby umysłowej w celu umieszczenia umysłowo chorego w jednym z krajowych zakładów dla obłąkanych mogą wydawać c. k. lekarze powiatowi i fizycy miast Lwowa i Krakowa (wolne od stempla).

Świadcstwa sądowo-lekarskie czyli tak zwane *visa et reperta*, podlegają jako wydawane osobom prywatnym ostemplowaniu marką na 1 kor. Forma ich odpowiada w zupełności formie protokołu oględzin sądowo-lekarskich.

Świadcstwo sądowo-lekarskie składa się pod względem formy z trzech części: *pierwsza* powinna zawierać imię, nazwisko, wiek, stan, miejsce zamieszkania osoby badanej, wreszcie i miejsce, w którym lekarz ją bada. Po tym wstępie następują krótkie a możliwie dokładne wywiady co do istoty zajścia objawów podmiotowych i co do osób, które w niem czynny udział brały. Jeżeli osoba poddana badaniu jest nieletnią, nieprzytomną lub dotkniętą chorobą umysłową, zasięga się wywiadów od osób ją otaczających.

Druga część stanowi wynik przedmiotowego badania i część tę dzieli się wedle potrzeby na oznaczone liczbami porządkowymi ustępy a to w tym celu, aby się można na nie w orzeczeniu powołać. W części tej zwraca się uwagę na wszelkie szczegóły, podobnie jak w zwykłym badaniu klinicznym, zaczynając od uwag co do

ogólnego odżywiania i budowy ciała osoby badanej, co do stanu ciepłoty ciała, tętna, wrodzonych lub nabytych zboczeń, wreszcie co do chwilowych stanów zresztą fizjologicznych, jak np. ciąży. Po tych uwagach następuje opis ściśle przedmiotowy, zrozumiały nawet dla nielekarza, tyczący się znalezionych śladów obrażeń cielesnych lub innych zaburzeń. W opisie tym należy unikać zwrotów, stanowiących raczej rozpoznanie, jak wierny opis stanu, w jakim badany się znajdował w chwili badania. Jeśli badanie przedmiotowe nie stwierdza zmian anatomicznych dla objawów podmiotowo uczuwanych przez badanego, należy w miejscu odpowiedniem podnieść ujemny wynik badania przedmiotowego.

Trzecią i ostatnią częścią świadectwa jest orzeczenie, które stanowi właściwe rozpoznanie zaburzeń w protokole opisanych, jakoteż i ocenę ich sądowo-lekarską. Ocenę sądowo-lekarską uszkodzeń ciała podaje się na podstawie znajomości odnośnych paragrafów obecnego kod. karn., stosując się nadto do wymagań §. 132 ust. o postępowaniu karnem z dnia 23 maja 1873: »znawcy mają wyrzec w szczególności, które ze znalezionych obrażeń ciała lub nadwreżeń zdrowia same przez się lub w związku z innemi bezwzględnie albo ze względu na szczególne okoliczności przypadku, należy uważać za lekkie, ciężkie lub dla życia niebezpieczne; jakie skutki obrażenia takie zwykle za sobą pociągają i jakie w obecnym przypadku szczególnym stąd nastąpiły, tudzież jakimi środkami albo narzędziem i w jaki sposób takowe zadane były«.

Świadectwo sądowo-lekarskie.

Steinpel
1 Kor.

Katarzyna S., lat 20, żona rolnika z Libertowa, podaje iż ją dnia 19 marca b. r. pobili Józef K. i Tekla jego żona z Gaja, kołkiem z płotu i ręką.

Badanie dnia dzisiejszego wykazuje:

1) Kobieta wzrostu średniego, prawidłowej budowy, dość dobrze odżywiona, nieokazująca ogólnych objawów chorobowych.

2) Na twarzy, a mianowicie na grzbiecie nosa dwa otarcia przyskórka, wielkości ziarna grochu, podobne zdrapanie na górnej wardze po stronie prawej i tuż koło kąta ust prawego, wreszcie smugowate zdrapanie w środku brody, wszystkie strupem zaschłej krwi pokryte.

3) na grzbiecie, wzdłuż całej prawie prawej łopatki, smugowate zasinienie.

4) Kończyna górna prawa przedstawia się o kilka ctm, krótszą w porównaniu z kończyną górną lewą; badana, kończyną tą nie może poruszać, a przy usiłowaniu ruchów biernych ramieniem, doznaje mocnego bólu. Ramię prawe okazuje się prawie w połowie swej długości obrzmiałe, zasiniałe i kątowato zgięte. Kąt zgięcia tego zwrócony jest rozwartością swą ku wewnątrz. Przy badaniu dotykiem czuje się w miejscu tego zgięcia trzeszczenie i wyraźną nieprawidłową ruchomość kości, badanie to sprawia dotkliwy ból.

5) Zresztą na ciele nie ma innych śladów obrażeń.

ORZECZENIE.

1) Obrażenie opisane pod l. 4 przedstawia się jako złamanie kości ramieniowej prawej prawie w połowie trzonu tejże i stanowi uszkodzenie ciała ciężkie połączone z upośledzeniem zdrowia i niezdolnością do pracy, która trwa zwykle w tych przypadkach przez więcej, niż dni 30. Okoliczności tej czy upośledzenie zdrowia potrwa w danym przypadku przez więcej niż 30 dni, na razie stanowczo rozstrzygnąć nie można. Rozstrzygnięcie to będzie możliwem dopiero po zdjęciu opatrunku ustalającego.

2) Obrażenia opisane pod l. 2 i 3 stanowią uszkodzenia ciała lekkie tak razem wzięte, jak i każde z osobna, połączone z upośledzeniem zdrowia około 7 dni trwającym.

3) Złamanie kości ramieniowej mogło być następstwem uderzenia ciałem twardem, tępem, ciężkiem, siłą użytą np. kołem z płotu, otarcia przyskórka na twarzy były zadane najpodobniej do prawdy paznogciami palców.

Co niniejszem, jako zgodne z zasadami nauki lekarskiej, do wiadomości c. k. Sądu podaję.

Dr X. X.

Kraków, d.

II. Uwagi o oględzinach i sekcji sądowej zwłok.

Rozporządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych i sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 1855 r. Nr. 26 dz. u. p. zamieszcza dokładne przepisy, odnoszące się do sposobu wykonania oględzin i sekcji sądowej zwłok (*vide* Zbiór ustaw Dra Barzyckiego). Oględzin i sekcji zwłok dokonują dwaj lekarze zazwyczaj w ten sposób, iż jeden (młodszy) wykonywa sekcję, drugi starszy dyktuje protokół sekcji.

Gdy jednak jasno jest zrozumiałem, iż obducent lepiej ze stanu znalezionego w zwłokach zdaje sobie sprawę, przeto właściwszem i więcej wskazanem jest, aby obducent sam protokół w miarę postępu sekcji dyktował. Protokół sekcji winien być wiernym odbiciem znalezionego stanu rzeczy i winien zawierać opis wszelkich czynności obducenta skierowanych ku możliwie ścisłemu wywiązaniu się z zadania swego. Protokół powinien być podany w formie zwięzłej, łatwo nawet dla nielekarza zrozumiałej; stanowić ma on wierny opis stanu narządów zwłok, nigdy zaś gotowego rozpoznania. Protokół składa się z 3 części: 1) z nagłówka; 2) z opisu oględzin zewnętrznych; 3) z opisu oględzin wewnętrznych.

W przypadkach, w których zależy na stwierdzeniu tożsamości osoby, należy oględziny zewnętrzne ciała poprzedzić dokładnym a systematycznym opisem odzieży, w jaką zwłoki są przybrane.

Szemat dla protokołu sekcji:

A. Oględziny zewnętrzne.

1) Zwłoki — płeć (mężczyzny... kobiety... dziecka płci...), wiek, długość ciała, odżywienie, budowa (zbożenia w budowie).

2) Zmiany pośmiertne tj. stężenie pośmiertne utrzymuje się (lub nie) w kończynach górnych... dolnych; plamy pośmiertne... ich umiejscowienie... rozległość... barwa... nacięciem stwierdzone.

3) Zabarwienie powłok (zielone ze zgnilizny i t. d.).

4) W razie stwierdzania tożsamości zwłok; włosy głowy, ich długość, zabarwienie, inne właściwości, włosy zarostu twarzy... kolor rączówek, opis twarzy i reszty ciała, szczególnych znaków i t. d. np. na rękach jako dowód zatrudnienia.

5) Zachowanie się żrenic (rozszerzone, zwężone, równomiernie lub nie), spojówki (obecność wynaczynionek), naturalne otwory jam ciała jak otwory uszne, nosowe, ust, pochwy i odbytu zawierają ciała obce... treść... lub nie. Z otworów... czuć woń podobną do... W jamie ust... język... zęby. Części płciowe zewnętrzne...

6) Opis uszkodzeń, blizn znalezionych (każde uszkodzenie osobno oznaczać literami porządkowymi a, b, c, i t. d.).

7) Oprócz wyżej opisanych śladów uszkodzenia, innych się nie spotyka.

B. Oględziny wewnętrzne.

(Sekcję należy wykonać w zwykłym anatomicznym porządku nawet w przypadkach otruc.

8) Powłoki czaszkowe po stronie wewnętrznej okazują... sklepienie czaszki budowa jego... grubość kości... okazuje... Opona twarda... zatoki żyłne zawierają krew płynną... skrzepy... Opony miękkie okazują... pod nimi... zwoje mózgowe powierzchowne... Mózg zbitości... na rozkroju... zawartość krwi... komórki... ich rozmiary... zawartość... wyściółka ich... sploty naczyńniowe... zwoje mózgu podstawowe... mózdzek... most Varola... rdzeń przedłużony... naczynia na podstawie mózgu... ich grubość... zawartość... Podstawa czaszki po oddzieleniu opony twardej okazuje... Jamy bębenkowe (w razie potrzeby) zawierają...

9) Krtan i tchawica z przodu in situ rozcięta zawiera... Mięśnie szyi... naczynia wielkie szyi... gruczoł tarczowy... język i gardło... nagłośnia, wewnątrz krtani... przełyk... gardziel w górnej części...

10) Mięśnie klatki piersiowej i brzucha... rozwinięte... stan przepony do brzegu żebra... po stronie prawej... po lewej...

11) Ułożenie trzew w klatce piersiowej... worki opłucnowe zawierają... płuca wolne lub przyrośnięte... opłucne płuc... pod nimi... miąższ płuc powietrzny lub nie (w których częściach)... na rozkroju płuco prawe... wejście rozkroju... zbitość... dobywa się treść... za uciskiem... z przeciętych oskrzeli... płuco lewe... opłucne ścienne... gruczoły przyoskrzelowe...

12) Worek osierdziowy wolny... zrośnięty z... zawiera... serce wielkości... pod osierdziem... przebieg naczyń wieńcowych (prosty lub kręty)... komórka lewa zawiera... zastawka dwudzielna... przedsionek lewy... komórka i przedsionek prawy... zastawka trójdzielna... mięsień sercowy... jego grubość... zabarwienie... zbitość... nitki ścięgniste... mięśnie brodawkowe na rozkroju... tętnica płucna zawiera... zastawki jej... aorta wstępująca zawiera... błona wewnętrzna jej ściany... zastawki jej... ujścia tętnic wieńcowych i ich drożność... Tchawica i oskrzela z tyłu rozcięta w całej długości okazują... dolna część gardziela.

13) Ułożenie trzew w jamie brzusznej... zawartość worka otrzewnowego... otrzewna jelit... ścięgna... krezka... gruczoły krezkowe...

14) Wątroba wielkości... brzegi jej... powierzchnia... jej torebka... na rozkroju... powierzchnia... zbitość... zawartość krwi... zabarwienie... woreczek żółciowy... żółć... przewód żółciowy...

15) Śledziona, wielkość... torebka... na rozkroju... zbitość... ilość krwi...

16) Nerka prawa i lewa wielkość... torebki... powierzchnia nerek po złuszczeniu torebek... na rozkroju rysunek... istota korowa... piramidy... miedniczki... moczowody...

17) Pęcherz moczowy zawiera... barwa moczu... (w przypadkach otruc wypuścić czystym cewnikiem mocz do czystego naczynia i przechować)... błona śluzowa pęcherza...

18) Pęcherzyki nasienne... jajniki... macica... jej wielkość... część pochwowa... ujście zewnętrzne... jama macicy... zawiera... pochwa...

19) Żołądek (w przypadkach otrucia podwiązać u wpustu odźwiernika i otworzyć nad naczyniem) ściana zewnętrzna żołądka... zawartość żołądka... jakość treści... oddziaływanie... błona śluzowa...

20) Dwunastnica zawiera... jej błona śluzowa...

21) Trzustka... na rozkroju...

22) Jelita cienkie... treść... błona śluzowa...

23) Jelita grube...

24) Gruczoły zaotrzewnowe...

25) Aorta zstępująca piersiowa... brzuszna...

26) Po wyjęciu trzew okazują żebra... kręgosłup... kości miednicy... kości kończyn...

27) (W razie potrzeby). Po otwarciu jamy kręgowej okazuje rdzeń... jego opony...

W przypadkach sekcji zwłok noworodków należy w oględzinach zewnętrznych podać cechy odnoszące się do okoliczności, czy dziecko jest donoszone lub nie, a więc: 1) długość zwłok (długość podana w ctm. podzielona przez 5 wyraża miesiąc życia płodowego w drugiej połowie ciąży). 2) Obwód główki, wymiary: prosty, skośny, wielki, dwuciemienny, dwuskroniowy, szerokość barków, miednicy, rozmiary ciemienia. 3) stan włosów główki, obecność meszku, stan chrząstek nosa i małżowin usznych, stan paznogci, jąder w mosznach rozwój podściółki tłuszczowej, stan jąder kostnych w dolnej nasadzie kości udowej i ich rozmiar.

Nadto podaje się cechy, po których poznaje się noworodka, a więc: 1) obecność krwi i mazidła skór nego na powłokach ciała; 2) stan pępowiny, oba jej końce; 3) stan przedgłowa; 4) obecność smółki. Celem wyjaśnienia pytania z §. 130 p. k. czy dziecko urodziło się żywym należy wykonać tak zwane próby życia tj. próbę hydrodrastyczną Schreiera i żołądkowo-jelitową Breislausa.

Po ukończeniu sekcji mają obducenci wydać swe zdanie, czyli orzeczenie w sposób ogólny bez motywów tj. bez powoływania się na odnośne ustępy protokołu. O ile protokół przedstawiał tylko opis przedmiotowego stanu sekcją stwierdzonego, o tyle orzeczenie stanowi podmiotowy sąd obducentów. Orzeczenie powinno być odpowiedzią na pytania objęte §. 129 ustawy o postępowaniu karnem, a więc powinno mieścić objaśnienie co w danym przypadku było bezpośrednią przyczyną śmierci i co tę wywołało. Jeśli przyczyny śmierci sekcja nie

dostarczyła, należy to wyraźnie w orzeczeniu zaznaczyć. W przypadkach powikłanych, w których nadto zachodzi potrzeba dokonania dalszych badań np. spektralnych, mikroskopowych itd., lub w których ważnemi dla orzeczenia stają się pewne wskazówki przez śledztwo uzyskać się mające, ograniczyć się należy tylko do tymczasowego orzeczenia, zastrzegając sobie na później orzeczenie dokładne i mótutowane.

W każdym orzeczeniu należy po wyjaśnieniu przyczyny śmierci podać, czy ona była wynikiem własnej winy denata, przypadku, czy też czynnego udziału drugiej osoby. Jeśli na zwłokach stwierdza się obrażenia, wówczas należy podać w orzeczeniu, czy one powstały za życia, czy też po śmierci, następnie czy je zadała druga osoba; w tym ostatnim razie, należy odpowiedzieć na pytania (§. 12 p. k.): *a)* czy czyn ten drugiej osoby spowodował śmierć *a)* już ze swej natury w ogólności, *b)* lub z powodu właściwego osobistego usposobienia lub z powodu szczególnego stanu obrażonego; *c)* z powodu okoliczności przypadkowych, wśród których czyn spełniono; albo *d)* z powodu przyczyn, które przypadkiem nastąpiły, lub czynem samym były wywołane lub z niego wynikły i czy *e)* śmierci można było zapobiedz wczesną i stosowną pomocą lekarską.

UWAGA. Na mocy §. 359 u. k. jest obowiązany każdy lekarz uczynić doniesienie w przypadkach zbrodni, a doniesienie to podobnie jak i załączone doń świadectwa lekarskie, mające stanowić dowód i poparcie doniesienia, są wolne od stempla.





Warunki przyjmowania chorych obłąkanych do zakładów publicznych lub prywatnych.

Według §. 273 ust. cyw. za obłąkanego lub głupkowatego ten tylko uznany być może, który za takiego sądownie, po dokładnem zbadaniu zachowania się jego przez wyznaczonych do tego przez sąd lekarzy, uznany zostanie. W przypadku takim postanowienie sądu do publicznej wiadomości podane być powinno. Sąd w tym razie ustanawia kuratora (§. 269).

Zakłady dla obłąkanych są prywatne albo publiczne. Do prywatnych, zakładanych jedynie za pozwoleniem politycznej władzy krajowej, przyjmowani być mogą chorzy, tylko na podstawie świadectwa lekarskiego, potwierdzającego istniejącą chorobę umysłową. Świadectwo to musi być wystawione przez lekarza powiatowego lub gminnego miejsca pobytu chorego, lub gdyby przez innego lekarza było wystawione, musi być potwierdzone przez lekarza powiatowego lub gminnego i wygotowane najpóźniej w 14 dniu przed wniesieniem prośby o przyjęcie. Jeżeli chory był poprzednio w kuracji lekarskiej, dodaną być musi historia choroby, skreślona przez lekarza ordynującego. Chorzy, których władza bezpieczeństwa z powodu zagrażającego ogółowi bezpieczeństwa do zakładu prywatnego oddać jest zniewoloną, mają być przyjęci na podstawie świadectwa wystawionego przez lekarza, którym ta władza rozporządza. Lekarz kierujący zakładem ma o przyjęciu chorego w przeciągu 24 godzin donieść trybunałowi pierwszej instancji, w którego okręgu zakład się znajduje, z prośbą o potwierdzenie odbioru doniesienia. Doniesienie to wtedy tylko ma być zaniechane, jeżeli nie ma wątpliwości, że chory jeszcze pozostaje pod władzą ojcowską. Jeżeli taki chory podczas pobytu swego w zakładzie dojdzie do 24 roku życia, należy o tem, wyszczególniając stosunki jego osobiste, donieść trybunałowi pierwszej instancji. Tożsamo ma nastąpić, jeżeli zajdą okoliczności, które pociągają za sobą zmianę osoby prawnego zastępcy, a sąd opiekuńczy lub kuratelarny skądinąd

o tych okolicznościach nie wie. Osoby umieszczone w prywatnych zakładach dla obłąkanych, które uważać należy za wyleczone, mają być z zakładu wypuszczone, po porozumieniu z temi osobami, które prosiły o przyjęcie chorego do zakładu, albo w miejsce tychże pieczę nad chorym przyjęły. Także chorzy nieuleczalni nie mogą być w zakładzie dłużej zatrzymywani, jeżeli ich wypuszczenia żądają krewni, lub ich prawni zastępcy. Chorzy niewyleczalni mogą być oddani tylko swym prawnym zastępcom, lub osobom przez tychże wskazanym. Jeżeli z zakładu będą wypuszczone osoby, które władza bezpieczeństwa oddała z powodu grożącego ogółowi niebezpieczeństwa, poprzednio o wypuszczeniu tę władzę należy zawiadomić. Taksamo należy postąpić w razie uwolnienia takich osób na próbę. O wypuszczeniu chorych wyleczonych zostających pod kuratelą należy odnośny sąd zawiadomić.

Zakłady publiczne dla obłąkanych rządzą się własnymi statutami, które muszą być potwierdzone przez ministra spraw wewnętrznych. Zakłady publiczne dla obłąkanych mają czynić doniesienia wyżej wymienione do tychże władz sądowych. Gminy a w szczególności ich organa lekarskie są obowiązane utrzymywać w naoczności tych obłąkanych, którzy nie są umieszczeni w domach obłąkanych i czuwać nad pielegnowaniem tychże. Chorych na umyśle, którzy nie pozostają pod władzą ojcowską lub opiekuńczą, mają gminy w celu dalszego zarządzenia wskazać temu trybunałowi, do którego okręgu są wcielone. Władze sądowe są obowiązane o ustanowieniu opiekunów i kuratorów dla umysłowo chorych, znajdujących się w zakładach dla obłąkanych zawiadomić te zakłady. (Dz. d. p. z. r. 1874. L. 71).

Przyjmowanie do Kulparkowa i wydalenie. (Tożsamo stosuje się i do Szpitala św. Łazarza w Krakowie). Chorych przyjmuje do zakładu dyrektor na żądanie stron lub władz bezpieczeństwa. Aby chory mógł być przyjęty, należy dyrektorowi przedłożyć: Świadectwo władzy miejscowej z wymienieniem stosunków rodzinnych i majątkowych chorego a także historią choroby, sporządzoną przez lekarza i poświadczoną przez fizyka powiatowego. Jeżeli oddaje władza bezpieczeństwa, to powinna wymienić fakty. Jeżeli chory ma leczyć się własnym kosztem, to należy jeszcze dołączyć pisemne zobowiązanie tej osoby, która ma spłatę uiszczać. Chorzy winni być oddani do zakładu należycie odziani.

Dyrektor zakładu do 24 godzin powinien donieść o przyjęciu chorego trybunałowi pierwszej instancji.

O zamierzonym wydaleniu chorych wyleczonych, lub nieuleczonych nie zagrażających publicznemu bezpieczeństwu lub obyczajności i o terminie wydalenia, powinien dyrektor zakładu zawiadomić rodzinę lub pra-

wnego zastępcę, urząd gminy, do której chory jest przynależny, władzę opiekuńczą, jeżeli pod tą władzą zostaje i władzę bezpieczeństwa, jeżeli ona oddała chorego do zakładu ze względów policyjnych.

Przy odbieraniu chorego niewyleczonego, odbierający powinien złożyć dyrektorowi: przyzwolenie władzy opiekuńczej, przyzwolenie gminy, w której chory ma mieszkać i pisemne zobowiązanie się do dalszego pielęgnowania chorego. (Dz. u. k. 1876. 15 Lutego. Nr. 6).





WYMIAR NALEŻYTOŚCI

przypadających lekarzom i weterynarzom jako znawcom sądowym.

Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości w porozumieniu z ministerstwami spraw wewnętrznych i skarbu z dnia 20-go marca 1901 odnoszące się do wymiaru należytości, przypadających lekarzom znawcom, w sprawach karnych. Dziennika ustaw państwa Nr. 34 z dnia 3-go kwietnia 1901. XVI.

Wśród dochodzeń w sprawach karnych i w związku z wykonaniem kary obowiązują obecnie następujące rozporządzenia, odnoszące się do wymiaru należytości dla lekarzy, znawców w miejsce taryfy z dnia 17-go lutego 1855 D. u. p. Nr. 33.

§. 1. Lekarzom-znawcom należy w dochodzeniach karnych wymierzać należytości według następującej taryfy:

A. Za czynności sądowo-lekarskie.

1. Za badanie osoby uszkodzonej, wywód oględzin i orzeczenie w przypadkach uszkodzeń ciała rozmyślnych lub z zaniedbania:

- a) w przypadkach zwyczajnych 3 k.
- b) w przypadkach wymagających szczegółowego i drobiazgowego badania względnie orzeczenia . . . 6 k.
- c) w razie jeżeli potrzeba szczególnego naukowego uzasadnienia orzeczenia 10—20 k.

2. Za badanie, wywód oględzin i orzeczenie w takich przypadkach, w których niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia powstało w inny sposób, w szczególności za badania, mające na celu stwierdzenie odbycia porodu lub aktu płciowego (mianowicie wśród zamachów przeciw obyczajności i w przypadkach badań matek w obec czynów przeciw życiu dzieci (noworodków):

- a) w przypadkach zwyczajnych 6 k.
- b) w przypadkach wymagających szczegółowego i drobiazgowego badania względnie orzeczenia . . . 10 k.

- c) w razie gdy potrzeba szczegółowego naukowego uzasadnienia orzeczenia 10—20 k.
3. Za wywód oględzin, orzeczenie i badanie narzędzi, płam, leków, trucizn i t. p., o ile zachodzi potrzeba badań takich oddzielnie od badań określonych pod 1 i 2:
 - a) w przypadkach badań zwykłych, gołem okiem 3 k.
 - b) w przypadkach badań gołem okiem lecz w obec potrzeby naukowego uzasadnienia orzeczenia. . . 6 k.
 - c) gdy zachodzi potrzeba badań mikro lub spektroskopowych względnie innych sposobów badania fizycznego (w szczególności wśród badań płam krwawych, nasiennych, bakteryi i t. p.) 10—20 k.
4. Za badanie bakteryologiczne wywód i orzeczenie gdy zakładano hodowlę bakteryi lub uciekano się do doświadczeń na zwierzętach 20—40 k.
5. Za sekcję zwłok ludzkich lub ich części wraz z wywodem 12 k.
6. Za sekcję płodu niedojrzałego wraz z wywodem 6 k.
7. Za orzeczenie na podstawie sekcji zwłok (5—6):
 - a) w przypadkach zwykłych 6 k.
 - b) w przypadkach wymagających szczegółowego naukowego uzasadnienia orzeczeń. 10—20 k.
8. Za dokonanie samych zewnętrznych oględzin zwłok ludzkich, płodu lub popłodu (bez wykonywania sekcji) wraz z wywodem i orzeczeniem 6 k.
9. Za obecność w charakterze znawcy:
 - a) wśród dokonania oględzin 6 k.
 - b) wśród wydobywania zwłok z grobu (ekshumacyi) 10 k.
10. Za badanie stanu umysłowego wraz z wywodem i orzeczeniem 10—40 k.
(gdy przypadek wymaga użycia dłuższego czasu i zabiegów będzie wynagrodzenie policzone w myśl końcowego ustępu §. 384 ust. o post. kar.).
11. Za wywód i sprawozdanie w przypadkach ocenienia stanu zdrowia i ciała:
 - a) osób obwinionych, świadków, znawców, sędziów przysięgłych i t. p. celem stwierdzenia przyczyny ich niestawiania się: we Wiedniu, Pradze, Bernie, Lwowie, Krakowie, Gracu, Lublanie, Tryjeście, Salzburgu i Insbruku 4 k.
 - we wszystkich innych miejscowościach 2 k.
 - b) Za badanie więźniów celem ocenienia zdolności do pracy w zakładach pracy przymusowej i t. p. (o ile badań takich nie objęto osobnym układem lub porozumieniem w myśl §. 9-go) 1 k.
12. Za obecność przy rozprawach głównych wraz z wynagrodzeniem za czynione przy tej sposobności wyjaśnienia, dokonywanie wywodów i orzekanie: za pierwszą godzinę obecności 6 k.

za każdą następną chociażby rozpoczętą godzinę obecności 2 k.

(Obliczania czasu obecności przy rozprawach dokonywać należy za każdy dzień z osobna, a przerwy wśród jednej rozprawy lub pomiędzy kilku po sobie następującymi rozprawami nie dłużej niż godzinę trwające należy wliczać w czas obecności przy rozprawie).

13. Za badanie aktów w miarę ich objętości 3—10 k.

14. Za orzeczenia wydane na podstawie badań dokonanych przez innego lekarza:

a) w przypadkach określonych pod 1) 2) i 3) a) przypadają wynagrodzenia powyżej podane.

b) we wszystkich innych przypadkach jaknajmniej w przypadkach wydawania orzeczeń na podstawie badań i wywodów chemicznych lub technicznych 6 k.

c) w razie potrzeby szczegółowego naukowego uzasadnienia 10—20 k.

15. Za samo zbadanie na ciele uszkodzonego lub chorego, mające na celu późniejsze podanie wyводу 3 k.

16. Za stawienie się znawcy w skutek wezwania gdy czynność sądowo-lekarska nie odbyła się (w razie jeżeli nie może żądać dyjet) 3 k.

17. Dyjety i koszta podróży:

a) lekarze pozostający w służbie rządowej mają policzać dyjety odpowiednie swej randze.

b) wszyscy inni lekarze policzają dyjety według IX rangi.

§. 2. Oprócz należytości wymienionych w § 1 mają znawcy prawo żądać zwrotu wydatków uczynionych w gotówce przy czynnościach sądowo-lekarskich (jak za środki dezinfekcyjne, odczynniki i t. p.) nie mogą jednak żądać zwrotu wynagrodzenia za dostarczenie potrzebnych narzędzi i przyrządów lekarskich.

§. 3. Pod względem kosztów podróży i dyjet należy stosować postanowienia, odnoszące się do urzędników państwowych (§ 386 ust. o post. kar.).

§. 4. Stronom obowiązany do zwrotu kosztów (§. 3^o) i 390 ust. o post. kar.) w myśl §. 384 ust. o post. kar. należy wliczać wynagrodzenia taryfowe mimo, że ich nie wypłacono znawcy pobierającemu stały ryczałt.

§. 5. W razie powołania kilku znawców, ma każdy z nich prawo żądać całkowitego wynagrodzenia.

§. 6. Na sądach ciąży obowiązek ograniczenia powoływania znawców i określenia ich czynności zgodnie z istotną potrzebą, ich obowiązkiem jest stosownie do §. 123 p. k. oznaczyć przedmioty i podać cel badania i udzielać znawcom wyjaśnień na podstawie aktów. Akta należy udzielać znawcom tylko wśród warunków objętych drugim ustępem §. 123 p. k., a więc wtedy, gdy ustne wyjaśnienia nie są dostateczne, jeżeli udzielenie aktów okazuje się niezbędnem, a nie sprzeciwiają się

temu szczególne przeszkody. Sądy mają baczyć, aby badaniom znawców poddawano szczegóły związane ściśle z przedmiotem dochodzenia karnego. W przypadkach wątpliwych jest obowiązkiem sądów przekonać się poprzednio czy wynik badania ze strony znawców będzie w ogóle dla dochodzenia użyteczny.

§. 7. Jeżeli wśród dochodzeń zachodzi wątpliwość czy badaniu ze strony znawców należy podać znacniejszą liczbę przedmiotów, lub czy może dostatecznem będzie zbadanie tylko niektórych, jest obowiązkiem sądów ograniczyć badanie tylko do kilku przedmiotów, lub też skłonić znawców do zaniechania dalszych badań skoro tylko cel badania osiągnięto.

§. 8. Sądy drugiej instancyi mają przyznawać:

1. Należytości znawców określone pod A. 1. c, 2 b. i c, 3 c, 4, 7 b, 10 i 14 c.
2. Należytości za nadzwyczajne badania, których nie objęto powyższemi postanowieniami.

W razie jeżeli zachodzi potrzeba uchwały sądu drugiej instancyi, należy treść uchwały uwidocznic na akcie zawierającym odnośne przyznanie ze strony sądu pierwszej instancyi. Uchwała taka podlega odwołaniu w myśl §. 392 i 481 p. k. gdyż mimo, że zapadła za zgodą drugiej instancyi sądowej pochodzi właściwie od sądu instancyi pierwszej.

§. 9. Postanowienia objęte taryfą II. rozporządzenia z dnia 17-go lutego 1855 dz. p. p. Nr. 33 za czynności lekarskie, chirurgiczne i położnicze, dokonywane z polecenia władz sądowych tracą moc obowiązującą.

O ile czynności takich nie sprawują lekarze osobno w tym celu ustanowieni, jest obowiązkiem kierowników sądów ustanowić ryczałtowe wyrządzenia w drodze umowy, z zastrzeżeniem przyzwolenia ze strony ministerstwa sprawiedliwości. Umowę zawrzeć należy z jednym względnie w razie potrzeby z kilku lekarzami zamieszkałymi w siedzibie sądu lub bezpośredniem tegoż sąsiedztwie. Wynagrodzenia takie wypłacać się będzie jako ryczałt miesięczny lub roczny. Tej samej zasady przestrzegać należy w obec akuszerki za sprawowanie czynności położniczych. Szczegółowe wskazówki ukażą się osobno.

§. 10. Powyższe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1-go lipca 1901 r.

Spens m. p.



NACZELNE WŁADZE SANITARNE

Przy ministerstwie spraw wewn.

Dr Kusy Emanuel, c. k. Szef sekcji i ref. sanit.

NAJWYŻSZA RADA ZDROWIA

(K. k. oberster Sanitätsrath).

Przewodniczący:

Prof. Vogel August r. dw.

Zastępca przewodniczącego:

Prof. Ludwik Ernest, r. d.

Członkowie zwyczajni:

Prof. Dr Chrobak Rudolf
r. d.

Prof. Dr Braun Gustaw r. d.

Dr Daimer Józef r. minist.

Dr Dvorák Jan pos. sejm.

Prof. Dr Exner Zygm. r. d.

Prof. Dr Eiselsberg An-
toni r. d.

Prof. Dr Jaksch Rudolf.

Prof. Dr Kratschmer Flo-
ryan.

Dr Kusy Emanuel j. w.

Dr Mucha Wiktor, Dyr.
szp. p.

Prof. Dr Polansky Stan.

Prof. Dr Weichselbaum
An. r. d.

Prof. Dr Wagner Juliusz.

Członkowie nadzwyczajni:

Prof. Dr Gruber Fr. r. d.

Dr Illing Ferdynand radca
sekc. Min. i ref. weter.

Prof. Dr Inama-Sternegg
Karol.

Grüner Robert (Aptekarz).

Kremel Aloizy (Aptekarz).

Muhl Fryderyk r. d.

Prof. Dr Schindelka Hugo
(weter.).



C. K. KRAJOWA RADA ZDROWIA.

Skład i zakres takowej, jako ciała obradującego i doradczego, oznaczony jest ustawą z dnia 30 kwietnia 1876 r. dz. ust. p. Nr. 68 o organizacyi publicznej służby zdrowia.

Przewodniczący:

Czyżewicz Adam, Dr med. i mag. pol., c. k. prof. pol.
i prym. szp. p, we Lwowie.

Zastępca przewodniczącego:

Dr Festenburg Edward Gerard, Prezydent Izby lekar.

Członkowie:

a) ze strony Rządu:

Prof. Dr Bądyński Stan.	Prof. Dr Kadyi Henryk.
Prof. Dr Czyżewicz Adam	Dr Merunowicz Józef j. n.
j. w.	Prof. Dr Ant. Noga Mars.
Dr Festenburg Edward.	Prof. Dr Schramm Hilary.

b) ze strony Wydziału krajowego:

Dr Starzewski Józef, dyr. szp. powsz.

Prof. Dr Machek Emanuel.

c) Delegaci Izby lekarskich:

Zobacz Izby lekarskie.

Lekarze powiatowi: (IX rangi.)

WŁADZE SANITARNE W GALICYI,

Departament sanitarny c. k. Namiestnictwa galio. we Lwowie.

Dr Merunowicz Józef, c. k. radca Dworu, referent sanitarny krajowy.

Biuro sanitarne:

Dr Barzycki Józef, c. k. insp. sanit., radca cesarski.

- » Lachowicz Zdzisław, c. k. inspektor sanit., radca ces.
- » Krzyżanowski Kalikst, c. k. lekarz powiat.
- » Teodorowicz Tadeusz, c. k. lekarz powiat.
- » Szuliński Adam, c. k. konc. sanit.
- » Kubisztal Stanisław, c. k. asyst. sanit.
- » Gąsiorowski Napoleon, c. k. asyst. sanit.

Biuro weterynaryi:

Ponicki Franciszek, c. k. weterynarz krajowy.

Harasymowicz Dyonizy, c. k. inspektor weterynaryi.

Lang Henryk, c. k. starszy weterynarz powiatowy.

Starsi lekarze powiatowi: (VIII ranga).

Dr Gładyszowski Emil, Dr Wągrowski Karol, Dr Zawadziński Stanisław, Dr Serkowski Bolesław, Dr Skibicki Adam, Dr Wurst Adolf, Dr Obtułowicz Ferdynand, Dr Dembowski Mieczysław, Dr Bielański Gustaw, Dr Pietrzycki Antoni, Dr Litwinowicz Orest, Dr Czyżewicz Władysław, Dr Nycz Wincenty, Dr Frydman Zenon, Dr Berggrün Adolf.

Lekarze powiatowi: (IX ranga).

Dr Ciepeliowski Kazimierz, Dr Dorożyński Jakób, Dr Lic Henryk, Dr Jendl-Sausenhofen Ignacy, Dr Filiewicz Jan, Dr Dzikowski Zygmunt, Dr Jabłoński Jacek Stanisław, Dr Hirschler Mieczysław, Dr Coghen Antoni, Dr Danielski Jan, Dr Kramarzyński Mieczysław, Dr Balicki Stanisław, Dr Sobolewski Franciszek, Dr Głowiński Wincenty, Dr Witkowski Edward, Dr Kownacki Józef, Dr Loewy Alojzy, Dr Lebedowicz Emil, Dr Ściborowski Kazimierz, Dr Krzyżanowski Kalikst, Dr Bednarski Jan, Dr Schmidt Filip, Dr Kuhn Adolf, Dr Peters Józef, Dr Friedberg Józef, Dr Opieński Jan, Dr Mośmiłowski Walery, Dr Gawlikowski Stanisław, Dr Wazrzycki Bronisław, Dr Ślączka Antoni, Dr Teodorowicz

Tadeusz, Dr Szczepański Włodzimierz, Dr Pohorecki Władysław, Dr Nycz Henryk, Dr Stokłosiński Franciszek, Dr Karpiński Stanisław, Dr Żukotyński Franciszek, Dr Bory Julian, Dr Hyżycki Cyryl, Dr Milewski Tadeusz, Dr Piotrowski Edward, Dr Fuchs Leon, Dr Biesiadzki Antoni, Dr Gołębiowski Karol, Dr Bąkowski Teofil, Dr Mieroszewski Kazimierz, Dr Haim Leopold, Dr Szaynowski Maryan, Dr Dolnicki Cyryl,

Koncepiści sanitarni: (X ranga).

Dr Mossor Kazimierz, Dr Tyszkowski Leon (przydzielony do minister. spr. wewn.), Dr Małaczyński Roman, Dr Michalik Józef, Dr Lubowiecki Józef, Dr Josse Eugeniusz, Dr Janikiewicz Stanisław, Dr Kurasiewicz Józef, Dr Soniewicki Teodor, Dr Godłowski Aleksander, Dr Mosler Maksymilian, Dr Serkowski Roman, Dr Kowalewski Edmund, Doc. Dr Szuliński Adam, Dr Orski Jan, Dr Kaczyński Stanisław.

Asystenci sanitarni:

Dr Kropaczek Franciszek, Dr Kurzyniec Wojciech, Dr Czerwiński Władysław, Dr Jarocki Piotr, Dr Sobie-
szczański Ludwik, Dr Stablewski Wacław, Dr Baczyński Eustachy, Dr Zatlokal Rudolf, Dr Stangenhau-
s Aleksander, Dr Kondratowicz Andrzej, Dr Kubisztal
Stanisław, Dr Sękiewicz Franciszek, Dr Udziela Ma-
ryan, Dr Palester Henryk, Dr Biliński Mieczysław, Dr
Łobaczewski Adam, Dr Gąsiorowski Napoleon, Dr Me-
runowicz Roman, Dr Goldstaub Bernard.



Prof. Dr Stanisław

Prof. Dr Tadeusz Browicz

KRAKÓW.

IZBA LEKARSKA W KRAKOWIE.

wybrani w 1905 r.

Członkowie Izby:

Zastępcy:

- Dr Schoengut S.
- » Wicherkiewicz B.
- » Langie A.
- » Różecki J.

- Dr Ackermann A.
- » Landau J.
- » Flis K.
- » Gwiazdomorski J.

z Krakowa.

- Dr Gawlik J.
- » Łodziński W.
- » Kijas T.
- » Cwiklicer L.
- » Walczyński J.
- » Jabłoński S.
- » Dietzius A.

- Dr Idziński W.
- » Służewski K.
- » Zieliński E.
- » Zaleski K.
- » Bernadzikowski S.
- » Fijałkowski W.
- » Sawicki A.

Do Izby lekarskiej krakowskiej należą następujące powiaty:

Biała, Bochnia, Brzesko, Brzozów, Chrzanów, Dąbrowa, Dobromil, Gorlice, Grybów, Jarosław, Jasło, Kolbuszowa, Kraków, Krosno, Łańcut, Limanowa, Lisko, Mielec, Myślenice, Nisko, Nowy Sącz, Nowy Targ, Pilzno, Podgórze, Przeworsk, Ropczyce, Rzeszów, Sanok, Strzyżów, Tarnobrzeg, Tarnów, Wadowice, Wieliczka, Żywiec.

....

Towarzystwo lekarskie krakowskie.

Tow. lek. krakowskie założone w roku 1867 na mocy statutu zatwierdzonego reskryptem c. k. Namiestnictwa z d. 12 marca 1867 — obecnie obowiązuje statut z r. 1904. Na mocy statutu zubożeli członkowie czynni, oraz wdowy i sieroty po członkach czynnych mają prawo zapomogi i pensyi stałej z funduszków Tow. lek. galicyjskiego.

Towarzystwo wydaje »Przegląd lekarski« — czasopismo tygodniowe założone w roku 1862 przez ówczesne Towarzystwo naukowe, gdy to ostatnie przeobrażone zostało na c. k. Akademię Umiejętności, »Przegl. lek.« przeszedł w r. 1873 na własność Tow. lek. krak. i od tego czasu staraniem onegoż wychodzi.

Towarzystwo posiada dom własny, zbudowany na gruncie podarowanym przez miasto przy ul. Radziwiłłowskiej 4. Lokal artystycznie urządzony obejmuje salę posiedzeń, bibliotekę, pokoje klubowe, piękny westibul. Oprócz tego znajduje w nim pomieszczenie Izba lekarska, Towarzystwo samopomocy i mieszkanie gospodarza domu. Telefon 524.

Zarząd Towarzystwa spoczywa według § 17 i 18 statutu w rękach komitetu, którego skład w r. 1905 jest następujący:

Prezes: Prof. Dr Julian Nowak.

Wiceprezes: Doc. Dr Maxymilian Rutkowski.

Sekr. stały: Dr Eugeniusz Borzęcki.

Skarbnik: Doc. Dr Stanisław Dobrowolski.

Sekr. doroczny: Dr Tadeusz Pisarski.

Bibliotekarz: Dr Jan Landau.

Gospodarz domu: Doc. Dr Michał Seńkowski.

Przewodnicz. kom. przemysł.: vacat.

Przewodniczący kom. redakcyjnej »Przeglądu lekarsk.«:
Dr Kwaśnicki August.

Podskarbi komitetu redakcyjnego: Prof. Dr Stanisław Ciechanowski.

Przewodnicz. kom. słown.: Prof. Dr Tadeusz Browicz.

WYDZIAŁ LEKARSKI W KRAKOWIE i zakłady tegoż.

Zakład anatomii opisowej.

(Ulica Kopernika 12. Tel. 328).

Dyrektor: Prof. Dr Kazimierz Kostanecki. *Asystent I:* Doc. Dr Adam Bochenek. *Asystent II:* Doc. Dr Emil Godlewski. *Demonstrator I:* Dr Mieczysław Jaworowski. *Demonstrator II:* Edmund Rosenbauch. *Demonstrator III:* Tadeusz Rogalski.

Zakład fizyologiczny.

(Collegium medicum, Ulica Grzegórzecka. Tel. 166 e).

Dyrektor: Prof. Napoleon Cybulski. *Asystent I:* Prof. Dr Stanisław Maziarski. *Asystent II:* Dr Bolesław Rzegociński. *Demonstrator:* Wanda Herzokówna.

Zakład chemii lekarskiej.

(Ul. Kopernika 52).

Dyrektor: Prof. Dr Aleksander Stopczański. *Asystent:* Dr Stanisław Mostowski. *Demonstrator:* Karol Sermak.

Zakład patologii ogólnej i doświadczalnej.

(Collegium medicum, Ulica Grzegórzecka. Tel. 166 d).

Dyrektor: Prof. Dr Karol Klecki. *Asystent:* Dr Adam Wrzosek. *Demonstrator:* Adolf Maciesza.

Zakład anatomii patologicznej.

(Tamże. Tel. 166 b).

Dyrektor: Prof. Dr Tadeusz Browicz. *Asystent I:* Prof. Dr Stan. Ciechanowski. *Asystent II:* Doc. Dr Konrad Gliński.

Zakład farmakologiczny.

(Tamże. Tel. 166 c).

Dyrektor: Prof. Dr Józef Łazarski. *Asystent:* Dr Adam Maciąg. *Demonstrator:* Mag. farm. Jan Rożański.

Zakład higieny.

(Ulica Strzelecka 7. Tel. 302).

Dyrektor: Prof. Odon Bujwid. *Asystenci:* Dr Roman Nitsch, Dr Filip Eisenberg. *Elew:* Zygmunt Klemensiewicz.

Zakład Weterynaryi.

(Ulica św. Jana 20).

Dyrektor: Prof. Dr Julian Nowak. *Asystent:* Doc. Dr Stanisław Droba. *Demonstrator:* Dr Władysław Kania.

Zakład medycyny sądowej.

(Collegium medicum, ul. Grzegórzecka. Tel. 116 f).

Dyrektor: Prof. Dr Leon Wachholz. *Asystent:* Doc. Dr Stefan Horoszkiewicz.

Klinika lekarska.

(Ulica Kopernika 15. Tel. 306).

Dyrektor: vacat. w zast. Prof. Dr Walery Jaworski. *Asystent I:* Dr Józef Latkowski. *Asystent II:* Dr Erwin Mięśowicz. *Asystent III:* Dr Stanisław Szurek. *Demonstrator:* Dr Stanisław Szurek. *Elew I:* Dr Bolesław Krolewicz. *Elew II:* Dr Stanisław Łapiński.

Klinika chirurgiczna.

(Ulica Kopernika 40. Tel. 396).

Dyrektor: Prof. Dr Bronisław Kader. *Asystenci:* Dr Dr Adolf Klesk, Dr Feliks Majewski, Dr Mieczysław Staszewski. *Elew I:* Dr Józef Schlank. *Elew II:* Dr Jan Brzeski.

Klinika okulistyczna.

(Ulica Kopernika 40. Tel. 329).

Dyrektor: Prof. Dr Bolesław Wicherkwicz. *Asystent I:* Dr Wincenty Witaliński. *Asystent II:* Dr Tadeusz Berzowski. *Elew:* vacat.

Klinika położniczo-ginekologiczna.

(Ulica Kopernika 5. Tel. 27).

Dyrektor: R. dw. Prof. Dr Henryk Jordan. *Asystenci:* Dr Edward Cetnarowski, Dr Stanisław Przybylski, Dr Gustaw Wierzbicki.

Klinika chorób dziecięcych.

(W Szpitalu św. Ludwika, ul. Strzelecka 2. Tel. 170).

Dyrektor: Prof. Dr Maciej Leon Jakubowski. *Asystent:* Dr Tadeusz Żeleński. *Demonstrator:* Dr Teodor Cybulski. *Elew:* Dr Władysław Filipkiewicz.

Klinika chorób skórnych i wenerycznych.

(Szpital św. Łazarza).

Dyrektor: Prof. Dr Władysław Reiss. *Asystent:* Dr Jan Stopczkański. *Demonstrator:* Dr Jan Lenartowicz.

Oddział laryngologiczny jako klinika laryngol.

(Tamże).

Dyrektor: Prof. Dr Przemysław Pieniążek. *Asystent:* Dr Franciszek Nowotny.

Ambulatoryum dentystyczne.

(Rynek gł. 22. II piętro).

Dyrektor: Prof. Dr Wincenty Łepkowski. *Asystent:* Dr Kozaczka.

Tamże kursa dentystyki dla lekarzy.

Oprócz powyżej wymienionych prof. dyrektorów zakładów należą do wydziału lekarskiego:

Profesorowie nadzwyczajni:

Stanisław Domański, p. n. *Chorób nerwowych.*

Walery Jaworski, p. n. *Chorób wewnętrznych.*

Stanisław Pareński, p. n. *Chorób wewnętrznych.*

Julian Nowak, p. n. *Weterynaryi.*

Stanisław Ciechanowski, p. n. *Anatomii patologicznej.*

Stanisław Maziarski, p. n. *Histologii.*

Jan Piltz, p. n. *Psychiatrii i neuropatologii.*

Stanisław Ponikło, tyt. prof. *Chorób wewnętrznych.*

Karol Żuławski, tyt. prof. *Psychiatrii.*

Leon Kryński, tyt. prof. *Chirurgii.*

Aleksander Rosner, p. n. *Położnictwa i Ginekologii.*

Ludomił Korczyński, tyt. prof. *Chorób wewnętrznych.*
Wincenty Lepkowski, tyt. prof. *Dentystyki.*
Aleksander Bossowski, tyt. prof. *Chirurgii.*

Docenci prywatni:

Stanisław Braun, (*Położnictwo i Ginekologia*).
Aleksander Baurowicz, (*Laryngologia*).
Michał Seńkowski, (*Chemia*).
Maksymilian Rutkowski, (*Chirurgia*).
Ignacy Lemberger, (*Farmakologia*).
Wacław Chlumsky, (*Chirurgia ortoped.*).
Adam Bochenek, (*Anatomia*).
Franciszek Krzyształowicz, (*Chor. skórne i wener.*).
Emil Godlewski, (*Embryologia anat.*).
Kazimierz Majewski, (*Okulistyka*).
Xawery Lewkowicz, (*Pedynatria*).
Stanisław Dobrowolski, (*Ginekologia*).
Stefan Horoszkiewicz, (*Med. sądow.*).
Stanisław Droba, (*Bakteryologia*).
Konrad Gliński, (*Anatomia patolog.*).

C. K. ZAKŁAD POWSZECHNY DO BADANIA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH.

(Ulica Strzelecka 9. Tel. 303),

Dyrektor: Prof. O. Bujwid. *Nadinspektor:* Prof. Dr
fil. Leon Marchlewski. *Inspektor:* Dr med. Leonard Bier.
Adjunkt: Buraczewski. *Asystenci:* J. Hetper, Matejko.
Kancelista c. k. Namiestnictwa: Karol Jedliński.

SZKOŁA POŁOŻNYCH.

(w Szpitalu św. Łazarza. Tel. 263),

Dyrektor: Prof. Dr Aleksander Rosner, *Asystenci:*
Dr Tymoteusz Piotrowski, Dr Grzegorz Grzybowski,

Szpitala i zakłady leczn. w Krakowie.

Szpital krajowy św. Łazarza.

(ul. Kopernika 17. Tel. Nr. 52, ilość łóżek 766).

Składa się z 9 oddziałów:

- I a i b chorób wewnętrznych,
- II chirurgiczny, (Tel. 33).
- III położniczo-ginekologiczny,
- IV dla chorób ocznych,
- V dla chorób kiłowo-skrónych,
- VI dla umysłowo chorych,
- VII dla chorób zakaźnych.
- VIII dla chorób gardła i krtani.

W szpitalu mieści się klinika chorób skórnych i szkoła położnych.

Dyrektor: Prof. Dr Ponikło Stanisław.

Prymaryusze: Dr Borzecki Eugeniusz (oddział kiłowo-skróny). Prof. Dr Jordan Henryk (oddział położn. ginek.). Dr Krokiewicz Antoni (oddział wewn. B). Prof. Dr Pareński Stanisław (oddział wewn. A). Prof. Dr Pieniążek Przemysław (oddział laryng.). Prof. Dr Reiss Władysław (oddział kiłowo-skróny kliniczny). Dr Bogdanik Józef (oddz. chirurg.). Prof. Dr Wicherkiewicz Bolesław (oddz. okulist.). Prof. Dr Żuławski Karol (oddział dla umysłowo chorych). Prof. Dr Aleksander Rosner (c. k. szkoła położnych). Doc Dr Droba Stanisław (oddział zakaż.).

Sekundaryusze: Torczyński Teofil, Frommer A., Brand Leon, Grünhut Bernard, Czaykowski Antoni, Engländer Bernard, Żmigrod Bolesław, Murczyński Władysław, Laberschek Feliks, Owskiński Józef, Frączkiewicz Jan, Leinkram Michał.

Praktykanci: Grzybowski Grzegorz (asystent), Blassberg Maksymilian, Kwiatkowski Stanisław, Albinowski Alfred, Stopczński Jan (asystent), Jarecki Kazimierz, Kapelner Maurycy, Skórski Włodzimierz, Lewicki Roman, Wyhowski Władysław, Jasiński Rawicz Władysław, Piotrowski Tymoteusz (asystent), Josse Ferdynand, Pi-sarski Tadeusz, Gólski Stanisław, Habicht Kazimierz,

Siegel Samuel, Friedmann Ludwik, Baczyński Teofil,
Obmiński Ksawery, Hilfstein Chaim, Bobrowski Emil.

Szpital Braci Miłosierdzia na Kazimierzu.

(ul. Krakowska 40, ilość łóżek 62. Tel. 127).

Przełożony i zarządca: Bernatek Letus.

Lekarze: Doc. Dr Aleksander Bossowski, (operator).
Dr Jan Frączkiewicz. Dr Adam Langie, (okulista).

Szpital św. Ludwika dla dzieci

(ul. Strzelecka 2. łóżek 120) — Telef. 170

utrzymywany przez Towarzystwo »Opieki szpitalnej
w Krakowie, subwencyonowany przez kraj, składa się
z kilku oddziałów, między tymi oddziały dla chorób za-
kaźnych, osobny oddział dla matek i dzieci karmionych
piersią. W szpitalu mieści się też uniwers. klinika cho-
rób dzieci.

Dyrektor: Prof. Dr M. L. Jakubowski.

Prymaryusz: Dr Franciszek Murdzieński.

Operator: Doc. Dr Max Rutkowski.

Sekundaryusze: Dr Ad. Gettlich, Dr Ferd. Jossé.

Szpital izraelicki na Kazimierzu

(ul. Skawińska 8, ilość łóżek 80. Tel. 282).

Lekarze: Dr Jurowicz I., Dr Kirschner A., Dr Lax,
Dr Landau J., Dr Wachtel Z., Dr Bannet A., Dr Ehren-
preis E.

Tamże amb. chor. usznych Dr Spira; amb. chor.
skór. i wenerycz. Dr Steuermark, Dr Glassner R.

Pryw. Dom Zdrowia dra Jana Gwiazdomorskiego

(ul. Łobzowska 32. Tel. 67).

Przyjmuje chorych obojej płci na wszelkiego rodzaju
choroby, (z wykluczeniem chorób zaraźliwych i umy-
ślowych).

Pryw. Dom Zdrowia dla umysłowo chorych

dra Karola Żuławskiego prof. psychiatrii w U. J. (Długa 82.
Tel. 159).

Lekarz zakładu: Dr Stanisław Jankowski.

Laborat. lekarsko-chemiczne Doc. Dra Seńkowskiego
(ul. Radziwiłłowska 4. Dom «Tow. lek.» Tel. 524).

Zakład ortopedyczny Doc. Dra Chlumskyego
(ul. Mikołajska 28. Tel. 510).

Zakład Roentgenowski Dra Artura Fromera
(ul. Radziwiłłowska 29).

Zakład leczniczy Dra Nartowskiego (św. Anny 2. Tel. 359).

Zakład wodoleczniczy Dra Kupczyka
(ul. św. Agnieszki 5).

Kropla mleka.

Instytucja humanitarna poświęcona higienie wieku niemowięcego, pod kierunkiem lekarskim **Dra Tadeusza Żeleńskiego**, (Rynek, Pałac spiski).

Ambulatoryum powszechne

Dra Cezara Komoroswkiego, (Kraków-Dębniki 112).

Lecznica prywatna

Prof. Dra Wicherkiewicza (ul. Wolska 11. Tel. 286).

LWÓW.

IZBA LEKARSKA WE LWOWIE.

ukonstytuowana w roku 1905.

Prezydent: Dr Edward Festenburg ze Lwowa.

Wiceprezydent: vacat.

Członkowie Wydziału: Dr Henryk Mehrer ze Lwowa

» Jan Papée

» Prof. Włodz. Sieradzki

» Władysław Tatarczuch

Delegat do kraj. Rady zdrowia: Prof. Dr Antoni Mars.

Zastępca: Dr Alfred Bieglmayer.

Członkowie Izby:

Dr Kowalski ze Stryja.

» Mikołajski ze Lwowa.

» Moszkiewicz

» Piaskiewicz z Kołomyi.

Dr Smolarski z Przemyśla.

» Stöckl z Czortkowa.

» Zasadzki ze Szczerowic

» Żukowski ze Stanisławowa.

Zastępcy:

Dr Feuerstein ze Lwowa.

» Sołowij ze Lwowa.

» Świątkiewicz M. ze Lw.

» Szydłowski ze Lwowa.

» Kozłowski z Drohobycza.

» Wilson z Kopyczyniec.

Dr Krasowski ze Stanisławowa.

» Lewicki z Kołomyi.

» Gold ze Złoczowa.

» Ruczka z Niżankowic.

» Witoszyński z Tarnopola.

Do izby lekarskiej lwowskiej należą następujące powiaty:

Boćbrka, Bohorodczany, Borszczów, Brody, Brzeżany, Buczac, Cieszanów, Czorków, Dolina, Drohobycz, Gródek, Horodenka, Husiatyn, Jaworów, Kałusz, Kamionka, Kołomyja, Kosów, Lwów, Mościska, Nadwórna, Pecze-

*) Z czterech okręgów wynik wyboru nie wiadomy.

niżyn, Podhajce, Przemyśl, Przemyślany, Rawa, Rohatyn, Rudki, Sambor, Skałat, Śniatyn, Sokal, Stanisławów, Stary Sambor, Stryj, Tarnopol, Tłumacz, Tremboła, Turka, Zaleszczyki, Zbaraż, Złoczów, Żółkiew, Żydaczów.

TOWARZYSTWO LEKARZY GALICYJSKICH.

Towarzystwo lekarzy galicyjskich liczyło w roku 1904 trzech członków honorowych, 455 czynnych i 17 korespondentów należących do 20 sekcji, z których najliczniejsza lwowska, t. j. Towarzystwo lekarskie lwowskie liczy 186 członków. Towarzystwo prenumeruje dla wszystkich swoich członków „Przegląd lekarski”. Czysty stan czynny majątku Towarzystwa przedstawia z końcem r. 1904 wartość 522.489 k. 46 hal.

W skład Rady Zawiadowczej wchodzi:

Dr Merunowicz Józef, jako *prezes*.

Dr Opolski Wiktor, jako *zast. prezesa*.

Dr Festenburg Edward Gerard, jako *skarbnik*.

Dr Szulistański Adam, jako *sekretarz*.

Dr Edmund Kowalski, Dr Teofil Stachiewicz, Dr Zgórski Kazimierz; Dr Mars Antoni i Dr Gluziński Antoni jako *delegaci Towarzystwa lekarskiego krakowskiego*.

TOWARZYSTWO LEKARSKIE LWOWSKIE:

(tworzy sekcję Towarzystwa lekarzy galicyjskich).

Prezes: Dr Emil Wechsler.

Wiceprezes: Dr Jakób Mahl.

Sekretarz stały: Dr Rencki Roman.

Sekretarz doroczny: Dr Fabian Zawadzki.

Skarbnik: Dr Trzcieniecki Karol.

Gospodarz: Dr Festenburg Edward.

Bibliotekarz: Dr Sieradzki Włodzimierz.

WYDZIAŁ LEKARSKI WE LWOWIE

i zakłady tegoż.

(Ulica Piekarska, 52).

Zakład anatomii opisowej.

(Tel. 685 b).

Dyrektor: Prof. Dr Henryk Kadyi, *Asystent:* Dr Józef Markowski. *Demonstratorzy:* Zdzisław Tomaszewski, Zdzisław Czepielowski.

Zakład histologiczno-embryol.

(685 k).

Dyrektor: Prof. Dr Władysław Szymonowicz. *Asystent:* Dr Jan Grek.

Zakład fizyologiczny.

(685 e).

Dyrektor: Prof. Dr Adolf Beck. *Asystent:* Dr Adolf Gizelt.

Zakład chemii lekarskiej.

(685 f).

Dyrektor: vacat. *Asystent:* Dr Gerson Gittelmacher. *Demonstrator:* Leon Zbyszewski.

Zakład patologii ogólnej i doświadczalnej.

(685 d).

Dyrektor: Prof. Dr Jan Prus. *Asystent:* Dr Teofil Hołobut.

Zakład anatomii patologicznej.

(685 h).

Dyrektor: Prof. Dr Andrzej Obrzut. *Asystent I:* Doc. Dr Kuczera. *Asystent II:* Dr Witold Nowicki. *Demonstrator:* Dr N. Grebel.

Zakład farmakologiczny.

(685 g).

Dyrektor: Prof. Dr Popielski Leon. *Asystent:* Dr Jerzy Modrakowski. *Demonstrator:* Stefan Dąbrowski.

Zakład higieny.

(685 c).

Dyrektor: Prof. Dr Stanisław Bądryński. *Asystent:* Dr Kazimierz Panek.

Zakład medycyny sądowej.

(685 i).

Dyrektor: Prof. Dr Włodzimierz Sieradzki. *Asystent:* Dr Ferdynand Stankiewicz.

Klinika lekarska.

(Tel. 644).

Dyrektor: Prof. Dr Antoni Gluziński. *Asystenci:* Dr Kikinger, Dr Mar. Franke, Dr W. Ziembicki, *Demonstrator:* Dr W. Czernecki, *Elewi:* Dr M. Reichenstein, Dr J. Grek, Dr H. Balabayder.

Klinika chirurgiczna.

(Tel. 599).

Dyrektor: R. dw. Prof. Dr Ludwik Rydygier. *Asystenci:* Vacant. *Elew:* Dr Antoni Rydygier.

Klinika dermatologiczna.

(Tel. 571).

Dyrektor: Prof. Dr Włodzimierz Łukasiewicz. *Asystent:* Dr Józef Świątkiewicz.

Klinika okulistyczna.

(Tel. 577).

Dyrektor: Prof. Dr Emanuel Machek. *Asystent I:* Dr August Dybuś-Jaworski. *Asystent II:* Dr Alfred Burzyński.

Klinika położniczo-ginekologiczna.

(Tel. 623).

Dyrektor: Prof. Dr Antoni Mars. *Asystenci:* Dr K. Bocheński, Dr Tadeusz Czaplicki, Dr Ludwik Daun,

Klinika pediatryczna.

Dyrektor: Prof. Dr Jan Raczyński. *Asystent:* Dr Stanisław Progulski.

Klinika psychiatrii.

Dyrektor: Prof. Dr Halban N.

Oprócz powyżej wymienionych prof. dyrektorów zakładów należą do wydziału lekarskiego:

Prof. nadzwyczajni: Dr Grzegorz Ziembicki (*chirurgia*), (tyt. prof.). Hilary Schramm (*chirurgia*).

Docenci: Roman Barącz (*chirurgia*). Józef Wiczowski (*medyc. wewnętrzną*). Antoni Gabryszewski (*chirurgia*). Władysław Bylicki (*położnictwo*). Fr. Kościński (*położnictwo*). S. Bikeles (*anat. syst. nerwowego*). A. Sołowij (*położnictwo*). E. Kowalski (*wodolecznictwo*). A. Szulistański (*okulistyka*). A. Gońka (*dentystyka*). Jul. Marischler (*medycyna wewnętrzną*). Rom. Rencki (*medycyna wewnętrzną*). Kuczera Paweł (*anat. patol*). Dr Teodor Bohosiewicz (*dentystyka*). Dr Adam Bednarski (*okulist.*). Dr Maksymilian Herman (*chirurgia*).

Szpital e i zakł. lecznicze we Lwowie.

(Tel. 70).

Krajowy szpital powszechny we Lwowie

składa się: I) z 8 oddziałów przedstawiających razem 835 łóżek;

II) z zakładu położniczo-ginekolog. o 2 oddziałach, 140 łóżek.

III) z oddziału obserwacyjnego dla obłąkanych.

Dyrektor: Dr Starzewski Józef.

Prymaryusze: Prof. Dr Adam Czyżewicz (oddz. położniczy). Prof. Dr Emanuel Machek (oddz. oczny). Dr Wi-

ktor Opolski (oddz. wewn. II). Dr Józef Krzyszkowski (oddz. kiłowo-skórny m.). Dr Edward Sawicki (oddz. wewn. III). Dr Michał Świątkiewicz (oddz. kiłowo-skórny ż.). Doc. Dr Józef Wiczkowski (oddz. wewn. I). Prof. Dr Grzegorz Ziembicki (oddz. chirurg.). Zastępca Dr Arnold W. (oddz. zakaźny).

Prosektor Szpit.: Prof. Dr Obrzut.

SZKOŁA POŁOŻNYCH.

Dyrektor: Prof. Dr Adam Czyżewicz. *Asystent:* Dr A. Czyżewicz junior.

Krajowy Zakład dla obłąkanych w Kulparkowie.

(ilość łóżek 560).

Dyrektor: Dr Władysław Kohlberger.

Prymaryusz: oddz. m. Dr K. Kruszyński.

oddz. k. Dr H. Maliszewski.

Sekundaryusz: Dr J. Woszczyński.

„ Dr R. Zagórski.

Szpitalik dla dzieci św. Zofii.

(łóżek 110).

Dyrektor: Prof. Dr Jan Raczyński.

Prymaryusz oddz. chirurg.: Prof. Dr Hilary Schramm.

„ „ oczn.: Doc. Dr Adam Bednarski.

„ Dr Czarnik.

Sekundaryusz: Dr Stefan Świątkowski.

Szpital żydowski.

(180 łóżek. Tel. 198).

Dyrektor: Dr Melzer.

Prymaryusz oddz. chirurg.: Dr S. Ruff.

„ wewn. Dr Pisek.

Sekundaryusze: Dr Mayer i Dr Korman (mieszka w zakładzie).

Ambulatoryum: ginekolog. — Dr Mayer, oczne — Dr Zion, uszne — Dr Reinhold, skórne — Dr Heschelès, dziecięce — Dr Lilien.

Szpital dla nieuleczal. chorych fund. im. Bilińskich.

(ul. Bilińskich 13. Tel. 212).

Poliklinika powszechna.

we Lwowie, Lindego 5.

założona przez Towarzystwo Lecznicy powsz. we Lwowie.

Dyrektor: Dr Władysław Tatarczuch. *Zastępca Dyrektora:* Dr Bronisław Skałkowski. *Członkowie Wydziału:* Dr Barącz, Dr Gońka, Dr Trzciniecki, Dr I. Feuerstein, Dr Szydłowski.

Lekarze ordynujący na oddziałach.

Oddział chorób wewnętrznych: Dr Zajączkowski, Dr Zgórski.

Oddział chorób nerwowych: Dr Feuerstein.

Oddział chirurgiczny: Docent Dr Barącz, Profesor Dr Wehr, Dr Ruff.

Oddział ginekologiczny: Dr Hojnacki, Dr Sielski, Dr Skałkowski.

Oddział chorób dzieci: Dr Kucharski, Dr Szydłowski.

Oddział chorób gardła i nosa: Dr Mahl, Dr Trzciniecki.

Oddział oczny: Dr Kicki, Doc. Dr Szuliśławski.

Oddział dentystyczny: Dr Bienkowski, Doc. Dr Gońka.

Oddział chorób wenerycznych i skórnych: Dr Tatarczuch.

Zakład ortopedyczny.

Doc. Dr A. Gabryszewskiego — Pl. Maryacki 10.

Zakład wodoleczniczy „Maryówka“.

(Tel. 572).

Lekarz zakładowy: Dr Zakrzewski J.

Zakład dla kąpiei mineralnych sztucznych i wzięwań

Bratkowskiego — ul. Skrzyńskiego 10.

Lekarz zakładowy: Dr Oskar Pilewski, ul. Zielona 3.

Pryw. Zakład dla obłąkanych i nerwowych.

Dr Dobińskiego — asystent Dr Świątkowski Jan.

(żelazna woda), ul. Łukiewicza 6. Tel. 385.

Pryw. Zakład wodoleczniczy i sanatorium.

Dra A. Majewskiego — ul. Dwernickiego 3. Tel. 189.

Zakład ortopedyczny.

Dra E. Piaseckiego — ul. 3 maja 2.

Pryw. Zakład wodoleczniczy „Kisielka“

Doc. Dra Kowalskiego Edmunda.

Dom Zdrowia dra Kazimierza Soleckiego.

Ul. O. Hausnera. 11. Tel. 678.

ZAKŁADY KROWIANKOWE

Prof. Dra Barańskiego, Prof. Kretowicza.

AKADEMIA WETERYNARYJNA

we Lwowie, ul. Kochanowskiego 15. Tel. 125.

Akademia założona w roku 1881, początkowo jako szkoła średnia, została zreformowaną i przemienioną w szkołę wyższą w roku 1897. — Warunki przyjęcia: świadectwo dojrzałości. — Nauka trwa 4 lata, w ciągu tego egzamina roczne i 3 rygorozą poczem dyplom lekarza weteryn. Skład:

Prof. Dr med. i weter. Józef Szpilman (Klinika wewnętrzna). — Rektor A. W.

Prof. Dr med. i weter. Antoni Barański (hodowla, położnictwo, weter. sądowa).

Prof. Magister weter. Stanisław Królikowski (Klin. chir.).

Prof. Dr. filoz. Józef Nusbaum (anatomia, embryol., histol.).

Prof. nadzw. Dr med. i weter. Mieczysław Grabowski (patol. ogólna i anatomia patol.).

Prof. n. Dr med. Gustaw Piotrowski fizjologia, farmakolog., toksykolog.).

Adjunkt: vacat.

Nauczyciel kucia koni, lekarz weteryn. Paweł Kretowicz, (choroby kopyta, kuźnia).



Spis lekarzy według miejsca zamieszkania.

Kraków.

- D. Ackermann A. (*ch. kob.*),
Floryańska 23. Tel. 349.
Albinowski Alfred. Kolejowa 18.
Aronsohn J., Sebastyana 22, (w lecie w Krynicy).
Baczyński T., Klinika wewnętrzna.
Bannet A. (*okul.*), Plac WW. Świętych 11.
Baschkopf J. (*sk. i wen.*), Floryańska 25.
Baurowicz A. (*chor. gardła, nosa i usz.*), Rynek gł. 16. Tel. 191.
Berezowski T., Klinika okulista.
Bernaciński F. (*lek. m.*), Stradomska 2. Tel. 531.
Bielański G. c. k. s. l. p., Studencka 11.
Bielawski Jan, Wolska 7.
Bier L., Kolejowa 4.
Blasberg M., Dietla 49. Tel. 457.
Bobkiewicz H., Mały Rynek 3.
Bobrowski E., Plac Matejki 9.
Bochenek A., Kopernika 12.
Boczar S. (*ch. sk. i w.*), Szczepańska 3.
Bogdanik Józef, (*chir.*), Wielopole 4.
Borzęcki Eug. (*chor. sk. i wen.*), Floryańska 33.
D. Bossowski A. (*chir.*), św. Marka 20. Tel. 292.
Brand Leon, Szpital św. Łazarza. Tel. 33.
Braun S. (*chor. kob.*), Dietla 95. Tel. 221.
Browicz T. (*ch. usz i nosa*), Krupnicza 5. Tel. 197.
Brudzewski K. (*okulista*), Floryańska 38.
Bujwid Odon, Lubicz 28. Tel. 301.
Buzdygan M., (*ch. wewn.*), Bracka 8.
Cercha M. (*chor. kob.*), Sławkowska 4. Tel. 35. (w lecie w Krynicy).
Cetnarowski E., Kl. poł.
Chlumsky W. (*ortopedyja*), Mikołajska 28. Tel. 540.
Cholewicz F., Mikołajska 11.
Chotiner I., Gertrudy 17.
Ciechanowski S., Wielopole 4. Tel. 93.
Czaykowski A., Szpital św. Łazarza. Tel. 52.
Cybulski T. (*chor. dzieci*), Długa 17., Tel. 674.
Cybulski N., (*dentysta*), Basztowa 5. Tel. 318.
Czerny Ed., (*chor. kob.*), Sławkowska 25.
Dattner H., Gertrudy 10.
Dembowski M., Radziwiłłowska 17.
Dobrowolski S. (*ch. kob.*), Podwale 2, Tel. 568.

- D. Domański S., (*ch. nerw.*),
Szczepańska 9. Tel. 108.
Droba S., Floryańska 33:
Drożdż B., św. Jana 11.
Dundacek F. (*dentysta*),
Św. Anny 4.
Dylewski W., Grzegórze-
cka 22.
Ehrenpreis E. (*ch. kob.*),
Gertrudy 9. Tel. 347.
Eichhorn F., 1. kol. półn.,
Starowiślna 6. Tel. 120.
Eisenberg F., Lubicz 28.
Engländer B., Starowi-
ślna 4. Tel. 471.
Filipkiewicz S., Kolejowa
18, (w lecie w Trenczy-
nie).
Filipkiewicz Wł., Szpital
św. Ludwika.
Flis Kaz., Rynek gł. 9.,
Tel. 405.
Frenkel H., Piotra Micha-
łowskiego 13.
Friedman L., św. Sebe-
styana 9. Tel. 452.
Frommer A., Radziwiłł.
29, (Zakład roentgen.).
Frączkiewicz J., Floryań-
ska 47. Tel. 485.
Gertler M., Gertrudy 18.
Tel. 399.
Gettlich A. (*chor. dzieci*),
Floryańska 53.
Glassner R., Szpital żyd.
Gliński L. K., Collegium
medic. Tel. 166 b.
Godlewski E., Kopernika
12.
Godlewski M., (*chor. wew.*)
Groble 12.
Gogulski J., Starowiślna 8.
Goldberg H., Nad Ruda-
wą 15.
Gólski S., Basztowa 17.
Górski K., Sławkowska 30
Grażynski E., (*ch. dzieci*),
Kolejowa 12. Tel. 436.
Grabowicz W., św. Jana
15, (w lecie w Jaśkowi-
cach).
- D. Grünhut B., Dietla 43.
Grzybowski G., Szkoła
położn. Tel. 265.
Gwiazdomorski J., Siemi-
radzkiego 1 (Dom zdro-
wia). Tel. 67.
Habicht Kazimierz, Szpi-
talna 4.
Herlinger M., Szpital św.
Łazarza.
Hilfstein H., Skawińska 8.
Hirsch D., Krakowska 17.
Hirsch H., (*chor. wewn. i
dzieci*) Zielona 7. Tel. 547.
Horoszkiewicz S., 1. sąd.,
pl. Matejki 12.
Hoyer H., Basztowa 27.
Jabłoński A., św. Marka
23, 1. kol. p.
Jakobsohn L., Ogrodowa
1. 3.
Jakubowski M., Podwale
10. ch. dz. tylko konsi-
lia.
Jankowski S., 1. sąd. (*ch.
umysł.*), Szewska 9. Tel.
655.
Jarecki K., Św. Marka 7.
Jasieński W., Topolowa
22.
Jaugustyn S. (*chor. kob.*),
Sławkowska 20. Tel. 202.
Jaworowski M., Niecała 6.
Jaworski W. (*ch. wewn.*),
Starowiślna 10. Tel. 447.
Jordan H. (*chor. kob.*),
Sławkowska 1. Tel. 210
Josse Ferd., Radziwiłłow-
ska 4.
Junger J., Krakowska 13.
Jurowicz I., Stradom 17.
Kader B. (*operator*), Ba-
sztowa 4. Tel. 381.
Kapellner M., Szpital św.
Łazarza.
Kaufmann M., Floryań-
ska 47, (w lecie w Ma-
ryenbadzie).
Kaufmann O., Topolowa
30, (w lecie w Karlsba-
dzie).

- D. Kedzior W., (*ch. wewn.*),
Podwale 9. Tel. 70.
- Kirkor M., Klinika chir.
Kirschner A., Dietla 55.
- Klecki K., Karmelicka 29.
- Kłęsk A., Klinika chirurg.
Komorowski C., Szp. św.
Łazarza.
- Kopff L., Straszewskiego
21, (w lecie w Krynicy).
- Korczyński L. (*ch. wewn.*),
Kopernika 2. Tel. 440,
(w lecie w Szczawnicy).
- Korolewicz B., Klinika
wewn.
- Kostanecki K., Kolejowa
10. Tel. 214.
- Kozłowski M., (*sk. i wen.*),
Sławkowska 18.
- Kraft L., Topolowa 34.
- Kramarzyński K., 1. m.
k. ch., Mikołajska 26.
- Krokiewicz A. (*ch. wewn.*),
Kapucyńska 5. Tel. 454.
- Królikowski J., Grzegó-
rzecka 26.
- Krongold W., Gertrudy
13. Tel. 455.
- Krzyształowicz F. (*ch. sk.
i wen.*), Basztowa 10. Tel.
326.
- Kuncec H., Sławkowska.
- Kupczyk B. (*chor. nerw.*),
Szujskiego 11.
- Kurkiewicz S. (*ch. wewn.*),
Szpitalna 24.
- Kwaśnicki A. (*ch. dzieci*),
Basztowa 4. Tel. 252.
- Kwiatkowski S. B., (*chor.
wewn.*), Graniczna 9.
(w lecie w Marynbad.).
- Kwiatkowski S. G., Św.
Krzyża 3.
- Laberschek F., Plac Ma-
tejki 3.
- Landau J., (*chor. dzieci*),
Grodzka 69. Tel. 267.
- Landau R. (*chor. dzieci*),
Dietla 47. Tel. 491.
- Langie Adam (*okulista*),
Sławkowska 31.
- D. Latkowski Józef, Klinika
wewn. Tel. 342.
- Lauer Alex., Stradomska
1. 9.
- Lachs J., Jasna 5. Tel. 235.
- Leinkram M., Krakowska
33.
- Lemberger I., Garbarska
13.
- Lenartowicz Jan, Radzi-
wiłłowska 9.
- Lewkowicz K. (*ch. dzieci*),
Łazienna 3. Tel. 521.
- Lewicki R., Szpital św.
Łazarza.
- Liebermann E. (*okulista*),
Floryańska 20.
- Liebeskind J. (*chor. kob.*),
Dietla 79. Tel. 403.
- Luster L. (*kosmetyka*),
Grodzka 35.
- Lustgarten L., Grodzka
60. Tel. 270.
- Lustig S., Krakowska 35.
- Łapiński S., Klin. wewn.
- Łazarski J., Dietla 97.
- Łepkowski W. (*dentysta*),
Straszewskiego 26. Tel.
239.
- Lobaczewski A., Podwa-
le 13.
- Łopaciński M. (*ch. wewn.*),
św. Marka 5.
- Maciąg A., Colleg. med.
- Majewski F., Kopernika
40.
- Majewski K. (*okulista*),
Szczepańska 11.
- Marcisiewicz F. (*okulista*),
Wiślna 10.
- Matzke H. (*dentysta*), Plac
Dominikański 1.
- Mayzel T. (*ch. sk. i wen.*),
Szewska 21.
- Maziarski S., Karmelicka
33.
- Mączka T., Floryańska 31.
- Mendelsburg H., Rynek
15.
- Merz A. (*chor. dzieci*), Ko-
lejowa 8. Tel. 442.

- D. Mięśowicz E., Klinika wewnętrzna. Tel. 342.
 Mitschka K., Felicjanek 15.
 Misky E., Dolne Mł. 9.
 Mostowski S., Kopernika 12.
 Murczyński W., Mały Rynek 7.
 Murdziński F. (*ch. dzieci*), Szpitalna 36. Tel. 102.
 Münz E., Sławkowska 4.
 Nartowski M. (*ch. nerw.*), św. Anny 2. Tel. 359.
 Nitsch R., Lubicz 28.
 Nowak J., Graniczna 9.
 Nowak D., Aryańska 4.
 Nowotny F. (*chor. krtani*), Wielopole 4.
 Obmiński X., Szpital św. Łazarza.
 Owsiniński J., Szpital św. Łazarza.
 Ozga Jan, Niecała 9.
 Pareński S. (*ch. wewn.*), Wielopole 4. Tel. 208.
 Pawlica Wł., Szpital św. Łazarza.
 Piątkowski M. (*ch. wewn. i uszu.*), Szewska 19.
 Pieniążek P. (*ch. gardła*), Bračka 10. Tel. 164.
 Piepes W. (*dentysta*), Rynek 13.
 Pilz J. (*chor. umysł.*) Kar-melicka 6.
 Piotrowski T., Rakowicka 3. Tel. 523, (w lecie w Żegestowie).
 Pisarski T. F., Długa 23.
 Pluciński M., Podwale 2.
 Ponikło Stan., Basztowa 25. Tel. 192.
 Pożniak S. M., (*lek. kol.*), Kolejowa 13. Tel. 474.
 Pretzel G. (*dent.*), Floryańska 5.
 Przybylski S., Klin. poł.
 Radecki P., Mikołajska 4.
 Rapaport L., Wielopole 1. 6.
 D. Reiss W. (*ch. skór. i wen.*), Basztowa 25.
 Riedmüller B., Garbarska 8.
 Rosenblatt E. (*ch. dzieci*), Basztowa 25. Tel. 199.
 Rosner A. (*ch. kob.*), św. Jana 3. Tel. 82.
 Różecki J. (*chor. wewn.*), Floryańska 19. Tel. 370.
 Rzegociński B., Radziwiłłowska 29.
 Rutkowski M. (*operator*), Basztowa 6. Tel. 371.
 Rydel A. (*ch. nerw.*), Podwale 10. Tel. 573.
 Satkowski Z., Długa 31.
 Schaitter I., I. m. i sąd., Grodzka 62. Tel. 87.
 Scharf J., Starowiślna 34.
 Schermant J., Stradomska 15, (w lecie w Maryenbadzie).
 Schlank J., Kopernika 20.
 Schmidt S., Piotra Michałowskiego 74.
 Schneider L. (*ch. wewn.*), Floryańska 34. Tel. 287.
 Schoengut S. (*ch. uszu*), Pijarska 9. Tel. 171.
 Schudmak A. (*chor. żołą.*), Sebestyana 22.
 Schumann F. (*dentysta*), Rynek 29.
 Schwarz A. (*ch. sk. i wen.*), Floryańska 38.
 Sędziowski J., Rynek 44.
 Seńkowski M., Radziwiłłowska 4. Tel. 524. (labor. chem. lek.).
 Siegel Sam., Długa 17.
 Silberstein A., Miodowa 7.
 Skobel S. (*ch. sk. i wen.*), Rynek gł. 23.
 Skórski W., Radziwiłłowska 21.
 Skórczewski B., Batorego 18, (w lecie w Krynicy).
 Śliwiński M., Mikołajska 4. Tel. 276, (w lecie w Rymanowie).

- D. Stapa W., (*ch. dzieci*), Kolejowa 4. Tel. 34.
 Smolarski W., Rynek 45. Tel. 410.
 Sokołowski H., Szewska 12.
 Spira R. (*ch. uszu*), Grodzka 51.
 Stahr E., Kolejowa 7.
 Staniszewski J., św. Jana 28. (w lecie w Iwoniczu).
 Stankiewicz W. (*ch. kob.*), Kolejowa 1.
 Staszewski M., Kopernika 40.
 Steinberg B., Rynek 14.
 Steuermark Z. (*ch. skór. i wen.*), św. Jana 2.
 Stopczkański A., Kopernika 7.
 Stopczkański J., Szp. św. Łazarza.
 Supiński E., Pańska 10. (w lecie w Rabce).
 Surzycki J. (*ch. wewn.*), Franciszkańska 1. Tel. 156.
 Süsskind A., Grodzka 4.
 Syrop J. (*dentysta*), Plac WW. Świętych 9.
 Szewczyk J., Floryńska 13.
 Szurek S., Kopernika 15.
 Teichmann A., Grodzka 61, (w lecie w Piszczanach).
 Tokarski S., Wolska 3.
 Torczyński T., Szp. św. Łazarza. Tel. 52 c.
 Trembecki H., Rakowiecka 9.
 Trzcĩński B., Pijarska 2.
 Tyszecki T. (*dentysta*), Jagiellońska 5.
 Uromski H. (*dentysta*), Sławkowska 23.
 Wachholz L., lek. sąd., Basztowa 25.
 Wachtel Z. (*chir.*), Grodzka 32.
 Wachtel Z. (jun.), szpital żydowski.
 D. Warzycki B., c. k. l. pow. Radziwiłłowska 20.
 Wąsowicz Z. (*ch. wewn.*), Floryńska 44, (w lecie w Krynicy).
 Wernikowski W. (*dent.*), Rynek 6. Tel. 357.
 Wicherkiewicz B. (*okul.*), Wolska 11. Tel. 286.
 Wierzbicki G., Klin. pol.
 Wilczyński L. (*ch. wewn.*), Podwale 1.
 Wilkosz A., fizyk miejs., Mały Rynek 4. Tel. 217.
 Witaliński W. (*okul.*), Klinika okulistyczna.
 Wojciechowski B., (*ch. kob.*) Podwale 9. Tel. 362.
 Wójtowicz E., Bernardyńska 9.
 Wrzodek A., Wielopole 8.
 Wychowski Wł., Jagiellońska 9.
 Zanietowski J., Batorego 1.
 Zaremba G., Szpital św. Łazarza.
 Zeitner Józef, Dietla 73, (w lecie w Francensbadzie).
 Ziarko J., (*chor. wewn.*), Długa 7.
 Ziemiński M., Karmelicka 3.
 Zoll. J., st. 1. kol. p., (*ch. kob.*), Rynek 9. Tel. 254.
 Zopoth A., *l. m.*, Rynek Kleparski 5. Tel. 218.
 Żeleński T. (*chor. dzieci*), Karmelicka 6. Tel. 618.
 Żmigrod B., Karmelicka 9.
 Żuławski K. (*ch. umysł.*), Długa 82. Tel. 159.
 Żydlowicz W. (*chor. skór. i wen.*), Floryńska 22.
 Dentyści-lekarze:
 Cybulski N., Basztowa 5. Tel. 318.

- D. Dundaczek F., św. Anny 4.
 Lępkowski W., Straszewskiego 26. Tel. 239.
 Matzke H., Plac Dominikański 1.
 Piepes W., Rynek 13,
 Pretzel G., Floryańska 5.
 Schumann F., Rynek 29.
 Steinberg B., Rynek 14.
 Syrop J., Plac W.W. Świętych 9.
 Tyszecki T., Jagiellońska 5.
 Uromski H., Sławkowska 23.
 Wernikowski W., Rynek gł. 6. Tel. 357.

Dentyści-technicy:

- Dłużyński Jan, Floryańska 12.
 Hrebenda Wład., Szpitalna 20.
 Lipoński Wł., św. Krzyża 5.
 Łukaszewicz K., Sławkowska 8.
 Matuszewski H., Stolarska 13.

Lwów.

- Adler A., Bartosza Głowackiego 8.
 Arnold W., Kochanowskiego 15 a. (*nie prakt.*).
 Aschenazy Z., Kamienna 3.
 Auerbach E., Krakowska 14.
 Bader W., Kochanowskiego 1 d.
 Balabayder H., Klin. lek.
 Bałaban T., Wałowa 7. (*Okulistyka*).
 Barański A., (*prof. Ak. wet.*) Chorążczyzna 24.
 Barański B., Łyczakowska 39 A. (*Chirurgia*).
 Barącz R., Teatralna 11. (*Chirurgia*).

- D. Barzycki J., Kraszewskiego 23.
 Bądryński Stan., Gosiewskiego 4.
 Beck Ad., Zyblikiewicza 4.
 Bednarski Ad., Akademicka 5. (*Okulistyka*).
 Berezowski K., Kraszewskiego 23.
 Berger H., Sykstuska 8.
 Bett M., Kazimierzowska 37, 1. k. ch.
 Biber L., Brajerowska boczna 4. (*Chirurgia*).
 Bieńkowski B., Kościuszki 8. (*Dentystyka*).
 Bierer R., pl. Smolki 5.
 Biernacki E. Piekarska 42.
 Bikeles G., Rynek 43.
 Binder A. (*st. l. wet.*) Kurkowa 27.
 Blumenfeld A., Kopernika 28.
 Blaum St., Klinika chor. wewn.
 Błachowski K., Zyblikiewicza 33.
 Bocheński K., Klin. położ. (*Położn. i gin.*).
 Bohosiewicz T., Jagiellońska 7. (*Dentystyka*).
 Borzęcki Wład., Grodzickich 4.
 Breiter R., Trz. Maja 11. (*położn. i ginek.*).
 Brill M., pl. Akademicki 4.
 Bylicki W., Bielowskiego 5. (*Położn. i ginek.*).
 Bund Marek, Zamarstynowska 34.
 Buraczyński A., Czarnecka 6.
 Burzyński A., Klin. okul. (*Okulistyka*).
 Chajes H., Żulińskiego 3.
 Chajes J., Sykstuska 24.
 Chądzyński J., Sobieskiego 4.
 Chomin A., Zimorowicza 3.
 Chuderski F., Plac św. Jura 5.

- D. Czaczkowski J., Mickiewicz 4.
 Czaplicki T., Klin. poł.
 Czarnik St., Łyczakowska 9
 Czepielowski St., Piekarska 52.
 Czernecki W., Bielowskiego 1.
 Czyżewicz A., Cłowa 2., (*położn. i ginek.*).
 Czyżewicz A. jun., p. Pi jarów 15.
 Dach E., Chorażczyzna 5.
 Damański E., Piekarska 9, (w lecie w Iwoniczu).
 Dattner J., Jagiellońska 11 a.
 Daun L., Klin. położ.
 Dekański St., Sokoła 3.
 Dębicki Kl., Piekarska 6.
 Dobiński Wł., Łukiewicza 6.
 Doliński E., Głowińskie go 3,
 Draho koupil G., św. Szymona 1.
 Dubanowicz P., Łyczakowska 97.
 Dukiet J., Słowackiego 16.
 Dybuś Jaworski, Kl. okul. (*Okulistyka*).
 Ehrlich D., Sykstuska 17.
 Elektorowicz E., Łyczakowska 3., 1. m. II obw.
 Elias z - Radzikowski St. Batorego 12.
 Fels Isr., Słoneczna 1.
 Festenburg Ed., Domini kańska 11. (*Poż. i gin.*).
 Feuerstein Izyd., Sienkiewicza 3.
 Feuerstein L., Sieukiewicza 3.
 Feuerstein Neuman Nachman, Gródecka 1.
 Fiałkowski L., Żółkiewska 70.
 Fibich Stanisł., Franciszka 12.
 Filimowski L., Klin. poł.
- D. Franke Mar., Bielowskie go 5.
 Frankowski W., Pańska 27, 1. m. III obw.
 Fried A., Wałowa 11.
 Frisch J., Pasaż Hausmana 8. (*Sk. i wen.*).
 Fruchtmann Fran., Hetmańska 12. (*Dentystyka*).
 Fuchs St., pl. Maryacki 9. (*Dentystyka*).
 Gabel W., Gródecka 85.
 Gabryszewski A., Batorego 36. (*Chirurgia, ortopedia*).
 Gansl K., Hausnera 16.
 Gąsiorowski N., Pańska 21.
 Gębarzewski Z. L., Sapiehy 25. (*Położn. i ginek.*), 1. k.
 Gidlewski M., Kleinowska 3.
 Gizelt Ad., Żulińskiego 9.
 Gluziński A. Piekarska 14.
 Gluziński L., Wałowa 14.
 Głowacki B., Batorego 24.
 Gońka A., Kopernika 1. (*Dentystyka*).
 Gostyński J., Zyblikiewicza 10.
 Gracka J., Żółkiewska 71, 1. k.
 Graf J., Żółkiewska 29.
 Grek J., Piekarska 52.
 Grelński A., Sykstuska 37.
 Gröbel M., Sykstuska 28.
 Groman K., Piekarska 22.
 Gross K., Boimów 5.
 Grossman M., Kurkowa 3.
 Gruder L., Sienkiewicza 5. (*Okulistyka*).
 Gruszkiewicz J., Łyczakowska 19. (*Okulistyka*).
 Gürsching T., Hausnera 18.
 Haisig K., Pańska 6.
 Hamburger J., Radecka 6. (*Okulistyka*).
 Hescheles I., Słowackiego 3.

- D. Herman M., Łyczakowska 5. (*Chirurgia*).
 Hermelin E., Sykstuska 23.
 Hojnacki Wł., Słowackiego 2. (*Położn. i ginek.*).
 Hołobut T., Piekarska 52.
 Hornung K., 29 listop. 16.
 Jakubowski K., Kl. Tańskieję 3.
 Janacek J., Brajera 11.
 Janda Fr., Zielona 6.
 Jankowski W., Hetmańska 6. (*Dentystyka*).
 Jasiński St., Kamienna 1.
 Jaszczurowski K., L. Sapiehy 9, 1. m. V okr.
 Kaczorowski Br., Chorążczyzna 10. (*Dentystyka*).
 Kadyi H., Zielona 15.
 Kapper F., pl. Bernardyński 2.
 Karchezy E., Zyblikiwicz 18. (*Chirurgia*).
 Kasperek J., Ujejskiego 6.
 Kicki T., Teatralna 12. (*Okulistyka*), okul. m.
 Kielanowski B., Skarbowska 1.
 Kikinger E., Klin. 1ek.
 Klein L., Sykstuska 56 A.
 Kobylański A., Domsa 6.
 Kobryński W., Kościuszki 24.
 Koczyrkiewicz M., Supińskiego 2.
 Kołaczkowski A., Pańska 4. (w lecie Karsbad).
 Korman J., Grodzickich 1.
 Koźmiński F., Akademicka 26. (*Położ. i ginek.*).
 Kossak L., Wałowa 31.
 Kowalski E., Akademicka 11.
 Krasucki K., Pl. Jura 83.
 Krobicki T., Wałowa 23, 1. m. VII okr.
 Krygowski T., Trzeciego Maja 2.
 Krzyszkowski K., Krzywa 12.
 D. Krzyżanowski K., Zyblikiwicz 42.
 Kruszyński K., Słowackiego 16, (w lecie w Szczawnicy).
 Kruszyński Wł., Chorążczyzna 25.
 Kubisztal Stan., Piekarska 51.
 Kucharski P., Pl. św. Antoniego 7.
 Kuczera P., Piekarska 52.
 Kułakowski R., Łyczakowska 19.
 Kwiatkiewicz St., Pl. Bernardyński 12 A. (*Położn. i ginek.*).
 Lachowicz Z., pl. Trybunański 1.
 Landau F., Karola Ludwika 29.
 Lateiner E., Kopernika 9. (*Dentystyka*).
 Lauterstein L., Sykstuska 30.
 Lebenhart E., Lenartowicza 12.
 Legieżyński W., św. Michała 6, f. m.
 Leńko Z., Bielowskiego 6. (*Chirurgia*).
 Leszczyński R., Kręta 6.
 Lewicki St., (w lecie w Krynicy).
 Lewin A., Gródecka 58.
 Lickendorf I., Piekarska 11, 1. k. ch.
 Lilién N., Trzeciego Maja 10.
 Link I., Pasaż Hausmana 9. (*Chirurgia*).
 Litwinowicz T., Rzeźbiarska 1 A.
 Longchamps de Berier, Sapiehy 10. (*Chirurgia*).
 Ludwig A., Akadem. 16.
 Lukas A., Blacharska 8.
 Łukasiewicz Władysław, Kraszewskiego 5. (*Skór. i wen.*).

- D. Machek E., Akademicka 11. (*Okulistyka*),
 Mahl J., Jagiellońska 24.
 Majewski A., Dwernickiego 8.
 Majewski Al., Zimorowicza 3. (*Chirurgia*).
 Margulies M., Kopernika 9.
 Markowski J., Piekarska 52.
 Marischler J., Kopernika 3. (*Ch.zewn.*).
 Mars A., Kościuszki 18. (*Położn. i ginek.*).
 Mautendorfer Fr., Kleińska 4.
 Mayer J., Wałowa 3.
 Mehrer H., Kościuszki 6.
 Meizels S., Kotlarska 6.
 Merunowicz J., Zamojskiego 16.
 Meschel J., Sykstuska 33. (*Dentystyka*).
 Mikolašek A., Wałowa 8.
 Mintz I., Akademicka 3. (*Dentystyka*).
 Mikołajski S., Śniadeckich 6.
 Modrakowski J., Piekarska 55.
 Moraczewski W., św. Mikołaja 11, (w lecie w Karlsbadzie).
 Moraczewska Zofia, św. Mikołaja 11.
 Mosing St., Szkoła kadecka.
 Moszkowicz J., Akademicka 14.
 Müller E., Łyczakowska 19 A.
 Müller Fr., Jagiellońska 8. (*Chirurgia*).
 Münzer J., Karola Ludwika 37.
 Nowak W., Dom Inwalidów.
 Notz J., Zyplikiewicza 15.
 Nowicki W., Piekarska 52, nie prakt.
- D. Obrzut A., Kraszewskiego 3, nie prakt.
 Obtułowicz F., Trzeciego Maja 21.
 Ogórek Flora, Halicka 20. (*Położn. i ginek.*).
 Opolski W., Wałowa 13.
 Owczarski J., Hoffmana 11.
 Ozarkiewicz E., Korniaaków 11. k. ch.
 Paklikowski Br., Jagiellońska 4.
 Panek K., Piekarska 52, nie prakt.
 Papée J., Piekarska 10, 1. polic.
 Pawlicki A., Hofmanna 9.
 Pfau A., Żółkiewska 26.
 Piasecki E., Trzeciego Maja 2.
 Pilewski O., Zielona 4.
 Piotrowski G., Zyplikiewicza 27.
 Pisek W., Jagiellońska 12.
 Plischke A., Staszica 6.
 Podlewski K., Chorażczynna 16.
 Popielski L., Piekarska 52.
 Praszil T., Gołębia 6, (w lecie w Truskawcu).
 Progulski St., Szp. św. Zofii.
 Prus J., Kościuszki 7.
 Quest R., Pl. Bernardyński 2.
 Raczyński J., Sykstuska 42. (*chor. dzieci*).
 Rappaport M., Jagiellońska 2 A.
 Rappaport S., Sykstuska 9.
 Rapp L., Jagiellońska 7.
 Rechen L., św. Stanisława 6.
 Reich S., Słoneczna 40.
 Reichenstein M., Sykstuska 8.
 Reinhold J., Sykstuska 27.
 Reinhold Z., Sykstuska 27. (*Dentystyka*).

- D. Reiss W., Jagiellońska 17. (*Okulistyka*).
- Reizes D., Kazimierzowska 31.
- Rencki R., Kraszewskiego 3.
- Rentschner E., Krakowska 16.
- Rittigstein H., Skarbkowska 35.
- Riwczes F., Łyczakowska 24 A. (*Chirurgia*).
- Roicki (Berger) A., Zimorowicza 5. (*Sk. i wen.*).
- Rozenzweig L., Trzeciego Maja 7. (*Okulistyka*).
- Rosner I., Chorażczyzna 5. I. m. IV obw.
- Rosner J., Batorego 9, (w lecie w Francensbadzie). (*Położn. i gin.*).
- Roth A., Żółkiewska 15.
- Różański J., Kraszewskiego 11, nie prakt.
- Rubin A., Skarbkowska 7, I. k. ch.
- Ruff S., Kraszewskiego 1. (*Chirurgia*).
- Rydygier A., Pijarów 15.
- Rydygier L., Mickiewicza 8. (*Chirurgia*).
- Sawczyński A., Teatralna 11.
- Sawicki E., Chorażczyzna 22.
- Sawicki Stella J., Długosza 15.
- Schellenberg L., Czarnieckiego 12. (*Położn. i ginek.*).
- Schmelkes M., Brajerowska 6.
- Schneider K., Brajerowska 3.
- Schneider N., Mickiewicza 5.
- Schram H., Sykstuska 22. (*Chirurgia*).
- Senensieb M., Halicka 1. (*Dentystyka*).
- Selzer J., Pańska 9.
- D. Selzer M., Sobieskiego 10.
- Serbeński W., Sykstuska 36, I. miejsk.
- Sielski F., Trzeciego Maja 11, (*Położn. i ginek.*).
- Sieradzki Wł., Czarnieckiego 3.
- Silberstein S., Sykstuska 34, I. k. ch.
- Singer M., Kotlarska 1.
- Skałkowski Br., Kościuszki 14. (*Położn. i gin.*).
- Skrobaczewski P., Zimorowicza 15.
- Słęk Fr., pl. Bernard., (*Chirurgia*).
- Sobelsohn E., Kotlarska 6.
- Sochański J., Pańska 2.
- Sokal J., Łukasieńskiego 4.
- Sokal M., Halicka 15.
- Soleski K., Hausnera 11.
- Sołomowicz J., Hausnera 9.
- Sołowij A., Mickiewicza 3. (*Położn. i ginek.*).
- Sołtysik M., pl. Sienkiewicza 3.
- Spalke Z., Klementyny Tańskiej 1.
- Spitzer J., Kleinowska 5.
- Stachiewicz Teof., Sobieskiego 4.
- Stankiewicz F., Hoffmana Opata 4, (nie prakt.).
- Starzewski J., Krzyżowa 17 A.
- Stauber S., Skarbkowska 2.
- Stocknopf J., Kazimierzowska 20.
- Stroynowski E., pl. Maryacki 6. (*Położ. i gin.*).
- Świątkiewicz M., Grodzickich 1. (*Sk. i wen.*).
- Świątkiewicz J., pasaż Mikolascha.
- Świątkowski J., Łukiewicza 6.
- Świątkowski S., Wałowa 14. (*Ch. dzieci*).

- D. Świtalski M., Akademi-
cka 11.
Szczepański Z., Sakra-
mentek 10 a.
Szczurkowski St., Tea-
tralna 5.
Szpilman J., Akademia
weter.
Sztembarth C., Batorego
26, 1. k. ch.
Szulislawski A., Jagiel-
lońska 8. (*Okulistyka*).
Szuszkiewicz P., Zybli-
kiewicza 33 a. 1. polic.
Szydłowski Zd., Akade-
micka 11.
Szymański H., na Błonie 1.
Szymonowicz Wł., Pań-
ska 14. (*Chor. ucha*).
Tataczuch Wł., Braje-
rowska 20. (*Sk. i wen.*),
1. m. VI obw.
Teodorowcz T., Techni-
cka 1.
Terenkoczy Leop., Zybli-
kiewicza 18.
Thom I., Janowska 52.
Trzcieniecki K., Akade-
micka 11.
Turnau K., Chorażczyzna
6.
Wachłowski Z., Sykstu-
ska 43.
Wachnianin M., Akade-
micka 26.
Wachtel A., Kopernika 20.
Wajgel Eug., Łyczako-
wska 9.
Walach Don., Skarbkow-
ska 3.
Wątarek A., Szeptyckich
30.
Weksler E., Pańska 6.
Wehr W., Trzeciego Ma-
ja 10. (*Chirurgia*).
Weigel J., Akademicka 22.
Wein H., Jagiellońska 17.
(*Położn. i gin.*).
Weinreb M., Sykstuska
23. (*Położn. i ginek.*).
Weissberg L., Szp. pow.
- D. Wernicki J., Karola Lu-
dwika 5.
Wiczkowski J., Kościu-
szki 4.
Wiktor J., Małeckiego 7.
Wilczek K., Nabelaka 24.
(*Chirurgia*).
Willer Abr., Karola Lu-
dwika 31.
Wiśniewski W., Piekar-
ska 52.
Wodecki Z., Unia Lubel-
ska 11.
Wolf Ar., Krakowska 34.
Zabłocki St., plac Ma-
ryacki 9.
Zajączkowski J., Grodzi-
ckich 2.
Zakreys Fr., Gródecka
50 B.
Zalewski T., Sykstuska
35. (*laryng.*).
Zakrzewski J., Długosza
1. Tel. 684.
Zawadil B., Sykstuska 22.
(*Położn. i ginek.*).
Zawadzki Al., Dwerni-
ckiego 3.
Zgórski K., Sokoła 1.
Ziembicki G., Teatralna
10. (*Chirurgia*).
Ziembicki W., Bielo-
wskiego 6.
Zion O., Sykstuska 21.
(*Okulistyka*).
Zipper Arm., Kraszew-
skiego 1.
- Chirurgowie:*
- Beschloss M., Żółkiewska
30.
Blaustein E., Gródecka 52.
Chilf S., plac Benedy-
ktyński 5.
Gabel H., Sobieskiego 24.
Kreiner E., Strzelecka 2.
Kurzer L., pl. Krakowski
12.
Lateiner L., Karola Lu-
dwika 31. (*Dentysta*).

Lisowski M., pl. Halicki
14. (*Dentysta*).
Mark S., pl. Maryacki 8.
(*Dentysta*).
Schnitzer P., plac Hali-
cki 14.

I. Pow. Bialski.

D. Nycz Win., *Biała s. l. p.*
Czyżyk F., » *s. szp.*
Gerber Rud. » (*dent.*).
Hess Ernest, »
Juras Ant. » *pr. szp.*
Kapelusz E., »
Kwieciński M., » *l. m.*
Macher O., »
Sroczyński J., »
Steuer Alf., »
Dworzański K., *Kęty l. m.*
Dziewoński Wł., » *l. o.*
Stanko W., » *em.*
st. l. p.
Schlank Maur., *Oświęcim.*
l. m.
Slosarczyk Ant., »
Wechsler Leop., »
Hanakowski W., »
Keller R., *Wilamowice l. m.*
Miodoński F., *Buczkowice*
l. o.
W. Dziurzyński T., *w. p.*

2. Pow. Bobrecki.

D. Czerwiński K., *Bóbrka*
a. s.
Gabryszewski Tad., »
Bober Jan, *Chodorów l. k.*
Jasilkowski M., »
Dortort Ch., *Wybranów-*
ka l. o.
C. Handt Izydor, *Chodorów.*
Roth Wilh., *Bóbrka l. m.*
Urich S., »
W. Kruczkowski T., *w. p.*

3. Pow. Bocheński.

D. Pietrzycki A., *Bochnia*
s. l. p.

D. Fränkel J., *Bochnia.*
Górski Cz., » *l. sal.*
Nodzyński B., » *s. szp.*
Oświecimski S., *Bochnia*
pr. szp.
Pallaschek F., *Bochnia, s.*
szp.
Gąsiorok F., *Łapanów l. o.*
Ligeża J., *Wiśnicz l. z. k.*
Majewski T., *Niepołomice*
l. m.
Schmidt A., *Łupnica mur.*
l. o.
Zakaszewski W., *Ujście*
solne l. o.
C. Wieselmann M., *Wiśnicz.*
W. Wagner St., *w. p.*

4. Pow. Bohorodczański.

D. Serkowski Rom., *Boho-*
rodzany k. s.
Fereniewicz M., *Bohorod-*
czany l. o.
Żurakowski R., *Sototwina*
l. o.
Seller J., *Sototwina.*

5. Pow. Borszczowski.

D. Mosler M., *Borszczów k. s.*
Kittner J., » *l. m.*
Zathey Wilh. »
Altmann Z., *Jezierzany*
l. m.
Bilwin Z., *Mielnica.*
D. Krauss Ad., *Mielnica l. o.*
Glas J., *Korolówka l. m.*
Seidner Abr., *Skala. l. m.*
W. Gałek Józef, *s. w. p.*
Bartel J.

6. Pow. Brodzki.

D. Friedberg I., *Brody l. p.*
Aufrecht Oz., »
Jung Adolf, »
l. m.
Kalach Feliks »
Schapira Aleks., » *s. s.*
l. m.
Sołtysik St., » *l. k.,*
p. s.

- D. Strumiński Ad. *Brody*.
 Weissmann S. L. » s. szp.
izr.
 Zasadzki St., *Szczurowice*
l. o.
 Ustrzycki Jul., *Podkamień*
l. o.
 Bełzowski M., *Toporów l. o.*
 Landesberg M., *Założce.*
l. m.
 C. Grünfeld Iz., *Brody*.
 Nussbaum M., *Podkamień*
l. m.
 Rager Izidor, *Założce.*
 Rosenbaum Leon, *Łopatyn*
l. m.
 W. Biliński Wł., *st. w. p.*

7. Pow. Brzeski.

- D. Nycz Hen., *Brzesko l. p.*
 Bernacki Fr., » *l. m.*
 Bernadzikowski Sz., *Brze-*
sko.
 Berger Marek, *Brzesko.*
 Knauer W., *Radłów.*
 Grzybczyk St., *Szczurowa*
l. o.
 Łowczowski W., *Wojnicz*
l. m.
 Dujanowicz Z., *Zakliczyn*
l. m.
 Janczy Fr., *Czchów l. o.*
 C. Czernek H., *Wojnicz*
l. m.
 W. Schimer Leon, *w. p.*

8. Pow. Brzeżański.

- D. Skibicki Ad., *Brzeżany*
s. l. p.
 Falk B., *Brzeżany l. k. ch.*
 Kowenicki Adam, *Brzeża-*
ny. pr. szpil.
 Malsburg H., » s. szp.
 Palester H., » a. s.
 Teitelbaum M., »
 Uranowicz Tad., » *l. m.*
 Barban Chaim, *Kozowa,*
l. k.
 Sochanik Stan., » *l. o.*
 Schenker A., *Narajów l. o.*
 W. Waśniewski Fr., *w. p.*

9. Pow. Brzozowski.

- D. Lic Hen., *Brzozów l. p.*
 Niziołek P., » *l. m.*
 Mang Józef, *Dynów. l. m.*
 Misky Edward. *Jasienica*
l. m.
 W. Żuk Wincenty, *w. p.*

10. Pow. Buczacki.

- D. Hirschler M., *Buczacz l. p.*
 Bienenwald J., » *l. m.*
 Feller Aron, »
 Kroo Józef, »
 Krzyżanowski E., » *l. m.*
 Mogilnicki Wł., »
 Nacht Fabiusz, »
 Baczyński A. *Koropiec l. o.*
 Sokal Majer, *Jazłowiec.*
 Deisenberg A., *Jazłowiec*
l. z.
 Obler W. *Monasterzyska*
 Borysiewicz W. »
 Bobek Jan, *Potok Złoty.*
 C. Adler Sz., *Monasterzyska*
l. f.
 W. Strutyński J., *w. p.*

II. Pow. Chrzanowski.

- D. Berggrün Alf., *Chrzanów*
st. l. p.
 Hochbaum O., » *l. m.*
 Rieser Adolf, *Chrzanów,*
l. kl.
 Woynarowski K., » *l. gór.*
 Damski W., *Jaworzno l. gór.*
 Neymand S., »
 Dura J., *Krzeszowice l. s.*
 Walkowski J., » *l. o.*
 Dobrzyński J., *Trzebinia*
l. k. i o.
 Skórkowski J., *Trzebinia.*
l. m.
 Bednarski J., *Alwernia l. o.*
 Górka J., *Siersza*
 Schneck K., *Szczakowa l. f.*
 W. Bogdan Grzegórz, *w. p.*

12. Pow. Cieszanowski.

- D. Piotrowski E., *Cieszanów*
l. p.

D. Konera S., *Lubaczów pr. sz.*
i l. k.

Potochajło J., » s. s.

Rosenblüth E., » l. m.

Mildner Józef, *Oleszyce.*

Sochacki L., *Narol l. o.*

Hryniewiecki J., *Dzików*
l. o.

C. Rotter A., *Cieszanów l. m.*

W. König Pinkus, *w. p.*

13. Pow. Czortkowski.

D. Wągrowski K., *Czortków*
s. l. p.

Bubeniczek Fr., »

Hausvater Jakób, »

Blaustein Józef, »

Stoekl Adolf, »

l. m. i k.

Lutyński L., *Jagielnica*

l. f. i k.

Stoklasa J., *Białobóżnica*

l. o.

C. Oestersetzer A., *Czortków.*

W. Atlas H., *w. p.*

14. Pow. Dąbrowski.

D. Kurzyniec W., *Dąbrowa*
a. s.

Millet Abr., *Dąbrowa.*

Garbusiński S., »

Przybyszewski W., *Żabno*

l. m.

Rudnicki Karol, *Szczucin.*

W. Łukaszewski Andrzej,

w. p.

15. Pow. Dobromilski.

D. Bory Jul., *Dobromil l. p.*

Cwiklicer Ludw., » l. s.

Goldstaub B., » a. s.

Puchalski Szczp., » l. o.

Marynowski Józef, *Bircza*

l. m.

Dornfest Abr., *Bircza.*

Górski St., *Rybotycze l. o.*

Jaremkiewicz M., *Krościen-*

kó ad Chyrów l. o.

C. Brauner Leon, *Dobromil.*

W. Stupnicki Antoni, *w. p.*

16. Pow. Doliniański.

D. Peters Józef, *Dolina l. p.*

Kotłowski Stan., »

Kosterkiewicz J., » l. m.

Nowak Józef, *Wygoda l. f.*

Berwid Bol., *Rożniatów l.*

f. i o.

Sekanina Jan, *Rożniatów.*

Krzyształowicz A., *Wet-*

dzierz l. o.

Müller Rudolf, *Perehińsko.*

Ikałowicz K., *Bolechów l. s.*

Podlusi M., » l. m. i k.

Blumenthal J., »

C. Kułowski L., »

W. Lubliner Leon, *w. p.*

17. Pow. Drohobycki.

D. Kuhn Adolf, *Drohobycz l. p.*

Sękiewicz Fr., » a. s.

Braunn Alfr., » s. szp.

Feuerstein H., »

Friedländer E., »

Eliasiewicz Z., » s. szp.

Hoffner O., » l. m. i k.

Klarfeld I., »

Kozłowski B., » pr. szp.

Lechowski Wik., » l. k. ch.

Mindes Joachim, »

Pelczar Z., » l. s.

Rosenschein S., »

Tiegerman Em., » l. m.

Wilder Izydor, » l. k. ch.

Tworowski Ignacy, *Pod-*

buż l. o.

Rubinstein N., *Medenice*

l. o.

Kapellner M., *Borystów*

l. k. ch.

Berman Dawid, *Borystów*

l. k. ch.

Löw Bern., *Borystów l. g.*

i k. ch.

Tenner Ig., *Schodnica l. o.*

Dwernicki St., *Borystów*

l. k. ch.

Węclewski S., *Stebnik l. s.*

Lichtgarn Daw., *Tustanowi-*

ce-Wolanka.

W. Tychowski W., *szp.*

18. Pow. Gorlicki.

- D. Frydman Z., *Gorlice l. p.*
 Bielewicz Fel., > *l. m.*
 Frühling Marc., >
 Kohn M., >
 Kretowicz Wal., >
 Przesmycki Jan, *Gorlice s.*
szp. i l. k. ch.
 Żuławski Leon, *Gorlice pr.*
szp.
 Katiński Ludwik, *Biecz*
l. m.
 Świeżawski L., *Gładyszów*
l. o.
 W. Matuszewski M., *w. p.*
 Somnier I., *w. m.*

19. Pow. Grodecki.

- D. Balicki Stan. *Gródek l. p.*
 Szponder W., > *l. m.*
 Markl J., *Janów l. o.*
 Kłesk Rom., *Dąbrowica,*
l. o.
 C. Landau Ad., *Gródek.*
 Schöps Ign., *Janów.*
 W. Lille O., *w. p.*
 Paluch A., *w. m.*

20. Pow. Grybowski.

- D. Jendl S. I., *Grybów l. p.*
 Jakubowski A., > *l. k.*
 Kozierowski E., > *l. k. ch.*
 Sałaban Leop., > *l. m.*
 Waiigórski C., > *l. w. p.*
 Zarzycki Eman., *Bobowa*
l. o.
 Mańkowski Kaz., *Ciężko-*
wice l. m. i o.
 W. Wędrychowski J., *w. p.*

21. Pow. Horodeński.

- D. Sobieszczański L., *Horo-*
denka l. p.
 Ciepanowski J., *Horodenka.*
 Kanafass Ozyasz, >
 Roszko Ant., > *l. sz.*
 Bujalski Maryan, *Obertyn*
l. o.
 Karabiński E., *Czernelica*
l. o.

- C. Burnatowicz R., *Obertyn.*
 W. Rudnicki W., *w. p.*
 Bach Ludwik, *w. m.*

22. Pow. Husiatyński.

- D. Pohorecki Wł., *Husiatyn*
l. p.
 Herscher Izaak, *Husiatyn*
s. sz.
 Gerżabek B., *Husiatyn pr.*
sz.
 Auerhahn W., *Chorostków*
l. o.
 Rosenbaum N., *Kopyczyńce*
 Safian Ł., >
 Wilson Rysz., > *l. m.*
 Brandman A., *Probużna*
l. o.
 C. Rares Izydor *Husiatyn,*
l. m.
 Siebner Nat., *Kopyczyńce.*
 Sobelsohn Daw., *Probużna*
l. m.
 W. Jakubowski S., *a. w.*

23. Pow. Jarosławski.

- D. Czyżewicz Wł. *Jarosław*
s. l. p.
 Dietzius Adolf, *Jarosław*
l. k.
 Fechter T., *Jarosław pr. sz.*
 Feldmann M., >
 Friedwald Abr., >
 Händel Anzelm, >
 Meissels. Zyg., >
 Mach Seb., >
 Nacht E., >
 Puzon Rom., > *s. szp.*
 Rossberger Sal., *Jarosław*
2 l. m. (dent.)
 Semler Daw., *Jarosław*
 Trzaskowski J., *Jarosław.*
 Turzański Grz., *Jarosław*
1 l. m.
 Turnheim Saul, >
 Schmeidler Leon, *Rady-*
mno l. k.
 Mallik Józ., *Radymno l. m.*
 Jastrzębski W., *Sieniawa*
l. o.
 Dawid Majer, *Sieniawa l. m.*

D. Przybylski St., *Pruchnik*
l. o.
C. Ackerbauer S., *Jarostaw*.
W. Miziura A., w. p.

24. Pow. Jasielski.

D. Szczepański W., *Fasto* l. p.
Cieglewicz Stan., »
Hicner Aleks., » l. m.
i k. ch.
Kadyi Józef, » s. sz.
i l. więz.
Macudziński Wal., » p. sz.
i l. k.
Meth Sz., »
Szczepański Tyt., » l. w. p.
Łopaczyński E. *Olpinach*,
l. m.
Zawiera A., *Żmigród* l. m.
Szwarc J., » l. w. p.
Roth Józ., *Krempna* l. o.
W. Pawlikiewicz Jan, w. p.

25. Pow. Jaworowski.

D. Orski Jan, *Jaworów* k. s.
Miszewski St., » l. k.
i k. ch.
Jahr Saul, *Krakowiec* l. m.
Sędzimir Sz., » l. s.
Schmidt S., *Wielkie Oczy*
C. Bendel Zygm., *Jaworów*.
Gabel Rub., » l. m.
W. Bernstein Józ., w. p.

26. Pow. Kałuski.

D. Wurst Adolf, *Kałusz* s. l. p.
Kurowiec Jan, »
Markiewicz D., » l. szp.
Nadel Rubin, »
Jastrzębski Jul., *Wojni-*
tów l. o.
C. Kiczales Herm., *Wojniłów*
l. k.
W. Sigall Herman, w. p.

27. Pow. Kamionecki.

D. Gawlikowski S., *Kamion-*
ka l. p.

D. Stupnicki Wł., *Kamionka*
l. m.

Markstein W., *Kołomyja*
Jaciów Teod., »
Czerkawski J., *Dziedziłów*.
Prebendowski S., *Radzie-*
chów.
Pawluk Bazyli, *Witków*
nowy l. o.
Adlerstein Aron, *Busk*.
Zaorski Br., »
C. Raps Maks, *Kamionka*.
Siegelbaum Jak., *Busk*.
W. Kałkowski Józ., w. p.

28. Pow. Kolbuszowski.

D. Ciepielowski, *Kolbuszowa*
l. p.
Billig Elias, » l. m.
Bukowski Piotr, *Sokołów*
l. o.
Szóstkiewicz St., *Majdan*
l. o.
W. Kohlberger St. a. w.

29. Pow. Kołomyjski.

D. Milewski Tad., *Kołomyja*
l. p.
Allerhand Jul., *Kołomyja*
(*ginek.*).
Hulles Jakób, »
Flecker O., »
l. k. ch.
Jaworski Bol., » l. k. ch.
Kirchen Oskar, »
Koffler Maur., »
Kozakiewicz Al., »
Kos J., »
Łuniewski S., » (*ok.*)
s. sz.
Lewicki Zenob., » p. s.
Maresch Bron., »
Offe Jakób, »
(*dent.*).
Piaskiewicz Wł., *Koło-*
myja l. m. i k.
Rosenheck Sal., *Kołomyjā*
l. m. i sz.
Silberstein Izyd., »
Sumorok K., *Gwoździec*
l. o.

C. Reder E., *Kołomyja (dent.)*
 Ternier Hersch, »
 W. Machalski, s. w. p.

30. Pow. Kosowski.

D. Janikiewicz St., *Kosów k.s.*
 Stablewski W., » a. s.
 Baraniecki R., » l. s.
 Bażant Wacł., »
 Goldhaber Majer, »
 Tarnawski A., »
 Skomorowski Jan, *Kuty*
 l. m.
 Goldschlag Leiz., *Kuty*.
 Zatiokał R., *Kosmacz a. s.*
 Doboszyński L., *Zabie*.
 Siatecki K., » l. o.
 Pawlicki T., *Pistyn l. o.*
 Rosmarin H., *Hryniawa*.
 C. Rudich Leon, *Kosów l. m.*
 Berger Adolf, *Kuty*.
 W. Strowski Mar., a. w.

31. Pow. Krakowski.

D. Bielański Gust., *Kraków*
 l. s. p.
 Warzycki B., *Kraków l. p.*
 Komorowski B., *Półwie*
Zwierzynieckie Tel. 419.
 Malinowski G., *Czernichów*
 Ludmirski Z., *Liszki l. o.*
 W. Rutkowski K., *Kraków*
 w. p.

32. Pow. Krośnieński.

D. Słaczka Ant., *Krosno l. p.*
 Kropaczek Fr., » a. s.
 Jasiński A., »
 Kocay Aleks., »
 Walsleben J., » p. sz.
 Lanes S., *Dukla*.
 Strycharski J., *Dukla*.
 Przysiópski Jak., *Korczyn*
 W. Cieleński W., s. w. p.
 Krynicki St., a. w.

33. Pow. Łańcucki.

D. Witkowski E., *Łańcut l. p.*
 Fleszar Jan, » l. m.
 Howiecki M., *Leżajsk l. s. i k.*
 Zawilski St., » l. m.

D. Maurer M., *Żółynia l. m.*
 Tryniecki Bol., » l. o.
 C. Arzt I., *Łańcut l. sk.*
 W. Dulęba M., s. w. p.

34. Pow. Limanowski.

D. Haim L., *Limanowa k. s.*
 Gnoiński M., »
 Kruk Kazim., »
 Maurer Z., »
 Czapliński Stan., *Mszana*
dolna.
 Herzig N., *Mszana dolna*.
 Orzeł Józef, *Ujanowice*.
 W. Atlas H., w. p.

35. Pow. Liski.

D. Karpiński St., *Lisko l. p.*
 Porajewski Jan, » l. m.
 Turteltaub J., *Lisko*.
 Robel Wiktor, *Baligród l. o.*
 Heftler N., *Ustrzyki l. m.*
 Lenartowicz R., » l. k.
 Dulęba, *Lutowiska l. o.*
 Prost J., » l. m.
 Markiewicz J., *Cisna l. o.*
 W. Kachnikiewicz Br., w. p.

36. Pow. Lwowski.

D. Obtułowicz F., *Lwów s. l.*
 p. i s.
 Barącz, *Dublany l. szk.*
 Kohlberger, *Kulparków*
dyr. z. obł.
 Kruszyński S., *Kulparków*
pr. z. obł.
 Maliszewski H., *Kulparków*
pr. z. obł.
 Woszczyński J., *Kulpar-*
ków s. z. obł.
 Fox Jan, *Kulparkow*.
 Wisłocki Jan, »
 Zagórski Rom., »
 Zakrzewski Józ., *Maryów-*
ka ad Winniki.
 Acker Sal., *Szczerzec l. k.*
 Trześniowski E., *Szczerzec*.
 Fruchtmann F., *Zniesienie*.
 Wachowicz J., *Jaryszów l. o.*

D. Gąsiorowski S., *Winniki*
l. f.
Stanowski K., *Winniki*
s. l. f.
W. Markowski Z., w. p.

37. Pow. Mielecki.

D. Godłowski Al., *Mielec k. s.*
Frank Apol., > l. k.
Kijas Błażej, > l. m.
Sternberg Józ., >
Cymbler Waler., *Radomyśl*
Lorenski And., >
C. Schabbus M., *Mielec l. m.*
W. Małecki M., w. p.

38. Pow. Mościcki.

D. Lebedowicz Emil, *Mościska l. p.*
Langer Józef, *Mościska l. o.*
Polański Stan., > l. m.
Hryniewicz Tad., *Sądowa*
Wisznia.
Rokossowski W., *Sądowa*
Wisznia l. o.
Kosz Korn., *Krukienice*
l. o.
C. Raab H., *Sądowa Wisznia*
l. m.
W. Grochowski K., w. p.
Bien J., *Sądowa Wisznia*
w. m.

39. Pow. Myślenicki.

D. Schmidt F., *Myślenice l. p.*
Gałuszka J., > l. m.
Łodziński W., *Dolna Wieś*
l. o.
Maszewski St., *Sułkowice*
l. o.
Służewski K., *Jordanów*
l. m.
Kaden K., *Rabka.*
Lang Otokar, > l. o.
Karaś A., *Maków.*
Uchacz Bł., *Maków l. sk.*
Zduń Jan, *Raba wyżnia.*
Zduń Józef, *Skawa.*
W. Soltykiewicz J., w. p.

40. Pow. Nadwórniański.

D. Jossé J., *Nadwórna k. s.*
Bibrig Sz., > l. sk. i k.
Cieszewski W., > l. o. i k. ch.
Last Herman, >
Puzdrowski J., *Zielona.*
Bogdański B., *Delatyn*
l. s. i k.
Fraenkel H., *Delatyn.*
Harasowski A., *Delatyn*
l. m. i k. ch.
Pasicznicki E., *Łanczyn*
l. o.
Głuszkiewicz W., *Mikuliczyn l. o. i k.*
W. Chwalibiński M., w. p.

41. Pow. Niski.

D. Loewy Alojz., *Nisko l. p.*
Ławrowski Wł., > l. o.
Hernich Fr., *Rudnik l. o.*
Reik Jakób, *Ulanów l. o.*
W. Brayer S., *Ulanów w. p.*
W. Ochnicz M., w. p.

42. Pow. Nowosądecki.

D. Filewicz J., *N. Sącz l. p.*
Ameisen Maur., >
Dudziński Jan, >
Kijas Tadeusz, > l. k.
Kosterkiewicz Fr., >
Mohr Dawid, > l. k. ch.
Olszewski Br., > l. k.
Piłchowski Tad., *N. Sącz*
l. l. m. l. więz.
Richter Józ., *N. Sącz*
Siedlecki J., > pr. szp.
Silberman L., > 2 l. m.
Zieliński Edw., > s. szp.
Łukasiewicz, *Muszyna l. k.*
Kmietowicz F., *Krynica l. g.*
Ebers H., >
Chilewski H., *St. Sącz l. m.*
Gawelkiewicz L., *St. Sącz*
l. k.
Chwalibóg H., *Łąck l. o.*
C. Zauderer Maur., *N. Sącz.*
W. Piskorski Jan, w. p.

43. Pow. Nowotarski.

- D. Bednarski J., *N. Targl.p.*
 Langsam Gutman, »
 Schein Herm., » *l. m.*
 Gorski X., *Szczawnica*
 (w lecie).
 Kołaczkowski J., *Szczawnica*.
 Hammerschlag R., *Krościenko l. o.*
 Brzeziński E., »
 Chramiec And., *Zakopane*.
 Chwistek Br., »
 Czaplicki Zd., »
 Dłuski K., *Kościelisko*.
 Dłuska Bronisława, *Kościelisko*.
 Gaik Jan, *Zakopane*.
 Gawlik J., »
 Janiszewski T., »
 Majewicz E., »
 Piasecki Wen., »
 Wojczyński M., »
 Żychoń Józef, »
 Beaurain K., *Poronin l. o.*
 Grodecki F., *Czarny Dunajec l. o.*
 W. Mendlowski B., *w. p.*

44. Pow. Pecozeniżyński.

- D. Biliński Miecz., *Peczeniżyn a. s.*
 Vincenz A., *Peczeniżyn l. o.*
 Kleski A., *Jabłonów l. o.*

45. Pow. Pilzneński.

- D. Biesiadzki A., *Pilzno l. p.*
 Mydlarski Wł., » *l. m.*
 Lewicki Z., *Brzostek l. m.*
 W. Raff Herm., *w. p.*

46. Pow. Podgórski.

- D. Dembowski M., *Podgórze s. l. p.*
 Łobaczewski A., *Podgórze a. s.*
 Aronsohn Sam., *Podgórze*.
 Goldberger Iz., »
 D. Kepler Paweł, »

- D. Pancewicz Izyd., *Podgórze*
 Piórko A., » *l. k.*
 Pisek H., »
 Smorągiewicz Kaz., » *l. m.*
 Świątek Winc., »
 Dika H., *Świątlniki l. o.*
 Nawrat St., *Skawina l. m.*
 Michnik A., » *l. k.*
 W. Rutkowski K., *s. w. p.*

47. Pow. Podhajecki.

- D. Mossor K., *Podhaje k. s.*
 Choróbski St., » *pr. szp.*
 Landau Aron, » *l. m.*
 Salpeter Mich., » *s. szp.*
 Gliksmann S., *Wiśniowczyk l. o.*
 Sobelsohn F., »
 W. Wojciechowski M., *Podhaje*.

48. Pow. Przemyśki.

- D. Kramarzyński M., *Przemyśl l. p.*
 Benoni Ferd., *Przemyśl*.
 Blech H., »
 Cichański A., » *s. sz.*
 Doliński M., » *s. sz.*
 Ehrlich H., »
 Frauenglas M., »
 Fränkel J., »
 Grabscheid M., »
 Gruber F., »
 Keller Dawid, »
 Kantz Oskar, » *(dent.)*.
 Kutna Samuel, »
 Lityński Luc., »
 Madéyski Józ., » *pr. sz.*
 Mannheim Z., » *l. m.*
 Michalik Fr., » *l. k. ch.*
 Oller Michał, » *l. k. ch.*
 Pordes M., » *l. k.*
 Rościszewski E., *Przemyśl l. w.*
 Schoeffer F., *Przemyśl (dent.)*.
 Smolarski Zygm., *Przemyśl l. m.*
 Springer K., *Przemyśl*.
 Süsswein, » *s. sz.*
 Szyszkowski M., » *l. k.*

D. Trybulec Fr., *Przemyśl*
l. m.

Wojtowicz J., » l. k.

Kaczurba St., *Medyka* l. o.

Ruczka S., *Niżankowice*
l. o.

Dobrzański St., *Dubiecko*

C. Chilf Joachim, *Przemyśl*
(dent.).

Biber Maurycy, »

Talheim Joachim, »

W. Fried Ferd., w. p.

Topper L., a. w.

49. Pow. Przemyślański.

D. Hyżycki C., *Przemyślany*
l. p.

Barbag Herm., *Przemy-
ślany* l. m.

Schutt E., *Przemyślany*
dyr. szp.

Mendlowski Wł., *Gliniany*.

Moch Jan, » l. m.

Szarkowski A., *Dunajów*
l. o.

Trelski Mikołaj, *Świrz* l. o.

C. Kostmann I., *Przemyślany*

Kümmernann S., *Gliniany*

W. Proskurnicki A., w. p.

50. Pow. Przeworski.

D. Kowalewski E., *Przeworsk*
k. s.

Końciewicz Jan, *Przeworsk*
l. k. ch. i m.

Silberstein Józef, »

Smyczyński Ign., »
l. k. ch. i k.

Sawicki Ant., *Kańczuga*
l. m. k. ch. l. k.

W. Łucki Józef, s. w. p.

51. Pow. Rawski.

D. Stokłosiński F., *Rawa* l. p.

Dadlez Julian, » l. k.

Rose Eman., »

Gorner Izyd., *Lubycza*.

Miczulski Ant., *Niemirów*
l. o.

Kibitz L., *Uhnów*.

Ożarowski St., » l. o.

D. Jaciów Mik., *Magierów*
l. o.

C. Elner M., *Niemirów* l. m.

Kibitz Nat., *Rawa* l. m.

C. Kibitz Bern., *Uhnów*.

Sternberg J., *Lubrycza*.

W. Szymuński Ant., w. p.

52. Pow. Rohatyński.

D. Szajnowski Mar., *Rohatyn*
l. p.

Dorożyński J., *Rohatyn* l. o.

Schaff S., *Rohatyn*.

Stein Maur., »

Terlecki Ant., » l. m.

Gwozdecki T., *Lipica* l. o.

Gürsching T., *Bukaczowce*

Damm Albert, *Bołszowce*.

Halarewicz B., *Bołszowce*
l. k.

Mach And., *Bursztyn* l. m.

Porycki Br., *Bukaczowce*
l. m.

W. Weisberg Abr., w. p.

53. Pow. Ropczyński.

D. Żukotyński Fr., *Ropczyce*
l. p.

Roller Fryd., *Ropczyce*.

Potok K., » l. m.

Bętkowski Z., *Dębica* l. m.

Męzki T., »

Kołasiński A., *Wielopole* l. o.

Kronfeld H., *Sędziszów*.

Górka J., » l. o.

C. Benda Ant., *Dębica* l. k.

Reiss El., »

W. Panek Jan, w. p.

54. Pow. Rudecki.

D. Tyszkowski L., *Rudki* l. s.

Śnieżek Ludw., » l. m.

i k.

Blauer T., *Komarńo* l. m.

Jakliński Leon, *Komarńo*
l. szk.

Markl J., *Horożanna wielka*
l. o.

W. Weissberg Ad., w. p.

55. Pow. Rzeszowski.

- D. Danielski J., *Rzeszów l. p.*
 Ściborowski K., » *l. p.*
 Bujniewicz Jak., *Rzeszów l. k. i k. ch.*
 Dornfest Izyd., *Rzeszów.*
 Elsner Józef, *Rzeszów s. szp.*
 Fiałkowski W., *Rzeszów l. k.*
 Herz Em., *Rzeszów.*
 Hopfer Sam., »
 Jabłoński St., » *pr. szp.*
 Kalman Józ. L., »
 Koepel Henr., »
 Kraus Herm., »
 Nieć Teofil, »
 Strasser Efraim, »
 Teller Józef, » *l. m.*
 Zagórski Ad., » *p. szp. l. m.*
 Grosse Zenon, *Głogów l. o.*
 Sieniewicz Mich., *Błażowa l. o.*
 Solecki J., *Tyczyn.*
 C. Bernfeld Leon, *Tyczyn.*
 Herzum Józ., *Głogów.*
 Reiner Iz., *Rzeszów.*
 W. Skuciński J., *s. w. p.*

56. Pow. Samborski.

- D. Sobolewski Fr., *Sambor s. l. p.*
 Biegelmayer Alf., *Sambor p. s. i l. m.*
 Chrząszczewski W., *Sambor s. sz.*
 Ciuk Aleksander, *Sambor.*
 Klauber Adolf, »
 Markiewicz Henr., »
 Ortyński Włod., »
 Winogradzki A., »
 Dreifach Izidor, *Łąka l. o.*
 W. Federowicz W., *w. p.*

57. Pow. Sanocki.

- D. Jabłoński J., *Sanok s. l. p.*
 Stangenhau A., » *a. s.*
 Drewiński M., » *l. f.*

- D. Edelheit Z., *Sanok*
 Krynicki Józ., » *l. m.*
 Pajączkowski W., » *p. s.*
 Ramer Salomon, » *s. sz.*
 Zaleski Karol, » *l. w.*
 Bielecki Ign., *Rymanów l. o.*
 Eisenstein J., *Rymanów.*
 Galant Józef, *Zagórz l. k.*
 Chotiner J., *Bukowsko l. m.*
 Scharf Jak., *Bukowsko.*
 C. Atlas Sal., *Sanok (dent.).*
 W. Szczerba Jan, *w. p.*

58. Pow. Skalański.

- D. Lubowiecki J., *Skalat k. s.*
 Gottfried Mojż., » *l. m.*
 Lpski » *p. szp.*
 Mieses I., *Grzymałów l. m.*
 Schmar J. » *l. k.*
 Dawid Sal., *Podwołoczyska.*
 Swiderski Bruno, »
 Türkel Samuel, » *l. m.*
 Pilecki Z., *Tarnoruda l. o.*
 Ausobsky J., *Touste l. o.*
 Bardach, *Grzymałów.*
 C. Berger E., *Zadniszówka.*
 Metall I., *Podwołoczyska.*
 W. Serwa Józef, *w. p.*

59. Pow. Śniatynski.

- D. Werner K., *Śniatyn s. l. p.*
 Kaczyński St., » *a. s.*
 Ciszka Edmund, » *pr. szp.*
 Janikiewicz S., » *k. san.*
 Kuśnierczyk P., » *s. szp.*
 Margulies Wolf, » *l. k. ch.*
 Mehrer Izidor, » *l. m.*
 Lic F., *Zabłotów a. s. i l. f. t.*
 Neuberger Z., *Zabłotów l. k.*
 Krański Jul., *Rożnów l. o.*
 W. Janowicz Stef., *s. w. p.*
 Dobrzański N. *w. m.*
 Różankowski N., *Zabłotów em. w. m.*

60. Pow. Sokalski.

- D. Głowiński W., *Sokal l. p.*
 Jajus Miron, *Sokal l. m. i s. szp.*

- D. Łuszczkiewicz J., *Sokal p.s.*
 Urech Marek, »
 Maciejowicz S., *Tarkaków*
l. o.
 Frostig Henr., *Beltz l. m.*
 Siewierski P., »
 Hoeflich Jan, *Waręż l. o.*
 Wachnianin J., *Krystynopol*
l. m.
 C. Blum Zygmunt, *Beltz.*
 Pordes Sal., *Krystonopol.*
 C. Starwer M., *Krystonopol*
 W. Eitelberg Br., *w. p.*

61. Pow. Stanisławowski.

- D. Gołębiowski K., *Stanisławów*
wów l. p.
 Atlas J., *Stanisławów.*
 Bardach Józ., »
(akusz.).
 Berghoff F., »
 Chołowiecki L., *Stanisławów.*
 Dawidowicz E., *Stanisławów.*
 Dobrucki G., *Stanisławów*
s. szp.
 Drzewicki S., »
l. m. i k.
 Goldhaber J., »
 Hacker D., »
l. k. ch.
 Janowicz W., »
 Kopaczyński W., »
l. z. k. i k. ch.
 Krasowski S., »
pr. szp.
 Kreutz J., »
(okulist.).
 Lachawiec A., »
 Lehmann J., »
 Majewski J., » *l. k.*
 Mondschein M., »
 Ostafiński M., »
 Opolski Jan, »
 Pacyna J., »
(wener.).
 Raczyński A., »
(dent.).
 Richter A., »
 Rosenbaum J., »

- D. Rozmarin J., *Stanisławów*
l. k.
 Rubinstein J., » *l. m.*
 Stefanicki J., »
(dent.).
 Stenzel B., » *l. m.*
 Wnękowicz St., »
 Zukowski Aleks., » *l. k.*
 Wittels J., *Knihinin wieś*
l. g.
 Stock Jak., *Halicz l. o.*
 Zins Klem., » *l. m. i k.*
 D. Zaleski K., *Maryampol l. o.*
 C. Grader M., *Stanisławów.*
 Löwner A., »
(dent.).
 Pomeranz L., »
 Rosenbaum M., »
 W. Grodecki Miecz., *w. p.*
 Hofmoki O., *w.*
 Geller W., *Halicz w. m.*

62. Pow. Staro-Samborski.

- D. Małaczyński R., *Stary*
Sambor k. s.
 Salzmann J., *Stary Sambor.*
 Frucht M., *Chyrów.*
 Mężyk J., » *l. z. Jęz.*
 Kędzierski W., *Topolnica*
l. o.
 Langbank B., *Starosól l. o.*
 Rawski A., *Łopuszanka l.*
prz. k.
 C. Obuszkiewicz St., *Stary*
Sambor l. m.
 W. Orzechowski Mar., *w. p.*

63. Pow. Stryjski.

- D. Serkowski B., *Stryjs. l. p.*
 Antoniewicz W., »
 Chalbanazy D., » *l. k.*
 Chuderski F., » *s. szp.*
 Czarnecki J., » *s. sz.*
 Kiczała J., »
 Kippel Jakób, »
 Lów Wojc., »
l. k. ch.
 Kowalski M., » *l. k.*
 Frey I. G., »
 Schächter Sam., »
 Serkowski W., »

D. Sołtysik M., *Strzyj pr. szp.*
 Meisels Jul., »
 Peczenik L., »
 Schindler Iz., »
 Eichel E., *Skole.*
 Michalski W., *Skole l. m.*
 Mironowicz K., » *l. s.*
 Rappaport O., *Synowódzko*
górne l. o.
 C. Rosenberg Nach., *Stryj.*
 Temple D., *Stryj l. o.*
 Kräuterblüth Jak., *Skole.*
 W. Smoluchowski Jan, *w. p.*

64. Pow. Strzyżowski.

D. Kurasiewicz J., *Strzyżów*
k. s.
 Patryn J., *Strzyżów l. k.*
 Taub Sam., *Strzyżów.*
 Zawisza A., *Czudec l. m.*
 Natter W., *Frysztak l. k.*
i o
 C. Spiegel M., *Frysztak l. m.*
 W. Pilch Antoni, *w. p.*

65. Pow. Tarnobrzęski.

D. Momidłowski W., *Tarnobrzę*
l. p.
 Orzechowski L., *l. m. i k.*
 Urbanik R., *pr. sz.*
 Verstaendig Elias, *l. m.*
 Dumaire W., *Rozwadów*
l. k.
 Hochstim A., » *l. m.*
 Radziński K., »
 Kuźniar W., *Grebów l. o.*
 Meller J., *Baranów l. m.*
 Stanowski Z., *Radomyśl l. o.*
 C. Helmann T., *Tarnobrzę.*
 W. Zagórski St., *w. p.*

66. Pow. Tarnopolski.

D. Gładyszowski E., *Tarnopol st. l. p.*
 Michalik J., *Tarnopol k. s.*
 Birkenfeld Ch., »
 Eckhardt Józef, *Tarnopol*
p. s. l. k. ch.
 Frisch Jul., *Tarnopol l. k.*

D. Gold Jakób, *Tarnopol*
 Grabowski A., »
 Gruszkiewicz K., »
 Hordyński Dob., »
 Isterewicz S., »
 Kowenicki W., »
 Leiblinger I., » *s. l. m.*
 Lustig H., »
 Münzer M., » *l. k.*
ch. i k.
 Ochsenhorn Ch., »
 Rappaport S., »
 Rehan L., »
 Rosenfeld Maur., *Tarnopol.*
 Świstun A., »
 Szeląg Z., »
 Topolnicki J., *Tarnopol*
s. sz.
 Weissberg Z., *Tarnopol.*
 Witoszyński W., » *l. m.*
 Brudziński L., *Mikulińce*
l. o.
 Koller B., *Mikulińce l. m.*
 Morawski M., »
 Rosenmann O., *Mikulińce*
l. k. ch.
 Selzer Z., *Czerniechów l. o.*
 C. Planer J., *Tarnopol.*
 Stein Adolf, » *(dent.).*
 W. Marko Dymitr, *st. w. p.*

67. Pow. Tarnowski.

D. Dzikowski Z., *Tarnów s.*
l. p.
 Ader Antsch., »
 Ebersson M., »
 Fööbus Izrael, »
 Fürbek L., » *l. k.*
 Glaser Leop., »
 Kowalski Sew., »
 Metzger Jan, »
 Ozimek Stan., »
 Pilzer Herm., » *l. m.*
 Rogalski Wł., »
pr. szp.
 Schützer Leon, »
l. szp. izr.
 Starachowicz J., »
l. k. ch.
 Stronczak K., » *s. sz.*
 Szatkowski Miecz., » *s. sz.*

- D. Trammer A., *Tarnów*
 Walczyński J., » *l. m.*
 Zbigniewicz J., »
 W. Szydłowski Z., *s. w. p.*
 Sammet E., *w. m.*

68. Pow. Tłumacki.

- D. Małaczyński Rom., *Tłumacz k. s.*
 Hovurka Antoni, *Tłumacz l. m. i k. ch.*
 Weinreb S., *Tłumacz.*
 Blumenblatt L., *Tysmienica l. k.*
 Laskiewicz J., *Niżniów l. k. i o.*
 Pertak M., *Ottynia l. k. i o.*
 Scherp D., *Ottynia.*
 Sakler E., *Tysmienica l. f.*
 W. Przykopa R., *w. p.*

69. Pow. Trembowelski.

- D. Litwinowicz Orest., *Trembowla st. l. p.*
 Olpiński J., *Trembowla l. k.*
 Deutsch Z., »
 Feuerstein L., *Budzanów l. m.*
 Bryliński J., *Janów l. o.*
 Perlmutter Adolf, *Struszków l. o.*
 C. Hrazdilek E., *Struszków.*
 Neustein J., *Trembowla l. m.*
 W. Kuźniar Józef, *a. w.*

70. Pow. Turozański.

- D. Jarocki P., *Turka a. s.*
 Ozga J., » *p. szp.*
 Reich S., » *l. m.*
 Zadurawicz E., » *l. o. i szp.*
 Jüngst W., *Borynia l. o.*
 W. Mamak *w. p.*

71. Pow. Wadowicki.

- D. Zawadziński. *Wadowice s. l. p.*
 Bukowski A., *Wadowice p. s.*
 Opydo Fr., *Wadowice l. k.*
 Żędzianowski Stan., *Wadowice l. m.*

- D. Landau Sch., *Andrychów.*
 Wróblewski W., » *l. o.*
 Zborowski Józ., »
 Lewandowski J., *Tłuczan.*
 Grzybowski S., *Zator l. zk.*
 Tarchalski J., »
 Nikliborc J., *Zebrzydowice.*
 C. Erychleb Jan, *Kalwarya.*
 Weczerka A., *Wadowice.*
 W. Vergesslich L., *Wadowice w. p.*

72. Pow. Wielicki.

- D. Kownacki J., *Wieliczka l. p.*
 Kazrlik M., » *l. s.*
 D. Podobiński A., *Wieliczka l. m.*
 Steiner Stan., *Wieliczka st. l. s.*
 Spitzel Jakób, *Wieliczka l. p. k. ch.*
 Nieć Jul., *Dobczyce l. o.*
 W. Hirsch, *w. p.*

73. Pow. Zaleszczyki.

- D. Udziela M., *Zaleszczyki a. s.*
 Blutreich Izaak, »
 Sołowski Jan, » *p. sz.*
 Rosen Abr., » *s. sz.*
 Gilnreiner M., *Tłuste l. o.*
 Hendrychowski S., *Uście szko l. o.*
 Jeger J., *Tłuste.*
 C. Reischer I., *Zaleszczyki l. m.*
 W. Tabaczyński St., *w. p.*

74. Pow. Zbarazki.

- D. Fuchs Leon, *Zbaraż l. p.*
 Berger Mich., » *l. m. i sz.*
 Biliński Wł., »
 Drozdowski W., *Nowe Siołto l. o.*
 C. Mantel Maur., *Zbaraż.*
 W. Horodnicki Mik., *w. p.*

75. Pow. Zborowski.

- D. Baczyński E., *Zborów a. s.*
 Skórski M., » *l. k.*
 Sturm Leon, »
 Fränkel H., *Tomorzany l. m.*

C. Hirschhorn F., *Jezierna*.
Petersil J., *Zborów l. m.*
W. Krynicki St., *c. k. as. w.*

76. Pow. Złoczowski.

D. Coghen A., *Złoczów l. p.*
Szaynowski W., » *k. s.*
Bendel Sam., » *l. k.*
Gold Józef, »
Heyne Bol., » *l. m.*
Jarosz W., » *p. s.*
Mazanek J., »
Paulo A., » *l. k. ch.*
Zaleski Eust., *Złoczów*
em. s. l. p.
Lauffer A., *Olesko l. o.*
Łopatyński J., *Gólogóry*
l. o.
C. Aderschläger I., *Biały*
kamień.
Urysz R., *Biały Kamień*
Deutsch H., *Złoczów l. m.*
Bienenwald S., *Sasów.*
Skrowaczewski »
W. Horodyłowicz, *w. p.*

77. Pow. Żółkiewski.

D. Opieński J., *Żółkiew l. p.*
Drzymalik S., » *l. m.*
Muszkiet K., » *p. s.*
Wachs M., » *s. sz.*
Wyrzykowski K., *Żółkiew*
s. sz.
Finkel H., *Kulików l. o.*
Newestiuk J., *Mosty wiel-*
kie l. gm.

C. Elner Sal., *Żółkiew zast.*
l. m.
W. Ulrich Leop., *w. p.*

78. Pow. Żydaczowski.

D. Kondratowicz A., *Żyda-*
czów a. s.
Grabscheid D., *Żydaczów*
l. gm.
Mihowicz B., *Rozdół.*
Rawski Tad., » *l. s.*
Doboszyński Z., *Drohowsz*
l. zakł.
Gozdecki J., *Żórawno l. o.*
Roth Sal., » *l. g.*
Kryształowicz Aug., *Mi-*
kołajów l. g.
C. Wehrn L., *Mikołajów*
W. Nowak J., *w. p.*

79. Pow. Żywiecki.

D. Bąkowski T., *Żywiec l. p.*
Fonferko A., » *s. sz.*
Idziński Wikt., » *pr. sz.*
Seidler Ant., » *l. k.*
Blumenfeld Joa., *Zabłocie.*
Schmetterling A., »
Gawlik J., *Sucha l. szk. i k.*
Nowak Wład., *Węgierska*
Górka.
Wieselman J., *Slemień.*
Łodygowski I., *Milówka*
Nieć Jul., *Milówka.*
C. Klein A., *Rajcza l. sk.*
W. Dalkiewicz Mieczysław,
a. w.

Lekarze Polacy, I. w księstwie Cieszyńskim.

A) Pow. Bielski.

D. Offner E., *Bielsk.*
Jেকেles, *Bystra.*
Rybak Leon, *Strumień.*
Pick Lud., »
Czop J., *Żaworze.*
Hoeflich, *Dziedzice.*

B) Pow. Cieszyński.

D. Wieluch J., *Cieszyn.*

D. Sikora J., *Żabłonków.*
Hnatyszak A., *Trzyniec.*

C) Pow. Frysztacki.

D. Knapczyk A., *Bogumin*
miasto.
Dobija F., *Bogumin dwo-*
rzec.
Miszke K., *Frysztat.*


D. Kunicki Rysz., *Frysztat.*
Olszak W., *Karwina.*
Michalik St., *Rychwałd.*

D. Kłuszyński H., *Piotrowice.*
Buzek J., *Dąbrowa.*
Silbiger B., *Stonawa.*

II. w Ostrawie morawskiej.

D. Bernhang A., *Ostrawa*
morawska.
Himmelblau J., *Ostr. mor.*
Seidl W., „ „

D. Dyński H., *Przewóz ad*
Ostr. mor.
Rogoyski Stan., *Witkowice*
ad Ostr. mor.



Lekarze Polacy w powiecie Cieszyńskim.

D. Sirota A., *Żabno.*
Białycki A., *Żabno.*
D. Knapczyk A., *Żabno.*
Dobila E., *Żabno.*
Miska K., *Żabno.*

Lekarze Polacy w powiecie Cieszyńskim.

A) Pow. Bielski.
D. Ofner E., *Bielsko.*
D. Ofner E., *Bielsko.*
D. Ofner E., *Bielsko.*
D. Ofner E., *Bielsko.*
D. Ofner E., *Bielsko.*
B) Pow. Cieszyński.
D. Wielech J., *Cieszyń.*



Alfabetyczny spis lekarzy

wraz z datą i miejscem uzyskania dyplomu lekarskiego.

OBJAŚNIENIE: Pierwsza liczba przy nazwisku oznacza powiat.

Kr. oznacza Kraków.

L. » Lwów.

Druga liczba oznacza rok otrzymania dyplomu.

Jeśli nie podano miejsca, dyplom uzyskanym został w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W. oznacza Wiedeń. L. Lwów.

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Acker S. 36. | Barański A. L. |
| Ackermann A. Kr. 1894. | Barański B. L. 1894. |
| Ader A. 67. W. 1894. | Baraniecki R. 30. 1893. |
| Adler A. L. | Barącz R. L. 1881. |
| Adlerstein A. 27. | Barącz I. 36. 1890. |
| Agathstein J. 28 1896. | Barbag H. 49 W. |
| Albinowski A. Kr. 1902. | Barban Chaim. 8. |
| Allerhand 29. 1902. L. | Bardach J. 61. |
| Altmann Z. 5. | Barzycki J. L. 1866. |
| Ameisen M. 42. 1894. | Baschkopf J. Kr. 1888. |
| Antoniewicz W. 63. | Baurowicz A. Kr. 1892. |
| Arnold W. L. 1890. | Bazes J. 22. |
| Aronsohn I. Kr. 1895. | Bażant W. 30. Praga. |
| Aronsohn S. 46. 1881. | Bądryński S. L. 1895. |
| Aschenazy Z. L. 1886. | Bąkowski T. 79. |
| Atlas J. 61. | Beaurain K. 43. 1896. |
| Auerbach E. L. W. 1885. | Beck A. L. 1890. |
| Auerhahn W. 22. W. | Bednarski A. L. 1894. |
| Aufrecht O. 6 W. | Bednarski J. 11. 1895. |
| Ausobsky J. 58. | Bednarski J. 43. |
| Baczyński A. 10. | Bełzowski M. 6. |
| Baczyński E. 75. W. | Bendel S. 76. 1891. |
| Baczyński T. Kr. 1902. | Benoni F. 48. 1893. |
| Bader W. L. 1902. | Bentkowski Z. 53. 1880. |
| Balicki S. 19. | Berezowski K. L. 1874. |
| Balabayder H. L. | Berezowski T. Kr. |
| Bałaban T. L. Grac 1800. | Berger H. L. |
| Bannet A. Kr. 1898. | Berger Marek 7. |
| | Berger M. 74. W. 1898. |

- Berggrün A. 11.
 Bermann D. 17. *Praga*.
 Bernaciński F. Kr. 1898.
 Bernacki F. 7. 1882.
 Bernadzikowski S. 7. 1885.
 Berwid B. 16. 1897.
 Bett M. L. 1883.
 Biber L. 1879. *W*.
 Bibring S. 40. *W*.
 Biegelmajer A. 56.
 Bielański G. Kr.
 Bielawski J. Kr. 1899.
 Bielecki J. 57. 1888.
 Bielewicz F. 18. 1890.
 Bienenwald I. 10.
 Bieńkowski B. L. 1885.
 Bier L. Kr. 1896.
 Bierer R. L. 1883. *W*.
 Biernacki E. L.
 Biesiadzki A. 45. 1890.
 Bikeles G. L. *W*. 1890.
 Biliński Miecz. 44. 1893.
 Biliński W. 74. 1895.
 Billig E. 28. *W*. 1889.
 Bilwin Z. 5. 1900.
 Binder L.
 Birkenfeld Ch. 66. 1900.
 Blaim L.
 Blauer T. 54. *W*.
 Blaustein J. 13. 1896.
 Blasberg Maksym. Kr. 1899.
 Blech B. 48. *W*. 1895.
 Blumenfeld J. 79. 1882.
 Blumenthal J. 16. *W*. 1892.
 Blutreich J. 73. *W*. 1891.
 Blumenfeld A. L.
 Blachowski L.
 Bobek J. 10. 1874.
 Bober J. 2. 1892.
 Bobkiewicz H. Kr. 1884.
 Bobrowski E. Kr.
 Bochenek A. Kr. 1898.
 Bocheński K. L. 1898.
 Boczar S. Kr. 1898.
 Bogdanik J. Kr. 1879.
 Bogdański B. 40.
 Bohosiewicz T. L. 1895.
 Borzęcki E. Kr. 1889.
 Bory J. *W*.
 Borzęcki Wł. L. 1898.
 Borysiewicz W. 2.
 Bossowski Al. Kr. 1887.
 Brand L. Kr. 1898.
 Brandman A. 22.
 Braun A. 17.
 Braun S. Kr. 1884.
 Breiter L. 1898.
 Brill M. L. 1900. L.
 Brochocki T. 37. 1899.
 Browicz T. Kr. 1872.
 Brudzewski K. Kr. 1893.
 Brudziński L. 66.
 Bryliński J. 69. 1894.
 Brzeziński E. 43.
 Bubeniczek F. 13. *Ż*. 1870.
 Bujalski M. 21.
 Bujwid O. Kr. 1884.
 Bujniewicz J. 55. 1887.
 Bukowski A. 71. 1886.
 Bukowski P. 28. 1895.
 Bund Marek. L. *W*. 1898.
 Buraczyński A. L.
 Burzyński A. L. 1900.
 Buzdygan M. Kr. 1882.
 Bylicki W. L. 1871.
 Cercha M. Kr. 1887.
 Cetnarowski E. Kr. 1902.
 Chajes H. L.
 Chajes I. L.
 Chalbanazy A. 63. 1899.
 Chądzyński J. L. 1885 *Paryż*.
 Chilewski A. 42.
 Chlumsky V. Kr.
 Cholewicz F. Kr. 1882.
 Chołowiecki. 61. 1897.
 Chomin A. L. 1889.
 Choróbski S. 47.
 Chotiner J. 57. 1900.
 Chramiec A. 43. 1885.
 Chrzászczewski. 56. 1886.
 Chuderski 63. 1901.
 Chwalibóg H. 42.
 Chwistek Br. 43. 1883.
 Ciechanowski. Kr. 1897.
 Cichański A. 48.
 Cięglewicz S. 24. 1876.
 Ciepanowski J. 21.
 Ciepeliowski K. 28.
 Cieszewski Wł. 40. 1895.
 Ciszka E. 59. 1894.
 Cink A. 56. *W*.

- Coghen A. 76.
 Cwiklicer L. 15. 1878.
 Cybulski N. Kr. *Petersburg*. 1880.
 Cybulski Teod. Kr.
 Cymbler W. 37. 1888.
 Czaczkowski J. L. 1896.
 Czaplicki T. L. 1900.
 Czaplicki Z. 43.
 Czapliński St. 34. 1897.
 Czarnecki J. 63.
 Czarnik S. L. 1893.
 Czaykowski A. Kr. 1898.
 Czepielowski S. L.
 Czerkawski J. 27.
 Czernecki W. L. 1900.
 Czerny E. Kr. 1895.
 Czerwiński K. 2. 1894.
 Czyżewicz A. L. W. 1865.
 Czyżewicz A. jun. L. 1900 L.
 Czyżewicz W. 23.
 Czyżyk F. 1.
 Dach L. 1897.
 Dadlez J. 51. 1883.
 Damm A. 52. 1902. L.
 Damm L. L.
 Damski W. 11. 1884.
 Danielski J. 55.
 Dattner H. Kr.
 Dattner J. L.
 Dawid M. 23.
 Dawid S. 58. W. 1892.
 Dawidowicz E. 61.
 Dębicki K. L. 1872.
 Deisenberg A. 10.
 Dekański S. L. 1891.
 Dembowski M. 46.
 Deutsch Z. 69. W. 1894.
 Dietzius A. 23. W. 1878.
 Dika H. 46. 1896.
 Dłuski K. 43. 1899.
 Dłuska B. 43.
 Dobiński W. L. 1972.
 Doboszyński L. 30. 1896.
 Doboszyński Z. 78.
 Dobrowolski S. Kr. 1897.
 Dobrucki 61. 1896.
 Dobrzański S. 48.
 Dobrzyński J. 11. 1897.
 Doliński E. L.
 Doliński M. 48. 1895.
 Dolnicki C. 73.
 Doliński W. L.
 Domański E. L.
 Domański S. Kr. 1868.
 Dornfest A. 15.
 Dornfest J. 55. W. 1892.
 Dorożyński J. 52.
 Dortort Ch. 2.
 Drahokoupil G. L. *Praga*. 1898.
 Dreifach I. 56. W. 1891.
 Drewiński M. 57. W. 1879.
 Droba St. Kr. 1896.
 Drozdowski W. 74.
 Drożdż B. Kr. 1880.
 Drzewicki S. 61.
 Drzymalik S. 77. W. 1879.
 Dubanowicz P. L.
 Dudziński J. 42. 1899.
 Dukiet J. L. 1874.
 Dujanowicz 7. 1897.
 Dulęba 35. 1889.
 Dumaire W. 65. 1881.
 Dundaczek F. Kr. 1899.
 Dura J. 11. 1874.
 Dwernicki S. 17. 1862.
 Dworzański K. 1. 1865.
 Dybuś-Jaworski L. 1899.
 Dylewski W. Kr.
 Dziewoński W. 1. 1867.
 Dzikowski Z. 67.
 Ebers H. 42. 1881.
 Ebersohn M. 67. 1880.
 Eckhard J. 66. W. 1872.
 Edelheit 57. W. 1890.
 Ehrenpreis E. Kr. 1899.
 Ehrlich D. L. W. 1889.
 Ehrlich H. 48. W. 1896.
 Eichel E. 63.
 Eichhorn F. Kr. 1881.
 Eisenstein I. 57.
 Eisenberg F. Kr.
 Eliasiewicz Z. 17. W. 1893.
 Elias S. L. 1893.
 Elektorowicz E. L. 1879.
 Elsner J. 55. 1891.
 Engländer B. Kr. 1899.
 Falk B. 8.

- Fechter T. 23. 1894.
 Feldmann M. 23. *W.* 1890.
 Feller A. 10. *W.* 1896.
 Fels I. L. *W.* 1897.
 Ferensiewicz M. 4. 1893.
 Festenburg E. L. 1867.
 Feuerstein I. L. 1893.
 Feuerstein H. 17. *W.*
 Feuerstein L. L.
 Feuerstein Łaz. 69.
 Feuerstein N. L. *W.* 1895.
 Fiałkowski L. L. *W.* 1880.
 Fiałkowski W. 55. 1883.
 Fibich S. L. 1895.
 Filewicz J. 42.
 Filimowski L. L.
 Filipkiewicz S. Kr. 1880.
 Filipkiewicz W. Kr.
 Finkel H. 77. *W.*
 Flecher O. 29.
 Fleszar J. 33. 1880.
 Flis Kaz. Kr. 1896.
 Fox J. 36.
 Foebus I. 67.
 Fonferko A. 79. 1900.
 Frank A. 37. 1894. *W.*
 Franke M. L. 1900.
 Fraenkel J. 3. *W.* 1890.
 Fränkel J. 48.
 Fraenkel H. 40. *W.* 1893.
 Fränkel H. 75.
 Frankowski W. L. 1890.
 Frączkiewicz J. Kr. 1901.
 Frauenglas M. 48.
 Frenkel H. Kr.
 Frey I. 63.
 Fried A. L.
 Friedberg J. 6.
 Friedländer E. 17.
 Friedman L. Kr. 1898.
 Friedwald A. 23. *W.* 1875.
 Frisch J. 66. *Praga*,
 Frisch Jul. L. *W.* 1892.
 Frommer Kr. 1898.
 Frostig H. 60. *W.*
 Fruchtmann F. 36. *W.* 1896.
 Fruchtmann F. L.
 Frucht M. 62. *W.* 1897.
 Frühling M. 18. 1891.
 Frydman Z. 18.
 Fuchs S. L. 1889.
 Fuchs L. 74.
 Fürbek L. 67. 1899.
 Gabel W. L.
 Gabryszewski A. L. 1887.
 Gabryszewski T. 2.
 Gaik J. 43. 1893.
 Gałuszka J. 39. 1895.
 Gansl. L. 1900. *Graz*
 Garbusiński S. 14. 1893.
 Gawalikiewicz L. 42. 1870.
 Gawlik J. 43. 1894.
 Gawlik J. 79. 1864.
 Gawlikowski St. 27.
 Gąsiorek F. 3. 1884.
 Gąsiorowski N. L. 1901. L.
 Gąsiorowski S. 36. 1899.
 Gębarzewski Z. L. L.
 Gerber R. 1.
 Gertler N. Kr. 1893.
 Gerzabek 22. 1898.
 Gettlich A. Kr. 1897.
 Gidlewski M. L.
 Gilnreiner M. 73. *W.*
 Gizelt A. L. 1902 L.
 Glas J. 5.
 Glaser L. 67. *W.* 1855.
 Glassner R. Kr.
 Glicksmann St. 47.
 Gliński K. Kr. 1898.
 Gluziński A. L. 1880.
 Gluziński L. L. 1882.
 Gładyszowski E. 66.
 Głowacki B. L. *W.* 1860.
 Głowiński W. 60.
 Głuszkiewicz W. 40. 1896.
 Gnoiński M. 34. 1899.
 Godlewski E. Kr. 1899.
 Godlewski M. Kr.
 Godłowski A. 37. 1894.
 Gogulski J. Kr. 1898.
 Gold J. 76. *W.* 1890.
 Gold J. 66. *W.* 1894.
 Goldberg H. Kr. 1897.
 Goldberger I. 46. 1893.
 Goldhaber I. 61. *Josephinum*
 Goldhaber M. 30.
 Goldschlag L. 30.
 Goldstaub B. 15.
 Gólski St. Kr. 1900.
 Gołębiowski K. 61.

- Gońka A. L. 1883.
 Gorner I. 51.
 Gorski Ks. Kr.
 Górka J. 11. 1900.
 Górka J. 53.
 Górski Ks. 43.
 Górski C. 3. 1882.
 Górski S. 15.
 Gostyński J. L. W. 1873.
 Gotfried M. 58. W.
 Gozdecki J. 78.
 Grabowicz W. Kr.
 Grabowski A. 66. 1901. L.
 Grabowski M. L. 1895.
 Grabscheid M. 48. W.
 Grabscheid 78. 1894.
 Gracka J. L. 1887.
 Graf J. L. 1901. L.
 Grażyński E. Kr. 1893.
 Grek J. L. 1901. L.
 Greliński A. L.
 Grodecki F. 43. 1879.
 Groman L. 1900. W.
 Gross K. L. W. 1863.
 Grosse Z. 55. 1893.
 Grossmann M. L.
 Gröbel M. L.
 Gruber T. 48.
 Gruder F. L. W.
 Gruszkiewicz L. 1900. 65.
 Grünfeld S. 6.
 Grünhut B. Kr. 1898.
 Grzybczyk S. 7. 1886.
 Grzybowski Kr. 1898.
 Grzybowski S. 71.
 Gürsching L. 1903. L.
 Gwiazdomorski J. Kr. 1879.
 Gwozdecki T. 52. 1895.
 Habicht K. Kr.
 Hacker D. 61. 1896.
 Haim L. 34.
 Halarewicz B. 52. W.
 Händel A. 23.
 Hammerschlag R. 43. 1888.
 Haisig K. L. 1896.
 Hamburger L. 1888. W.
 Harasowski A. 40. 1897.
 Hausvater J. 13. W. 1896.
 Hanakowski W. 1. 1891.
 Heftler N. 35. W. 1895.
 Hendrychowski St. 73.
 Herlinger M. Kr.
 Herman M. L. 1895.
 Hermelin E. L.
 Hernich F. 41. 1887.
 Herscher I. 22.
 Herz E. 55. W. 1892.
 Herzig N. 34. 1892.
 Hess E. 1. W. 1891.
 Heszeles E. L. W. 1893.
 Heyne B. 76. 1888.
 Hicner A. 24. 1889.
 Hilfstein H. Kr.
 Hirsch D. Kr. 1894.
 Hirsch H. Kr. 1893.
 Hirschler M. 10.
 Hochbaum O. 11. 1894.
 Hochstim A. 65. 1889.
 Hoffner O. 17. W.
 Hoeflich J. 60.
 Hofmohl L. 1897.
 Hojnacki W. L. 1892.
 Hołobut T. L. 1900. L.
 Hopfen S. 55.
 Hordyński A. 8.
 Hordyński D. 66. L. 1904.
 Hornung K. L. 1900. L.
 Horoszkiewicz Kr. 1898.
 Hovurka A. 68. W.
 Hoyer H. Kr.
 Hryniewicz T. 38.
 Hryniewicz J. 12.
 Hulles J. 29. W.
 Hyżycki S. 49.
 Idziński W. 79. 1888.
 Ikałowicz K. 16. W. 1886.
 Iłowiecki M. 33. 1888.
 Isterewicz St. 66. 1899.
 Jabłoński A. Kr.
 Jabłoński J. 57.
 Jabłoński S. 55. 1875.
 Jaciów M. 51. 1894.
 Jaciów T. 27. 1893.
 Jahr Saul 25. 1900.
 Jajus M. 60. W.
 Jakliński L. 54.
 Jakubowski A. 20. W. 1875.
 Jakubowski K. L. 1902. L.
 Jakubowski M. Kr. 1861.

- Janaček L. 1894. *Praga*.
 Janczy Fr. 7. 1895.
 Janda F. L. *Josephinum*. 1862.
 Janikiewicz St. 30. 1894.
 Janikiewicz S. 59.
 Janiszewski T. 43.
 Jankowski S. Kr. 1890.
 Jankowski W. L. 1896.
 Janowicz W. 61. *W*. 1894.
 Jantsch L. 1888. *Praga*.
 Jarecki K. Kr.
 Jaremkiewicz M. 15. 1892.
 Jarocki P. 70. 1892.
 Jarosz W. 76. 1892.
 Jasilkowski M. 2. *W*. 1892.
 Jasiński W. Kr.
 Jasiński A. 32. 1866.
 Jasiński S. L. 1901.
 Jastrzębski J. 26.
 Jastrzębski W. 23. 1889.
 Jaszczurowski K. L. 1894.
 Jaugustyn St. Kr. 1806.
 Jaworowski M. Kr.
 Jaworski W. Kr. 1880.
 Jaworski B. 29. 1880.
 Jeger I. 73. *W*. 1895.
 Jendl J. 20.
 Jordan H. Kr. 1870.
 Josse Ferd. Kr.
 Josse J. 40. 1895.
 Junger J. Kr. 1880.
 Jung W. 6. *W*. 1895.
 Jüngst W. 70. 1891.
 Juras Ant. 1. 1897.
 Jurowicz J. Kr. 1868.
 Kaczorowski B. L. 1887.
 Kaczyński S. 59. 1894.
 Kaczurba S. 48. 1898.
 Kaden K. 39. 1886.
 Kader Br. Kr. 1891. *Dorpat*.
 Kadyj J. 24. 1886.
 Kadyj H. L. *W*. 1875.
 Kalach F. 6. *Praga*.
 Kalman J. 55. 1900.
 Kanafas O. 21. *W*.
 Kantz 48. *W*. 1895.
 Kapellner M. Kr. 1902.
 Kapellner 17. 1896.
 Kapelusz E. 1. *W*. 1889.
 Kapper L. 1884. *Pr*.
 Karabiński E. 21.
 Karaś A. 39. 1897.
 Karchezy E. L.
 Karpiński S. 35.
 Kasperek L. 1895.
 Katynski L. 18. 1891.
 Kaufmann O. Kr. 1894.
 Kazrlik Ml. 72. 1897.
 Kędzior W. Kr. 1894.
 Kędzierski W. 62. 1896.
 Keller D. 48. *W*.
 Keller R. 1. 1889.
 Kepler P. 46. 1893.
 Kibitz L. 51.
 Kicki T. L. 1886.
 Kiczales I. 63.
 Kielanowski B. L. 1900.
 Kijas B. 37. 1855.
 Kijas T. 42. 1887.
 Kikinger E. L.
 Kippel J. 63.
 Kirchen 29. *W*. 1880.
 Kirkor M. Kr.
 Kirschner A. Kr. 1874.
 Kittner J. 5.
 Klarfeld I. 17. 1900. L.
 Klaubner A. 56. *W*. 1891.
 Klecki K. Kr. 1891. *Dorpat*
Kraków. 1893.
 Klein L. 1879. *W*.
 Kłesk A. Kr. 1900.
 Kłesk R. 19.
 Kleski A. 44.
 Kmietowicz F. 42. 1890.
 Knauer 7. *W*. 1898.
 Kobryński W. L. *W*. 1887.
 Kobylański A. L. 1891. *W*.
 Kocay 32. 1885.
 Koczurkiewicz L. 1895.
 Koepel H. 55. *W*. 1894.
 Koffler Maur. 29.
 Kohlberger 36. 1881.
 Kohn M. 18.
 Kolasiński A. 53. *Praga*. 1890.
 Koller B. 66. *Josephinum*.
 Kołaczkowski A. L.
 Kołaczkowski J. 43. 1874.
 Komorowski B. 31. 1901.
 Komorowski C. Kr.
 Koncowicz J. 50. *W*. 1878.
 Kondratowicz A. 78.

- Konera S. 12. 1898.
 Kopaczyński W. 61.
 Kopff L. Kr. 1880.
 Korczyński L. Kr.
 Korman I. L. W. 1891.
 Kosterkiewicz F. 42. 1879.
 Kosterkiewicz A. 16. 1894.
 Kościński F. L. 1890.
 Kos J. 29.
 Kossak L. L. 1878.
 Kostanecki K. Kr. Berlin 1890.
 Kosz K. 38.
 Kotłowski S. 16. W.
 Kowalewski E. 30.
 Kowalski S. 67.
 Kowalski M. 63.
 Kowalski E. L. 1886.
 Kowenicki A. 8. 1895.
 Kowenicki W. 66. 1895.
 Kownacki J. 72.
 Kozakiewicz A. 29.
 Kozierowski E. 20.
 Kozłowski B. 17. 1892.
 Kozłowski M. Kr.
 Kraft L. Kr.
 Krański J. 59.
 Krasucki. L. 1887.
 Kraus H. 55. 1889.
 Krauss A. 5. 1895.
 Kramarzyński M. 48.
 Kramarzyński K. Kr. 1877.
 Krasowski St. 61.
 Kretowicz W. 18. 1872.
 Kretz B. L. W. 1883.
 Kreutz J. 61. 1895.
 Krobicki T. L. 1876.
 Krokiewicz A. Kr. 1886.
 Kronfeld H. 53. 1896.
 Krongold W. Kr. 1874.
 Kroo J. 10. W.
 Kropaczek F. 32. 1890.
 Kruk K. 34. 1877.
 Królikowski J. Kr.
 Kruszyński K. L. 1884.
 Kruszyński W. L. 1897.
 Kruszyński St. 36.
 Krygowski T. L. 1890.
 Krynicki J. 57. W. 1890.
 Krzyszkowski J. L. 1897.
 Krzysztalowiec Ad. 16. W. 1868.
 Krzysztalowiec August. 78.
 Krzysztalowiec F. Kr. 1892.
 Krzyżanowski E. 10. W.
 Krzyżanowski K. L. 1888. W.
 Kubiszał St. L. 1898.
 Kucharski P. L. 1885.
 Kucera P. L. 1897. Praga.
 Kuhn A. 17.
 Kunzek H. Kr. 1894.
 Kułakowski R. L.
 Kupczyk Kr.
 Kurasiewicz J. 64.
 Kurkiewicz St. Kr. 1896.
 Kurowiec J. 26. W.
 Kurzyniec W. 14. 1895.
 Kuśnierz P. 59.
 Kutna S. 48.
 Kuźniar W. 65. 1891.
 Kwaśnicki A. Kr. 1876.
 Kwiatkiewicz S. L. W. 1885.
 Kwiatkowski B. St. Kr. 1896.
 Kwiatkowski S. Kr. 1902.
 Kwieciński M. 1. 1879.
 Labersche E. Kr. 1901.
 Lachawiec A. 61.
 Lachowicz Z. L. 1875.
 Lachs J. Kr. 1894.
 Landau A. 47.
 Landau F. L. W. 1888.
 Landau S. 71. 1894.
 Landau J. Kr. 1894.
 Landau R. Kr. 1894.
 Landesberg M. 6. W. 1893.
 Lang O. 39. 1894.
 Langbank B. 62. 1894.
 Langer J. 38. 1893.
 Langie A. Kr. 1888.
 Langsam 43. 1893.
 Last A. 40. W. 1888.
 Laszkiewicz A. 68. W.
 Lanes S. 32.
 Lateiner E. L. W. 1884.
 Latkowski J. Kr.
 Lauer A. Kr.
 Laufer M. 76.
 Lautersiein L. L.
 Lebedowicz E. 38.
 Lebnhart E. L.
 Lechowski W. 17.
 Lechowicz. L. 1901. W.

- Legeżyński W. L. *W.* 1890.
 Lehman. 61. 1889.
 Leiblinger J. 66. *W.*
 Leinkram M. Kr. 1902.
 Lemberger I. kr. 1898.
 Lenartowicz J. Kr. 1902.
 Lenartowicz R. 35. 1890.
 Leńko Z. L. *W.* 1894.
 Leszczyński R. L. 1901. L.
 Lewandowski J. 71. 1905.
 Lewicki L. 45.
 Lewicki S. L. 1898.
 Lewicki R. Kr.
 Lewicki Z. 29. *W.* 1891.
 Lewin A. L. *W.* 1895.
 Lewkowicz Ks. Kr. 1895.
 Lic H. 9.
 Lic F. 59.
 Lichtgarn D. 17.
 Lickendorf I. L. 1889. *W.*
 Liebermann E. Kr.
 Liebeskind Kr. 1897.
 Ligeza J. 3.
 Lilien N. L. *W.* 1892.
 Link L. 1873. *W.*
 Lippel J. 63. 1891.
 Lipski K. 58. 1900. *Graz.*
 Litwinowicz T. L. 1900. L.
 Litwinowicz O. 69.
 Litwinowicz O. L. 1901.
 Lityński L. 48. *W.*
 Loewy A. 41.
 Longchamps L. 1878.
 Lorentski A. 37. 1868.
 Löw B. 17. *W.*
 Löw W. 63.
 Lubowiecki J. 58.
 Ludmirski Z. 31.
 Ludwig St. L.
 Lukas A. L. *Praga.* 1871.
 Luster L. Kr.
 Lustig H. 66.
 Lustig S. Kr. 1890.
 Lustgarten L. Kr. *W.* 1870.
 Lutyński L. 13. *W.* 1876.
 Ławrowski 41. *W.* 1897.
 Łazarski J. Kr. 1879.
 Łepkowski W. Kr. 1890.
 Łobaczewski A. Kr. 1899.
 Łodziński W. 39. 1875.
 Łodygowski J. 79. 1898.
 Łopaciński M. Kr. 1895.
 Łopatyński E. 24.
 Łopatyński J. 76.
 Łowczowski W. 7. 1891.
 Łukasiewicz W. L. 1883.
 Łukasiewicz W. 42. 1883.
 Łuniewski S. 29.
 Łuszczkiewicz J. 60.
 Mach S. 23. 1895.
 Mach A. 52.
 Machauf W. 1902.
 Machek E. L. *W.* 1877.
 Macher O. 1.
 Maciejowicz 60. 1897.
 Maciąg A. Kr.
 Macudziński W. 24. 1868.
 Mączka T. Kr. 1876.
 Madeyski J. 48.
 Mahl J. L. *Graz.*
 Majewicz E. 43. 1898.
 Majewski F. Kr.
 Majewski Kaz. Kr. 1897.
 Majewski T. 3. 1895.
 Majewski A. 61. 1894.
 Majewski A. L. *W.* 1871.
 Majewski Al. L. 1885. *W.*
 Mallik J. 23.
 Malinowski G. 31. 1891.
 Maliszewski H. 36. *W.*
 Malsburg H. 8. 1896.
 Matzke H. Kr. *W.* 1884.
 Małaczyński R. 68. 1892.
 Małaczyński R. 62.
 Manheim M. 48. *W.*
 Mang J. 9. 1899.
 Mańkowski H. L. 1900.
 Mańkowski K. 20. 1895.
 Marcisiewicz F. Kr. 1883.
 Maresch 29. *W.* 1801.
 Margulies M. L. 1893. *W.*
 Margulies W. 50. 1900.
 Marischler J. L. 1894.
 Markiewicz J. 35. 1898.
 Markiewicz D. 49. 1894.
 Markiewicz H. 56.
 Markl J. 54. 1892.
 Markstein W. 27. *W.* 1896.
 Markowski J. L. 1900. L.
 Mars A. L. 1875.

- Marynowski J. 15. 1891.
 Maszewski St. 39. 1898.
 Mautendorfer L. 1866. W.
 Mayer L. W. 1890.
 Mauer M. 33. W.
 Maurer Z. 34. 1901.
 Mayzel T. Kr. 1879.
 Mazanek J. 76. 1894.
 Maziarski St. Kr. 1897.
 Mehrer H. L. W. 1872.
 Mehrer J. 59. W.
 Meisels J. 63. W.
 Meisels Z. 23. W. 1888.
 Meisels S. L.
 Meller J. 65. 1894.
 Mendowski W. 49. 1895.
 Mendelsburg H. Kr. 1880.
 Merunowicz J. L. 1873.
 Merunowicz R. L. 1900.
 Merz A. Kr. 1898.
 Meschel J. 1896.
 Meth S. 24. 1892.
 Metzger J. 67. W. 1852.
 Mezki T. 53.
 Mezyk J. 62.
 Michalik Fr. 48. 1890.
 Michalik J. 66. 1888.
 Michalski W. 63.
 Michl. L. 1901. Pr.
 Miczulski J. 51.
 Mises I. 58. W. 1895.
 Mises H. L. 1903. L.
 Mięslowicz E. Kr. 1899.
 Michnik A. 46.
 Mihowicz Br. 78. 1894.
 Mikolaschek A. L.
 Mikołajski S. L. 1888.
 Mildner J. 12.
 Milewski T. 29.
 Millet A. 14. 1861.
 Mindes J. 17.
 Mintz J. L. 1898. W.
 Miodoński Fr. 1. 1893.
 Mironowicz K. 63. W. 1874.
 Misky E. Kr.
 Miszewski St. 25. 1899.
 Mitscka K. Kr.
 Moch J. 49. W.
 Modzakowski J. L.
 Mogilnicki 10. W. 1894.
 Mohr D. 42. W. 1886.
 Momidłowski W. 65.
 Mondschein M. 61.
 Moraczewska Z. L. 1900.
 Moraczewski W. L. 1891.
 Zurych.
 Morawski M. 66.
 Mosing. L. 1896.
 Mosler M. 6.
 Mossoczy S. 10.
 Mossor M. 47.
 Mostowski St. Kr.
 Moszkowicz J. L. W. 1882.
 Murczyński W. Kr. 1895.
 Murdzieński F. Kr. 1877.
 Muszkiet K. 77.
 Müller E. L. 1901.
 Müller F. L. 1892.
 Müller R. 16. 1897.
 Münz E. Kr. 1890.
 Münzer J. L. 1899. W.
 Münzer M. 66. W.
 Mydlarski W. 45. 1890.
 Nacht E. 23.
 Nacht F. 10. W.
 Nadel R. 26. W. 1897.
 Nartowski M. Kr. 1896.
 Natter W. 64. 1886.
 Nawrat S. 46. 1886.
 Neuberger Z. 59. W. 1601.
 Newestiuk J. 77. 1894.
 Neymand S. 11. 1901.
 Nieć J. 79. 1900.
 Nieć T. 55.
 Nikliborc. J. 71. 1896.
 Nitsch R. Kr. 1899.
 Niziołek P. 9. 1893.
 Nodzyński B. 3. 1890.
 Notz J. L.
 Nowak Dyon. Kr. 1902.
 Nowak Jul. Kr.
 Nowak I. 16. W.
 Nowak W. L.
 Nowak Wład. 79. 1895.
 Nowicki W. L. 1902.
 Nowotny Fr. Kr. 1897.
 Nussbaum 6.
 Nycz W. 1.
 Nycz H. 7.
 Obmiński X. Kr.
 Obrzut A. L. 1881.

- Obtulowicz F. 36. 1874.
 Ochsenhorn M. 61. W. 1881.
 Ochsenhorn Ch. 66. W. 1892.
 Offe I. 29.
 Ogórek Fl. L.
 Olejnik M. M. 77. 1890.
 Oller. 48. 1896.
 Olpiński J. 69.
 Olszewski B. 42. 1889.
 Opieński J. 77. 1888.
 Opolski W. L. 1867.
 Opolski J. 61.
 Opydo F. 71. 1881.
 Orski J. 25. 1889.
 Ortyński 56.
 Orzechowski J. 61. 1893.
 Orzeł J. 34. 1881.
 Ostafiński M. 61.
 Oświecimski S. 3. 1875.
 Owczarski J. L.
 Owsiniński J. Kr. 1901.
 Ozga K. 70. 1899.
 Ozimek S. 67. W. 1886.
 Ozarkiewicz E. L. W. 1888.
 Ożarowski S. 51.
 Pacyna J. 61. 1900.
 Pajaczkowski W. 57. 1893.
 Paklikowski B. L. 1901.
 Palesten H. 21. W. 1892.
 Panek L. 1897.
 Papée J. L. 1891.
 Pancewicz J. 46. 1877.
 Pareński S. Kr. 1868.
 Pasiecznicki E. 40. 1900.
 Patryn J. 64. 1883.
 Paulo A. 76.
 Pawlica W. Kr.
 Pawlicki A. L.
 Pawlicki T. 30. 1879.
 Pawluk B. 27. W. 1894.
 Peczenik L. 63. W. 1893.
 Pelczar Z. 17. 1801.
 Perlmutter A. 69.
 Pertak M. 68. 1893.
 Peters J. 16.
 Pfau Ascher L. 1900.
 Piasecki E. L. 1896.
 Piasecki W. 43. 1871.
 Piaskiewicz W. 29. 1880.
 Piątkowski M. Kr. 1890.
 Pieniążek P. Kr. 1874.
 Piepes W. Kr.
 Pietrzycki A. 3.
 Pilecki Z. 58. 1896.
 Pilewski O. L. 1893.
 Piltz J. Kr.
 Pilzer H. 67. 1890.
 Piotrowski E. 12.
 Piotrowski G. L. 1886.
 Piotrowski S. Kr. 1897.
 Piotrowski Tym. Kr. 1895.
 Piórko A. 46. 1882.
 Pisek W. L. 1879.
 Pisek H. 46. 1895.
 Pisarski T. Kr.
 Plischke. L. 1900. Pr.
 Pluciński M. Kr.
 Płochocki T. 42. 1889.
 Podlewski K. L. 1883.
 Podtusi M. 16. W. 1872.
 Podobniński A. 72. 1869.
 Podsoński. L. 1895.
 Pohorecki W. 22.
 Polański St. 38. 1896.
 Pollaschek F. 57.
 Ponikło S. Kr. 1877.
 Popielski L. L.
 Porajewski J. 35. 1897.
 Pordes M. 48. W. 1874.
 Porycki B. 52. 1894.
 Potochajło J. 12.
 Potok H. 45. 1896.
 Poźniak M. Kr. 1896.
 Praschil I. L. 1897.
 Prebendowski S. 27. 1893.
 Pretzel G. Kr. 1901.
 Probst J. 35.
 Progulski St. L.
 Prus J. L. 1883.
 Przesmycki J. 18. 1888.
 Przybylski S. 23. 1900.
 Przybylski S. Kr.
 Przybyszowski 14. 1895.
 Przysiópski J. 32. 1887.
 Puchalski S. 15. *Innsbruck* 1891.
 Puzdrowski J. 40. L.
 Puzon R. Kr. 1900.
 Quest R. L.
 Raczyński J. L. 1889.

- Raczyński A. 61. 1897.
 Radecki P. Kr. 1891.
 Radziński K. 65. 1893.
 Rager J. 6.
 Ramer S. 57. 1898.
 Rapoport L. Kr. 1902.
 Rappaport M. L. 1898. W.
 Rapoport S. 66.
 Rapaport O. 63.
 Rapp L. L. W. 1890.
 Rappaport S. L. 1879 W.
 Rawski A. 62.
 Rawski T. 78. 1896.
 Rechen L. L. 1901. L.
 Rehan L. 66.
 Reich S. 70
 Reichenstein M. L. 1900.
 Reik J. 41. W. 1896.
 Reinhold J. L. W. 1889.
 Reinhold Z. L. W. 1892.
 Reiss W. L. 1898.
 Reiss Wł. Kr. 1890.
 Regiec J. Kr.
 Reitzes D. L. 1805.
 Rencki R. L. 1893.
 Rentschner L. 1902. L.
 Richter A. 61. W.
 Richter J. 42. 1856.
 Riedmüller B. Kr. 1895.
 Rieser H. 1890.
 Rittgstein St. L.
 Riwczes. L. 1890. W.
 Robel W. 35. 1892.
 Rogalski W. 67.
 Roicki A. L. 1870
 Rokossowski W. 38. 1893.
 Roller F. 53. W. 1871.
 Rościszewski E. 48. 1886.
 Rose E. 51. 1897.
 Rosen A. 73.
 Rosenbaum. 6.
 Rosenbaum U. 22.
 Rosenbaum 61. 1897.
 Rosenblatt E. Kr. 1878.
 Rosenblüth E. 12. W. 1889.
 Rosenfeld A. 66. W.
 Rosenfeld M. 66.
 Rosenheck S. 29. W.
 Rosenheim. 17.
 Rosenmann O. 66
 Rosenzweig L. L. W. 1872
 Rosmarin J. 61.
 Rosmarin H. 30.
 Rosner Al. Kr. 1890.
 Rosner Ig. L. W. 1863.
 Rosner J. L. 1872.
 Rossberger S. 23. W. 1889.
 Roszko A. 21.
 Roth A. L. 1902. L.
 Roth J. 24. 1853.
 Roth S. 78. W. 1897.
 Roth W. 2.
 Rożeczki J. Kr. 1888.
 Rózański J. L. 1866.
 Rubin A. L. 1901. L.
 Rubinstein J. 61. W.
 Rubinstein N. 17.
 Ruczka S. 48.
 Rudnicki K. 14. 1881.
 Ruff S. L. 1895.
 Rutkowski K. Kr.
 Rutkowski Maks. Kr. 1892.
 Rydel A. Kr. 1899.
 Rydygier A. L. 1901. L.
 Rydygier L. L. *Gryfia*. 1874.
 Safian L. 22. 1897.
 Sakler E. 68.
 Salpeter 47. W. 1896.
 Salzmann J. 62.
 Sałaban L. 20. 1991.
 Satkowski Z. Kr. 1894.
 Sawicki A. 50. 1893.
 Sawicki E. L. W. 1863.
 Sawicki J. L. 1870. *Stras.*
Krak.
 Sawczyński A. L. 1901.
 Schaitter J. Kr. 1883.
 Schaff S. 52. W.
 Schapira A. 6. W. 1891.
 Scharf J. Kr.
 Scharf J. 57.
 Schächter Sam. 63.
 Schein H. 43. W. 1870.
 Schellenberg L. L. *Graz*.
 1892.
 Schenker A. 8.
 Scherp D. 68. W. 1896.
 Schermant J. Kr. 1895.
 Schindler I. 63.
 Schlank J. Kr.
 Schlank M. 1. 1874.

- Schmar F. L.
 Schmar J. 58. L.
 Schmidler L. 23. 1889.
 Schmelkes M. L. 1892.
 Schmetterling A. 76. W. 1892.
 Schmidt A. 3. 1898.
 Schmidt F. 39.
 Schmidt S. 25. 1901.
 Schoeffer F. 48. *Graz*.
 Schöngut S. Kr. 1887.
 Schneck K. 11. W. 1887.
 Schneider G. L. 1897.
 Schneider L. Kr. 1889.
 Schneider N. L. 1900. L.
 Schor. L. 1874. W.
 Schramm H. L. 1880.
 Schudmak A. Kr.
 Schumann F. Kr. 1890.
 Schutt E. 49. 1898.
 Schützer L. 67. 1890.
 Schwarz A. Kr. 1887.
 Sciborowski K. 34.
 Seidler A. 79. W. 1863.
 Seidner A. 5. W.
 Sekanina J. 16. *Josephinum*.
 1872.
 Seller I. 4. W. 1895.
 Selzer J. L. 1892.
 Selzer M. L. 1901. L.
 Selzer Z. 66.
 Semler D. 23.
 Seńkowski M. Kr. 1895.
 Senensieb I. L. 1902. W.
 Serbeński W. L. 1803.
 Serkowski B. 63.
 Serkowski R. 4. 1895.
 Serkowski W. 63.
 Sędziowski J. Kr. 1901.
 Sędzimir C. 25. 1896.
 Sękiewicz F. 17. 1896.
 Siedlecki J. 42. 1890.
 Sielski S. L. W. 1880.
 Sieniewicz M. 55. 1892.
 Siatecki K. 30.
 Siebner N. 22.
 Siegel S. Kr.
 Sieradzki W. L. 1894.
 Siewierski P. 60.
 Silbermann L. 42. W. 1877.
 Silberstein J. 29. W. 1888.
 Silberstein J. 50.
 Silberstein J. Kr.
 Silberstein S. L. W. 1891.
 Singer M. L. W. 1889.
 Skałkowski B. L. W. 1886.
 Skibicki A. 8.
 Skobel S. Kr. 1872.
 Skomorowski J. 30. W.
 Skórkowski J. 11. 1898.
 Skórczewski B. Kr. 1876.
 Skórski M. 75.
 Skórski W. Kr.
 Skowroński W. 67. 1874.
 Skrobaczewski P. L.
 Słaczka A.
 Słęk F. L. 1897.
 Sliwiński M. Lr. 1879.
 Słosarczyk A. 1. 1886.
 Słapa W. Kr. 1891.
 Służewski K. 39. 1895.
 Smolarski W. Kr. 1894.
 Smolarski Z. 48.
 Smorągiewicz K. 46. 1889.
 Smyczyński J. 50.
 Snieżek L. 54. 1890.
 Sobelsohn D. 22.
 Sobelsohn Efr. L. 1901. L.
 Sobelson Fr. 47.
 Sobieszczański L. 21. 1894.
 Sobolewski F. 56.
 Sochacki Leon. 12. 1894.
 Sochanik t. 8. S.
 Sochański J. L. 1886.
 Sokal Jak. L. 1902. L.
 Sokal M. L.
 Sokal M. 10. W.
 Sokołowski H. Kr. 1886.
 Soleccki J. 55. 1890.
 Soleski K. L.
 Solomowicz J. L.
 Sołowski J. 73. 1880.
 Sołowij A. L. 1884.
 Sołtysik M. 63. 1895.
 Sołtysik. L. 1898.
 Sołtysik S. 6.
 Soniewicki T. 62. 1893.
 Spalke Z. L. 1893.
 Spira R. Lr. W. 1880.
 Spitzel J. 72. 1886.
 Spitzer J. L. 1887. W.
 Springer K. 48.
 Sroczyński J. 1. 1895.

- Stachiewicz T. L. 1885.
 Stablewski W. 30.
 Stahr E. Kr. 1895.
 Stangenhaus 57. 1894.
 Staniszewski J. 31. 1895.
 Stankiewicz F. L. 1895.
 Stankiewicz. Kr. 1896.
 Stanko W. 67.
 Stanowski K. 36. 1891.
 Stanowski Z. 65. 1898.
 Starachowicz J. 97. 1891.
 Staszewski M. Kr.
 Stauber S. L. W. 1894.
 Starzewski J. L. 1894.
 Stefanicki J. 61.
 Stein M. 52. W. 1897.
 Steinberg B. Kr.
 Steiner S. 72. 1886.
 Stenzel B. 61.
 Sternberg J. 37. 1893.
 Steuer A. 1. W. 1894.
 Steuermark Z. Kr.
 Stock J. 61. 1899.
 Stocknopf J. L.
 Stoeckl. 13. W.
 Stoklassa J. 13. 1886.
 Stokłosiński F. 51.
 Stopczanski A. Kr. W. 1858
 Stopczanski J. Kr. 1902.
 Strasser E. 55.
 Stroynowski E. L. W. 1873
 Stronczak K. 67.
 Strumiński A. 61.
 Strycharski J. 32. 1900.
 Stupnicki W. 27. W.
 Sturm L. 75. W. 1894.
 Sumorok K. 29. 1896.
 Surzycki J. Kr. 1885.
 Supiński E. Kr. 1896.
 Süsskind A. Kr. 1889.
 Süsswein. 48.
 Świętek W. 46. 1872.
 Świątkiewicz M. L. 1886.
 Świątkiewicz J. L. 1899.
 Świątkowski J. L.
 Świątkowski S. L. 1897.
 Swieżawski L. 18.
 Swiderski B. 58. W. 1873.
 Swistun A. 66.
 Switalski M. L. 1897.
 Syrop J. Kr. 1894.
 Szarkowski 49. 1896.
 Szatkowski M. 67.
 Szajnowski Wl. M. 52.
 Szczepański W. 24.
 Szczepański T. 24. 1867.
 Szczepański R. L. 1899.
 Szczepański Z. L.
 Szczurkowski L. 1900. L.
 Szelaż J. 60.
 Szewczyk J. Kr. 1862.
 Szostkiewicz K. 53.
 Szostkiewicz S. 28. 1885.
 Szpilmann J. L. 1883. W.
 Szponder W. 19. 1879.
 Szurek S. Kr.
 Szware J. 32. 1900.
 Sztembarth C. L. 1883.
 Szulistański L. 1890.
 Szuszkiewicz P. L. 1872.
 Szydłowski Z. L. 1888.
 Szymański H. L. 1886.
 Szymonowicz W. L. 1893.
 Szyszkowski W. 48. W. 1874.
 Tarchalski J. 71. 1880.
 Tarnawski A. 30. 1877.
 Taub S. 64. 1895.
 Tatarczuch W. L. 1877.
 Teichmann A. Kr. 1896.
 Teitelbaum M. S. W.
 Teller J. 55. 1894.
 Tenner J. 17. W.
 Teodorowicz T. L.
 Terenkoczy L. 1883. W.
 Terlecki A. 52. W.
 Tiegermann Em. 17. W.
 Thom T. L.
 Tokarski F. 24.
 Tokarski St. Kr. 1894.
 Topolnicki J. 66.
 Torczyński T. Kr. 1890.
 Trammer A. 67. W. 1891.
 Treliński M. 49. 1896.
 Trembecki H. Kr. 1898.
 Trybulec F. 48.
 Trzaskowski B. 22. 1887.
 Trzcieniecki K. L. *Graz*. 1887.
 Trzciniński B. Kr. 1894.
 Trzciniński P. 53. 1896.
 Trześniowski R. 36. 1897.
 Tryniecki B. 33. 1896.

- Turnau K. L.
 Turnheim S. 23.
 Turteltaub S. 35.
 Turzański G. 23. 1887.
 Tuszyński F. Kr.
 Türkel S. 58. *W.* 1896.
 Tworowski Ign. 17.
 Tyszecki T. Kr.
 Tyszkowski L. 54.
 Uchacz B. 39. *W.* 1877.
 Udziela M. 48. 1888.
 Uranowicz T. 8. 1877.
 Urbanik R. 65. 1898.
 Urech 60 *W.*
 Uromski H. Kr. 1896.
 Ustrzycki J. 6. 1895.
 Verstaendig J. 65.
 Vincenz A. 44. *W.*
 Wachholz L. Kr. 1890.
 Wachnianin J. 60. 1895.
 Wachnianin M. L.
 Wachłowski. L. 1900. *W.*
 Wachowicz I. 36.
 Wachtel A. L. 1884.
 Wachtel Z. Kr. 1893.
 Wachtel Z. (jun.). Kr.
 Wachs M. 77.
 Wajgel E. L. 1898.
 Wągrowski K. 13.
 Wątarek A. L. 1897.
 Walczyński J. 67. 1881.
 Waligórski Cz. 78.
 Walkowski J. 11. 1896.
 Wallach D. L. *W.* 1893.
 Walsleben T. 32.
 Warzycki Kr. 31.
 Wąsowicz Z. Kr. 1896.
 Wechsler E. L. 1889.
 Wechsler L. 1. 1893.
 Wehr W. L. 1875.
 Weigel J. L. *W.* 1866.
 Wein H. L. 1897.
 Weinreb Moj. L. 1897. *W.*
 Weinreb S. 68.
 Weissberg L. L. 1899.
 Weissberg Z. 66. *W.*
 Weissmann G. 6.
 Węclewski T. 17.
 Werner K. 59.
 Wernikowski W. Kr. 1898.
 Wernicki J. L. *Moskwa.* 1860.
Kraków. 1866.
 Wernicki K. 19. 1895.
 Wicherkiewicz. Kr. *Berlin.*
 1872.
 Wiczkowski J. L. 1883.
 Wierzbiński G. Kr.
 Wieselmann J. 79.
 Wieselmann M. 3.
 Wiktor J. L. 1876.
 Wiktor M. L. 1895.
 Wilczyński L. Kr. 1900.
 Wilder I. 17. *W.*
 Willer A. L. 1890. *W.*
 Wilkosz A. Kr. 1874.
 Wilson R. 22.
 Winogrodzki A. 56. 1900.
 Wisłocki J. 36.
 Wiśniewski W. L.
 Witoszyński W. 66. 1895.
 Witkowski E. 33.
 Witaliński W. Kr. 1901.
 Wittels J. 61.
 Wnekowicz S. 61.
 Wobr Pr. 1890.
 Wodecki Z. L.
 Wojciechowski B. Kr.
 Wojczyński M. 43. *Peters-*
burg. 1895. *Kraków* 1900.
 Wójtowicz E. Kr. 1891.
 Wójtowicz J. 48.
 Wolf Aron L. 1901.
 Woszczyński J. 36. 1893.
 Woynarowski K. 11. 1895.
 Wróblewski W. 71. 1895.
 Wurst A. 26.
 Wychowski Wł. Kr.
 Wyrzykowski K. 77. 1896.
 Wysocki A. 76.
 Zabłocki S. L. *W.* 1896.
 Zadurów B. 70.
 Zadurów E. 70. 1886.
 Zagórski A. 55. *Bazylea.*
 1866.
 Zagórski R. 36.
 Zajączkowski J. L. 1895.
 Zakaszewski W. 3.
 Zakreys F. L. 1890.

- Zakrzewski J. L. 1893.
 Zaleski E. 76.
 Zaleski Karol. 57.
 Zaleski Kaz. 61.
 Zalewski Teof. L.
 Zanietowski J. Kr. 1893.
 Zaorski B. 27.
 Zaremba G. Kr.
 Zaręba A. 14. 1872.
 Zarzycki E. 20.
 Zasacki S. 6. 1894.
 Zathay W. 5. 1903.
 Zatlókal R. 30. 1894.
 Zavadil T. L. 1890.
 Zawadziński S. 71.
 Zawadzki. L. 1902. L.
 Zawilski S. 33. 1894.
 Zawisza A. 64.
 Zbigniewicz J. 67. 1890.
 Zborowski J. 71. 1870.
 Zduń J. 30. (ojc.). 1854.
 Zduń J. 39. (syn). 1892.
 Zeitner J. Kr. 1894.
 Zgórski K. L. 1884.
 Ziarko J. Kr. 1896.
 Zieliński R. 42. 1894.
 Ziembicki G. L. *Paryż*. 1875—
W. 1880.
 Ziembicki W. L. 1900. L.
 Ziemiński M. Kr.
 Zins Klemens 61. 1896.
 Zion O. L. *W.* 1891.
 Zipper A. L. 1899. *Graz*.
 Zierhoffer K. 47. *W.* 1892.
 Zoll J. Kr. 1892.
 Zopoth A. Kr. 1896.
 Żędzianowski S. 71. 1888.
 Żeleński T. Kr. 1900.
 Żmigrod B. Kr. 1900.
 Żukowski A. 61. *W.*
 Żuławski K. Kr. 1870.
 Żuławski L. 18. 1896.
 Żurakowski R. 4. 1898.
 Żukotyński J. 53.
 Żychoń J. 43. 1894.
 Żydłowicz W. Kr. 1894.

SPIS CHIRURGÓW.

- Ackerbauer S. 23. *Lwów*
 1870.
 Aderschlager J. 75. *Peszt*
 1899.
 Adler S. 10. *Peszt*. 1860.
 Arzt J. 33. *Lwów*. 1862.
 Atlas S. 57. 1875.
 Bendl Z. 25. *Peszt*.
 Benda A. 52. *W.* 1858.
 Bendel Z. 25.
 Berger A. 30. *Klausenburg*.
 Berger E. 58. *Lwów*.
 Bernfeld L. 55. *Budapeszt*
 1868.
 Beschloss M. L. L. 1863.
 Biber M. 48. L.
 Bienenwald S. 75. L. 1868.
 Blaustein E. L. L. 1860.
 Blum Z. 60. *Klausenburg*.
 Brauner L. 15.
 Burnatowicz R. 21. *Ołomu-*
nec.
 Chilf J. 48. L.
 Chilf S. L. L. 1866.
 Czernek H. 7. *W.* 1852.
 Deutsch H. 75. *Peszt*.
 Elner M. 51. L.
 Ellner S. 76. L.
 Erychleb J. 71. *Peszt*. 1869.
 Gabel H. L. L. 1866.
 Gabel R. 25. L.

Grabscheid M. L. L. 1869.

Grader M. 61. L. 1868.

Grünfeld J. 6. *Peszt.*

Handt J. 2. *Klausenburg.*

Hellman T. 65. L. 1865.

Herzum J. 55. *Ołomuniec* 1853.

Hirsch H. 51. *Peszt.*

Hirschhorn F. 75. L.

Hladij S. 22. L.

Hrazdilek E. 66. *Ołomuniec.*

Kelhofer S. 70. L.

Kibitz B. 51. L.

Kibitz N. 51. L.

Kiczales H. 26. L.

Klein D. 78. *Ołomuniec* 1868.

Kostman J. 49. L.

Kräuterblüth J. 63. *Klausenburg* 1867.

Kreiner E. L. L. 1874.

Krist 6.

Kujłowski L. 16. L. 1849.

Küermann. 49.

Kurzer L. L. *Peszt.* 1868.

Landau A. 19. L.

Lateiner L. L. L. 1861.

Letz S. L. L. 1864.

Lisowski M. L. *Magist. wie-*
deński.

Loewner 61. L.

Mantel M. 74. *Peszt.*

Mark S. L. L. 1872.

Metal J. 58. *Peszt.* 1860.

Mosler M. 10. L. 1859.

Neustein J. 69. L.

Nussbaum M. 6. *Peszt.* 1855.

Obuszkiewicz S. 62. L. 1868.

Ostersetzer A. 131 L.

Planer J. 66. L. 1867.

Petersil J. 75. L.

Pomeranz F. 61. L. 1858.

Pordes S. 60. L.

Raab H. 38. L. 1855.

Rager J. 6. L. 1860.

Raps. 27.

Rares J. 22. L.

Reder E. 29. *Klausenburg.*

Reiner J. 55. L. 1851.

Reischer J. 73. *Klausenburg.*

Reiss E. 53. L. 1864.

Rosenbaum L. 6. L.

Rosenbaum M. 60. L.

Rosenberg N. 62. L. 1865.

Roth W. 2. L.

Rötter A. 12. L.

Rotter H. 55.

Rudich L. 30. *Klausenburg.*

Salver J. 48. L.

Schabbus E. 37. *Klausenb.*
1871.

Scheps J. 19. *Klausenburg.*

Schnitzer P. L. W.

Siebner N. 22. L.

Siegelbaum J. 27. L.

Sobelsohn D. 22. L.

Spiegel E. 64. L. 1872.

Starwer M. 60.

Stein A. 65. *Klausenburg.*

Temple D. 63. *Peszt.*

Terner H. 29. L.

Thalheim J. 48. L. 1874.

Weczerka A. 71. *Ołom.* 1852.

Wieselmann M. 3. L. 1870.

Wehrn L. 77.

Zauderer M. 42. *Wieden.* 1851.



RABKA

Najsilniejsza solanka jod i brom zawierająca.

ZAKŁAD ZDROJOWY

położony na słonecznej wyżynie, 510—540 mtr. n. p. m. wśród ślicznych widoków na okalające góry. Klimat łagodny, podgórski (subalpine), powietrze czyste, wolne od kurzu.

Cztery źródła: **Maryi, Rafaeli, Krakusa i Kazimierza** obfitują w najsilniejszą solankę jodo-bromową (chlorku sodu 23,00, jodku sodu 0,049, broniku sodu 0,078 na 1000 wody).

Wydatność dzienna źródeł około 36,000 litrów.

Wskazania główne: **Scrophulosis, Tuberculosis localis, Lues choroby kobiece, Rachitis i t. d.**, wogóle wszystkie stany w których czy to ogólnie, czy miejscowo, rozcodzi się o przyspieszenie wymiany materii.

Urządzenia kąpielowe bardzo wygodne,

z zastosowaniem najnowszej wiedzy technicznej, pod względem sanitarnym bez zarzutu, kąpiele solankowe, borowinowe, hydroterapia, massage, okłady i kąpiele częściowe, mułowe, zakład gimnastyczny i t. d.

Mieszkania w willach w obszernym, 40-morgowym parku rozrzuconych, bardzo wygodne, niektóre z całym komfortem urządzone. Tak park jak i wszystkie mieszkania oświetlone elektrycznie. **Wszystkie domy skanalizowane. Wodociąg wody źródlanej.** Restauracye pierwszorzędne.

Stacya kolejowa, pocztowa i telegraficzna w miejscu. Przy każdym pociągu omnibus zakładowy. Bezpośrednie połączenie kolejowe z Krakowem, Lwowem i Zakopanem (2 godziny jazdy).

Wszelkie zwykłe urządzenia dla wygody i rozrywki kuracyuszów, jak: czytelnia, biblioteka, gry towarzyskie, muzyka zdrojowa, koncerty, reuniony, piękne wycieczki i t. d.

Ceny bardzo umiarkowane.

SÓL MINERALNA RABCZAŃSKA

najsilniejsza pod względem zawartości jodu i bromu, przewyższa wszystkie podobne tak skutecznością, jak i pod względem taniości. Służy do urządzania kąpiei solankowo-jodowych w domu. Do nabycia tylko w oryginalnem opakowaniu w pudełkach à 1 klg. we wszystkich główniejszych aptekach i składach wód mineralnych.

Prospektów i dokładnych informacyi udziela na żądanie

Zarząd Zakładu kąpielowego w Rabce.

Stacya kolei:

Muszyzna-Krynica

z Krakowa 5 $\frac{1}{2}$ godzin
ze Lwowa 11 godzin
z Budapesztu 9 g. jazdy.

KRYNICA

C. K. ZAKŁAD ZDROJOWY
W GALICYI

Pocztą

trzy razy dnia.

Urząd telegraficzny

w mieście.

w Karpatach 600 mtr. n. p. m.

Od stacyi kolejowej Muszyzna-Krynica godzina bitej drogi. Na stacyi wygodne powozy.

Środki lecznicze: Źródło „główny” i „Ślotwinka” oraz „Źródło Józefa” bardzo silnej szczawiy wapienno- i magnezowo-sodowo-żelazistej. Kąpiele mineralne bardzo obfite w kwas węglowy wolny, ogrzewane metodą Schwarza. Nader skuteczne kąpiele borowinowe. Kąpiele gazowe z czystego kwasu węglowego. Skarbowy Zakład hydropatyczny. Kąpiele rzeczne, elektryczne, mięsienie (masaże), leczenie dyetyczne i terenowe. Klimat wzmacniający, podalpejski. Wody mineralne krajowe i wszelkie zagraniczne. Kefir, żentylca, mleko sterylizowane. Gimnastyka lecznicza. Apleka.

Lekarz zakładowy Dr Leon Kopp z Krakowa stale cały sezon ordynujący, nadto 14 lekarzy wolno praktykujących. Mieszkania przeszło 1500 pokoi z całkowiłym komfortem urządzonych w cenie od 1 kor. 10 h. zwyż. Dom zdrojowy z hotelern. Czytelnia, wypożyczalnia książek. Restauracye. Pensjonaty prywatne. Hotele. Cukiernie. Kościół katolicki. Kaplica. Cerkiew. Muzyka zdrojowa stała (dyrektor A. Wronski). Stary teatr, koncerty, bale, wycieczki towarzyskie, place gry do lawn-tennis. Spacer w uroczyskach okolic Karpacza. Rozległy park szpilkowy wzorowo urządzony, koło 100 morgów obszaru. Frekwencya w 1904 r. 6352 osób. Sezon od 15. maja do 10. października. W maju, czerwcu i wrześniu ceny kąpeli i pomieszek w domach skarbowych o 25% niższe. W lipcu i sierpniu nie udziela się ubogim żadnych ulg, jak uwolnienie od łask kuracyjnych i t. p.

Rozsyłka wód mineralnych krynickich od kwietnia do listopada. Składy we wszystkich większych miastach w kraju i za granicą.

Blizszych wyjaśnień udziela, na żądanie broszury i prospektu rozsyła

C. K. ZARZĄD ZDROJOWY W KRYNICY.

**ZAKŁAD
WODOLECZNICZY
DRA J. KOŁĄCZKOWSKIEGO
W SZCZAWNICY**

Cały rok otwarty. Cały rok otwarty.

W pensjonacie opłaca jedna osoba od 9 kor. za wszystko,

Kuchnia wyborna i zdrowa.

Własne gospodarstwo dostarcza mleka i t. p.

Hydroterapię, masaż i elektryzowanie stosuje się przy picciu wody mineralnej.

UWAGA: Umysłowo chorych i zakaźnymi chorobami dotkniętych nie przyjmuje się.

Rządowo



uprawniona

FABRYKA WÓD MINERALNYCH

SZTUCZNYCH I SPECYALNYCH LECZNICZYCH

odznaczona 11 medalami i dypl. honor.

POD FIRMĄ

K. RZĄCA I CHMURSKI

w Krakowie, ul. św. Gertrudy 4, Telefon 227

WYRABIA

pod kontrolą Komisji przemysłowej Towarzystwa Lek. krak.
przez Towarzystwo lekarskie polecone

a) Wody mineralne naśladowane:

na wzór	Selterskiej	flaszka $\frac{3}{4}$ l.	32 h.
»	Bilińskiej	» $\frac{3}{4}$ l.	30 »
»	Gieshüblerskiej	$\frac{1}{1}$ l. 35 h., $\frac{3}{4}$ l. 30 h., $\frac{1}{2}$ l.	25 »
»	Vichy, Grand-Grille, Celestins i Hôpital	$\frac{1}{1}$ l. 80 h., $\frac{1}{2}$ l.	50 »
»	Maryenbadzkiej, Ferdinands- i Kreutzbrunn	flaszka $\frac{3}{4}$ l.	40 »
»	Kissingen Rakoczy	flaszka $\frac{3}{4}$ l.	40 »
»	Homburg (Elźbiety)	duża fl. $\frac{1}{1}$ l. 80 h., mała flaszka $\frac{1}{2}$ l.	40 »

b) Wody specjalne lecznicze:

Woda litowa	flaszka obj. 350 cm ³	30 h.
» jodowa	» 500 cm ³	40 »
» z pyrofosfor. żelazowym	mocniejsza 350 cm ³	50 »
» » »	słabsza 350 cm ³	44 »
» bromowa	mocniejsza obj. 500 cm ³	56 »
» » »	słabsza obj. 500 cm ³	40 »
» sodowa kwaśna	mocniejsza i słab. obj. 500 cm ³	30 »
» » »	hygieniczna obj. 500 cm ³	25 »

Do nabycia w aptekach i drogueryach.

Broszury z podaniem składu chemicznego przesyła się
na żądanie franco.

WODY MINERALNE LECZNICZE

według przepisu

Prof. D-ra W. JAWORSKIEGO w Krakowie

(Przegląd Lekarski 1902. Klinisch-Therapeutische Wochenschrift 1902)

WYRABIA

Rządowo uprawniona fabryka

K. RZĄCY I CHMURSKIEGO

w Krakowie, ul. św. Gertrudy 4, Telefon 227

a) Wody mineralne:

Nr.	Woda lecznicza	h.	Nr.	Woda lecznicza	h.
	fl. $\frac{3}{4}$ l.			fl. $\frac{3}{4}$ l.	
I	Normalna	40	X	Wapniowa	40
II	Alkaliczna słab.	30	XI	Litowa	50
III	» mocn.	35	XII	Jodowa słabsza . .	50
IV	Słona słabsza . .	35	XIII	» mocn. $\frac{1}{2}$ l.	50
V	» mocniejsza	40	XIV	Bromowa sł. $\frac{3}{4}$ l.	40
VI	Alkaliczno-słona .	30	XV	» m. $\frac{1}{2}$ l.	40
VII	Glauberska mocn.	40	XVI	Żelazista $\frac{3}{4}$ l. . .	40
VIII	» słab. .	30	XVII	Arsenawa $\frac{1}{2}$ l. . .	50
IX	Magnowa	40	XVIII	Arseno-żelazista fl.	
				$\frac{1}{2}$ ltr.	50

b) Wody organiczne lecznicze:

Aqua alcalina effervescens (rosea)	fortior	10 h.
» » »	mitior	40 »
» Calcinata »	fortior	60 »
» » »	mitior	40 »
» Magnesiae carb. effervescens	40 »

Broszury, podające skład i terapeutyczne stosowanie tychże wód, przesyłamy na żądanie franco.



LABORATORYUM LEKARSKO-CHEMICZNE

Med. i fil. Dra M. SEŃKOWSKIEGO

Docenta chemii Uniw. Jagiell. i chemika sąd.

w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 4
Dom Towarzystwa lekarskiego, Telefon 524.

przeprowadza na żądanie P. T. Kolegów wszelkie rozbiory chemiczne mikroskopowe i bakteryologiczne (także na zwierzętach) służące do celów dyagnostyki lekarskiej.

W razie potrzeby wskazówki dyagnostyczne i terapeutyczne, o ile one stoją w związku z badaniem chemicznem, dyskretnie do wiadomości lekarza.

Badanie środków spożywczych, tajemnych leków, trucizn i t. d.

LABORATORYUM CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNE

EUGENIUSZA MATULI
RADOMYŚL (KOŁO TARNOWA)

Poleca WP. Lekarzom wyroby własne od szeregu lat zastosowywane w lecznictwie, jakoto:

„Sapomenthol“ Matula

używany zewnętrznie do nacierania, znakomicie działający w cierpieniach reumatycznych stawów i mięśni gośćcowych, nerwobólach, po złamaniach i t. p. Wypróbowany na klinice Wiedeńskiej. Literatura Medic. Blätter 45/904. Setki atestów lekarskich. Do nabycia w aptekach po cenie 1 kor. 40 h. i 5 kor.


„Stomachin“ (Cognac chinae)

w zaburzeniach żołądkowych, ułatwia trawienie, wzmacnia, zwiększa apetyt. Przy hyperem. gravid. zbaw. działa. Cena kor. 2 i 4 za flaszkę.

„Ferrophosphat“ Matula

identyczny w działalności z Syr. Fellova, dra Eggera i t. p. W przypadkach niedokrewności, w cierp. narządu nerwow. krzywicy, neurastenii, nieoceniony. Wydaje się jedynie w aptekach na przepis lekarza. Cena za flakon koron 2.

Celem uniknięcia naśladownictw, uprasza się przepisując, używać formułki: ORIGINAL MATULA.



DR. MED.


Antoni Jaworowicz

z Poznania ul. Szylera Nr. 1

ordynuje jako lekarz kąpielowy

w Bad Nauheim

OD MAJA DO KOŃCA WRZEŚNIA.



ZAKŁAD ORTOPEDYCZNY

© **Dra A. GABRYSZEWSKIEGO** ©

Docenta chirurgii Uniwersytetu lwowskiego

LWÓW, PL. MARYACKI 10

otwarty od godziny 3—6 popoł.

zaopatrzone we wszystkie najważniejsze przyrządy gimnastyczne szwedzkie (wykonane w Stockholmie) przyrządy do uruchomienia kręgosłupa (Knoke Dresslera w Dreźnie), wahadłowe i t. d.

Leczy się garby i skrzywienia kręgosłupa (scoliosis), zwichnięcia biodrowe wrodzone, krzywe kolana i stopy, zeszczywnienia i przykurczenia stawów, złamania, zwichnięcia i t. d. masażem, gimnastyką oraz odpowiednimi
przyrządami.

**Wyrób gorsetów i aparatów
ortopedycznych.**

Dra TARNAWSKIEGO

Fizykalno-dyetyetyczna

KLIMATYCZNA LECZNICA

w Kossowie (za Kołomyją)

otwarta od 1-go maja do końca października.

Kossów, leży w południowo-wschodnich Karpatach, osłonięty górami, wolny od wiatrów na wysokości 400 m. n. p. m. Odznacza się największą ilością dni pogodnych, małymi opadami atmosferycznymi (600 mltr.) i najwyższą ciepłotą w Galicyi. (Przeciętna roczna do 9⁰ Cels.).

→·→ Wskazania lecznicze: ·←←


Cierpienia nerwowe, trawienia, niedokrewność i skazy krwi: moczanowa, zimnicza, żółzowa, także skaza kiłowa. Łżejsze płucne cierpienia natury pobudliwej, oraz choroby ginekologiczne. Ozdrowieńcy i młodzież o słabym rozwoju mają tu warunki do wzmocnienia i nauczania się higienicznego życia. Nie przyjmuje się gruźlicy rozwiniętej, chorób umysłowych ani padaczki.

POMIESZCZENIE NA 80 OSÓB.

Nowa łazienka wzorowa. Droga z Kołomyi 4 mile, krótsza 3 mile ze stacyi Zabłotów fiakrem.

Najlepiej rannym pociągim ze Lwowa, w południe jest w Zabłotowie. Nocą do zakładu przyjeżdżać nie można, ani też bez upewnienia się o miejsce, aby uniknąć zawodu, gdy niema wolnych pokoi. Wskazanem jest nadesłać szkic cierpienia i w razie przyjęcia zadatek dla pewności.

Informacye w prospekcie, który zarząd posyła.



SANATORYUM Dra DŁUSKIEGO

W ZAKOPANEM

DLA CHORYCH PIERSIOWYCH

Otwarte przez cały rok. Wspaniały widok na Tatry. Wystawa wszystkich okien na południe. Obszerne leżalnie dla leczenia klimatycznego.

Wzorowe urządzenia pod względem higieny:

Oświetlenie elektryczne. Kanalizacja. Ogrzewanie centralne parą. Wodociągi zimnej i ciepłej wody na wszystkich piętrach. Kąpiele i natryski. KAMERA odkażająca.

CENY:

Utrzymanie (6 posiłków dziennie) wraz ze światłem, opałem, kąpielami, opieką lekarską oraz wszelkimi zabiegami lekarskimi wynosi 9 koron dziennie.

Pokój od 2-ch koron na dobę.

Powozy na zamówienie do pociągów.

Pocztą, telefon i telegraf w samem Sanatorjum.

DOM ZDROWIA **DLA** **umysłowo chorych**

Dr. KAROLA ŻUŁAWSKIEGO

w Krakowie. ul. Długa 1. 82,

Telefon 159

przyjmuje osoby dotknięte chorobą umysłową, alkoholistów, morfinistów, jakoteż osoby dotknięte wszelkiego rodzaju nerwicami, połączonemi ze zboczeniem umysłu.

Leczenie odpowiednio do postępów nauki, hydro- i elektroterapia w miarę potrzeby.

Dom zdrowia istniejący od 16 lat

urządzony z komfortem

nie ustępuje w niczem pierwszorzędnym zakładom zagranicznym.

Staranna opieka lekarska, wszelkie wygody i towarzyskie życie wśród rodziny są zapewnione.

Ceny wraz z opieką lekarską i zupełnem utrzymaniem od 5 do 10 złr. dziennie

stosownie do umowy i wymagania

Właściciel Zakładu przesyła na żądanie program jakoteż udziela wyjaśnień ustnych i pisemnych.

Prof. Dr. K. Żuławski Dr. Stan Jankowski

kierownik Zakładu.

lekarz zakładowy.



ZAKŁAD ORTOPEDYCZNY

Dra V. CHLUMSKY'EGO

Docenta Uniwersytetu Jagiell.

w Krakowie, ul. Mikołajska 28, I. p.

Telefon 540.



LECZENIE SKRZYWIEN KREGO-
SLUPA I KONCZYN, CHOROB
STAWOWYCH. GIMNASTYKA LE-
===== CZNICZA. MASAŻ. =====

APARATY ZANDEROWSKIE.

WLASNY WYRÓB ORTOPE-
DYCZNYCH PRZYRZĄDÓW.

W SZCZEGÓLNOŚCI WEDŁUG SYSTEMU
HESSINGA. PASKI PRZEPUKLINOWE.

LECZENIE GORĄCEM POWIE-
TRZEM. ELEKTRYZACJA.



MARIENBAD (Czechy)

628 metrów n. p. m., klimat podalpejski, las wysokopienny, położenie osłonięte.

Kreutzbrunn, Ferdinandsbrunn, najsilniejsze zdroje glauberskie w Europie (5 gr. w litrze). Wskazania: Choroby przemiany materii, schorzenia serca (otłuszczenie), wątroby, jelit, zaburzenia w krążeniu i t. d.

Rudolfsquelle, wybitnie wysoka zawartość węglanu wapniowego i magnezowego. Wskazania: Podagra, skaza moczniowa, chroniczny katar miedniczek nerkowych, pęcherza itd. kamienie nerkowe, chroniczny katar jelit i t. d.

Ambrosiusbrunn, najsilniejsza czysta szczawa żelazista (0.177 gr. dwuwęglanu żelazawego w litrze). Wskazania: Anemia, chloroza i t. d.

Waldquelle, przy schorzeniu narządu oddechowego.

Naturalne kąpiele z bezwodnika węglowego rozmaicie stopniowane. Kąpiele borowinowe (75.000 w sezonie). z własnych pokładów borowinowych. Zakład wodoleczniczy. Kąpiele parowe i elektryczne. Instytut balneologiczno-hygieniczny. Instytut Zanderowski. Żętyczarnia centralna.

Frekwencya 26.500. ★ Turystów 75.000.

Prospekty wysyła bezpłatnie magistrat.

Kąpiele SALZBRUNN na Szląsku

407 mtr. ponad p. m.

Stacya kolei Wrocław-Halbstadt.

Pora zdrojowa od 1 maja do początku października.

dawno znane, sławne alkaliczne źródło Oberbrunnen; ogromne obszary w górach położone, powietrze górskie, wielkie zakłady mleczne i żętyczne (wyjałowione mleko, kefir, mleko ośle, owcze, kozie); pneumatyczny gabinet i t. d. wskazany w chorobach gardła, krtani i płuc, w nieżytach żołądka i jelit, w chorobach wątroby. (kamieniach żółciowych), skazie moczniowej (dnie), cukrówe.

W nowo zbudowanym zakładzie kąpiele (z kwasem węglowym i elektryczne), sale do mięsienia, wodolecznictwo; oddział med.-mechaniczny (orygin. Zander), wzięwalnia (Heyer).

Rozsyłka Oberbrunnen przez pp. Furbach i Striebold w »Bad Salzbrunn«.

Książęco-plesska Dyrekcyja w »Bad Salzbrunn«.

Bad Warmbrunn

• • • w Górach Olbrymich • • •

346 m. n. p. m., stacya kolei żelaznej.

6 zdrojów siarczanych. gorących, o temperaturze 25—43° C. Wskazane w reumatyzmie, podagrze, cukrzycy, cierpieniach przewodu pokarmowego, nerek i pęcherza, cierpieniach nerwowych, kobiecych i skórnych. Picie wód i leczenie kąpielami. Kąpiele basenowe, wannowe, tusze, kąpiele borowinowe, z kwasu węglowego, elektryczne.

**Własny zakład wodoleczniczy,
dla masażu i t. d.**

Miejsce klimatyczne u stóp Gór Olbrymich. Wspaniałe promenady, koncerty, reuniony, teatr, lawn-tennis i inne place do zabaw.

Sezon od 1. maja do 1. października.

Prospekty wysyła na żądanie Zarząd kąpielowy w Warmbrunn albo Allgemeine Bäder-Verkehrs-Anstalt in Berlin NW. Neustädtische Kirchstrasse 15.

Wysyłą wód leczniczych z »Nowego« i »Małego źródła« tudzież wody stołowej ze »źródła Ludwika« zajmuje się

Hermann Kunicke w Warmbrunn.

Dr. KAHLBAUM GÖRLITZ

Zakład leczniczy dla chorych nerwo-
wych i umysłowych.

Zakład leczniczy nieprzymusowy dla
chorych nerwowych.

Zakład lekarsko - pedagogiczny dla
nerwowo i umysłowo chorych
w wieku młodzieńczym.


MERAN willa „Stefanie“

Dr. R. Bindera lecznica klimatyczna i fizy-
kalno-dyetetyczna otwarta od 1 września do
końca maja.

Wskazania: Choroby nerwowe, sercowe,
krwi, wymiany materii, stany osłabienia
i rekonwalescencyi. Płucno-chorych - gruźli-
cznych zakład nie przyjmuje. Wielki komfort,
znakomite położenie, kuchnia dyetetyczna,
ceny umiarkowane.

Prospektów i wyjaśnień proszę żądać pod adresem:

Dr. Binder, Meran.




GRIES OBOK BOZEN

UZDROWISKO W POŁUDNIOWYM TYROLU


POBYT OD POCZĄTKU WRZEŚNIA DO KOŃCA MAJA.

I.

SANATORIUM GRIES



wyłącznie dla piersiowo chorych
(kuracya leżeniem na świeżem po-
wietrzu, dyetetyka, inhalacye).



II.

KURHOTEL SONNENHOF

z oddziałem leczniczym (wodole-
czenie, masaż, elektroterapia, ką-
piele z kwasem węglowym i w świe-
tle elektrycznem, dyetetyka, lecze-
nie winogronami) dla ozdowień-
ców i chorych innych kategorii.

Oba zakłady lecznicze otrzymały na mię-
dzynarodowej wystawie uzdrowisk we Wie-
dniu 1903 r. najwyższe nagrody.

LEKARZ KIERUJĄCY:

DR. LUDWIK NAZARKIEWICZ.

Lecznica powszechna **Dra Cezara** **Komorowskiego**

**Sztuczne kąpiele mineralne wszelkiego
rodzaju.**

**Hydroterapia wzmacniająca, nacierania, na-
tryski, kąpiele pełne z polewaniami ręcz-
nemi, półkąpielki.**

Mechanoterapia, masaż, elektroterapia.

**Zbiorowe Inhalatoryum na sposób zagrani-
czny. Pneumatoterapia apar. Waldenburga,
skuteczna w przypadkach rozedmy płuc, nie-
żyty oskrzeli i innych stanach pozapalnych
narządu oddechowego,**

**Wszelkie zabiegi lekarskie wykonywane
przez rutynowane siły pod ścisłą kontrolą
lekarską, lub bezpośrednio przez lekarza
zakładowego.**

Pokoje dla chorych. Zakład otwarty cały rok.

Kraków-Dębniki 112. ul. Pocztowa.

SANATORYUM I ZAKŁAD WODOLECZNICZY

MARYÓWKA

3 klm. od Lwowa, wśród wzgórz i lasów malowniczo
położony, z komfortem urządzony.

Otwarty rok cały.

Środki lecznicze: **Woda** we wszelkiej formie, kąpiele i tusze parowe; **Kąpiele gazowe** CO₂ obojętne lub solankowe; **Kąpiel elektryczna** galwaniczna i faradyczna; **Kąpiele powietrzne i słoneczne.** Okłady mułem „Fango z Bataglii“;

Leczenie dyetetyczne (wzorowa kuchnia).

Leczenie **gimnastyką** w sali odpowiednio urządzonej: **Szkoła chodzenia dla tabetyków** wedle metody Dr. Frenkla z Heiden w sali 17 m. długiej, 5 m. szerokiej. **Leczenie elektrycznością**, prąd galwaniczny, faradyczny i influencyjny. **Masaż faradyczny**, specyfik przeciw atonii przewodu pokarmowego.

Gruźliczych i obłąkanych nie przyjmuje.

Jako były lekarz na klinikach chorób kobiecych Prof. Ehrendorfera w Insbruku, Winckla w Monachium i Chrobaka w Wiedniu przeprowadzam wszelkie kuracje w zakres położnictwa i ginekologii wchodzące.

◀ Na żądanie prospekta. ▶

Pension od 5–10 koron dziennie, zależnie od pokoju.

Lekarz kierujący i właściciel

Dr. Józef Zakrzewski

Lwów 14. Maryówka. Telefon Nr. 572.

Lussinpiccolo

znakomita zimowa stacya klimatyczna słowiańskiej Rivieri

z jednostajnym bardzo łagodnym klimatem wyspiańskim

(23 godzin drogi z Krakowa przez Fiume, Pola, Tryest).

Powietrze w Lussinpiccolo bogate w ozon, wolne od kurzu, wichrów, jest miejscem odpowiedniem dla chorych na gardło, piersi, serce, dla ozdrowieńców, po zakaźnych chorobach, operacyach, dla chorych nerwowych, dla chorych na blednicę, żołądy i t. d.

Pobyty od połowy września do końca maja.

Ceny wszystkie bardzo umiarkowane.

Metoda lecznicza stworzona przez Brehmera, jest klimatyczno-hygieniczno-dyetetyczną z uwzględnieniem **Thalassotherapii.**

Wszelkich wyjaśnień udziela

Dr. Franciszek Wobr (Polak)

zimą w Lussinpiccolo,

latem w Cieplicach Trenczynskich.

Własne inhalatoryum.

MORSZYN

(powiat Stryjski)

== 316 metrów ponad p. m. ==

Stacya kolei żelaznej w miejscu tuż obok zakładu, dziennie czterokrotne połączenie nader wygodne ze Lwowem, Stryjem, Stanisławowem i t. d.

Oprócz słonych źródeł, znakomite słono-gorzkie źródło. Wyrób soli zdrojowej do picia i na kąpiele. Nader skuteczna borowina. Łazienki dla kąpielei solankowych, borowinowych i zabiegów hydropatycznych urządzone z wszelkim komfortem. Mięsienie. Aparat Polano. Zakład położony w rozległym, zdrenowanym parku, okolony zewsząd wysokopiennymi lasami, posiada wodociąg wody źródlanej.

Zakład jest własnością funduszu wdów i sierot po lekarzach w Towarzystwie lekarzy galicyjskich.

Saxlehnera Woda Gorzka

HUNYADI JÁNOS działa
łagodnie,

HUNYADI JÁNOS działa
pewnie,

HUNYADI JÁNOS działa
szybko.

Najlepsza z podobnych wód.

Należy uważać, aby etykieta
prawdziwej wody

„HUNYADI JÁNOS“

miała firmę

„Andreas Saxlehner“



Polecane przez Świetne Towarzystwo
lekarskie krak.

Z pomiędzy dziś znanych przetworów
żelazistych jest najłatwiej strawnym
i nie psującym zębów środkiem

Liquor Mangano Ferri Peptonati

składu 0.60% Fe i 0.10 Mn

WYROBU

Aptekarza D. Matuli w Podgórzu.

Polecany jako środek lekko strawny,
pobudzający apetyt w blednicy, braku
krwi, malaryi, zolzach, w kobiecych
i nerwowych słabościach.

Sposób użycia: Dzieciom do lat 12
daje się 2 razy dnia po łyżce od kawy
z mlekiem; osoby dorosłe używają
2—3 razy dnia po łyżce stołowej.

NA SKŁADZIE W KAŻDEJ WIĘKSZEJ APTECE.

CENA 2 KORONY.

Wyrób krajowy tańszy o 25% od takiegoż nie-
mieckiego Dr. Gude'go w Lipsku.

DWIE FLASZKI WYSYŁAM FRANKO.

Próbki wysyłam na żądanie oplatnie.

„HYGEA“

Wystawa krajowa Lwów 1894. Medal złoty i Medal srebrny Izby Handlowych. O Praga 1896. 2-ga Międzynarodowa Wystawa farmaceutyczna. Dyplom honorowy i medal państwowy.

Chem. farm. Laboratoryum

MARYANA ZAHRADNIKA

APTEKARZA W ZŁOCZOWIE.

POLECA:

KAPSUŁKI LECZNICZE „HYGEA“

*UZNANE przez Tow. lekarskie krakowskie
za NAJLPSZE I NAJTAŃSZE.*

PUDEŁKA ORYGINALNE PO 50 i PO 100 SZTUK.

CENY STAŁE OZNACZONE.

Do nabycia we wszystkich aptekach.

UWAGA: Aby uniknąć droższych, o wątpliwej jakości i dawce wyrobów, upraszam dodawać na receptach „FABR. ZAHRADNIK IN SCAT. ORYG.“, aby tylko moje oryg. wyroby wydawano

M. ZAHRADNIK.



Medal wystawy
LEKARSKO-PRZY-
RODNICZEJ 1900.



WILHELM W. ORNATOWSKI

Z AMERYKI, CHICAGO

Dostawca c. k. kliniki okulistycznej i szpitali.

Fabryka narzędzi chirurgicznych

w Krakowie, ul. Mikołajska l. 10.

Wykonywa narzędzia medyczne, chirurgiczne i elektro-ortopedyczne, własnego pomysłu sznurówki do prostowania wszelkich skrzywień ciała, również wszelkiego rodzaju bandaże, jakoteż pasy brzuszne i pępkowe,

PO BARDZO UMIARKOWANYCH CENACH.

Uskutecznia wszelkie w zakres tego zawodu wchodzące roboty stalowe i metalowe.

Wyrabia: Brzytwy, Nożyczki i Scyzoryki, oraz przyjmuje wszelkie roboty szlifierskie.

OBSTALUNKI WYKONUJE NAJDOKŁADNIEJ, STARANNIE
I PUNKTUALNIE

Ośmielam się nadmienić, że dla wydoskonalenia się w swoim zawodzie praktykowałem i zbierałem doświadczenia poza granicami kraju przez lat kilka, a powróciwszy, oddaję pracę swoją i zapal na usługi WP Profesorów i Lekarzy, jakoteż i Szanownej Publiczności prosząc o poparcie, za które z powierzonej mi pracy choćby najdrobniejszej i najtrudniejszej wywiążę się z sumiennnością i elegancją i w ten sposób zasłużę sobie na dalsze względy.

Alfred Biasion

optyk c. k. kliniki okulist. uniw. jagiell.

w Krakowie, plac Szczepański 1. 1.

Magazyn założony w roku 1801.

Odznaczony 10 medalami złotymi i srebrnymi i Dyplonem honorowym Ministerstwa handlu.

Instrumenta Optyczne, Fizyczne i Matematyczne.

Główny skład na Galicyę
oczków sztucznych ludzkich.

Fabryka narzędzi chirurgicznych, ortopedycznych i bandaży.

Środki Opatrunkowe dla pielęgnowania chorych.

Dzwonki, przyrządy elektryczne, aparaty elektryczne lekarskie.

Pończochy gumowe patent. belgijskie na
żylaki.

CENY ZNIŻONE, KONKURENCYJNE.

EKSPEDYCJA DOKŁADNA.

Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation.

Oddział farmaceutyczny, Berlin S. O. 36.

Lecytyna „Agfa“

Lecytynowe pigułki

Lecytynowe iniekcye

} tonicum nerwowe zawierające fosfor, otrzymane z czystego żółtka.

Bromocoll. Nervinum i anti-epilepticum. Zawiera 20% organicznie połączonego bromu. Bez smaku bez działania ubocznego na żołądek.

Bromocolowe tabletki w paczkach po 50 sztuk à $\frac{1}{2}$ gr.

Bromocoll solubile.

Bromocoll w roztworze 10%,
jako maść 20%,
jako mydło 10%
jako czopki, puder i plaster.

} Stosowany zewnętrznie celem usunięcia świądu w pruritus, prurigo, guzach krwawn., urticaria, lichen ruber, eczema itd.

Chloroform Anschütz. Chemicznie czysty z salicylid-chloroformu. Nie zmienia się w przechowaniu, w oryg. flaszczkach po 25, 50 gr. i $\frac{1}{2}$ kg.

Nowość. Falszki do chloroformu z czapczkami (D. R. P.).

Kroplomierze do tych flaszek. Przystos. do każdej flaszki oryg. chloroform. Anschütza. Praktyczne.

Tanocol. Adstringens jelit bez smaku. Nieszkodli. Działa znakomicie w ostrym i przewlekł. nieżycie jelit.

Tanokolowe tabletki z czekoladą. Nadają się do stosowania w praktyce dziecięcej. W paczkach oryginalnych po 20 tabl. à 2 gr. zawierające $\frac{1}{2}$ gr. tanocolu.

Peruol. Bez barwy i zapachu. zamiast balsamu peruwiańskiego jako antiscabiosum.

Peruolowe mydło 40% Do leczenia następowego i u. chronienia przed świerzbem.

Resorbin. Maść nie drażniąca jako constituents do maści. Kombinować można z wszyst. przetworami. Kosmetyk po oparzeniu i odmrożeniu. Maść chłodząca.

Resorbin-Creme. Znakomity. dobrze przyprawiony kosmetyk w tubach po 25 gr.

Cesorbin z rtęcią szary i czerwony. Zastępuje znakomicie »szaruchę«. Bez zapachu, nie plami. Przetwór zabarwiony na czerwono cynobrem, do dyskretnego stosowania w praktyce kobiecej.

Specyalność. W graduowanych rurkach szklanych à $\frac{15 \text{ i } 30, \quad 25 \text{ i } 50}{33\frac{1}{3}\%, \quad 50\%}$ gr.

Ordynacya: Ad tubam graduatam.

Paczki po 10 tub. Słoje po $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{1}$ kg.

Prospekty, literatura, próbki na żądanie darmo i opłatnie.


Pracownia i skład instrumentów
chirurgicznych, aparatów ortopedycznych i bandaży

POD FIRMĄ:

L. GEORGEON & J. TREPCZYŃSKI

dostawców c. k. klinik i szpitali krajowych

LWÓW, ULICA RUSKA L. 1.



Poleca oprócz innych rzeczy, kleszcze porodowe według oryg. modelu Prof. Dr. Madurowicza, trepany Dr. Kadyja, zasówki Dr. Kozłowskiego, wzierniki według Doc. Dr. Koźmińskiego, kleszcze do gasterostomii Doc. Dr. Hermana.

Również swój na wielką skalę rozwinięty dział wyrobu sprzętów żelaznych lekarskich, jak stołów operacyjnych, szaf żelaznych na instrumenta, umywalni pedałowych, oraz kompletnych wyrobów koniecznych do urządzenia szpitali, sal operacyjnych lub pokoi ordynacyjnych PP. lekarzy.

REIM I SPÓŁKA

Rynek 37, KRAKÓW, Linia A-B.

POLECAJĄ:

Aparaty Soxhleta do sterylizowania mleka.

Flaszki, ssawki i przyrządy do karmienia dzieci.

Ochroniacze piersi i odciągacze pokarmu.

Prześcieradła gumowe dla położnic i dzieci.

Baseny dla chorych i flaszki na urynę.

Poduszki gumowe i chłodniki dla chorych.

Okłady ciepłe dla chorych »Thermophor«.

Pończochy gumowe na żylaki.

WATA BRUNSA. WATA NA WAGĘ.

Hegary, klysopompy, węże do tychże.

APARATY INHALACYJNE.

WSTZYKAWKI. ROZPYLACZE.

Termometry maksymalne dokładne.

SŁUCHAWKI DLA GŁUCHYCH.

Spluwaczki higieniczne wszelkiego rodzaju.

PARYSKIE TOWARY GUMOWE

oraz wszelkie inne artykuły chirurgiczne, higieniczne
i ginekologiczne.

Płaszcz gumowe nieprzemakalne

męskie i damskie.

Kalosze rosyjskie i amerykańskie.

CENNIKI NA ŻĄDANIE DARMO I OPŁATNIE.

Dwutlenek wodoru Mercka 30%.	Perhydrol	znakomity środek odka- żający.
Niedrażniący, stosunkowo nietrujący przetwór na- duercza,	Paranefryna	wskaz: znieczulanie przez wstrzykiwanie.
Znakomity środek do znieczulania miejsco- wego,	Tropakokaina	ulubiony środek do znie- czulania rdzeniowego,
Nowy związek Thiosina- minu,	Fibrolizyna	w wodzie łatwo rozpusz- czalny.
Nie zrównany środek na- senny	Veronal	nie wywołuje ubocznych działań, jak inne środki nasenne.
Gorąco polecany środek przeciwgoścowy	Glycosal	wolny od właściwych kw. salicylowemu i poł. te- goż działań ubocznych.
Znakomicie zastępuje połączenia Bromu	Bromipina	wskaz: Niedomoga ner- wowa, hysterya, pada- czka.
Pochodna morfiny, ła- godna, w wodzie łatwo rozpuszczalna	Dionina	wskaz: Nieżyt oskrzeli i krtani, gruźlica płuc.
Zastępuje znakomicie połącz. Jodu z alk.	Jodipina	wskaz: Zółty, nieżyt oskrzeli, rozedma płuc, kiła trzeciorz., miażd- życa tętnic, rwa kul- szowa.
Znakomity środek do ła- mowania krwawień	Stypticyna	wskaz: Krwotoki mie- siączkowe, krwotoki w latach przechodowych.
Surowica baranów z wy- ciętym grucz. tarczycy- wym	Antityreoidyna Möbiusa	Ulubiony środek w cho- robie Basedova.

Literatura PT. Lekarzom darmo i opłatnie.



Chemiczna fabryka w Darmstadt.

Medal złoty na wystawie w Pradze 1896.

**PIERWSZA KRAJOWA FABRYKA
OPATRUNKÓW CHIRURGICZNYCH**

pod kontrolą Komisji przemysłowej krak. Tow. lekarskiego

M. L. Dobrowolskiego w Podgórzu

POLECA:

Watę Brunsa, watę szpitalną, watę drzewną, watę celulozową, watę białą klejoną w rulonach, włókno drzewne, batyst Billrotha, jedwab i katgut surowe lub preparowane, fil de Florence, kalikot biały i szary, organtynę białą odtłuszczoną i szarą. — Opaski, gazy impregnowane i inne opatrunki używane. — Plastry smarowane własnego wyrobu i amerykańskie. — Pastyłki sublimatowe Prof. Obalińskiego.

**Jedyna fabryka w kraju, posiadająca własną
karderyę waty.**

Laboratorium parowe. — Oświetlenie elektryczne.

**Skład hurtowny materiałów aptecznych
ARTYKUŁÓW GUMOWYCH I CHIRURGICZNYCH.**



Dyplom honorowy jako najwyższe uznanie za wyrób opatrunków, Lwów, 1888 r. — Rok założenia 1887.

Rok założenia 1864.

RUDOLF MANN

dostawca dla szpitali kraj., kasy chor. i kolei państw.

PRACOWNIA BANDAŻY I PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH

Lwów, ul. Teatralna l. 4.

POLECA:

Paski przepuklinowe najnowszych systemów.

Pasy brzuszne pępkowe i laparotomijne.

Bandaże żylakowe, hemoroidalne, pasy dla pań w ciąży i po porodzie.

Suspensorya w przeróżnych gatunkach.

Zbiorniki na mocz dla mężczyzn, kobiet i dzieci.

Gumowe poduszki, worki na lód, prześcieradła gumowe

Pończochy gumowe na żylaki najnowszego systemu bez szwu.

Przyrządy inhalacyjne, hegary, wstrzykawki.

Szczudła, sztuczne nogi, szyny i t. d.

Ogrzewacze żołądka, gąbki ochronne, ochronne daszki do ocz.

Opaski menstrualne Diany.

Gorsety higieniczne Diana.

Prostotrzymacze, gorsety dla ułomnych.

Wszelkie przyrządy do pielęgnowania chorych.

Wata Brunsa i wszelkie przyrządy chirurgiczne.

Skład towarów gumowych i opatrunków chirurgicznych.

PRAWNIE ZASTZEŻONE!

DZIURKOWANE
PASTYLKI SUBLIMATOWE
„ZAHRADNIK“.

Po raz wtóry polecone przez Tow. lek.
krak., tańsze od wyrobów niemieckich.


Wszystkim Wp. Lekarzom, zwłaszcza
Wp. Dyrektorom szpitali, **przychylnym**
przemysłowi krajowemu, polecam moje
pastylki, przewyższające pod względem
łatwej rozpuszczalności i dokładnej ilości
sublimatu, wszystkie niemieckie wyroby.

Proszę przepisywać i żądać tylko:

PASTILLI SUBLIMATI PERFORATI „ZAHRADNIK“

Próbki wysyłam na żądanie opłatnie.

M. Zahradnik.



C. Ash & Sons

Wiedeń I. Spiegelgasse Nr. 2 róg Graben

SKŁAD FABRYKI


Claudius Ash & Sons

W LONDYNIE.

Fabryka sztucznych zębów.

Narzędzia i wszelkie utensilia w zakres
dentystyki wchodzące.

SPECYALNOŚĆ: „Aseptyczne meble“
z metalu i szkła jak szafki, stoliki, eta-
żerki, umywalnie i t. p.



SŁOWNIK LEKARSKI POLSKI

DZIEŁO NIEZBĘDNE
DLA KAŻDEGO LEKARZA POLAKA.

Opracowali z polecenia Tow. lekar. krak.
Prof., Dr. Tadeusz Browicz, Stanisław Ciechanowski, Stanisław Domański, Leon Kryński przy współudziale Towarz. lek. warsz., Wydziału lek. Tow. przyj. nauk w Poznaniu, oraz wielu lekarzy i przyrodn. polskich. Kraków, 1905 Nakładem Tow. lek. krak. Wielka 16-a, stron $\times + 762$.

Cena w Austrii za egzemplarz trwale oprawny 20 koron, z przesyłką pocztową 21 kor. W Niemczech za egzemplarz trwale oprawny 20 Marek, w Warszawie Rbs. 8.50.

Do nabycia w Administracyi
„PRZEGLĄDU LEKARSKIEGO“
Kraków, Wielopole 4.
W Warszawie skład główny w księgarni
E. Wende i Sp.

Komisya słownikowa Tow. lek. krak. uprasza lekarzy polskich o nadsyłanie wszelkich uwag, wniosków, jakoteż materiału słownego na ręce przew. kom. prof. Browicza w Krakowie.

PRZEGLĄD LEKARSKI

wychodzi 45 rok w Krakowie, co tydzień,
w objętości co najmniej 2 arkuszy druku.

Przegląd Lekarski

jest organem Tow. Lek. krakowskiego,
lwowskiego, Tow. lekarzy galicyjskich
i Tow. lekarskiego polskiego w Chicago.

Przegląd Lekarski

zamieszcza: I. Artykuły oryginalne
z klinik i szpitali. II. Oceny i sprawo-
zdania z najnowszych dzieł. III. Wy-
ciagi i streszczenia prac oryginalnych.
IV. Zapiski lecznicze. V. Felieton. VI. Ko-
respondencye. VII. Wiadomości zawo-
dowe i statystyczne. VIII. Bibliografia
i wiadomości bieżące.

Cena prenumeraty wraz z przesyłką po-
cztową kor. 20, marek 16, rubli 7 rocznie.

Przedpłatę nadsyłać najlepiej wprost
do administracyi „Przeglądu Lekar-
skiego“ w Krakowie, lub za pośredni-
ctwem księgarni i urzędów pocztowych.

Roczne zestawienie.

Miesiąc	Przychód		Rozchód	
Styczeń . . .				
Luty				
Marzec . . .				
Kwiecień . .				
Maj				
Czerwiec . .				
Lipiec . . .				
Sierpień . . .				
Wrzesień . .				
Październik .				
Listopad . .				
Grudzień . .				
Razem . . .				

ZAPISKI


tyczące się niektórych wypróbowanych preparatów.

Zastosowanie jako	Preparat	Szczególnie korzystne własności wyróżniające z pomiędzy podobnych preparatów
Antiphtisicum i desiniciens dla jelit Diureticum i antiasthmaticum.	Styracol Diuretinum	Bez smaku. Wydaje 85% gwajakolu. Długotrwałe działanie. Nudności i podrażnienie żołądka bardzo rzadkie.
Antidiarrhoicum Desiniciens dla jelit i tonicum	Tannalbinum Ichthalbinum	Bez smaku, Działa dopiero w jelitach. Bez smaku. Podnieca apetyt.
Preparat smołowy W zastępstwie pyrogallolu	Anthrastol Lenigallol	Bezbarwny. Mniej drażniący skórę. Działanie żrące łagodne niebolesne.
Związek pochodny pyrogallolu Zastępuje jodoform	Eugallol Jodoformogen	Działanie energiczniejsze niż pyrogallolu. Prawie bezwonny, daje się sterylizować.
Związek nukleinowy zawierający żelazo	Triferrinum	Zawiera organicznie związany fosfor. Znoszony przez najslabszy żołądek.
Haemostaticum maciczne Lokalne haemostaticum	Styptol Ferropyrinum	Antiphlogisticum i sedativum. Działanie analgetyczne. Bez działania żrącego.

Literatura i próbki bezpłatnie.

KNOLL & COMP.

= LUDWIGSHAFEN a/Rh =





MATTONIEGO
GISSHÜBLER
naturalna
SZCZAWA
alkaliczna



Zdrowisko znane od wieków jako skuteczne w chorobach dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, w dnie, nieżyście żołądka i pęcherza. Nadaje się szczególnie dla dzieci, rekonwalescentów i w czasie ciąży.


HENRYK MATTONI

c. k. austr. nadworny i kameralny dostawca

Giesshübl-Sauerbrunn

Stacya kolei żelaznej koło Karlsbadu w Czechach.

Wiedeń - Francensbad - Budapeszt.



Mattoniego zakład zdrojowo-kąpielowy

Giesshübl-Sauerbrunn

Stacya kolei żelaznej koło Karlsbadu w Czechach.

Źródło pierwotne Mattoniego szczawy
Giesshüblerskiej.

Leczenie pneumatyczne i zapomocą wziewań.

Dla chorób nerwowych i piersiowych, ozdrowieńców,
w nieżytych, gościu i t. d.

Franzensbad

(Franciszkowe Łaźnie)

ŚWIATOWEJ SŁAWY ZDROJOWISKO BOROWINOWE

Posiada najsilniejsze źródła żelaziste, nie upośledzające trawienia szczawy żelaziste, zdroje alkaliczno-glauberskie, szczawy litowe.

Cztery wielkie państwowe zakłady kąpielowe wyposażone naturalnymi, zamożnymi w kwas węglowy kąpielami żelazistymi, mineralnymi, solankowymi i strumieniowymi. Znane ze skuteczności kąpiele borowinowe, łaźnie parowe i suche, kąpiele elektryczne i świetlne. Zakład lekarsko-techniczny i inhalatorium.

Polecane:

w niedokrwistości, blednicy, żółtacz, gościcu, dnie, niezycie dróg oddechowych, przewodu pokarmowego i narządów moczowych, nawykowem zaparciu, cierpieniach systemu nerwowego, hysteryi, niemocy nerwowej, w cierpieniach kobiecych, wysiękach zapalnych, cierpieniach serca: niedomodze mięśnia sercowego, chronicznem zapaleniu mięśnia sercowego, wadach serca, nerwicach i otłuszczeniu serca.

Największe w Austrii uzdrowisko dla cierpień sercowych.

Sezon od 1-go maja do 20-go września.

PROSPEKTY BEZPŁATNIE.

Wszelkich wyjaśnień udziela zarząd kąpielowy.

Wysyłka znanej ze skuteczności wody litowej

„ŹRÓDŁO NATALII“.

Zakład zdrowo - klimatyczny W SZCZAWNICY

poleca się gorąco
obywatelskiemu poparciu P. T. Lekarzy
z ordynacją wód
ze źródeł

Józefiny, Magdaleny i Stefana
silniejszych od tego rodzaju
szczaw alkaliczno-sodowo-słona-
wych zagranicznych, jak wody
Emskie, Gleichenberskie, a zwa-
szcza Selterska.

Mieszkania zakładowe i pościel po
każdym wyjeździe gościa są pod-
dawane najściślejszej **desynfekcyi**
formalinowej i w parowym aparacie
Thursfielda.

Dzierżawca i zarządca

Feliks Wiśniewski.

Bilińska szczawa rodzima

najznakomitsza ze szczaw alkalicznych

zawiera w 10.000 części: węglanu sodowego 33,1951, siar-
kanu sodowego 6,6679, węglanu wapniowego 3,6312, chlorku
sodowego 3,9842, węglanu magnezowego 1,7478, węglanu
litowego 0,1904, składników stałych 52,5011, kwasu węgło-
wego całkowitego 55,1737, kwasu węglowego wolnego i lu-
źnie związanej 38,7660, temperatura źródeł 10,1—11° C.

Wypróbowane od najdawniejszych czasów źródło
lecnicze w chorobach nerek, pęcherza, żołądka,
w podagrze, nieżytych oskrzelowym, hemoroidach,
cukrzycy i t. d. Znakomity napój dyetetyczny.

Zakład leczniczy Sauerbrunn

urządzony z najwyższym komfortem

wanny, parówki, kąpiele elektryczne i świetlne,
zakład wodoleczniczy całkowicie urządzony.

Lekarz zdrojowy Dr. Wilhelm Reuss.

Inhalatorium: oddzielne gabinety. Rozpylanie plyn-
nów za pomocą zgęszczonego powietrza (Systemem
Clara). Sala do inhalacji lignosulfitem. Komory
pneumatyczne. Masaż.

Pastilles de Bilin

(kołaczyki trawienne Bilińskie)

uznane jako

wybórny środek w zgadze, nieżytach żołądka i w o-
gólności w zaburzeniach trawienia.

Na składzie we wszystkich handlach wód mineralnych,
aptekach i drogueryach.

Dyrekcya zakładu zdrojowego w Bilinie (Czechy).

